


No 2 no Kaman.



PAVLI
ÆGINETÆ
OPERA



1567





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4871/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4871/A/2

A. XIX. 0

4871/A/1

4

2

(1567 года).

Библиотека
Древн. Кн. Е. В. Пр. Н. П.
Ольденбургскаго.



И.О.

2

43

(1567)

Proclamation
of the King
of the North
of the South



21

21


AE G
MEI
A 10 A
Andern
sum
2

Adm
M

42550
PAVLI
AEGINETAE
MEDICI OPERA,

A IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico exercitatisimo
summiq[ue] iudicij conuersa, &
2 illustrata commentarijs.



*Adiectæ sunt Annotationes Iacobi Goupyli
Medici Parisiensis, in aliquot singulo-
rum Librorum Capita.*



VENETIIS,
Apud Hieronymum Scotum.

M D LXVII.

FCO.

9

AFECTIVE

MEDICI OTBRA

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT

CAUSAE CAUTIVIT



AD H

VIRV

CARDIN

10. 671

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi

Medi


Medi

Medi

Medi



AD HONORATISS.
VIRVM IO. BELLAIVM
CARDINALEM ET EPISCOPVM
PARISIENSEM,



IO. GVINTERII ANDERNACI
Medici in Paulum Aeginetam præfatio.



VAM olim Pauli Aeginetæ in-
terpretationem latinam tibi di-
caui, uir honorate, & omni di-
gnitate princeps, eam rursus ma-
iore nunc cura, & fide ad uetusta
exemplaria, ipsiusq; artis ratio-
nem exactam, recognitamq; , ac
breuibus quibusdam commentarijs, illustratam offero:
non dubitans, quin illam eo sis animo excepturus, quo
olim ueluti rudimēta, & prima operum nostrorum exer-
citia solebas. Hoc autem nomine potissimum offero: ut
gregijs tuis in me beneficijs, literata quædam remunera-
tione, ac debita beneuolentiæ memoria gratiam repo-
nam. Tu siquidem iuuentutis nostræ studijs ad optimas
quasq; artes celebrandas, recolendasq; fauere nunquam
destitisti: per te labores nostri, qualescunq; in Græcis me-
dicinæ autoribus suscepti, clarissimo Francorum Regi
Francisco innotuerunt. Vnde mihi non uulgaria præmia,

* 2 & data

& data sunt, & proposita, siue ad opes, siue ad gratiam.
Ergo quicquid à me unquam exactius eruditiusq; proue-
nerit, id omne iure tibi optimo debere me libenter agno-
scam. Cui enim potius aliquis otij sui fructum acceptum
referre poterit, quàm Mecænati suo, & patrono, eiq; eru-
ditione, prudentia, & pietate excellentissimo? sub cuius
etiam nominis celebritate & patrocínio tutior à male-
uolis, & uiligatoribus esse possit. Nam hodie ita com-
paratum est, ut statim ubi quis ingenij sui fœturas ma-
gno partas sudore in publicum ediderit, nonnulli malefe-
riati homines, acutius atque acrius uitia quàm recta ui-
deant: auctori potius, quàm codicum deprauationi ascri-
bentes, quanquam nullius hætenus fuerit philosophiæ,
aut medicinæ interpretes, quem non sæpius aberrasse de-
monstrare possem. Nullus autem labor in disciplinis ue-
teribus instaurandis, magis quidem negotij, & mole-
stiæ plenius, minus autē auctori gloriosius suscipi queat
quàm qui in auctoribus conuertendis insumitur. Id quod
ego annis iam sat multis experior, dum communibus ho-
minum studijs & publicæ utilitati prodesse cogito. Cum
enim olim Lutetiæ medicinam publicè docerem, non pa-
cos obiter Græcorum libros scholæ nostræ quasi latinita-
te donauit, ac in hoc præsertim excudendos permisi: pri-
mum ut amicis aliquot gratificarer, deinde ut habere e-
ueteribus medicis, quos studiosis prælegerem. Eos tame-
libros ex tempore sic potius quàm cura translatos, inte-
rim per interualla reuifere, ac recognoscere decreueram
maius aliquando otium, & meliorum codicū exemplari
nactus, sine quibus nihil posse quemlibet ingeniosum pu-
to. Inter ceteros Paulum quoq; Aeginetam, excellen-
tissimæ medicinæ scriptorem, annis mille desideratum, primus
tegru

egrum latinū facere sum aggressus, ea sanè causa & ra-
tione, ut post ampla illa Galeni theoremata compendio-
sum aliquē authorem scholæ nostræ haberent, ex quo me-
dendi rationē, quam practicē uocant, fideliter condisce-
rent. Paulus siquidem omnes recentiores à Galeno citra
controuersiā compendio, ordine, artificio, perspicuitate,
& doctrina superat. Adde quod multa erudite tractet,
alijs aut intacta, aut etiā incognita. Quid de parte chi-
rurgica dicam? quam ita feliciter & dilucidè persequi-
tur, ut Auicēna ille Arabicæ familiæ princeps non pau-
ca in suum librum mutuare sit dignatus. Porro quod ad
partes meas attinet, in hisce septem Pauli libris pluri-
mum laboris mihi subeundū fuit, tum exemplariū uitio,
quamuis tria contigerint diuersa, tum quod in Chirurgi-
ca uel instrumentorū nomine difficillima, nulli fere Lati-
ni autores habeantur, quos tutò queas imitari. Quippe
is semper mihi in uertendis Græcorū monumentis fuit
animus, ut præter fidem, purè omnia Latine & planè
quoad eius fieri potuit, exprimerem. Quamquam hodie
multos agrestes hircososq; philosophos, si dijs placet, ui-
dere liceat, quos impolita, & rudia magis delectant. Ex
horū numero nonnulli grauiore disciplina exponere ag-
gressi, uocabulis sordidis, & à politiore humanitate alie-
nis fædarunt, contaminaruntq;. Vnde fit, ut qui paulò
humanius educati, institutiq; sint, non reformident illas
adeò sed fugiant, oderint, & despiciant: cum magis refer-
ret egregias mentes, præclaraq; ingenia, sermonis uenu-
state, & elegantia, ad seueriores illas, ut ita dicā, matro-
nas allicere. Quod an nos in hoc opere præstitimus, e-
rum esto iudicium, certe sedulò conati sumus. Vale
clarissime apud Mediomatrices.


✱

3

PAULI



INDEX EORVM
QVAE HOC OPERE
CONTINETVR.



BAPTISMVS	Abscessus rumpentia	290
instrumen	Abscessum generatio	291
tum 435	Notæ	ibid. & 30. 4
Abdominis	Abscessum neruicorum medi-	
interioris	camenta	290
membra-	Abfinthium	479
nę uulne-	Acacalis, Acacia, Acalyphe,	
ra quomodo manu curen-	Acantha, Aegyptia uel arabi-	
tur	ca, Acantha leuce, Acan-	
Abdominis suendi ratio	thium	479
Abies	Acantobolon	382
Abrasa quomodo curēda	Acanthus	470
Abrasa ab inflāmatione quid	Aceratos emplastrū Gal. 619	
tueatur	Acetabulū 510 & 662 & 663	
Abratum	Aceti fax	549
Abscessibus corporis exterioribus conuenientia medica	Acetum	527
menta	Acetum scillites 575. quibus	
In abscessibus qualia corpora	utile	575
inueniri soleant	Achores quid 113. unde orian-	
Abscessui quomō manu scal-	tur ibid. quomodo curen-	
pelloq; sit medendum	tur ibid. & 114.	
Abscessum in pus trāgisse quo	Achras	479
modo deprehendendū	Acidorum uires	265
Abscessus medicamētorū	Acinos herba	470
Abscessus quid	Acini mali punici	536
	Aconitum	470
	Aconiti	

INDEX.

Aconiti poti notæ 356	Reme	menta 328
dia 356		acutus morbus exacte nō exa
Acopa unde dicantur 231 &		cte 713
637 & 67		acutus morbus ibidem
Acopa calefacientia quibus cō		acutus ex decedentia 714
stent, eorum usus, Acopa e-		adarce tantū acrimoniæ & ca-
mollientia quibus conue-		loris habet ut extrinsecus
niant, Acopa quam spissitu		cū aliis imposita urat. 468
dinem habere debeant 637		adeps animalium . 47 & 543.
Acopon à uarietate pœcilon		suillus ibidē caprillus ibidē
dictum 638		anserinus ibidem. gallorum
Acopon azanitæ, Acopon bar		gallarum ibid. leoninus
baricum dia euphorbiu, ad		ibidem. bubulus ibidem. ur
coxendicum dolores, & alia		sinus, uulpinus ibidem uipe
pleraque 640		rinus ibidem
acopon Basilii, ibidem		adeps marinum calidior & sic-
acopon bromion 638		cior quàm fœminarū ibid.
acopō cui nomē est pyxis 636		adeps uetustate calidior reddi-
acopon dysodes ex Gal. 638.		tur 544
aliud ibidem		adglutinamenta 602
acopon ex abiete Gal. 640		adanthum 471 & 832
acopon ex atramēto librario,		adolescētia ætas 671
cutis ruborem peculiariter		adolescens mulier ibid.
inducens, idq; potissimum		ædæon 468
in iis quibus altera capitis		ægilops 771
pars dolet, ex commētariis		ægilops 468
Alexandri 641		ægilops morbus quid. 149 &
acopon ex nigra populo. 640		376 curatio ibidem
& 673		ægirinum oleum 645
acopon lysiponium 639		ægiros 463
acoron 470		ægyptia artaba 63
acorus nostra 322		ægyptia, pessus 662
acrides 479		ægyptia spina sanguinem &
acrium uires 468		alias fluxiones retinet 470
acrochordon 23		ægyptia stomatica 599
acroteriasmos 426		ægyptia terra 483
acrou acraganthus 87		æma 469
acte 470		æquinoctium uernum quid in
aculeos extrahentia medica-		hominibus efficiat 55
		* 4 æquinoctio

INDEX.

Aequinoctio uerno quid faciendum	ibidem	Aethale	467
Aequinoctium uernū dies habet quadraginta sex usque ad uergiliarum ortum ibi.		Aethiopica olea	489
Aequinoctiū autumnale quid in homine efficiat	56	Aethiopis	468
Aequinoctio autumnali quid faciendum, & Ab æquinoctio autumnali dies sunt quadraginta sex ad occasum uergiliarum	ibidem	Aetius Cappadox	272
Aera lolium	469	a etonycho. 468 agallocū	467
Aeræ aquæ quib. cōferunt	24	Agapeti compositio ad podagram. 584	Agaricum 457
Acrem morborū causam esse quomodo cognoscatur.	87	agarici nigri damnum corpori afferentis remedia	362
Aereolus	661	agarici uires. 558	Dandi modus & pondus. ibidem.
Aer intemperatus contrariæ temperiei confert	22	le deligendū, ageraton	467
Aeris flos mixtus collyrijs palpebrarum & asperitates & ficus exierit. 552	quomodo coqui debeat	649	ageratus
Aer optimus. 22	Semper prodest, & Aer temperatus corporibus utilis	ibid.	agglutinamenta
Aer uitiosus ibidem. semper nocet ibidem : quomodo emendandus	87	agglutinamēta oculorum qui defluxionib. infestātur	612
Aerugo 498	quomodo coquenda	653	agnus
Aes combustū ad cicatricem ulceribus obducendam in sicccioribus corporibus præstantissimum est. 552	quomodo coquendum	662	agninus sanguis
Aestate quæ uictus ratio conueniat	25	agrestis	467
Aetatum omniū uictus ratio	6	Agrioscordon	540
		aima 469	aizoon 466
		alabastrites	517
		alana terra	486
		alæ quomodo adurantur	393
		alauda. 510	albus cygnus 664
		albugines oculorum quomodo curentur	154
		album diarodon	609
		alexa. 471	alcibiadion 496
		alcibiadios anchusa	467
		alcyonium	475
		alexandri cyphoides	582
		alexandri purgatio ex Rhodomelite confecta	562
		alexandri acopon ex atramento librario	637
		alica	43
		alimenta quæ laudatiss.	40
		alimentum facultates	ibidem
			alimon

INDEX.

alimon	471	aluus quomodo emolliēda	54
allium	42 & 540	alui deiectiones quid præfa-	
alme	471	giant 74 uide deiectio.	
aloe	ibidem	aluo astrictæ quomodo me-	
aloe quibus danda	556	dum	213
aloen exhibēdi tempus & mo-		aluus quomodo subducenda	
du	ibidem	sanis	20
aloe quomodo coquenda	654	alui fluxionibus maxime bi-	
aloe sola inter medicamenta		lios medetur lac coctū in	
purgantia stomacho con-		quod demissi sunt igniti ma-	
ducit	557	rini calculi 49 & intestino-	
alopex	472	rum torminibus	49
alopecia unde dicta	107	alui astrictæ citæ & cruentæ	
alopeciæ remedia	108	in febribus causæ & cura-	
alopecia & ophiasis quomodo		tio	103
differant	107	alypon	472
alos achne	472	alypi feminis uires, quantitas	
alos anthos	ibidem	& dandi modus	559
alphitidon	431	alysson	472
alporum generatio 281 cura-		alyssi uires & utendi mo-	
ratio	ibidem	dus	559
alphi albi unde ducant origi-		amantium notæ 135, cura-	
nem	ibidem	tio	ibidem
alphi nigri unde generantur		amaracinum oleum	643
ibidem		amaracus	472
als	470	amarantus	472 & 490
alsine	473 & 523	amarorum uires	465
altercum	549	amaurosis oculorum	158
alterci assumpti notæ 354. Re-		ammanitæ fungi	43
media	ibidem	amazonum pastillus	589
althæa	471	ambrosia ad febres arcendas	
alumen 543. quomodo co-		apta	638
quendum	646	ambrosia	472
aluminatæ aquæ ad quid con-		ambustorum medicamenta	
ducant	24		284
aluus quomodo subducen-		ambustis quomodo pili renā-	
da	12	scantur	285
aluus pueris quomodo cien-		ami	472
da	405	amiantum	ibidem
		amithaonis	

INDEX

amirahonis empl.	619	andrachme	474
ammos	473	andronius pastillus	590
ammoniacum quomodo co- quendum	615	androsæmon, androsarces	474
ammoniacum thymiama, am- moniacū suffimen, ammo- niaci gutta	473	anemomæ	ibidem
ammoniæ suffiminis, pon- dus. modus utendi, atque uirres	560	anethine malagma	636
amomum	474	anethinum oleum	643
amores	431	anethum	474
ampelos melæna, & ampelos leuce	473	anethinum olea incoctū, dolo- re lenit & somniferū est	92
ampelos agria	473	aneurisma quid 3: 6. Eius cau- sæ 87. Notæ ibid. curatio,	
ampelos hemeros	ibid.	angina eiusq; species, & cura- tio	173
ampeloprasum	473	anguis senectæ	485
ampelitis terra	485	anicetos empl.	619
amphisbenæ morsus curatio	344	ani inflammationis curatio	233
amigdalinum oleum	643	ani erysipelata quomodo cure- tur	ibidem
amygdalinum metopion ibid.		ani dolorem mitigantia	234
amygdala, dulcia, amara 43 & 475		ani excrementia quomodo cu- randa	ibidem & 235
amylum	43	ani ulcera pascendo serpentia quomodo sananda	232
amylon, & amurca	373	ani rimas curantia ibid. &	234
ambrochismus in quibus & quomodo fiat.	272	ani cōdylomata quomodo cu- randa	234
anagallis, & anagyrus	475	ani cōdylomata, tubercula & rimæ quomodo manu cu- rentur	424
anarrhinon	475	ani fistularum curatio manu administrata	420
ancylosis quid & quomodo cu- randa	326	ani non perforati curatio	423
anaphorici	178	ani ulcera humida quomodo curanda	232
anas	46	ani ulcera citra inflammationē oborta quomodo curanda ibid.	
anatis sanguis	469	ani procidentis curatio	235
anchilops eiusq; curatio	149	ani ulcera sicca recentia quo- modo curanda	232
anchusæ quatuor	467	animi	
ancyle, & ancylosis	226		
ancylion, ancyloglosson	380		

INDEX.

animi relaxatio ad probā cor-	apchema. 433	aphace 479
poris educationem pluri-	aphrodes papauer	521
um affert momenti 6	aphronitrum	479
animæ defectus causæ & re-	aphroselenes lapis	517
media 104. & deinceps	aphroditarium	595
animalia pedestria 47	aphrodisiasticon clidon pastil-	
animalia fera siccus, quā do-	lus. 586	aphros. 479
mestica, alimentū exhibet,	aphias curantia 6. & 171	
minusq; excrementiciū 48	apiastrum. 521	apios. 476
animalia uolatilia 46	apium 538.	apiū grandæ 498
animalium partes 47	apium palustre	49
animalium pedestrium car-	apium ictus notæ. 339. Reme-	
nes, & anisum 475	dia, & apium montanū 527	
anodynnon medicamentum ad	apium syluestre 541	
abrafā, flagris cæsa, & articu-	apii dimidii quod ad radicem	
lorum contusiones 286	est utendi modus 559	
anodynō colliriū liquidū 146	apiū quas uires possideat 41	
anonis 475	apochyma 476	
anorexia 192	apochymatis coctio 655	
anseris 46	apochynon 476	
anserinū adeps 542	apollinaris herba 551	
anseris sanguis 469	apomeli 601	
anserū oua 46, anthemis 555	apomeli, ex commētariis phi-	
antheron 597, anthyllis 475	lagrii 601	
antiadas curantia 172	apoplexia quid 135	
antidotum quid 571	apoplexia cui ætati & tēpera-	
antidotum dia hæmaton ex	mēto potissimū accidat 136	
sanguinibus 471 & 469	apoplexiæ signa, & apoplexiæ	
antidotorum differentia 571	caussa apoplexia curatio 136	
antidotum Mitridatis, diastin-	apofyrmata quomodo curan-	
cu 575	da 285	
antidotum philonis 577	apotherapia 8. & 10. & 11	
antidotum, Sotera 578	apothrausis 432	
antidotum Satyriacum 587	appetentia canina quomodo	
antidotum theodoretum 217	curanda 99	
antidotū theriace quomodo	apri iccur 495	
paretur 570. Eius usus 572	aqua 549. nitrosa, bitumino-	
anthirrhinon 475	sa, ibid pluuiialis, ibidem ma-	
antiochi hiera 567	rina 495	
antilium 636	aqua	
antitasis. 438		
aparinx 476		

INDEX.

aqua hydropicis quomodo e-	aqua frigida in febribus putri-
mitatur. 396	dis quando tuto exhibea-
aqua inter cu-	tur, & aqua quæ optima 22
tem. Vide, hydrops, & aquæ	eius notæ 78
aluminatæ ad quid condu-	aquæ areæ quibus cōferāt 24
cant 24. nitrosæ, & falsæ	aquæ frigidæ subito cumula-
ibid. sulfuratæ ibid. bitumi-	tum potæ remedia 362
natæ ibid. ferreæ, & aqua in	aqua uitiosa 22. quomodo
qua ferrū extinctū est 538	corrigenda 23
aqua frigida qñ assumenda 23	aquarum sponte prouenien-
aquam educentia 560. quibus	tiū differentia 24. uires ibi-
conueniant ibid.	arabica spina 469
aquæ rosatæ quam hydrosa-	arabicus lapis 517
tum dicūt, composio 601	arachne, & araneus 476
aquosorum uis 465	araneæ ictus notæ 340 reme-
aquosum ramicē curatū 228	dia, & arbutus 508
aqua frigida quando cum fidu-	aceuthos 476
cia propinanda in febr-	archigenis hiera 566
ibus 83	archigenis medicamentum ad
aquam elicentiā quibus exhi-	uiperarum morsus 344
benda 562	archigenis medicamentum ad
aquæ bituminæ quibus confe-	erosionem mamillarum cū
rant 24	maliginitate 290
aquarum naturalium differen-	archigenis medicamentū ad
tia, & aquæ sulfuratæ qui-	carcinode & cacoethe ulce
bus conferant, & aqua uitio-	ra 300
sa quomodo emēdanda 23	arction. 466 arena 473
aquæ falsæ & nitrosæ quibus	algemon. 152 argemone 476
conferant 24	argæi montis Cappadociæ la-
aquæ ferreæ quibus confe-	pides 517
rant ibidem	argentum uiuum 549
aquæ uitiosæ notæ 22	argenti spuma 516. quomodo
aquæ frigidæ potu coercendi	coquenda 652
phrenitici 127	argenti uiui assumpti notæ &
aquam educentia 220	remedia 361
aquam uitiosam sumpturus	argenti recrementum 490
quæ præmittere debeat 23	arida medicamenta eorumq;
aquosorum uires 464	uariæ differentia. 591 aridū
aqua marina 496	ad xerophthalmiā &c. 609
aquarum naturalium uis 24	ariduna

INDEX.

aridum collyrium Gal. quod		dignoscendi causa	64
oculos tuetur	612	arteriæ post aures in quibus	
aridum dia crocu	612	passionibus incidendæ	365
aridorum mensuræ	663	arteriæ quomodo diuidantur	
arietum testiculi	47	ibidem	
ariobarzanion emplastrū	614	arteriæ asperæ tumor q. bron-	
arifarum	475	cho cele dicitur	387. eius
aristolochia	ibidem	differeñtia duplex ibidem cura-	
aristolochiæ clematidis pon-		tio	388.
us, modus exhibendi & ui-		arteriam humidiorē quæ red-	
res	558	dant	72
aristophanium empl.	620	arteria aspera quomodo inci-	
armenia	45	di debeat	383
armenia empl.	623	ἀσθητική	175
armenia terra	485	arteriotomia	365
armeniacus lapis	517	arthritis quid 258. signa	ibid.
armeniacum	477	arthritidis causæ	257
armenia mala	45	arthritis à podagra quid diffe-	
arnabo	477	rat	258
arnoglossum	477	arthritidis ex sanguineo hu-	
aron	477	more curatio	261
arquatus	225	arthriticis non sanguineis so-	
arsenicum	477	lum, sed pituitosis etiam &	
artaba ægyptia	663	melancholicis in morbi ini-	
artemisiæ	477	tio sanguis mitti debet ibi.	
arteriace ad abscissum uocis		arthritidis ex bile curatio	259
sonum & eius claritatem fa-		articularius morbus uide ar-	
ciens	178	thritis.	
arteriace, hypoglossis appel-		articulorum dolor uehemens	
lata, ad abscissionem uo-		quomodo leniendus	ibid.
cis, raucitatem, & ægrè reii-		articuli unde laxentur, articu-	
cientes	ibidem	lorū relaxatorū curatio	377
arteriæ quid	63	articulorum doloribus contra-	
arteriarum usus	ibidem	ctis intenso frigore aut hu-	
arteriarum origo	ibidem	moribus inter ossa articulo-	
arteriæ omnes eodem pulsan-		rum impactis	263
di modo inter se & cum cor-		articulorum topi quomodo	
de conueniunt	ibid.	curandi	264
arteriæ quæ tangendæ pulsus		articulorū topi quid coale-	
		scere	

INDEX.

scere impediāt	263	after pastillus	585
articulorum intortorū & con-		astragalus	479
tusorum remedia	302	astmatici 179. eorū curō ibid.	
articulorum contractio seu li-		astringentium uires	465
gatio quæ ancylosis dicitur		astringentiū ante & post cibū	
quomodo curanda	326	sumptorum facultas	45
articulorum cōtusionum me-		atactos compositio ad poda-	
dicamenta	286	gram	584
articulorum morbis quomo-		atregena	46
do & quæ medicamenta		athanasia Oribasii	577
adhibenda.	262	athema emplastrum	620
articulorū ulcerū curatio	320	athera	469
artos 478 artus sanguine in-		atheroma quid 306. curatio	
festati quomō curētur	264	ibid. & 386	
asarum. 478 asbole 478		atracton. 428 atractylis 479	
ascabotes, & ascarides lum-		atractylis uires	41
brici 331. ubi generentur		atra bilis duplici modo gene-	
ibid causæ & curatio	332	ratur	560
ascyrrhon	478	atram bilem uacuantia medi-	
ascyrrhoides	475	camenta simplicia	560
asclepias	478	atram bilem purgantia medi-	
asclepion chironium	530	camenta quibus & quando	
asclepion panaces	ibid.	exhibenda	560
asclepios smegma aridū	594	atramentum indicum	520
aselli. 459 asiae petrae flos	517	atramentum scriptorium	520
asini 527 asininum lac	482	atramenrum sutorium 552. c.	
asininū iecur. 495 aspaltus	479	20. 4. quomodo coquen-	
aspalatus. 478 asparagus	479	dum	654
asparagorum differentia & ui-		atriplex	479
res 479 asphodelus	42	atrophia oculorum	156
aspera arteria quomodo inci-		attenuantium alimentorum	
di debeat	383	uires	40
aspidis morsus notæ 346. cu-		auditum grauē corrigentia	14
tio	347	auditum grauē curatia	161
aspidis tria genera	346	auditus grauis quomodo cu-	
aspidis exuuium	485	randus	163
asplenon, astaphis, aster atti-		auditorii meatus non perfora-	
cus	478	ti causa & curatio	377
aster magni	610	auellana 45 auena 43	
		quenæ	

INDEX

avenæ decoctio.	43	aves	46	B	
aures animalium	47	Bacca prunorum	sylue-		
auricula muris	472	strium	507		
auriū sordes extrahentia	161	Baccharis	480		
aurium dolor quas causas ha-		Baion malagma	634		
beat & quomodo curari de-		Balaninon oleum	649		
beat. 159. & deinde per to-		Balanus myrepica	480		
tum caput.		Balaustium,	Balenæ	50	
auribus incidentia quomodo		Ballote.	480	Balnea alumi-	
extrahantur.	163	noſa quibus conferant	24		
auribus incidentia quomodo		Balnea ærea quib. cōferat ibi.			
modo extrahantur.	378	Balnea bituminata quibus cō-			
aurium sonitus quomodo cu-		ferant	ibid.		
randus	163	Balnea ferrea quibus confe-			
auriū uermes quomodo cu-		rant	ibidem		
randi, aurium cruorem fun-		Balnea ſalfa & nitroſa quibus			
dentium remedia, aurium		conferant	24		
ulcera diuturna quæ ſa-		Balnea ſulfurata quibus con-			
nent	162	ferant	ibidem		
aurium tinnitus quomodo e-		Balnei aquæ dulcis calidi uti-			
mendandus	163	litates	ibidem		
auriū humiditates deſiccātia	5	Balneorum naturalium diſſe-			
auris contuſæ curatio	422	rentiæ	ibidem		
aurium pus curantia	161	Balneorum ſordes	485		
aurium caro excreſcens quo-		Balsamum	480		
modo arcenda	162	Barbara, emplaſtrum	620		
aurium ulceribus cum inflam-		Barbaricum acopon, dia eu-			
matione quid faciendū ibi.		phorbiu	639		
aurium curta quomodo ſar-		Barbe alopeciiſ efficax reme-			
cienda	379	dium.	151		
aurium contuſio quomodo cu-		Baſiliſci morſus notæ	347		
randa	163	Baſilicum tetrapharmacū	614		
auripigmenti aſſumpti notæ		Baſilii acopon	639		
361. remedia	ibid.	Baſſi hygra adhypopios	153		
auripigmentum 479. quomo-		Batina mora	599		
do coquendum	649	Batrachi	Bdellium	480	
autumno quæ uictus ratio con-		Bdellii pondus, & modus uten-			
ueniat	25	di	560		
auulſorum remedia	203	Bdelliū quomō coquendū	651		
		Bechicon			

INDEX.

Bechicon	178	curetur	458
Bechicon ex styrace ad tussim		Brachii confracti curatio	443
577		Brassicę marine facultates	41
Bechium 481	Belulcum 428	Brassica marina	476
Besafa. 524	Beta 545	Brassicę facultates	41
Betę uires. 41	Betonica 481	Brathy. 485	Brion 482
Bilis atra duplici modo gene-		Britānica Bromiō acopō	624
ratur	272	Bromus 482, Bronchion	182
Bilis uomitioni quomodo oc-		Bronchus	175
currendum	101	Bronchocele	387
Bilem atram uacuantia medi-		Bryonia	483
camenta simplicia	560	Bryō thalassion, Buboniū	482
Bilem atram purgantia medi-		Bubo quid 96. Curatio ibid.	
camenta quibus & quando		βουβονομήλη	227
exhibenda	ibid. & 560	Bubulum lac	483
Bilem flauam educētia, quan-		Bubula caro	47
do & quibus exhibēda	560	Bubulum stercus	262
Bilem flauam purgantia medi-		Bubulum stercus	508
camenta simplicia 556. &		Bubulus talus	528
sequentibus		Bubulus adeps	542
Biliofis alui fluxionibus me-		Bucellatus purgans	561
detur lac coctum in quod		Buccina	50 & 505
calculi marini igniti deco-		Buglossum. 482	Bulbus 481
cti sunt 49 & intestinorum		Bulbus agrestis	357
torminibus	ibidem	Bulbi	42
Bithynus pastillus	591	Bulimos quomodo curet	99
Bitumen	48	Bunium, Buphtalmon	482
Bituminatę aquę quibus con-		Buprestis assumptę notę	352
ferant	24	Curatio, Buprestis	482
Bitumē quomō coquēdū	650	Butyrum	482
Blatta quę in pistrinis inueni-			
tur	539		
Blepharoxiston	150		
Blitum. 481	Bliti uires 41		
Boleti. 43	βομβύλια 124		
Botanicum emplastrum	611		
Botryon. 152	Botrys 583		
Bouis femora cremata	529		
Brachitis luxatio quomodo			

C

Acalia	500
Cachexia quid 218. eius	
curatio, Cactus arbor	541
Cacoethe ulcera	315
Cactos. 302	Cadmia 500. quo
modo coquenda	653
Cæcitude nocturna quid &	
quomodo curetur	156
Cæli	

I N D E X.

Cæsi flagris quomodo curan di 285, & 86	Calidioris temperaturæ no- tæ, Calidi & humidi tempe- ramenti notæ
Calamagrostis 500	29
Calamus, & Calaminta 500	Caliginem oculorum prohi- bentia 14
Calcanei ex longo decubitu attritus quomodo curandi 268	Callus quid 419
Calcaneorum & plani pedū scissuræ quomodo curandæ ibi.	Callos excidentia 318
Calciamentorum ueterū co- ria 488	Caluariæ fractæ curatio 43
Calx, & Calcis assumptæ no- tæ 361. remedia 549	Caluitium unde fiat 107
Calculorum in renibus no- tæ 207	Caluitii curatio 107. & 109
Calculi ne creentur 208	Camarosis 432
Calculorum materia 207	Cameli cerebrum 489
Calculi tussi eiekti 175	Campe. 500 Cancamum 599
Calculorum causæ 107	Cancanus ibidem
Calculi in uesica notæ 404	Cancer in quib. corporis par- tibus oriri soleat 299 Cau- sæ ibidem. Signa 300. Cura- tio 299
Calculorum in renibus cura- tio 207	Cancer in fœminarum mam- mis cur potissimum acci- dat 299
Calculi uesicæ quomodo ex- cindendi 404	Cancer latens 394
Calculus quibus excinditur, qui facile curationem reci- pianc ibidem	Cancer unde appelletur 300
Calculos quatuor aut quinq; asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarū trium, aut quatuor expuit quidam 182	Cancer cur planè non confa- nescat, & Cancer quid 272.
Calculus per anum in tenes- mo excretus 198	Incurabilis, & Cancer quo- modo præcauendus 300
Calculi in sanguinis reiectio- ne excreti 175	Cancer quibus partibus cor- poris accidat 394
Calida intemperies quomo- do corrigatur 36	Cancer quid 394. unde dica- tur, ibidem. Eius curatio ma- nu adhibita ibid.
Calidi & sicci temperamenti notæ 29	Cancri 50. & 501
	Canus non rabiosi morsus re- media 339
	Canis qui momordit rabio- sus sit an non, qua ratione cognoscas. 317 Canis rabidi morsum symptomata 336
	* * Caninus

I N D E X.

Caninus appetitus quomo-	bona, quæ mala	30
do curandus		99
Canis rabidi iecur	capitis morbos quæ signa præ-	495
Canis rabidi signa	cedant	13
canum stercus	capitis ulcera manantia unde	336
canes rabiūt plerunq; in æstu	fiant 113. quomodo curen-	508
uehementiore	tur	ibidem, & 114
canis rabiosi morsuum reme-	capitis exanthemata quomo-	336
dia. 338	do curentur	114
cannabis	capitis morborum signis ne-	509
canopus. 561	glectis quæ ægritudines se-	500
canopon	quantur	54
cātharidis assumptæ signa 352	capitis morborum signa ubi	
curatio, cantharides	apparuerint quid faciendum	
capillus qua ratione aureus	ibidem	
reddatur	capitis faui unde nascantur &	111
capitis dolor ex insolatu con-	quomodo curentur	113
tractus quibus notis digno-	capitis formatio	30
scatur	capitis pediculi quomodo abi-	115
capitis dolor ex insolatu con-	gendi	114
tractus quō curetur, capitis	capito piscis	49
dolorem ex frigida intempe-	capnistos pastillus	178
rie notantia, & curantia, ca-	capnion, & capnos	500
pititis dolorem ex bilioso hu-	capparis	41 & 501
more curantia	caprarum sanguis	470
caput cōfortij lege indolefcēs	caprarum syluestrium sanguis	
quomodo curetur, capitis do-	ibidem	
lor ex uino quō cureter	caprillus fimus	262
capitis dolor ex ictu quomo-	caprillum stercus	508
do curetur, capitis psydracia	caprillus adeps	542
quomodo curetur	caprilla caro	47
capitis dolorem ex calida in-	caprillum lac	482
temperie curantia	caprillum cornu	503
capitis dolor unde oriatur	caprillum iecur	495
ibidem	caput adurendi modus	263
capitis ulcuscula densa, rubra-	caput quomodo aduratur in	
que quomodo curanda	lippiantibus ægre spiranti-	113
capita 504	bus, & elephanticis	363
Menarū ibid. Sma-	caput per os & nares quibus	
ridis ibid. Muris ibid. Milui	medicamentis euacuaudū 21	
ibidem. Lacertæ	carbunculus	
ibidem		
capitis quantitas & figura que		

I N D E X.

carbuuculus quid. 298	causæ	caseus oxygalastinus	545
ibid. Notæ ibid. curatio	ibid.	caseosum lactis	483
carbunculus	287	castamum	502
carbunculus oculorum	155	castia, & castanea	46
carcinoma oculorum	ibidem	castorium	502
cardamine	539	catagmaticæ Oribasii 625. ex	
cardamomum	501	cōmentariis Heracleti	ibid.
cardamum	501	catalepsis	125
cardiogmos. 127	carduus 541	cataphora quid	72
cari radix. 42	caricæ 44	cataphoræ curatio	93
cari species. 23	caris 501	cataphora quid 53. causæ ibi.	
caries lignorum	537	curatio	ibidem
carnes optimæ quæ	47	cataplasma quod oras uulne-	
carnes uolatilium quomodo		ris latis in rabidi canis mor-	
differant	46	su feruat	328
carnem generantia medica-		cataplasma ad sacrum ignem,	
menta	309	herpetas, & abscessus, paroti-	
carnis contusæ curatio	302	das, & ambusta	295
caro bubula	47	cataplasmata	590
caro ceruina	ibidem	catapotia ex aloë 562. modus	
caro hircina	ibidem	utendi atque pondus ibidem	
caro humana	ibidem	catapotia ex lapide armenico	
caro leporina	ibidem	arthriticis	565
caro ouilla	ibidem	catapotia ad tussim ueterem	
caro suilla	ibidem	accommodata	177
caro thymi salsi	543	catapotia ex xylomacere, dy-	
caros	123	sentericis utilia	585
caros à lethargo quid disse-		catapotia ad destillationem in	
rat	123	fauces & tussim	177
carpesium	502	catapotia Dosithei ad iecur in	
carpesiæ liquoris poti notæ		scripta	583
356. remedia	ibidem	catheter	213
carya	500	catheterismus	402
caryinum oleum	646	catochos	121 & 125
caryophyllon	500	catochi causæ ibid. Signa ibi-	
caseus	49 & 548	dem. curatio	126
caseus laudatior	49	catochi uel catochomeni un-	
caseus acris	ibidem	de dicti. 125	caucalis 503
caseus pessimus	ibidem	cauda equina	493
		*** 2	caulos

INDEX.

Causos febris	81	Ceratoides membrana	150
Cautica. 151	Cecis 504	Ceratum thaidis quo facies	
Cedraa, Cedrus arbor	503	rubescat	198
Cedrus frutex, Ccle, Vide ramex, Cenchros, Cenchri		Ceratum dia turpænes ad po	
morsus notæ	346	dagram dolorem leniens mi	
Curatio, Centaurium	503	rabiliter	628
Centaurii minoris uires	558.	Cerosis quid 415. quomodo	
Pondus ibid Exhibendi mo		fit emendanda	ibid.
du, & Centunculus	486	Cerebrum 490. Leporis ibid.	
Cepa 42. 512	Cepæa 504	Galli ibid. Cameli ibid. Mu	
Cephalæam curas apophleg-		stelæ ibid. Hirundinum ibi.	
matismus	120	Ouillum	ibidem
Cephalæ	504	Cerebri membranæ inflam-	
Cephalææ curatio	118	mationis notæ, causæ & cu-	
Cephalæam curans epithe-		ratio	436
ma	ibidem	Cerebri uulnerati notæ	431
Cephalæam curans unguen-		Cerebri membranæ conuul-	
tum	119	neratæ signa	ibidem
Cephalæa	117	Cerebri mē branæ nigrescens	
Cephalæam curantia medica		quomodo curetur	436
menta daria	119	Cerebri erysipelatis signa &	
Cephalalgia unde oriā	115	curatio	123
Cephalicus puluis, capiti con		Cerebri temperatum notæ	30
ueniens	592	Cerebrum animalium	47
Cera	504	Cerebri inflammationis signa	
Ceræ cum oleo qui modus		& curatio	123
esse debeat in conficiendis		Cerion quid 421. eius cura-	
unguentis	556	tio	ibidem
Cera quomodo coquēda	663	Ceruicis tumorū curatio	388
Ceras 503	Ceramium 660	Cerui, cornu	503
Ceramium Italicum	ibidem	Cerui masculi pudēdum	468
Cerasia	45	Ceruina caro	47
Cerasia 504. dulcia, austera		Cerussæ assumptæ signa	361.
ibid. acida	ibid.	remedia, & Cerusa 555. quo	
Cerasi arboris gummi	ibid.	modo coquenda	646
Cerastis morsus notæ	346	Ceryces, & Cheræfolium	505
Curatio. 347	Ceratium 661	Chalbanæ	554
Ceratonia arbor	504	Chalaziō & eius curatio	150
		Chalcanthon, Chalcitis	554
		Chalcitis	

I N D E X.

Chalcitis quomodo coqui de beat	648	constantini sapo	598
Chalcidica lacerta	539	choriō. 4. 8 chrysanthos	490
Chaleos. 554 Chalcus	661	cyryse emplastrum	628
Chalcuanthos	554	chryfocolla	556
Chalazium quid 373. curatio ibidem		chryfocome	556
Chamæ. 50 Chamæacte 471		hryficus	556
chamædrops	555	chryfos. pessus emolliens	651
chamædrys, chamæleon	554	chus	651
chamælaæ pondus & modus administrandi 558. uires ibi.		cibis in uentre corruptis quid faciendum	15
chamælaæ	556	cibi fastidium prohibentia	1
chamæleuce	554	cibi fastidium eiusque causæ signa & curatio	191. & 192
chamæleontis nigri assumpti notæ 554 curatio ibidem		cibi qui laudatissimi	40
chamæleontis sanguis	469	cibi uarii assumi non debēt	40
chamæmelum	555	cibi fastidium in febribus quo modo curandum	98
chamæmelinon oleum	639	cicadæ	546
chamæpityos pondus & uten di modus	561	cicatrix ulceri quomodo indu cenda	313
camæpitys	555	cicatrices oculorum quomo- do curentur	154
chamæraphanon	561	cicatrices nigræ quomodo tol lendæ	316
chamæsyce, chelidones	555	cicatrices quomodo tingan- tur	154
chelidonia aspidis genus	346	cicer. 44 cicer	491
chelidonium. 555 chema	657	cichorium 506 cici	505
chemosis quid, & quomodo curetur	148	cicinum oleum	645
cherfæa aspidis genus	346	ciconiarum stercus	509
chezananze	565	cicuta	513
chia terra	485	cicutæ potæ notæ 355. reme- dia	ibid.
chiacum collyrion	601	cimex	485
chirurgicæ partes duæ	363	cinara quomodo preparan- da	41
chænix. 657. & 659 cholæ	555	cinerula. 342 cinis	545
cholera quid 195. eius curatio ibidem		cinnabaris, cinnamomū	505
chondrilla	556	cinaræ uires	41
chondrus	556	*** 3 cinocrambe	
chondri coctio	43		

INDEX

cinocrambe	476	cocci gnidiū vires, pondus, &	
circæa	505	sumendi modus	598
circuncisorum curatio	403	coccus baphicos	507
cirsocle. 409	cissaros	coccymelæa	ibidem
cissaris	505	cochlea. 510	cochleæ 50
cissos, & cisthos	506	cochleæ terrestres, cœlia	507
cissimum emplastrum	613	cœliacus affectus	197
cittæ causa	1	colchicon unde dicatur	357
citta grauidarum symptoma		colis glans contexta quomo-	
unde nomen acceperit	2	do aperiatur	401
citream malum	46	colicis dolor in Italia uictus	
citrei mali tres partes	ibidem	ratione temeraria curatus à	
citrium	506	quodam medico	205
citrium malagma	633	colla. 507	colon quid 202
claudiacum dia smyrnon	607	colobomata	379
clauus quid 269. curatio	ibidem	colocyntha, colocynthis	507
clauus quid & unde dicatur		colocinthidis effectus.	557
427. curatio	ibidem	pondus ibidem. exhibēdi mo-	
clauiculæ luxatæ curatio	455	dus ibi. quib. exhibenda ibid.	
clauiculæ cōfractæ curō	441	colicorum remedium	217
clematis, clematis altera	506	colis glans nuda quomodo cō-	
cleonis collyrium	609	tegenda	401
cleopatrar mors	348	colicus morbus quid 202. caus-	
clidion aphrodisiasticon, pastil-		sa ibidem signa ibidem, cura-	
lus	586	tio 203 & deinceps	
clidion oribasii ad dysenteri-		colico & renum dolori quid	
cos, & cœliacos	ibidem	commune, quid propriū 207	
clinopodium	506	colliquamenta corporis quō	
clystere uesticæ	403	curanda 92. & sequentibus	
clysteribus qui uti debeāt 20.		color urinæ aquosus rufus &	
& qualibus	ibidem	biliosus mediocriter palli-	
cneoron quas vires obtineat		dus quid significet	7
560		color malus corporis quomo-	
cnicus	507	do emendandus	13
cnici seminis pondus & sūmen		colpos quid 16. curatio	ibidem
di modus	598	columbarum sanguis	469
coagulum 535. leporinum ibi-		columbarum pullus	46
dem equinū ibid. Phoce ibi.		columbarum syluestrium ster-	
coccus cnidios	507	cus	509
		columella	

I N D E X:

columella 381. curatio ibidem	dat	128		
columellæ inflammatio quomodo curanda	172	comitialis morbus trifariam gignitur, & comitiales quomodo coarguendi	129	
collyrium anodynou	146	comum. § 14	commi 508	
collyrium malabathrinū	611	compositio Procli, podagræ & coxendicum doloribus accommodata	586	
colymbades. 45 collyria	603	compositio dia hermodactilu ad podagram	564	
collyrium ex succo fœniculi	608	compositio dia citriu, quod est ex malo medico, stomacho utilis	563	
collyriū ex opobalsamo	ibid.	compositio dia coronopodiu	565	
collyrium ex aloë	609	compositio rhodostacti	602	
collyrium ex succo fœnugræci, collyrium cleonis	609	compositio Agaperi ad podagram. § 86	compositio atactos ad podagram	ibidem
collyriū crassius ex uino	611	compositio pœonia	583	
collyrium ex duobus lapidibus ad asperitudinem	611	conchulæ Indicæ	527	
collyrium aridum Gal. quod oculos tuetur	ibidem	conchyliæ	507	
collyrium chiacum	604	concoctionis signa nunquam sinistrè apparent	61	
collyrium ex oleæ turionum succo tenerum	606	conditum calculos confringens	584	
collyrium ex decoctis	605	cōdylomata locorū muliebriū 415. quō excidenda	ibidem	
collyrium ex cornu Gale.	608	condylomatū ani curatio manu administrata	423	
collirium monohemeron	604	confecto Rhoetis	609	
collyrium dia hydryas repellens	602	confectio masuchæ	649	
collyrium liquidum ex caualide	609	congius	657. & 658. 659	
collyrium dia crocu	ibidem	cōuulfiones unde oriante	140	
collyrium Ilambonis	607	cōuulfionibus puerorum, mendentia. §	conuulfiones ex inanitione originem ducant an ex repletionem quomodo cognoscendum	141
collyrium è thure	608	* * 4	conuulfionum	
coma. 121 coma uigilans	121			
comatis uigilantis causæ	125			
signa ibid. curatio ibi. &	126			
comaros	508			
comitialis morbi notæ	128			
comitialis morbi causæ	ibid.			
comitialis morbi curatio	129.			
& deinceps, & comitialis morbus cui ferè ætati acci-				

I N D E X:

convulsionum curatio	ibid.	do emendādus, corporis col	
conyza, & copros	508	liquamentorū remedia	92
copron ad duritiem stomachi		cortex piceæ	533
& iocinoris malagma	632	corydallus	510
coracon emplastrum	619	corydos, coryza	175
coria calceamentorum ue-		cos olearia	517
rum. 487		costarum rupturæ & contusio	
corallium	509	nis, notæ & curatio	441
corium, coris herba, cordis		coctus	550
affect' quomoda curādi	188	cotis noxiæ detrimentū	517
cor animalium	47	cotyla. 661 cotyleden	510
coriandrum	510	coxarum dolor ab articulari	
cordis palpitatio	189	morbo quid differat	255
coris animal, coriandri assum		coxarum doloris causæ	ibid.
pti notæ 355. curatio	509	Notæ ibid. curatio	ibid.
corianum	509	coxarum fracturæ, differentia	
cordis temperaturæ notæ	33	notæ, & curatio	442
cornu. 504 caprillum, Hirci-		coxæ luxatæ curatio	464
num ibid. cerui ibid Tauri-		coxendices quō adurātur	419
num, & cornea membrana		crania. 510	crambe 511
oculi	152	crapulam quid discutiāt	51
coronopos	510	cratægonos	511
corpus hominis in quatuor		cremasteres	406
partes diducitur	53	creta sutoria	520
corpus ut bene oleat quomo-		cretica terra	485
do efficiendum, corporis li-		crethmon	511
uores prohibentia	31	crinaton suffimen	649
corpus crassum quomodo ex-		crimnon, & crinon	511
tenuandum	27	crines. 549 crisi instans quo	
corporis habitus quomodo		modo agnoscenda	61
recalfaciendus	13	crisis futura quomodo præn-	
corpus tenue quomodo im-		scenda, & crisis optima pera-	
pleatur	28	cta quomodo agnoscēda	63
corporum intemperatorum		crisis qualis futura sit, quomo-	
notæ	29	do dignoscendum 61. & se-	
corporis temperatissimi no-		quentibus.	
tæ	28	chrite quid eiusq; curō	350
corpus pletoricum	62	critonis smegma	597
corpus quō erugandum	13	crocium dia rhodon	610
corporis malus color quomo-			
			crocium

I N D E X.

Crocinum oleum	648	curei malagma	631
crocides pessus	651	cutis astrictio 10. Eius causæ	
crocides pastillus	589	ibid. Notæ ibid. curatio 11	
crocodili terrestris sâguis	469	cuti senili teneræque conue-	
crocodilorum terrestriû ster-		uientia medicamenta	289
cus	509	cyamos, & cyanos	512
crocodili morsus remedia	340	ciathus. 6 cyclaminus	512
crocodilus terrestris	541	cyclamini radices pondus &	
crocodilon, & crocus	512	modus utendi	662
crocomagmatis cōfectura	648	cyclisti	435
crocomagma quō pareat	588	cydonaton contusum frag-	
cromnion 512. crotones	561	mentis saluis	435
crudis humoribus abundantes		cygnarium, cygnus albus	605
quam curandi rationem de-		cygnus rubens, cyminum	512
derent	89	cynanche, cynosbatos	513
cruenti sputi causæ signa	181	cyphi 645. Eius materia ibid.	
cruentû sputû quō cureat	182	usus ibidem	
crus quō reponi debeat	448	cyphi magnum quod uocant	
crusta generantia medica-		solare ex rebus triginta sex	
menta	322	confectum	648
crystalloides humor oculi	157	cyphi, quod rebus uigintiocto	
cubiti fractura quō curada	447	cōstat, lunare appellatû	649
cubiti luxatio quot modis		cyparissus, & cyperus	513
fiat & quomodo cureat	456	cyphoides Alexandri	582
cucumer. 44 cucumis	539	cyphoides medicamentum ad	
cucumis syluestris	ibid.	iecorosus & pectoris uitia	
cucumeris syluestris radices		582	
torticu pondus	560	cypros. 513 cytinus	537
cucurbitulas admouendi mo-		cyprinum oleum ex commen-	
cus. 391. & deinceps		tarius Posidonii	643
cucurbita syluestris	507	cyprinum aliud, cytisus	513
cucurbita. 44 cucurbita	507	D	
cucurbitularum usus	391	Damascena	46
cucurbitula leuis quid effi-		Damascena	507
ciat	391	Damascena, Damasoniû	487
cucurbitula cum scarificatio-		Daphne, & Daphne herba ibi.	
ne ad quid præstet	392	Daphnoides. 506 Darti	406
cuminum. 513 cupressus	512	Daucus 487 Dauci radix	42
cura quid	135	Decretoria signa in morborû	
		principio	

I N D E X.

principio praua sunt 61. Sed ubi morbus inclinauerit, bo na sunt ibidem	Destillationis curat. Destilla tionis acris tenuisque cura tio. 177 Deuterion. 420
Decamyron malagma 629	Dia aloes medicamentum 595
Deiectio quæ optima 74	Dia anacardion 582
Deiectio cruda ibidem	Dia alicacabu pastillus 592
Deiectio merè ruffa ibidem	Diabrosis 181
Deiectio uiridis ibidem	Dia bacanu medicamentum he pati accommodatum 582
Deiectio nigra ibidem	Diabates quid 12. eius signa ibid. curatio ibidem
Deiectio liuida ibidem	Dia calaminthes 581
Deiectio oleosa, pinguisque ibidem	Diacodion, ex papaueris capi tibus & melle 577
Deiectio uiscosa ibidem	Dia coralliu pastillus 588
Deiectio nimis foetida ibid.	Diacodion compositum 178
Deiectio omnium deterrima & pestifera 75	Dia citriu medicamentu, tardè concoquentibus efficax 581
Deiectiones qd præfagiāt 56	Diacodion, ex papaueris capi tibus & sapa 177
Delphini 50	Dia chartiu pastillus 591
Dētes quomodo eximanē 380	Dia citriu compositio stoma cho utilis 563
Dentes exesi quomodo exi mendi ibidem	Dia chartu 596
Dentes superflui quomodo tollendi ibidem	Dia coronopediu compo 555
Dens confractus quomodo cu randus ibidem	Diacodyon 121
Dentes ab interitu uindican tia 14	Dia ægylops, acopon 636
Dentium dolora sedētia 169	Dia æron emplast. 620
Dentes quo tempore oriātur pueris 4	Dia cadmias empla. 615
Dentes attritos curantia 170	Dia dictamnu empl. 617
Dentiū candorē facientia ibi.	Dia erigerontos emplast. 624
Dentiū stuporē tollentia ibid.	Dia euphorbiu, acopon 631
Dentium inflammationē cu rantia, & Dentes mobiles sta bilientia. 169 Dētifriciū 170	Dia coralliu medicamentum, podagricis idoneum 586
Dentiētib. pueris superātia 5	Dia electru pastillus 590
Dentium smegma 170	Diarrhæa 196
Derma. 487 Destillatio 175	Dia hematon antidotum 575
	Dia hermodactilu compo ad podagrā 564 dia libanu 595
	Dia

INDEX.

Dia œnelæu pastillus	592	dia pirano emplastrum	615
Dia ostreon	595	dia hydrias collyrium	503
Dia oxynyrsines	596	dia zomaton collyrium	605
Dia phellon pastillus	191	dia crocu aridon	612
Dia physalidon	590	dia rhodon Nili	610
Dia rhodon pastillus	188	dia pternes emplastrum	626
Dia stole pulsus. 63. dia scincu.		dia turpænes ceratum	627
575 Dia spermatō pastillus.		dia halon emplast.	626
588 Diasphecles, hoc est ex		dia sampficu malagma	635
face uini cōbusta, Manetho-		diachromon emplastrum	629
nis. 595 Dia cinnabareos em		dictamnium	587
pla. 628 Dia iteon empl	622	dies decretorii	59
Dia meliloton malagma	629	dies speculatorij	60
Dia spermaton malagma	635	digerentia medicamenta	122
Dia strutiū empl	612	digiti in manu ubi adnascan-	
don, quæ septuaginta duas		tur, digitorum adnatorū dif-	
uncias pendunt	609	ferentia,, digiti adnati quo-	
dia talias collyrium	608	modo præcidendi	393
dia talias, ruffum, dia smyrnō,		digitorum luxatio quomodo	
claudiacum, diamoron sim-		curetur	450
plex, diamoron cōpositū	599	digitorū pterygia putrida quo	
diamoron ex moris batinis,		modo curanda. 270 digitorū	
quæ rubi fructibus sunt	599	pedis luxatorū curatio	463
dia caryō simplex, dia caryon		digitos puerorū, dentibus uul-	
cōpositū, dia gyreos emp	611	neratos quod sanet	5
diagleucous, dia besafa	600	digitorū cōtusion is & confra-	
dia rhodon album	609	ctionis curatio. 447 dioclis	
dia smyrnon ad & rhyadas &		epistola Antigono regi scri-	
ægylopas. 606 dia gigurton,		pta ad ualeitudinē tuendā	53
malagma. 635 dia chilon em		dionysias. 489 diospolites	581
pla. 615 dia sphodelu empla		diphryges quomodo coqui de	
strum. 615 dia ceratos colly-		beat	648
rium Galennis	605	diphryges, dipsacos	485
dia elcysinatos. 616 dia meli-		dipsas unde dictus. 345 dipsa-	
ros empl.	614	dis morsus notæ ibi. curō ibi.	
dia aloes collyrium	609	διαιχίας qd 367. Eius caus-	
dia libanu collyrium	608	sa ibi. curatio ibi. dolichō	44
dia scoridū emplastrum	615	doloris species & causæ	91
dia rhodon Crocinum	610	remedia	ibidem
		doloris	

I N D E X.

Doloris capitis in febribus cu- ratio	94	Ebulus.	471	Ebur	490	
Dorias 493	Dorycinon	488	Eccope.	433	Echini	50
Dorycnii poti notæ 358. re- media, Dosithei catapotia			Echinis herba, Echinus	497		
ad iecur inscripta	583	Echinon, Ecchimona quid				
Dothiene emplastrum	615	302. curatio, Echidna	493			
Drachma	662	Eclegma ex marrubio compo- situm	576			
Dracunculus	488	Eclegma ad tussim	177			
Dracunculi 332. ubi generen- tur ibid. curatio	ibidem	Eclegma ex marrubio sim- plex	576			
Dracunculi curatio	425	Ecpiesmus oculi	153			
Draconis marini ictus cura		Ecpiesma	433			
347		Estropion, eiusq; curatio	149			
Dracuntium	488	Estropium 371. Eius causæ				
Dropax Gallus Oribasii	639	ibidem. curatio, Educentia				
Dropacis duplex præparatio		spicula, aculeos, arundines, spinas & consimilia	320			
636. usus druppæ oliuæ	45	E'is onyca	433			
Drys	488	Elate,	Elatine.	490		
Dryni morsuum signa 344. re- media	345	Elaterii noxæ quomodo re- mouendæ	362			
Drynus pessimus serpens	344	Elaterii effectus 558. quale de- ligendum. ibid. Exhibendi				
Dryopteris	488	modus & pondus	ibidem			
Dulcis radícula	486	Elaphoboscus, Elaterium	490			
Dulcium uires	465	Elæa,	Elæon	489		
Duracina	45	Elæa, æthiopica	ibidem			
Dysenteria quid 199 species		Elæomeli	ibidem			
ibid. causæ ibid. signa ibi. Cu- ratio ibid. & sequentibus		Elephantia quid	272			
Dysenteria cruenta ibid. Ieco- raria, Dysentericis utilia ca- tapotia ex xylomacere	583	Elephantia incurabilis quare ibidem				
Dysodes acopon ex Gal.	635	Elephantia duplex ibid. Quæ minus malignior, Elephan- tiæ minus malignæ cura- tio	ibidem			
aliud	ibid.	Elephantia laborantium spi- randi difficultas quomodo curanda	276			
Dysodes malagma	635	Elephantia: causæ	272			
E		Elephantia				
E Benus	488					
Ebrietatē præcauentia	51					
Ebrietatis curatio	15					

I N D E X.

- | | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| Elephantia uictus ratio con- | ueniens | 274 | Empla. ex achate, discutiens |
| Elleborine | 491 | emolliensq; Empl. ex plum | |
| Eleoselinon | 490 | bagine ad calidas affectio- | |
| Elisphacus, Electrum | 496 | nes, Empl. coracon ex oxy- | |
| Elos. 153 | Elymus | 491 | melite, ad naturalium & no- |
| Empetron | 491 | mas accommodatum, Empla- | |
| Emphysema quid | 148 | strum Icesios ad strumas, ab- | |
| Emphysematis cura | ibidem | scessus, lienē, articulos, & co- | |
| Empiema 184 causæ 185 si- | | xendicum dolores | 620 |
| igna ibid. curatio | ibidem | Empla. Neronis, ad ictus om- | |
| Emplastrum smilion ad ab- | | nemq; particularum carnosarum | |
| scessus | 612 | dolorem | 622 |
| Emplastrum diascorodon ad | | Empl. ex cerusa uel oui | 615 |
| rumpendum, Emplastrum | | Emplastrum parygron Oriba- | |
| dia apyranu ad discutiendum, | | si, & Emplastrum ariobarz- | |
| Emplastrum diastruthiu, | | nion, Emplastrum ex dra- | |
| strumas discutiens, ibid. | | cunculo | 617 |
| Emplastrum pelarion ex scor- | | Emplastrum ex dracunculo ibi. | |
| ria argenti | 616 | Emplastrum Aristophanium | |
| Emplastrum è fermento ab- | | emolliens | 619 |
| scessus rumpens | 615 | Emplastrum ex althæa, poda- | |
| Emplastrum dothiene | ibid. | gricis aliisq; duriciis accom- | |
| Emplastrum ex succo lini se- | | modatum | 616 |
| minis discutiens detergens- | | Emplastrum cissonum ad ner- | |
| que | 614 | uorum uulnera, punctus, & | |
| Emplastrum ex melle | ibidem | maximè diuturna | ibidem |
| Empl. barbara quod cruentis | | Emplastrum botanicum | 614 |
| protinus uulneribus injicitur, | | Emplastrum ex polline farina | |
| & fracturarum callos fir- | | ceo | 611 |
| mant | 620 | Emplastrorum materia, præ- | |
| Empl. ex salicibus, glutinans | | paratio & differentia | 612 |
| cruenta excreantibus, & pu- | | Emplastrum pyrine, ad duri- | |
| rulentis efficax, thoraci im- | | tias scirrhus | 616 |
| positum | 621 | Emplastrum tetrapharmacū | |
| Empl. Galeni aceratos, glutina- | | | 614 |
| nat, concoquit. ulcera ad sup- | | Emplastrum dia chylon | 614 |
| purationem perducit | 619 | Empl. dia asphodelu | ibidem |
| Empl. ex oxelæo | 619 | Empl. oxera multiplicis usus | |
| | | | 619 |

Emplast.

I N D E X.

- Empl. ex ochra, inflammatio-
nem arcet tum sponte, tum
in iudicio tortis idoneū 721
- Empl. ex cedria, glutinat di-
scutit, abstergitq; ibid. Aliud
emolliens, Empl. ex pumi-
ce ad cicatricē ducendū 625
- emplastrum paula, strumis &
bubonibus efficax ibidem
- emplastrum palmulatum 617
- emplastrū ex metallicis 622
- emplastrum armenia fractu-
ris accommodata ibidem
- emplastrum ex anchusa, am-
bustis efficax 618
- empl. ex pampholige ibidem
- emplastrum leæna, noxia edu-
cit in superficiem, humores-
que euacuat 621
- emplastrū Macedonicum ibi.
- emplastrum chryse, cruentis
vulneribus accommodatū 628
- emplastrum anicetos glutinat
discutit, squamas separat, &
ad articulos recenti cicatri-
ce contractos nalet 622
- empl. Serapionis Melæne ibi.
- emplastrum ex lolio 629
- emplastrum lsis, cruentis ac-
commodata, ad glutinandū,
carnē inducendū, & purgan-
dum 619
- empl. ex urina mu-
li, podagricis utile 627
- emplastrum ex lapidis asii flo-
re, philagii ad scyrrhos ibi-
dem ex eodē Galeni ibidem
- emplastrum ex salis flore, ar-
ticulariis in declinatione ac-
commodatur 627
- emplastrum quod nutriendæ
ulcerum carni est ibidem
- emplastrum Italicum ad pur-
gandum sordida, inducen-
dumque carnem 628
- emplastrū entaticon ibidem
- emplastrum ex cinnabari ad
tophos aliosq; omnigenos
tumores induratos, dicitur
pamphethes 623
- emplastrū uiride simplex. 622
- aliud uiride, ad humida uitia
& carnis excrescētiās ibidem
- emplastrum peganera ad pleu-
riticos ibidem
- emplastrum athena, ad ulcera
sordida, impacta, neruorum
uulnera 620
- emplastrū dia dictamnus, gluti-
nans ad canū morsus, & om-
nigena ulcera ibidem
- emplastrū è nitro ad abscessus
scyrrhos, ad tumores 626
- emplastrū conglutinans ad ul-
cera quę serpendo depascūt,
& sanguinis sputum 623
- empl. ex cinere aspidū, discutit
strumas & podagras ibidem
- emplastrū leæna, siccatur discu-
titque, emplastrum ex nitro
ad carbunculos 624
- emplastrū ex anemone ibid.
- empl. uiride Macherionis, ad
coxendicum cruciatus, arti-
culos infractos, & abscessus
ibidem
- emplastrū ingrediētia medica-
mēta quō coqui debeāt 652
- emplastrum philocatiche, do-
lorem

I N D E X.

- | | | | |
|--|--------|---|-----------|
| lorem leniens, ad sedem uti-
lis | 615 | epicaunia ulcus oculi | 152 |
| emplastrū Amithaonis, ad ar-
culos recenti cicatrice con-
tractos, condulososq; ad ex-
trahendum etiā efficax | 619 | epilepsia trifariā gignitur | 128 |
| emplastrum ex perna tophos
soluit | 626 | epilepsiae curō. 129 & sequēt. | |
| emplastrū ex lixiuio, coxendi
cum doloribus, articulariis
& tumoribus oedema refe-
rentibus utile | 625 | epihialtes unde cōstituāt | 134 |
| empl. ex auellanis, ad articu-
lorum tophos probatū | 628 | epilepsiae causae, & epilepsiae
cui ferè ætati accidar | 128 |
| emp. Sphærien ad ardores | 641 | epilepsiae notæ | ibidem |
| emplastrum Nicolai ad recen-
tia uulnera, & sinus glutinan-
dos aptum. | 621 | epileptici quō coarguēdi | 129 |
| emplastrum ex liquore sycamino | 629 | epimedium | 493 |
| emplastrum dichromon | ibid. | emiētides quid 283. signa, cu-
ratio ibidem & 284 | |
| emplastrum dia cadmias, cica-
tricem inducens | 618 | epimelis. 491 epiphora ocu-
lorum quomodo curet | 147 |
| empl. Mnasæi discutiens | 612 | epiploenteroceles | 411 |
| emplastrum melanclorū | 616 | epipactis. 491 epiplocele | 411 |
| emplastrū ex seuetione | 617 | epistola Dioclis Antrigono re-
gis scripta ad ualitudinem
tuendam | 53 |
| emplastrum psittacium | ibidem | epithymi uires, pondus, &
utendi modus | 561 |
| emprosthotos | 142 | epithymbri uires | ibidem |
| encanthis qd eiusq; cura | 161 | epithymum | 491 |
| enchephalos | 438 | epomphalum medicamentū
quod umbilico illinitur ad al-
uum subducendam | 568 |
| engisoma | 432 | epithematū dīa & usus | 626 |
| entaticon empl. | 628 | epuli 380 Eius curatio, epu-
lis quid & quō curetur | 170 |
| enteroceles | 410 | equarum sanguis | 471 |
| enthenstici | 132 | erastriati panchrestos hy-
gra 612 erethrias terra | 485 |
| ephelidem curantia | 167 | eria, & erice | 492 |
| ephemeron, ephemeris assum-
pti notæ 457. remedia | 493 | erigerum 495 erinaceus | 493 |
| epihialtes unde dicatur | 134 | erimon | 492 |
| epihialtes quō cognoscat, ibid. | | erruum. 528 | eruca 492 |
| epihialtes quō curāndus ibidem | | erucæ picearum | 533 |
| | | erucæ facultates | 41 |
| | | erucæ pinorum assumptæ si-
gna 353. Curatio ibidem | |
| | | erucæ | |

I N D E X.

Erucae olerum	501	F	
Eryngium	495	Faba	512
Erysipelas inflammatoriū	99	Faba Aegyptia	ibidem
Erysipelas quid	287	Facies ut rubescat quomodo efficiendum	168
Erysipelata capitis periculosa,		Faciem à rugis asserentia	167
Eorum curatio	96	Faciei pilos tollentia	168
Erysipelas quid ibid. Curatio ibidem.		Faciei nigritias tollentia	ibid.
Erysipelatis cerebri signa & curatio.	123	Faciei uaros tollentia	ibidem
Erythrodonon	492	Faciei aspretudinem tollentia,	Faciei uitia quomodo curentur
erythroides, tunica	406		167
erithrum. 6; 9 eupatoriū	492	Facultates alimentorum	40
euphorbium	499	Fames grandis, in febribus quomodo curetur	99
euphorbii pondus, uires, & modus utendi	562	Farinaceus pollen	486
eunuchi quomodo fiant	414	Fastidium cibi	192
eunuchismus, euodes, à grato odore dictum, malagma	630	Fastidium cibi in febribus quomodo curandum	98
euzomon	492	Fastidium cibi prohibentia	1
exanthemata puero oborta quomodo curanda	4	Fatuitatis causa	126
exanthemata ficiosa capitis & menti quomodo curanda	114	Faustini pastillus	589
exanthematum capitis praesidium	113	Fauus quid	21. curatio ibid.
exarthroma	451	Fauus quid 307. quomodo curetur	ibidem
exercitationum genera	7	Fauis capitis unde nascantur, & quomodo curentur	113
exercitatio ualida seu uiolenta	7	Febrium continuarum origo notae & curatio.	83
exercitatio celeris	8	Fex	549
exercitatio quid	ibidem	Febriū putridarū agnitio	77
exercitationis commoda	7	Febriū tertianarū agnitio	78
exercitationis tempus idoneum, urinarum color indicat	ibidem	Febris tertiana	79
exercitatio uocis qualis esse debeat & quae eius sint commoda	9	Febris tertiana exacta	ibid.
exemphalon	397	Febris tertiana extensa	ibid.
		Febriū putridarū curatio	78
		Febris tertianae uictus	79
		Febris tertianae curatio	ibid.
		Febris tertianae nothae curatio	80
		Febrium	

I N D E X.

Febrium quartanarum agnitiono	ibidem	perquirere debeat	57
Febrium quartanarum differentia	ibidem	Fel. 555. Suillum 556. Ouillu	
Febrium quartanarum curatio, & Febrium quotidianarum agnitio	81	ibidem, Caprillum, Vrsoru,	
Febrium quotidianarum curatio, Febris quartana quo ferè anni tempore incipiat	80	Boum, Taurinu ibidè Hyæ-	
Febris hepialis signa, causæ & curatio	82	næ, Callionymi piscis ibid.	
Febris hepialis unde dicatur ibidem		Scorpionis ibidem maxime	
Febrium ardentiu agnitio	84	Hirundinis, Capræ syluestris	
Febriu ardentiu curatio ibid.		ibidem Gallorum, Perdicum	
Febrium quibus ex affectu erysipelaceo origo est notæ ibidem eorundè curatio ibidem		Accipitrum, Aquilarum ibid.	
Febriu hecticaru agnitio	85	Fel uolucrum acius & siccan-	
Febrium hecticarum duæ species, Febrium hecticarum curatio	ibidem	do uehementius, quàm quadrupedum	ibidem
Febrium diariarum causæ	76	Felis morsus notæ 342 curatio	ibidem
Febriè diaria qua ratione dignoscatur	ibidem	Femora bouis cremata	529
Febri diariæ qui oportuni ibi.		Femorû intertrigines curantia. 5	
Febri diariæ curandi ratio ibid.		Femoris fracturæ quomodo curentur	447
Febri diaria laborantium uictus, Febrium putridarum notæ	77	Fœniculum grande	497
Febrium putridaru curat.	78	Fermentum	494
Febris semitertianæ notæ, eiusque generatio duplex	86	Ferreæ aquæ quibus conferant	24
Febris semitertianæ curatio ibidem		Ferrum. 539	
Febres continentes	83	Ferula	525
Febris continens quid ibidem		Ficus. 44	
Febres curaturus quod & quæ		Ficus	546
		Ficus arbor	546
		Ficus humilis	555
		Ficus capitis morbus quomodo curandus	114
		Ficosa capitis & menti exanthemata quomodo curanda, & Felicula	488
		Felicula. 533.	
		Filix	535
		Fistula quid	420
		Fistula quid 318. curatio ibid.	
		Fistulæ insanabiles	422
		Fistulæ egrè consanescentes ibidem	
		Fistularum ani curatio quæ manu peragitur	ibidem

		Fistularum	

I N D E X.

Fistularum differentia	420	frictionum genera	8
Fistulæ quomodo manu curandæ	ibidem	frictionum nouæ coniugationes.	9
Fistularum ani latentium notæ	421	Frictio dura	8
Fistularum ani manifestarum notæ	421	frictio mollis, Frictio mediocris, Frictio multa & dura.	
Flagris cæsi quomodo curandi	285 & 286	frictio modica & mollis	ibid.
Flatus uentriculi unde generentur	195. quomodo curentur	frictio apotherapeutica	ibid.
	ibidem	frictio præparatoria	7
Flauum medicamentum	596	frigida lauatio quibus conueniat.	23
Fluxionibus alui biliosis maxime medetur lac coctum in quod calculi marini igniti demissi sunt	49 & intestinorum torminibus	Frigida intemperies quomodo corrigatur	37
	ibidem	frigus cui nocuit, quid facere debeat	18
Fœniculū.	519	frigidi & sicci temperamenti notæ.	30
Fœnugræcum	547	Frigidi & humidī temperamenti notæ	29
Fœtum educentia	238	frigidi temperamēti notæ	29
folium	553	frons quomodo incidatur & quibus	366
fracturis idoneū medicamentum	Oribasii 624. Ex commentarijs Heracleti	fructus temporarii	44
	ibidem	fructus arborum	ibidem
Fractura ossis quid	433	frumentaceorum uires	43
fractura in capite quid	ibidem	fucus.	553
fracturarum differentia	ibid.	Fuligo	516
fracturarum capitis differentia, Fracturæ capitis species quomodo dāprehēdēda	433	fuligo.	469
fracturæ capitis curatio	434	Fumaria	501
fracturæ cum nuulnere curat.	449	Fungorum assumptorum remedia	359
fracturæ callo nō firmatæ quomodo curandæ	452	furunculus quid	297. curatio, ibidem
fracturæ immodico callo obductæ quō curentur	450	fuga purgans & stomacho grata	564
Fraxinus	520	G	
		Agates	512
		Gala	483
		Galactites	516
		Galbanum quomodo coquendum	654
		Galenī collyriū ex cornu	608
		Galenium malagma	633
		Galenī picra	581
		Galerita.	510
		Gallion	484
		Galliopsis	

I N D E X.

- Galliopsis, & Galla.** 504 **Galli**
cerebrum. 489 **Gallina** 46
Gallarum stercus 509
Gallarum uentris interior
membrana 507
Gallus dropax, Oribasii 639
Gallarum chortalium san-
guis 471
Gallopsis. 487 **Gammachi** 50
ganglion quid 388. **Eius no-**
tæ ibidem, Curatio ibidem
Gangliū qd 187. **curatio ibi.**
gāgræna qd 291. **curatio** 292
gangrænarum remedia 292
garum. 487 **Ge, Genista** 542
genitali exulcerato conue-
niens medicamentum 267
gentiana 484
genu articulus luxatus quo-
modo reponatur 464
geranium. 484 **Geras** 485
ges enetera, gigarta ibidem
gingidion. 41 **gingidium** 485
gingiuas corrosas curatia 171
gladiolus. 526 **glandes** 46
glans unguentaria 480
glans penis contacta quomo-
do aperiri possit 401
glandes ad quid conueniāt 20
glandes unde conficiātur ibid.
glans colis nuda quomodo cō
tegenda 401
glandulæ animalium 47
glastum. 499 **glans** 486
glaucium ibidem
glaucoma quid eius remedia
157
glechon, & glocos 487
gluten piscium 500
glutinium 507
glutinium bubulnm 509
glycea quomodo curenē 166
glycyrrhiza, gnaphalium 487
gone pessus. 648 **gōgylis** 487
gordilion, gramma oboli 662
gramen 481
gramen arundinaceum 501
grandines tussiedo eiekti 175
grannm gnidium 507
granum tinctorium ibidem
crassum corpus quomodo ex-
tenuandum. 27 **grauedo** 175
grauedinis curatio ibidem
grauedinis puerorū curatio 4
gravidarum Symptomata, eo-
rumque remedia I
grossi. 525 **grues** 46
gummi 508
gummi cerosi arboris 504
gurgulio. 381 **gutturis aspredi**
nem curantia 177 **gutturi**
spinæ quō eximantur 382
gypsum. 488 **gypsi poti uotæ**
& remedia 360
gyrgathon. 133 **gyris** 488

H

- H** **Abitus corporis quomo-**
do recalfaciendus 13
Hæmatites. 516 **hemorrhoi-**
des cecę curatu difficiles exi-
stunt 234. **quō aperiendæ ibi.**
hæmorrhoidum fluxus super-
fluus quō sistendus, hæmor-
rhoides qd, & cur sic dicātur,
hæmorrhoides muliebriū lo-
corum quō excidendę 414
hæmorrhoides ani quomodo
manu curandæ 429

*** 2 Halatia

I N D E X.

Halatia, quasi dicas ex sale cō		Herpyllum	492
festa, purgatio	562	Hidos. 494	Hieracitis 517
Halmi uires	41	Hiera Antiochi	567
Harmation	617	Hiera Archigenis	568
Hastula regia	479	Hiera Galeni	565
Hedera	506	Hiera Iusti, Hiera Rufi	568
Hedera terrestris	551	Hippocampus	497
Hedycroi confectio	571	Hippolapathum	ibidem
Hedysmus, Hedyсарum	494	Hippomarathon	ibidem
Helcysma, Helleborus	492	Hippopotami	447
Helechryson, Helenium, He-		Hippopotamus	480
liocæs medicamentum	595	Hippofelinon	ibidem
Helxine	491	Hippofelinon	542
Hemerocalles	495	Hippofelini uires	41
Hemicrania	117	Hippuris	480
Hemicraniae curatio	118	Hircina caro	47
Hemina	661	Hircinum iecur	495
Hemionitis	495	Hircinu cornu	504
Hemiplagia quid	135	Hirundines	555
Hepar	495. Vide Iecur	Hirundinum cerebrum	489
Hepar quomodo uratur	395	Hirundinaria herba	555
Hepatis tēperaturæ notæ	34	Hirudinum deuoratarū digno	
Hepialus febris	82	tio 354. curatio	ibideur
Hepiali curatio	ibidem	Hyssopi liquidi medicamenti	
Hepesma. 493		præparatio	625
Heraclion	517	Hoedi sanguis	470
Heraclius lapis	ibidem	Hominis temperatiss. notæ	28
Herba lactaria	547	Hominis mori ⁹ remedia	348
Herba apollinaris	551	Hordeum	511
Herbæ quō coquendæ	652	Humanæ caro	47
Hermaphroditi unde appel-		Humerus summus quid	454
lati	414	Humeri luxati curatio	454
Eorum quatuor differentiæ,		Humiditates aurium defic-	
in uiris tres, in mulieribus		cantia	5
una ibidem curatio	ibidem	Humidi tēperamēti notæ	29
Hermodactylus stomacho no-		Hyalos. 550	Hyacinthus 550
cet	261	Hydatis quid 372. notæ ibi-	
Herpes quid	287	dem curatio, Hydnon	550
Herpes exedens	293	Hydor, & Hydrargyros	ibid.
Herpes miliaris.	ibidem	hydros	

I N D E X.

hydros. 346	hydrocele 228	cinoris notæ ibi. curatio 225
hydrocephalon quid 364.	Eius	icteri ex calida intemperie so-
causæ ibidem notæ ibidem cu	ratio	lidarum partium generatio
	ibidem	224. notæ 225. curatio ibid.
hydromalum uinosum 500		ictericis quæ uena secāda ibid.
hydrops leucophlegmatias,		Idæa radix 497
hypofarcidos, uel anasarca,		iecur 496. Canis rabidi ibid.
eiusque signa & causæ 219.		caprillum ibidem, hircinum
eiusdem curatio ibidem &		ibidem, lacetræ ibidem, Lupi
220. & 221		num ibidem, Agninum, Apri
hydropeperi 550		ibidem, Mergi ibidem
hydropicis aqua quomodo		iecur animalium 47
emittatur 396		iecur suillum ibidem
hydrophobia 336		iecur quomodo uratur 394
hyemi quæ uictus ratio conue		ilambonis collyrium 603
niat 24		ileos quid. 206 ilex 535
hygra ex caualide 609		incrassantium alimentorum
hygidion Ammonii 604		differentiæ & uires 40
hyoscyamus, hypericum 550		incubo uel incubus unde dica
hypericon. 509 hypecoō 551		tur. 134 indicus lapis 517
hypocistis, hypoglosson ibid.		infans recens natus quomodo
hypoglottides medicamē. 176		nutriendus 3
hypopyi. 374 hypopii 153		infantium uictus ratio 6
hypophæston 551		inflāmatio proprie quid 287
hyposphatismus 366		curatio 288
hyposphadion 401		inflammatio erysipelacea 96
hyposphagma quid eiusq; cu-		inguinalis herba 294
ratio 148		inguinibus conueniens medi-
hyrcorum sanguis 470		camentum 290
hyssopum 550		inodora 464
	I	insaniæ curatio 147
I Aspis 516 Ichores 179		intemperies frigida quomodo
I Ichthyocolla 599		corrigatur 37
Icterus quid 524		intemperatorum corporum
Icterus niger 221		notæ 29
Ictericorum remedium 217		intertrigines femorum curan
icterus ratione iudicationis in		tia. § intertrigines curan
febris facile curatur 224		tia. 286 intestina terræ 485
icteri ex calida intemperie 10		intestini procidentia quomo-

*** 3 do

I N D E X.

do curan.	399	κακοχυμία quid	25
intestina animalium	48	καρωτικά medicamenta	122
intybus syluestris	506	L	
intybi facultates	41	L Aboriosam uitam agen-	
iocinoris affectus	214	tium uictus ratio	25
iocinorosi qui	ibidem	Labrorū curta quomodo far-	
iocinoris tēperaturæ notæ	34	cienda	371
iocinoris imbecillitas	214	Labrum ueneris	488 Lac
iocinoris frigidaē intemperiei		Lac recens multum	48
notæ ibidem curatio	216	Lac bubulum	484. Muliebre
iocinoris caua pars per aluū		ibid. Caprillū, A fininū, Ouil-	
gibba per urinas expurga-		lum, Vaccinum	ibidem
rur	218	Lac coctum	48
iocinoris siccaē intemperiei		Lac nutricis uiciatum quomo-	
notæ	215	do corrigatur	3
humidaē notæ ibi.		Lac ouillum	48
iocinoris inflammationis si-		Lac scissilæ	49
gna ibid. eiusq; curatio	217	lac humidius, Lac caprillū	48
iocinoris inflammatio à pleu-		lactis probatio	3
ritide quō discernenda	215	lac crassius	48
iocinoris inflammationum in		lac coquendi modus	ibidem
gibba eius parte, notæ	ibid.	lac statim à partu redditū	49
iocinoris uenarum obstructio		lac nutricis quot modis uicie-	
nis notæ ibid. curat	216	tur. 3 lactaria herba	546
ion. 497 ios, & iris.	498	lacerta. 538 lacerta	536
isatis 498 isis emplast.	619	lacertæ iecur	495
isopyron	498	lactuca	496
isotheon collyrium	608	lactucae facultates	41
itea 498 ἱτέων	122	ladanon. 514 lagopus	513
iudicium futurum quomodo		lanæ	492
prænosendum	61	lanæ pinguitudo	526
iudicium instans quomodo		lapathum. 514 lapides	516
agnoscendum. 61 iuglās	45	lapides quō coquendi	649
iuguli confracti curatio	440	lapides argæi montis cappado-	
iunctus angulosus	513	ciæ. 517 lapis specularis	543
iunci odorati & rotundi flos		apsana. 514 larinx	173
546		larix. 537 laserpitium	540
iuncus palustris	ibidem	lassitudinem ob exercitatio-	
iuniperus. 477 ixos	497	nem quatuor species earum	
ixiæ signa 357. remedia	ibid.	que	

I N D E X.

que remedia	9 & 10	lien quomodo aduratur	395
Lateralis dolor quid	186. nota	lien obstructionis nota	222
tæ ibi. causæ ibi. curatio	187	lien expultricis facultatis	
lathyrus	514	imbecillitas quomodo co-	
laurus arbor	487	gnosenda	ibidem
lauri foliorum uiridium pon-		lien intemperies quomodo	
dus	159	cûretur	ibidem
Laurus Alexandrina	487	lienteria quid, eius species,	
laurinum oleum	641	causæ, notæ, & curatio	197
leæna empla.	623 & 624	lignys	516
legumina. 44 lemæ quid	121	lignorum caries	538
lamonium	514	ligysticum	516
lemina terra. 484 lentes	550	lilium	511
lenticula	44	liliaceum oleum	640
lenticula palestris	552	linguæ animalium	47
lenticula curantia	169	linguæ morbus	171
lentiscus	546	linguæ scabrities quomodo	
lentiscinum oleum	642	curanda	101
leontopetalon	514	lini semen, lino spermon	517
lepidion, Lepidoile ossa	364	linozostis, lio sporon	517
lepis. 515 leporina caro	47	lipasmata	138
leporis cerebrum	488	Lippitudinis causæ	145. cu-
lepra quid 276. causæ ibid. si-		ratio	ibidem
gna ibid. curatio	277	liquidorum mensuræ	662
lethargi causæ 123. signa ibi-		liquidum collyrium ex cau-	
dem curatio	124	calide	612
lethargus à caro quid diffe-		liquor 527. Cyrenaicus, medi-	
rat	123	cus, Syriacus	ibidem
leucacanthum	515	lirinum suffimeu	649
leucas, leuce, leuce quid 280		lysiponium acopon	638
causæ ibidem curatio	ibid.	lithargyros, & lithi	516
leucas pastillus	592	lithospermon	517
leuiria	50	litrum	518
libanius pessus	651	liuores corporis prohibētia	13
libanotides, & libanotos	515	locustæ, & loligines	50
libanum 608 libella	50	lolium. 470 lonchitis	518
libra. 662 lichen herba	514	lonchitidis seminis pondus &	
lichenes equorum	ibidem	modus utendi. 562 lothus	
lien animalium	48	herba. 518 lotus arbor	519
		*** 4 lumbricorum	

INDEX.

lumbricorum origo	327	Malacia grauidarum Sympto	
lumbrici rotundi infantibus		ma. i Malache	519
peculiares	328	Mala costrata	50
lunare cyphi	649	malagma ad capitis dolorem	
lupinum, 496	lupinum 44		117
lupinum iecur	495	malagma anethine	635
luporum stercus	508	malagma ex baccis lauri	634
lupus, piscis	49	malagma ex seminibus	ibid.
luxatio quid	452	malagma erythrium	633
luxationis duæ species ibidem		malagma mendesium	630
luxatio cum fractura quomo-		malagma niarcium	631
do curetur	465	malagma pentamyron	632
luxatio cum ulcere quomodo		malagma euodes	633
curetur	464	malagma ex fertula campa-	
lycaonis signa 134. curatio		na	629
ibidem		malagma citrinum	634
lychnis	518	malagmatum differentia &	
lychnidis seminis pondus &		usus	629
modus utendi	561	Malagma dia sampsychu	635
lycium. 518 lycoctinon	471	malagma ex ninaceis	ibidem
lycopis	518	malagma decamyron	632
lycopis, lygis	468	malagma ex cenanthe	635
lynceus ad claritatem oculo-		malagma polyarchion ex Ga	
rum	607	leno 627. aliter	ibidem
lpyriæ febres	83	malua. 519 maluæ uires	41
lysimachium	518	malicorium	537
	M	malus armeniaca	522
M Acherionis emplastrum		malum citreum	46
uiride	625	malum medicum	506
Macedonicum emplastr.	624	malus persica, malum punicū	
Madarosis quid & eius cura-		cum 536. Eius acini	522
tio 150 Magnes	517	malum terræ	477
Magni aster. 609 Mala	521	mamillarum affectus curan-	
Mala dulcia ibidem austera,		tia	189
acida, assa, elixa	ibidem	mamiras	519
Mala punica	45	mammaram inflammationes	
Malabathrinum collyriū	611	quomodo curandæ	300
Malabathron	519	mammis medicamentum con-	
Malacia piscis	50	ueniens	290
		mandragora	

I N D E X.

mandragora	519	flauam purgantia	557
manethonis dia sphedes	595	medicamentum dia besala ex	
manus summæ cōtusionis cu-		ruta syluestri	600
ratio	448	medicamentum ex syluestris	
manna thuris	519	maluæ seminæ	585
manna thuris quomodo co-		medicamenti hyssopi liquidi	
quenda	651	præparatio	625
marathron	519	medicamentum philoxeni, pu	
marasmōs	85	rulentis & longa defluxione	
marcellius thronus pastillus		infestatis idoneum	579
691		medicamentum è musto	598
marciatum malagma	628	medicamentum dodechateon	
marina aqua	496	578	
marrubium	534	medicamentū dia citriu, tarde	
marrubium nigrum	481	concoquentibus efficax	581
masuaphion confectio	626	medicamētum massalioti	597
massalioti medicamentū	597	medicamentum quod ſumbi-	
maſtiche	526	lico illinitur epomphalium	
maxillæ cōfractæ curatio	430	dictū, ad aluū subducēdā	568
maxillarum luxatio quomo-		medicamentum ex myrto syl	
do curanda	452	uestri	597
maza. 45 mecon	521	medicamentum dia coralliu	
medicamentum ex thure	595	podagricis idoneum	586
medicamentum uomitum ci-		medic. dia calaminthes	581
tantia	567	medicamentum dia bacanu,	
medicamētum ex ostreis	595	hepati accommodatum	582
medicamentum ex duplici pi		medicamentū zopyrios ibid.	
pere	575	medicamentum Galeni è ſtil-	
medicamentum ex charta, ad		la comitialibus potissimum	
nomas oris potissimū & na-		efficax. 574	
turalium ulcera	593	medicamentum	
medicamenta purgantia com		trion piperon	578
posita	562	medicamentum ex succo ma-	
medicamentum heliocas, adu		li punici. 599	
rens,	593	medicamentū	
medicamenta atram bilē pur-		ex succis malorū ad appeten	
gantia quibus & quādo exhi		tiam abolitam & ægram con	
benda	560	coctionem probatum	580
medicamenta simplicia bilem		medicamentum fracturis ido-	
		neum Oribasii 628. Ex com	
		mentariis Heraclei ibidem	
		medica-	

I N D E X.

Medicamentum ex sanguine hircino	584	melanchloron emplastr.	616
medicamentum nephriticum excicadis	585	melanchlorus pastillus	593
medicamentum ex eruis	578	melanteria. 520 melaplacon	
medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus	579	tium quomodo paretur	580
medicamenta liquida quæ illi nuntur ad oris uitia, ac guttur accommodata	598	melenæ ierapionis empl.	619
medicamenta purgantia stomacho aduersantur, excepta aloe	558	melea	522
medicamentum à murino colore psaron dictum	596	melitera Oribasii	595
medicamentum emplastra ingredientium differentia eorumque coctio	612	meliceris quid 386. eius notæ	
medicamentum ex lupino iecore præstantissimum	582	ibidem curatio, & meliceris quid 306 curatio	ibidem
medicamentum xanthon	596	melilotus. 520 meline	491
medicum malum	506	melinum oleum	643
medimnus 662 medion	521	melitites. 516 melon	153
medimnus atticus	663	melopeon	44
medulla animalium	47	memæcylos	521
melan. 530 mel	51	membrum distortum callo fixatum quomodo curetur	451
mel coctum	ibidem	membrorum attenuatorum curatio	28
mel non coctum	ibidem	mēbrana cerebri si nigruerit quomodo curanda	437
mel sachar. 520 mel uino quanto ponderosius	658	memoriæ noxæ quomodo accidat 126. quomodo cognoscatur ibid. quō curetur	127
mel oleo quanto grauius	658	mensēs cīentia medicamentar. 237 menses mouentia	21
mela	521	mēsum immoderatus fluxus quas causas habeat 238 quomodo curandus, Mensium suppressis cōplures affectus & lōgos procreare solet	236
melancholia quid	131	mensium suppressio ob intera nearum partium aliquā primario affectā quomodo curari debeant, Mensium suppressionis causæ quibus notis deprehendantur	ibidem
melancholiæ causæ	ibidem	mensium suppressorum causæ	ibidem
melancholiæ signa	ibidem	ibidem curatio	ibidem
melancholiæ curatio	ibidem		mensēs
melancholia hypocondriaca	131		
melanthion, & meli	520		

I N D E X:

menſes uulneribus quādo flue re incipiant 235. quando de- ſinant 236	morbus comitialis trifariam gignitur 128
menſium tempus, menſes mo- ratos prouocantia ibidem	morbi publicè graſſantes 86
menſuræ 657	morbi publicè graſſantes un- de oriantur, morbi ex aeris ſtatu futuri quomodo præſa- giendi & prohibendi 87
menſurarum notæ ibidem	morbi letalis notæ 58
menſura aridorum ibi. & 663	morbi non letalis ſigna ibid.
mēſuræ liquidorū 657. & 662	morofis unde fiat 126
menta 494 meon 522	moroxus. 516 morus 522
mercurialis herba 517	motus mediocris ualerudini tuendæ ſummum affert præ- ſidium. 40 muliebre lac 483
mergi uenter 507	mulier ægrè pariens ſuperſtes ne futura ſit an minus quo- modo cognoscendum 416
mergi iecur 495	muliebris fluor 239 eius ſpe- cies cauſæ ibid. notæ ibid. cu- ratio, & muliebres loci, uide uulua & utetus
merulæ. 46 meſpila 521	muliebrium locorum clauſu- ræ cauſæ 415. incōmoda ibi. curatio ibidem
meſpila. 45 metopion 645	muliebrium locorum thymi condilomata & hæmorrhō- des quō excindantur ibidem
milax. 522 millefolium 524	mullus. 547 mullus piſcis 49
miliū. 503 miliū 43	mulſa 51
milphofis quid & eius cura- tio 150	mulſæ præparatio ibidem
mina, & mina ægyptia 662	multipedæ 528 muria 472
mina attica ibidem	murenæ morſus curatio 347
mina Romana minium quo- modo coquendum 652	muris arane iſtus notæ 342 curatio ibidem
minium rubricum 484	muris auricula 523
miſy 522	murium, ſtercus 509
miſy quomodo coquatur 652	muſæ paſtillus 590
mitrhidatis antidotū dia ſcin- cu. 573 Moaſæi emplaſtrum	muſtela 484
diſcutiens 917	muſtelæ uenter 507
modius 662	muſtelæ
modius ægyptius 663	
modus Italicus, mota qd 246	
notæ ibid. curatio 247	
molæ & aquæ inter cutē diſſe- rentia. 546 moly 524	
molybdos, & molydæna 522	
monohemerōn collyriū 604	
mora. 45 moræa 522	
morbi principium quod 57	

I N D E X.

mustelæ cerebrum	489	nares fractæ & contusæ quo-	
musculus, musculus marinus	483	modo curentur	438
myaces, myagros	523	narium uicia 165. & deinde	
myaron, mycete,	ibidem	per totum caput	
mydriasis oculorum	156	narium sanguinis fluxus quo-	
myelos	523	modo sistendus	166
myocephalon	153	narium ulcera quomodo cu-	
myopiæ qui, myopiasis	153	rentur	166
myosote, myrica	523	narium fœdus odor quomo-	
myriophyllon	524	do curetur	ibidem
myrmecia	233	narium uicia quomodo emen-	
myrmecia quid 427 unde sic		dentur. 165	nartex 525
uocetur 428 curatio ibidem		nascæthron, nascaphthon	524
myrrha. 542 myrrha 524		nasturtium	501
myrrha quomodo coquenda		nasturtij uires	41
652		natricis morsus notæ	346
myrrhis, & myrrhine	524	curatio	ibidem
myrsinatum emplastrum	618	naturalia. Vide pudenda	
myrsine	524	naturalium inflammationes	
myrsinoides. 506 myrtus	524	quomodo curandæ	300
myrtites quomodo fiat	561	naturaliū ulcera citra inflam-	
mystrum	658	mationem oborta quomo-	
mystrum magnum	ibidem	do curanda	232
mystrum paruum	663	naturalium particularum con-	
mytuli	523	seruatio	226
myurus unde dicatur	66	naturalium aquarum uis	24
myxa	523	naturalium aquarū dīæ ibid.	
N		naturalium balneorum diffe-	
Napus. 42 Napy	524	rentiæ	ibidem
Narce, & Narcissus	525	naturalium thymi	403
Narcoticorū largior usus quæ		naugantium uictus	26
incommoda afferat	260	nausea quomodo curanda	101
nardinum	607	naxiæ cotis detrimētum	517
nardostachys	524	nephriticis	207
nardus cizicine iniectio pri-		nephriticum medicamentum	
ma 629 altera iniectio ibi-		ex bellariis uesicæ & renum	
dem tertia iniectio	ibidem	exulcerationi idoneum	584
nardus gallica	524	nephriticum medicamentum	
nardus montana	ibidem	ex cicadis	483
		nepita	

I N D E X.

neripita. 598	nerion 525	nymphodoti pastillus 592
nerui testium 406		O
neruus præcisus quomodo cu		O Bolus 662
randus 326		O Oboli grammæ 662
neruis uulneratis aut punctis		Ochra. 485 Ochra 44
quæ accidunt 323		Ocimum, & Ocimoides 557
neruorum uulneratorum cu		oculorum caliginem prohi-
ratio ibidem		bentia 14
neruorum contusorum cu		oculorum expressionis cura-
ratio 326		tio. 158 ocularium medica-
neruicorum abscessum medi-		mentorum differentia atque
camenta 290		usus 603
neuras 525		Oculorum suffusio 375. unde
nigellæ incommoda quomo-		fiat ibid. notæ ibi. curatio 376
do amolienda 362		Oculorum qui defluxionibus
nili dia rhodon 610		infestantur agglutinamen-
nili malagma ad lienem om-		ta 612 Oculorum carcino-
nemq; duritiem 633		mati quid fieri debeat 155
nitrum 518		Oculi procidentia quomodo
nitrum quomodo coqui de-		curanda 153
beat 652		Oculi humor crystalloides
nitri spuma 480		157
nitrosæ & falsæ aquæ quibus		Oculorum obscuritas 158
conferant 24		Oculorum suppurationem cu
noctuæ sanguis 470		rantia 155
nucæ 502	nucæ 45	Oculi procidentia 153
nucæ uirides, aridæ ibidem		Oculorum habetudo 158
nuclei acinorum uuæ 487		Oculorum confusio quomo-
nutrix qualis esset debeat 2		do curanda 159
nutrici quæ sint uitanda ibid.		Oculi purulenti quomodo cu
nutricis lac laudatissimū ibid.		randi. 153 Oculorum suffu-
nutricis lac quod modis ui-		sio quid, eiusque curatio 157
cietur 3		Oculi si cute non obtegatur,
nutricis lac uitiatum quomo-		curatio. 370 Oculi purulen
do corrigatur ibidem		ti quomodo curandi 374
nyctalops quid & quomodo		Oculi dolorum causæ 145
curetur. 156 nymphæa 525		Oculorum epiphora, id est, de
nymphæ quid 415. Quomo-		fluxionis impetus quomodo
do excindenda ibidem		curetur 147
		Oculorum

I N D E X.

Oculorum unguis 374. cura- tio	ibidem	Olea digerentia	89
Oculorum phthysis eiusq; cu- ratio	156	Oleum	489
Oculorum atrophia eiusque curatio	156	Oleum amaracinum	646
Oculorum hebetudinem cu- rantia	155	Oleum amygdalinum	544
Oculorum albugines quomo- do curentur	154	Olea Aethiopica	489
Oculorum unguis qui ptery- gion græcis dicitur, quid, eiusque curatio	ibidem	Oleum ægirinum	644
Oculorum ulcera eamque cu- ratio. 152. Oculorum inflā- mationis curatio	145	Oleum anethinum	642
Oculorum cicatritrices quo- modo curentur	154	Oleum balaninum	644
Oculi membrana cornea	152	Oleum caryinum	ibidem
Oculorum carbunculo quid faciendum	155	Oleum chamæmelinum	642
Oculi tunica <i>ἡ ἀγομένη</i>	153	Oleum cicinum	644
Oculi dolorum curatio	145	Oleū cyprinū posidonii	646
Oculorum mydriasis	156	Aliud	ibidem
Ocimum. 41	Odora 466	Olei cum cera qui modus esse debeat in cōficiēdis unguen- tis &c.	656
Oe. 526	Oedema quid 25	Oleum crocinum	647
Oedema quid 301. causæ ibid. curatio	ibidem	Oleum dulce 490 omotribes ibid elotum ibid. Vetus ibi- dem. Tenuē ibidem. Sabinū ibid. Ex agresti olea ibid. Ri- cininum ibid. Sesaminum, Raphaninum	ibidem
Oedema aliorum morborum accidens nonnunquam 301. quomodo curandum ibidem		Oleum iriunum	646
Oedemata pedum discutiē- tia. 2	Oenanthe. 526	Oleum laurinum	645
Oenantheria	647	Oleum liliaceum	643
Onanthini confectio ibidem		Oleum lentiscinum	646
Alia. 649 Oenos, cœsypos 526		Oleum mastichinum 642. ma- gis uarium	ibidem
Osypus. 495 Olea. 489. Oleæ radicis corticis pondus & u- tendi modus	561	Oleum sycioniū simplex 642 compositum ibidem aliud ef- ficacius, Oleū melinū	643
		Oleum picinum	532
		Oleum raphaninum	644
		Oleum ricinum	ibidem
		Olei rosacei confectio	642
		Oleum sesaminum	643
		Oleum susinum	ibidem
		Oleum uiolaceum	644
		Oleum	

I N D E X.

- Oleum melle quanto leuius** 662
Oleum uino quāto leuius ibi.
Oleum quō coquendum 653
Olei diuerso genera quomo-
do conficiantur 640
Oleoform uires 470
Olearia cos 527
Olera syluestria uitiosos hu-
mores gignunt 41
Olerum facultates ibidem
Olera cruda peiores succos
procreant quā cocta 42
Olera cōdita muria uel oxal-
me quas facultates habeant
ibidem
olfactus uitia 165. & deinde
per totum caput
διχοφόρον uinum 122
oliuæ. 45 **olostium** 526
olympus seu olympiacū 607
olynthi 526
omenti procidentia quō cu-
randa. 401 **ὀμνήσις** 174
omphaciū. 602 **omphacome-**
lis præparatio 602
onagra. 526 **onobrychis** 527
onochelos, & onoclæa 468
onoma, & ononis 526
ononis. 476 **ononis** 526
onothera, onothuris ibidem
onychus. 527 **oon** 557
ophiasis unde dicta 107
ophires 517
ophthalmia unde fiat 145
opisthocranion 363
opisthotonos. 142 **opisthoto-**
nicis potio accommoda 143
opopanax quō coqui deat 645
opos 527. **Cytenaicus, medi-**
cus, syriac⁹, orchis herba 528
ordeum 43 **oreoselinum** 527
Oribasii clidion 589
oribasii dropax Gallus 636
oribasii melitera 595 **oribasii**
parygrum emplastrum 615
origanū. 527 **oriogenes pastil-**
lus. 593 **oris affectus** 168
oris uentriculi inflammatio-
nes quomodo, curentur 191
oryza. 43 **orminum** 528
orobanche, & orobos 528
orthopnoea. 179 **oryza** 528
ossa 528 **osta, & ostheon** 406
ostraca. 529 **ostracoderma** 49
ostracites. 517 **ostrea** 50
ostrea. 529 **osyris** 528
othoma 526
otium summum ualetudini
maxime obest 40
oua puncta 45. Fricta 47
ouilla caro 47
ouillum cerebrum 488
ouium stercus 509
ouillum lac 484
ouina pellis. 487 **ouron** 529
ouum, & oui candidum 557
oui luteum ibidem
ouum aceto incoctum uētris
fluxiones deficcat ibidem
oxera emplastr. 622 **oxos** 527
oxyacanthos, oxybaphus 662
oxymeli simplex 576 **oxyme-**
li Iuliani 560. **Pondus** 563
Vires ibidem
oxymeli splenicum 588
oxymeli scillinum 576
oxænas curantia 165

Præmia

I N D E X.

P

P Aeonias	486	particularum principalium uul-		
Pæonia compositio	583	neratarum agnitio	431	
Paguri. 50	Paliuron	529	partiū attenuatarū curatio	28
Palma	551	partium extremarū præcisio		
Palpebrarum pili oculum irri-		quomodo administrāda	426	
tātes quomodo curandi	152	parthenium. 491	parthenii ui-	
Palpebrarum uisionē ex uren-		res, & utendi modus	559	
te medicamento facta uete-		parthus difficilis causæ	253.	
res omnes damnarunt	269	curatio	254	
palpebræ superioris futura		partus ex utero qua ratione		
quomodo administrāda	368	exauriatur excindaturq;	417	
palpebrarum pediculi quomo-		deinde per totum caput		
do arcendi	150	parulis 379. Eius curatio ibid.		
palpitatio cordis	189	parulis quid & quomodo cu-		
palumbus	46	retur	170	
palumbi sanguis	470	parygrum empl. Oribasii	618	
palumbi uenter	507	passer troglodytes	550	
panaces Herculeum	529	passeres exigui	46	
pancratium	529	pastillus Oribasii elidion	580	
panicum. 491	panis	pastillus dia spermaton	588	
panis syncomistos	43	pastillus purgans	562	
papauer	521	pastillus ex spina Aegyptia	589	
papaueris liquoris epoti no-		pastillus dia castorui, colicis		
tæ 355	Curatio ibid.	efficax	592	
papyrus	530	pastilli scillini quomodo præ-		
paracynanche	173	parentur	571	
paralysis quid	135	pastillus dia rhodon	588	
pararthrema	452	pastillus faustini	591	
parastata	406	pastillus cui nomen est thro-		
pardalianches	471	nus Marcellus	591	
paresis curatio	137	past. ex erica, lieni dicatus	590	
parietaria	491	pastillus neræ ex Heræ com-		
paronychia	530	mentariis	590	
paronychia	270	pastillus trigonus	588	
parotis quid	164	pastillus nymphidoti	593	
partes animalium	47	pastillus capnistos ad tussim		
particularum naturalium con-		continuum	178	
seruatio	226	pastillus Criogenes	593	
		pastillus		

I N D E X.

pastillus musæ	590	periphymosis	402	
pastillus ad capitis dolorem ex intemperie calida	115	peripneumonia quid	180	
pastilli 584. eorum differentia		periscyphismus	367	
ibidem. Vfus	ibidem	peritonæi uulnera quomodo manu curanda	398	
pastillus aster dictus	588	perniones quid 267. eorum curatio, & persæa	531	
pastillus dia corallia	588	perturbacionis oculi causa	145	
pastinaca	543	pesti. 645	pestus quid 237	
pastinaca marina	549	pestorum differentia	649	
pastinaca radix	42	pestus titianus	651	
pastinacæ. 50	patella 448	pestorum aperientium mate- ria 650. Vfus	ibidem	
patellæ fractæ curatio	ibidem	pestus Aegyptia	651	
panicum. 43	pauo 45	pestilētia quō præcauenda	88	
pectoris rupturæ, impressionis confractiois notæ & cura- tio	442	pestilentia notæ	87	
pediculi capitis quomodo abi- gendi 114	pedis ossa fracta quomodo curentur	450	pestilentiam arcentia	87
pedis digitorum luxatorum curatio	464	petasites. 531	peuce 531	
pedū rimæ quō curandæ	268	peucedanum	ibidem	
pedum œdemata discutiētia	2	phaci, & phacos	552	
peganera emplastrum	625	phæo ad oculos sanguine suf- fusus, & magnos affectus	605	
paganum	531	phagedænæ remedia	311	
pelagii pisces	49	phalangites	552	
pelarion ad ulcera	605	phalangiorum morsus notæ, & curatio. 339	phalaris 552	
pelarion ex scoria argēti	613	pharici poti signa 358. reme- dia, & Pharynx	173	
pelecinos. 494	pelles calcea- mentorum ueterum	487	phaselum	44
penis glans nuda quomodo contegatur	401	phasganion	525	
pentamylon malagma	632	phasianus	46	
pentaphyllon	530	phasolum	488	
peperi, peplion, peplon her- ba, & pepon	44	phellos	551	
peponatum smegma	597	philagrianum malagma.		
perdix. 46	perdicium 490	philocotyche emplastr.	618	
periclymenon	530	philonis antidotum	577	
		philyras	552	
		phlegmone quid	287	
		****	phlomitis	

INDEX:

Phlomis. 526	phlomos 552	pisces cetacei 56
phlyctæna 153		pisces omnium deterrimi 49
phlyctenæ quō curandæ 284		pisces molles cute 50
phœnicine emplastrum 615		pisces pelagij 49
phœnix herba 552		piscium ius 498
φόνιγμοι 125		pissa. 531 pisselæon 532
phormion. 552	phrenes 121	pistacia. 46 pisum 44
phrenitis quid 120		pituita in uentriculo redun-
phrenitidos causæ ibidem &		dans, quomodo uacu ada 18
signa ibid. Curatio 121		pityides, & pityocampæ 532
phrygius 517	phrynion 534	pityos phlœos, pityriasis 112
phthysis oculorum 156		pityriaseos curatio ibidem
phthysis quō curetur 186		pityusa. 532 pix 531
phu 552		plantæ sordida ulcera quomo-
phusca, ad conterendum cal-		do curada. 267 platanus 533
culos 583		plethoricum corpus 62
phycos. 552	phygethlon 296	Πληθώρα quid 25
phylites 553	phyllon 552	plumbago 522
phyma quid 296. curatio ibi.		plumbago quō coquenda 651
piceæ cortex, & picis flos 532		plumbum 522
picinum olenm ibidem		plumbi scobis potæ signa 361
picra Galeni 581		remedæ, & pneumon 532
pilos argentia 109		pnigalion 134
pilos extenuantia 110		podagra quid 257 signa 258
pili palpebrarum oculum irri-		podagræ causæ 256
tantes quomodo curadi 151		podagrica remedia 586
pilos nutrientia 109		podagra ad arthride quid
pinaster 531		differat 256
pingitis terra 485		podagra quomodo præcaue-
pinguedo ani naliū 47		rit possit 267
pinguia quomodo coquenda		pœcilon acopon 634
653		pollen farinaceus 486
pini resina 536		polycnemon, polygalon 532
pini nucleus 45		polygonon polygonides 506
pinus. 531	piper 530	polyidæ sphragis 590
piper aquaticum 549		polypi 50
pappi quid 362 eorum reme-		polypus quid 378 unde dica-
dia. 361 pirum agreste 480		tur ibid. euratio ibidem
pirus. 476	pisces 49	polypodas curantia 165
		polypodion

I N D E X.

polypodion	533	psimmythion	557
polypodii radices uires & mo-		psitacium emplastrum	617
7 dus exhibendi	560	psora quid 276 causæ ibidem	
pomorum omnium facultates	44	signa ibidem curatio ibidem	
pompholyx	533	psoricō. 557 psorophthalmia	
pompholigeron emplastr.	618	quid eiusq; curatio	148
pondera, ponderum notæ	661	psydriacia capitis	113
populus nigra	569	psyllium	555
porrigo capitis	112	psylli assumpti notæ 355 re-	
porphyra. 533		media	ibidem
porrum 42		ptarmicæ	534
porrum agreste	474	ptelea, pteris, pterygion quid	
portulaca	475	374 curatio, pterygion ocu-	
potamogeton	533	lorū quid eiusq; curatio	154
poterion 534		ptyas aspidis genus	346
prafion 534		pudendum masculi cerui	469
prafoides. 491		pudendorum ulcera quomo-	
præcocia 45		do curanda	267. & 270
præster unde dictus	345	pudendorū rimas curantia	232
priapismus quid 231		puerorum stercus	508
causæ		puerorum aphthæ quomodo	
ibidem curatio	ibidem	curentur	5
principium morbi quod	57	pueris quomodo cienda alius	
prinos	534	4. & 5	
proficiscentium uictus	26	puerorum tussis quomodo cu-	
prueolis	534	randa	4
propolis quomodo coqui de-		puerorum morbi & sympto-	
beat	654	mata, & pueri quo tempore	
propomata	602	dentiant, & pulegium	486
prosechii stacticum	607	pulegii uires, pondus & sūmen	
prospheysis	406	di modus	561
protelus ad claritatem oculo-		pulicaris herba	557
rum, cicatricesque extenuat		pullus columbinus	46
610		pulmo 332. agninus, suillus,	
prunus, & prunus. pruni fru-		uulpinus	ibidem
ctus, pruna damascena	507	pulmo animalium	48
pruritus causæ 269 signa ibi.		pulmonis tēperaturæ notæ	32
pruritus gingivarum puero-		puls ad purgandum	563
rum curantia	45	pulsus quid	63
psaron medicamentum	596	**** 2	pulsus
pseudodictamnion	557		
psilothrum	598		
psilothra medicamēta q̄	226		

**** 2

pulsus

INDEX:

pulsus usus duplex	ibidem	purulenti quō adurendi	393
pulsus duri & uehementis discrimen	72	purulentorum curatio	185
pulsuum genera & differentiarū recensentur & explicantur	63. & deinceps	putredini quamlibet partem occupanti accommodata medicamenta	312
pulsuū causarū & præsagia.	69	pycnoconō. 535 pyrethrū	535
& sequentibus		pyrethri pondus & utendi modus. 559	pyrgite 46
puluis cephalicus, capiti conueniens	592	pyrine empl. 616 pyritidis	524
puluis pilos abolens, ad podagram	595	pyros. 536 pyxis acopon	639
puluis ex aloë	592	Q	
pumex	505	Vantitatis quæ mensuratur tres differentiarū	660
pumex quomodo coqui debeat	652	Quercus	488
purgans puls	563	Quinquefolium	530
purgantia medicamenta non simplici quodam temperamento, sed totius substantiæ proprietate purgant	556	R	
purgantiæ oliuæ	563	R Adicula	42
purgatio ex Rhodomelite Alexxandri	563	R Radicula dulcis	486
purgationibus quos uti conueniat	556	Radices quō coquendæ	652
purgationis tempus	ibidem	Radix fractura quomodo curanda. 447	Raia 50
purgans fusca, & stomacho grata	562	Ramicum genera	227
purgantia medicamenta composita	562	Ramex intestinorum rupto peritonæo difficilius curatur quam qui ob raritatem illius contingit	ibidem
purgans pastillus	564	Ramex omenti	411
purgans uinum in hydropicis	ibidem	Ramices pueri frequētius patiuntur & quare	227
purgans bucellatus	563	Ramex uaricosus 409. eius notæ ibid. curatio	410
purgatio halatia	564	Ramex tophaceus 409. curatio	ibidem
purgatione modum excedente quid fieri debeat	566	Ramex uetosus ibi. curat	420
purpuræ	533	Ramicis curatio	227
		Ranæ. 482 Ranæ rubetæ haustæ signa 353. curatio	ibid.
		Rauarum sanguis	470
		Rapa	

I N D E X:

Rapa, & Raphanis	42	ricininum oleum	644
Raphanidon	433	ricini pondus, utendi modus,	
Raphanus. 536	Raphano quā	& uires	561
do & quomodo utēdum	42	ricinorum sanguis	470
Raphaninum oleum	644	rigioris in febrib ⁹ curatio	95
Rapum. 488	Ratiocinationis	rimæ ani quomodo manu cu	
offensa quomodo contingat		randæ	424
dignoscatur & curetur	126	rimæ digitorum totorumque	
Raucitas	175	pedū quomodo curandæ	268
Racrementum	542	rhododaphne. 525	rosæ 537
Refracto. 432	Remedia 435	rosacei confectio	642
Renes animalium	47	rosmarinus	515
Renum affectus quomodo di-		rostra animalium	47
gnosceri & curandi	207	rubia, & rubra tinctorum	492
Repletionis curatio	15	rubus. 481	rubus caninus 513
Resinæ	536	rubens cygnus	605
Resolutionis curatio	137	rufi potio contra pestem	88
Resolutionis ob colicum do-		rumex	514
lorem cōtractæ curatio	278	rumex grandis	498
Rha, & Rhacos	536	ruptorum remedia	303
Rhagadæ ani & pudendorum		ruptis à quibus abstinēdū	228
quomodo sanandæ	232	ruta. 531	ruta sylvestris 524
Rhamnus. 536	Rheon 536	rutæ sylvestris nocentur re-	
Rhetinæ. 536	Rhinariū 608	media. 224	ruta ueneris ardo
Rhoda	537	rem obtundit	16
Rhodia radix	537	S	
Rhodia ad supprimendum san-		Sabina. 482	Sachar 520
guinem ulcera depascentia,		Sagapenum	537
& excrecentias	596	Sagapenū quomodo coquen-	
Rhodomalum	602	dum. 651	Sal. 471
Rhœ, & Rhœa	537	Sal quo	
Rhœlis confectio	603	coqui debeat	652
Rhogme. 432	Rhu 553	Salis flos. 473	Salamādra 537
Rhyas quid eiusq; curat.	151	Salamandræ assumptæ signa	
Rhypos	537	358. curatio	ibidem
Rhythmus quid	65	Sales theriaci. 574	Salix 498
Rhythmū differentia	ibidem	salsamentum thymi	546
rhythmus in pulsu quid	ibid.	Salsæ & nitrosæ aquæ quibus	
ricinum	505	conferant	24
		Salsorum uires	467
		*** 3	Saluia

I N D E X.

Salvia. 490	Sambucus 471	satyriasis quid eiusque causæ
Sambuci corticis radice pondus, vires, & mod' utedi 581		230 quæ symptomata eam consequantur ibidem
Samia terra 484		satyriacum antidotum 583
Sandaracha 534		satyrion. 538
Sandaracha quomodo coquenda 647		saxifraga, & saxiphages ibid.
Sandix. 534	Sanguis 570	scammonia 531
Sanguinē e naribus profluentem in febribus quomodo sistere oporteat 103		scandix 41 & 541
Sanguinis e naribus profluvium sedantia 166		scapularum compressionis, ruptoræ, refractionis notæ & curatio 442
sanguinem comouentia 236		schidacidon 432
Sanguis bubulus 48. leporinus ibidem, porci iuuenis ibidem, caprillus ibidem		schinos. 546
Sanguis ex uena, arteria uel naribus profluens quomodo sistendus 320		schistos 516
sanguinem uenane an arteria profundat quomodo dignoscatur 321		scillini pastilli quomodo præparentur 592
sanguinis renum profluvii curatio 211		scirrhos quid 303 eius differentia ibidem, qui sit insani- bilis ibidem, causæ ibidem, cura- ratio ibidem & 304
sanguinis profluvium curans medicamentum 212		sclerophthalmia quid eiusq; curatio 178
sanguinis ex ore profluvium quomodo sistendum 172		scolopendra merina 541
sanguis animalium 48		scolopendræ morsus notæ 341
sanguinaria 534		curatio ibidem
saporum species 462		scolopomachætion 366
sapphyrus. 517 saprotes 537		scolymon 541
sarcocolla ibidem		scolymos quas vires habeat 41
sarcomata curantia 165		scordion. 541
sardoniana herba 358		scordon 572
sardonianæ herbæ potæ signa ibidem		scordoprason 542
satireia 497		scorpoides 542
		scorpius. 406
		scrotum 407
		scroti inflammationis notæ 228
		scrupulus. 662
		scylla 541
		scytales morsus cura 344
		secundæ relictæ quomodo manu educendæ 419
		sedes, Vide anus
		se di

I N D E X.

sed illita quæ purgent	568	signa concoctionis nunquam	
sedis tuberosa ulcera quomodo curanda.	300	sinistre apparent	ibidem
selemusia terra	485	signa decretoria ubi morbus inclinauerit, bona sunt	ibid.
selinon	538	siliqua.	662 filiquæ 46
semen redundans quomodo imminuendum	17	silphe, & silphium	540
semina quò coeuenda	656	silurus, silibon sinapi	524
feminis redundantis noxa	17	sinapismi usus	636
feminaria uasa	35	inciput quibus secetur	367 & quomodo ibidem
sempervivum	469	singultus causæ	102
senescio herba	495	sinus quid	216 eius cura ibid.
serecta anguis	479	sion	340
senum habitus quomodo ricalfaciendus	13	sion quas habeat vires	41
seuum uictus ratio	12. & sequentibus.	siræon.	493 siricum 538
sepia	50	sifarum, & sifer	540
sepiæ testa, & seps	539	sisymbrium, & sison	ibidem
serapionis melæne emp.	616	sitis in febribus curatio	100
serapias.	528 seris 59	smegmata	594
seriphum, serpillum	492	smegma dentium	170
sertula campana	520	smegma pepouatum	597
serum lactis quomodo à caseo discernatur	49	smilax	543
sesamoides	539	smilacis potè signa	357 remeda 358
sesaminum olenm	643	smilion ad abscessus	612
sextarius	658. & deinceps	smiris.	517 smyrna 543
ficci temperamenti notæ	29	smyrnion	ibidem
ficyos.	540	smyrni vires	41
ficyos agrios	ibidem	stæchas	544
ficyonium oleū simplex	642	sol si quem exusserit, quid faciendum	18
compositum ibidem, aliud efficacius	ibidem	solani furiosi poti signa	358 remedia, & solanum 544
fideratio quid	291 uide sphacilos, & fideritis 529	solare cyphi	645
fideros, & fidion	538	solstitium æstiuum quid efficiat in hominibus	56
signa decretoria in morborum principio praua sunt	61	solstitium hyemale quid in corporibus humanis efficiat.	55

***** 4 somnus

I N D E X.

Somnus quid	52	dus utendi	561
Somni uehementis causſæ.	53	squatinæ	50
curatio, & Sonchus	542	squillæ, & stachys	543
Soporis uehementis causſæ ibi		stacticum proſechii	608
dem curatio	ibidem	staphiloma	153
Soporis noxiij curatio	93	staphyloma quid 374. curatio	
forba. 45		ibidem	
fordes balneorum	537	staphylinus. 543	ſteata 543
fordi	486	ſteatoma quid	306
fotera, antidotum	546	ſtegnosis	10
ſparganium	486	ſtellio transmarinus	342
ſpartos, & ſpeclarium	542	ſtellionis transmarini morſus	
ſpecularis lapis	543	remedia	ibidem
ſphacelos quid	ibidem	ſtercus 508. Canum ibid. Pue	
Curatio	291	rorum ibid. Lupinorum ibid.	
ſphæriō empl. ad ardoreſ	292	Caprillum ibid. Bubulū ibid.	
ſphincter 203 Σφύγκτης	621	ſtercus caprillum	262
ſphongion malagma	332	ſterilitatis remouendæ ratio	
ſphragis polyidæ	631	250. & deinceps.	
ſpica nardi 542 Indica, Syria-	590	ſternutamēta quæ citent	166
ca, & ſpina alba		ſternutamēta in febris quō	
ſpina Aegyptia uel Arabica	471	modo curentur	98
ibidem		ſtigmata quō curanda	282
ſpinæ gutturi quomodo exi-		ſtimmi, & ſtœbæ	544
mantur	382	ſtomachus quomodo adura-	
ſpirandi difficultas	179	tur	396
ſpodium. 543 ſpondylion	545	ſtomachus atra bile uitioſus	
ſpondyli	50	quomodo curandus	192
ſpongia, & ſpongos	543	ſtomachi exundationē impe-	
ſpongiarum lapides	517	dientia. i ſtomacho in febr-	
ſpontanearum laſſitudinum		bus quæ cura adhibenda	94
tres ſpecies, earum curatio		ſtomachi doloreſ conuulſoriū	
11. & deinceps.		quomodo curandi	195
ſpuma niri	480	ſtomachi affectus curâtia	191
ſpumæ argēti potæ ſigna	361	ſtomachi roſtionē emēdâtia	1
remedia, ſputi notæ	76	ſtomatica Aegyptia	600
ſputum cruentū curantia	177	ſtomatica medicamenta	598
ſquama	515	ſtrabiſimus quid, & quomodo	
ſquamæ Cyprię pōdus & mo-		curetur	158
		ſtrangulatorum	

I N D E X.

strangulatorum curatio	173	sycomora.46 sycomorus	545
stratiotes	544	sycolis quid eiusq; curatio	150
strobilina resina	538	symplytum petræum	545
strobilus	45	sympptomata & morbi puero-	
struma quid 385. Vnde dica-		rum dentientium 4 eorum	
tur ibidem ubi oriantur ibi-		curatio ibid. & sequentibus.	
dem curatio	ibidem,	synanche	173
strumæ quomodo curadæ	299	syncope in febr. causæ.	89
strutiocameli	46	remedia	ibidem & 90
strychnon	544	syntexis.48 syntexes quomo-	
stulitia unde fiat	126	do curari debeant	92
sturnorum stercus	509	syriasis quid	6
styperia, & styrax	544	syriasi succurrentia, syrica	46
styracis albi pondus, & utendi		syrmismi.54 systole pulsus	63
modus 560	suber 552	T	
succidanea inuicem medica-		T Abes quō curetur	186
menta 652 & deinde per to-		Tali articulus luxatus quō	
tum cap.		reponendus	563
succinum. 495	sudor 497	Talus bubulus	528
sudorem elicentia	22	Tamarix 523 Tarichos	546
sudori in febribus quid adhi-		Taurocolla	ibidem
bendum 96 suffimenta 648		Taurinum cornu	504
suffimen rosatum	ibidem	Taurorum sanguis	470
suffocatorum curatio	173	Tauri recens occisi sanguinis	
suffusio	375	poti notæ. 359 remedia	360
suigillata quō curetur	163	Taxus	441. & 357
suilla caro	47	Tecolithos. 517 Tedæ	483
suillus talus	528	Tela e corpore quomodo ex-	
sulfur quō coqui debeat 649		trahēda. 429 Telephion	147
sulfurata aquæ quibus confe-		Telis, & tellinæ	546
rantur 24 sulphur 498		temperamentorū ordinēs &	
suppurationem oculorum cu-		interualla	467
rancia	155	temperamēti optimi notæ	28
surditatis remedia	163	tenesmus quid unde oriatur,	
usinum compositum	643	& quomodo curetur	198
usinum oleum	ibidem	tenue, corpus quō impleat	28
uspiriosi qui 179. Eorum cu-		tephra. 547 terra	484
ratio, & syca	545	terra quomodo coquēda	654
syamina. 45	syce 545	terræ intestina	482
		terræ	

I N D E X.

Terræ tuber	550	thermarum differentia & uires 24. & deinceps	
terebinthus quid, eius causſæ, notæ & curatio	297	thermos	498
terebinthina refina	537	thlasis	432 & 433
terebinthina ad aluum subducendam quantitas & exhibitionis tempus	20	thlasis aurium	163
terminthos. §46	testæ 529	thlaspi	498
testes aphthæ ulceræ preſſi quomodo curandi	229	thoracis morbos quæ ſigna præcedant. §4	thridax 498
testiculorum caro excreſcens quomodo amouenda ibidem		thronus Marcellini paſtil. §88.	
testiculi inflammationis notæ 229 curatio	230	thus	515
testiculus quid	406	thuris lachryma quomodo coquenda	654
testiculi animalium	47	thuris manna	519
testiculorum inflammationis quomodo curandæ	300	thylacitis §24	thymbra 497
testiculorum temperaturæ notæ. §35	testiū conſeruatione 225	thymus 498	thymus 233
testudinis marinae ſanguis quomodo præparetur §48	Eius uſus	thymus locorū muliebriū 415	
tetrapharmacum empla.	614	quomodo excindendus ibid.	
tettiges. §46	teucrion §45	thymi naturalū quid 403. eorum differentia ibi curatio ibi.	
teuton	ibidem	Thynni prægrandes	50
thalaffion hydor	496	tibiae fracturæ quomodo curandæ	449
Thalafferos	610	tilia. §52	tiphodes febres 83
thalietrum	495	titanus	548
thapſia	498	tithymalus §46. Eius ſeptem ſpecies	ibidem
thapſia quō coquenda	654	titianus peſſus	652
thapſia quæ pericula nonnunquam afferat §62. eorundem remedia, & theion	498	tonſillæ §80. Eius cauſſæ ibidem, Curatio	381
thelypteron	ibidem	tonſillarum inflammationi reſiſtentia	171
theodothion minus	607	tophos in artubus quid coaleſcere impediatur	263
theriace antidotū quomodo pareretur §70. Eius uſus	572	tophi articulorum quomodo curandi	164 & 266
heriaci paſtilli quō fiant	570	tophorum commune	266
		tormina quomodo curentur	199
		torpedines	50
			torpedo

I N D E X.

torpedo marina	525	tylosis	150
toxicum unde dictum	359	V	
toxici poti notæ ibidem	Re-	V Accinum lac	483
media	ibidem	Valetudini tuendæ sum-	
trachoma quid, eius curatio		mũ otium maximè obest	40
150		Varices	409
tragacantha	548	uaricosus uarix	ibidem
tragium, & tragoriganũ ibid.		uari quid & quõ curan.	168
tragostitodes	ibidem	uasa quomodo diuidantur &	
tragus frumentaceus	ibidem	quibus	565
terebinthus	546	uasorum adustio quomodo ad	
tremoris origo	144	ministranda	366
triblium. 662 tribolos	546	uenæ sectio quomodo admi-	
tribulus, & triches	549	nistranda 391 & deinceps	
τριχίαι quæ curent	151	uenena	347
trichismus	433	uenenorum simplicium enu-	
trifolium. 538 trigle	548	meratio	351
trigonus pastillus	586	uenter 507 Mergi ibidẽ, Gal-	
triorchis. 528 triphyllon	538	linarũ uentris interior mem-	
tripolium	549	brana ibidem, Palumbi ibidi-	
triticum	43 & 535	dem, Mustelæ	ibidem
trixago palustris	541	uentriculi affectus curãtia	191
trogodytes passor	549	uentris morborum signis ap-	
tryglion	658	parentibus quid faciendũ	54
trygon, & tryx	549	uenter quõ emolliendus	56
tuberum facultates	43	uentriculus animalium	46
tubercula ani quomodo ma-		uêtriculi tẽperaturæ notæ	32
nu curanda	423	uentriculi flatus unde gene-	
turdis, & turtur	46	rentur, & quõ curentur	195
turturis sanguis	470	uentriculi intemperies quo-	
tussis	175	modo corrigantur	37
tussim continuam pastillus cu-		ueneris ardorem obtundit ru-	
rans	178	ta, Veneris commoda	16
tussi in febribus quomodo oc-		ueneris impotentia 231 caus-	
currendum	97	sæ ibidem, Curatio	ibidem
tussi grãdines & calculi ex pe-		ueratrum	425
ctore educti	175	ueratri albi assumpti noxæ	
tussilago	482	quomodo curandæ	362
tussiculæ puerorum curatio	4	ueratrũ quibus cõueniat	558
		ueratrum	

I N D E X.

Veratrū quō exhibeatur	568	sumpti remedia	362
uerbascū. 552 uerbenaca	532	uini moderate sumpti cōmo-	
uergiliarum exortus quid effi-		da. 51 uini immoderati sum-	
ciat in hominibus	56	pri incommoda	ibidem
ueri q̄ uict' ratio cōueniat	24	uinum omne nutrit	50
uermes terreni	486	uini potio in febris quando	
uerteborum contusionis, &		conueniat	78
fracturæ notæ, & curatio	443	uinū purgās in hydropicis	503
uertiginis curatio	128	uinum rubens & crassum	59
uerruca quid 428. unde sic no-		uini uires, uiola	497
minetur ibid. Curatio ibid.		uiola alba	515
uerruca penilis	233	uiolaceum oleum	643
uesicæ affectus quomodo di-		uipera	499
gnosceri, & curandi	207	uiperæ tum maris tum foemi-	
uesicæ calculi signa	404	næ morsus notæ	343
uesicæ clystere	403	uires quæ dissoluant	72
uesicæ exulceratæ signa	210	uiride empl. Macherionis	625
uesicæ morbos quæ signa præ-		uirulentorū p̄cautiones	334
cedant. 55 uesicæ morborum		uisum. 499 uitis nigra	475
signi, neglectis quæ ægritudi-		uitrum. 550 uituli marini	50
nes sequantur	ibidem	ulcus simplex quid	307
uesicæ resolutio	213	ulcus cauū quō implendū	309
uesicæ resolutionem comitan-		ulcera sordida quomodo pur-	
tia, Vespertilionū sāguis	470	ganda. 310 ulceri cicatrix	
uestis attritæ fragmentū	536	quomodo inducenda	313
uictus nauigantioni	26	ulcera carcinode quomodo	
uictus ratio omnium ætatū. 6		curentur. 300 ulcera chyro-	
& deinceps.		nia quomodo curanda	299
uictus ratio infantū, uictus rō		ulcera capitis manantia unde	
in laboribus uitam agentū	25	fiant 113. quō curentur	114
uictus rō senū 12. & sequētib.		ulcera uermes quō arcēdi	310
uictus ratio quolibet anni tē-		ulcera oculorū eorumq; cura	
pore quæ seruanda	24	tio. 152 ulcera cacoethe	315
uigiliæ quomodo arceantur	52	ulcera chironia, telepha	ibid.
uigiliarum uariæ causæ ibid.		ulcera uetera quō cur.	299
uigiliis in febris quō resistē-		ulcera articulorum quomodo	
dum 92. & sequentibus.		curentur	320
uinū albū 51 uinum dulce	50	ulcerū d. ruporum curatio	319
uinum meracioris copiosi as-		ulcus circa os sacrū unde pro-	
		ueniat	

INDEX.

- ueniat. 106 ulophonos 357
 umbilico illita q̄ purgent 567
 umbilici p̄minētis causſæ 397
 umbilici p̄minētis curat. 226
 uncia. 652 unedon. 491
 unguenta q̄uo coquan. 652
 unguentum zosimi ad tremu-
 los celebratū. 639 ungues 50
 ungues qui laborauerint, ut ab-
 ſcedant. 271 unguis oculorū,
 quid eiusque curatio 154
 unguium p̄teygiū quid 426
 ungues cruēti q̄uo curan. 217
 ungues contuſi quomodo cu-
 rādi, unguiū rednuīæ qd 270
 uocis exercitatio qualis eſſe
 debeat & quæ eius ſint cōmo-
 da. 9 uolatilia. 46 uomenti
 quid obſeruandum 19
 uomitus q̄uo prouocādus 54
 uomitus qui uti debeant, &
 quomodo. 527 ſequentibus.
 uomitus quæ comod p̄ſtet 19
 uomitioni bilis quomodo oc-
 curendum. 102 uranium 609
 ureteres. 210 urina 529
 urinam cientia. 55 urinarū col-
 lor aquoſus, ruſus, & bilio-
 ſus mediocriter pallidus qd
 ſignificet. 7 urinæ difficultas
 quomodo curatio. 213
 urinæ difficultatem indican-
 tia, & urinæ incontinentia
 unde oriatur 214
 urinā quæ mouent. 19 urinam
 mouentia. 220 urinarum no-
 tæ. 75 urinæ retentionis cauſ-
 ſæ. 403 urſorū ſanguis 470
 urtica, uteri abſceſſ⁹ notē 242
 uteri affectus 235
 uteri callus q̄uo curands 253
 uteri cancrorum ſpecies 244
 uteri clauſuræ, quam phinon
 appellant cauſſæ 250
 uteri duricies q̄uo curāda. 245
 uteri hæmorrhoides quomo-
 do deprehendendæ 253
 uteri inflāmationis cauſſæ 240
 uteri a naturali ſede declinan-
 tis curat. 241 uteri mola 246
 uteri ulcera paſcendo ſerpen-
 tia quomodo curanda 243
 uua. 381 uuæ. 44 uuæ inflam-
 matio quomodo curāda 172
 uua paſſa. 479 uulpes 573
 uuluæ abſceſſus quomodo ma-
 nu curandus 416
 uulua animalium 48
 uuluæ fluor 239
 uuluæ oſtij phymus quomo-
 do curetur 416

X

- X Anthion. 525 Xanthon
 medicamentum 595
 Xerophthalmia quid eiusque
 curatio. 148 xeftes 658
 xiphion, xyris. 525 xyraphiū
 medic. aduerſus capitis & mē-
 tiſcoſa exanthemata 114
 xyris. 525 xyſter. 608

Z


- Z Armala. 524 Zea 493
 Zingiber, & Zomos 495
 Zopyrios medicamētum 580
 Zosimi unguentum 639
 Zyme, & Zythus 495

FINIS INDICIS.

2



PAULI AEGINETAE
PERIODE VTI IN SVVM
DE RE MEDICA OPVS,



P R A E F A T I O.

*Pauli laborem nosce me, qui plurimas
Inuisit orbis terras, Aegina satus.*



ON EQVIDEM opus hoc quasi ue-
teres aliqua arti necessaria prætermise-
rint, componere sum aggressus, sed to-
tam ut disciplinam in compendium re-
digerē. E contrario enim illi rectē qui-
dem omnia & integrē e-laborauerunt:
recentiores autem præterquam quòd
illos ne legere quidem curant, etiam
loquacitatis adhuc coarguunt. Qua ra-
tione impulsus uolumen istud elucubraui, quod illis sanè qui
ipsum, ut uerisimile est habere uelint, eorum quæ legerunt cõ-
mentarius, mihi uerò exercitii loco erit. Absurdum nanq; fue-
rit rhetoras quidem compendiosis uti libellis iudicialibus, &
ad circumferendum accommodis, in quibus legum capita con-
tinentur, ut dum usus postulat, in promptu habeant, nos uerò,
nullam eorum habere rationem: quum illis non pauco tantū,
sed iam longo etiam tempore, legibus inspiciundis immora-
ri, ac differre iudicium liceat, nobis neutiquam, aut certe rarò
ea facultas concedatur. Etenim necessitas in quibusdam mor-
bis frequenter nullam ferens dilationem, subitam concretati o-
nem opemq; postulat. ob quod rectē Hippocrates occasionem
dixit

P R A E F A T I O.

dixit præcipitem. Illos præterea in solis ferè urbibus rerum utilitas incitat, & ubi libri nequaquam desiderantur: medicis autem non tantum in urbibus, aut agris, aut etiam locis desertis, uerum iam quoq; per mare frequenter in ipsis nauibus subita morborum necessitas ingruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino extremum adfert discrimen. Quoniam igitur uniuersas medendi rationes, aut particularem omnem materiam memoria tenere uel difficillimè, uel nequaquam aliquis possit, compendium hoc ex ueteribus collegi. Nulla enim de meo inserui, nisi paucula quædam in artis operibus mihi & uisâ & comperta. Nam in pluribus egregiis authoribus, magisque in Oribasio uersatus, qui & ipse librum totum, quo uniuersam de tuenda ualitudine rationem comprehendit, aliunde collegit utpote Galeno posterior, adeoq; recentior adhuc, optima quæ ex ipsis se legi, nullum quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Etenim Oribasii ipsius uolumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomæ contabiblon appellatum, quod totâ in se artis materiam complectitur, non omnes, quod grandius sit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustatium scripta, præterquam quod pleriq; morbi non attingantur, etiam imperfectam reliquorum præceptionem uideas, partim causarum, partim signorum, nonnunquam & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriam uenerint.

Præsens autem commentarius notas, causas, & curationem omnium morborum continet, similarium, instrumentorum, & eorum quæ ad unitatis diuortium pertinent: idque non summatim, sed quatenus licet amplè & diffuse. Ante hæc autem omnem uictus rationem quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremum autem librum de simplicibus compositisque medicamentis conscripsimus.

Quid singuli septem totius operis libri, nam totidem habentur, contineant.

PRimus omnem sanitatis tuendæ rationem tradit, item quomodo morbi peculiare ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisque nonnullis, caueantur, emendenturq;. Præterea ciborum omnium uires & usus habet, ut in capitibus comprehensum est.

Secundus

P R A E F A T I O

Secundus febreis uniuersas enumerat, ita ut præponantur ipsis, quæ eò conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretoriis, & id genus aliæ. Subiunguntur autem casus qui febribus superueniunt.

Tertius affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt, sicut à summo capite ad imos pedes, adeoque ungueis descendat.

Quartus agit de exterioribus, & ueluti in aperto contractis vitijs, quorum non certæ sedes assignari possunt, sed plureis particulas infestât. In quo & de tineis & dracunculis tractatur.

Quintus de animalibus ictu, morsuue uenenum relinquentibus differit, ubi & de rabiosi canis morsu, & metu aquæ adhæc de non rabili canis moru hominisque agitur. Inibi de uenis eorumque remediis disputatur.

Sextus chirurgicam omnem exponit, tum quæ carnis uitia curat, ubi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum quæ ossium fracturas, luxationesque artuum complectitur.

Septimus omnium medicamentorum uireis continet, primum quidem simplicium, deinde & compositorum, eorumque potius quæ in sex aliorum librorum discursa commemorari, præsertim maiorum & nominatarum compositionum. Scio enim illic non omneis diffusè explicari, ne disciplina, tædium afferat: tum, ut quærens aliquis unam, aut etiam plureis nobileis confecturas, faciliè inueniat. In fine adduntur nonnulla ad medicamentorum compositiones utilia. Item de alternantibus inuicem remediis agitur, ut totus liber in disciplinâ de ponderibus & mensuris definat. Incipiemus itaque primum uolumen.

Primus totius operis hic liber est, in quo omnia sanitatis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfatione dictum est. dicenturque iterum capita, ubi tantum hoc præbauerimus, quòd in primo, & secundo uolumine plurima ex Oribasio mutuati sumus. Non enim peculiarem uolumus constituere opinionem, sed ex omnibus utilitatem indipisci. In reliquis quinque libris paucissima tantum ex illius commentariis huc transtuli.

PAVLI

PAVLI AEGINETAE

I IBER PRIMVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete,

Quę grauidis superueniant, & quę uictus ratio eis conducat. Cap. I.



VANDOQVIDEM inter ea quę grauidis superueniunt, hæc potissimū infestare solent, stomachi exundatio, continuę uomitiones, sputa crebra, oris uentriculi rosio, & cibi fastidium: non alienum fuit remedia quibus ab eis uindicentur, præscribere. Pro sunt itaque ob ambulationes, cibi nō nimium dulces, uina fulua, odora, maxime quinquennia, & moderata potio. Hęc. n. omnia ne mulier stomachi exundationem experiatur uomatq; impediunt.

At medicamēti nomine, uincit polygoniū herbam aqua elixam bibere. item anethum & ponticam radicem, quę indigeti uocabulo rha nuncupatur, hæc tum ante, tum post cibum licet assumere. Extrinsecus præcordia adiuuari debent cataplasmate ex cenanthe balauatio, † cytisi smyriniq; coma, & fœniculi semine, siue per se, siue quomodocunq; uoles miscere, cum pal mulis & uino ueteri. Aduersus stomachi rosiones confert, calidam aquam bibere, quiete in ambulare. præcordia contegere lana molli. At eas quę cibum fastidiunt, uarijs & ad uoluptatem quæsitis cibis amyloq; sicco sollicitabis, magis autem hoc

PAVLI AEGIN. a obtuleris

obtuleris ijs quæ terram edere concupiscunt, ut in malacia, quod uicium Græcis Citta dicitur, accidere consuevit. id tertio à conceptu mense potissimum contrahitur. Nam tunc id quod in utero est, quicquid ratione alimenti ad ipsum fertur, tanquā imbecillius, nequit cōsumere, unde fit, ut quū uaria ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundēt, uaria & nature aliena appetat, exempli gratia, carbones extinctos, cretam Cimoliā, aliaq; complura. Hanc n. ob causam appellariōne huiusmodi affectus accepit, uel à picæ auis uarietate, uel q̄ eadē subinde hoc malo corripiatur. Iam labor, & longior peregrinatio etiam stomachum ad cibos excitat. Quæ uerò mulier citra labores agere consuevit, ea si uterū gerat, haud cōmode repentinās subibit motiones. Verūm acria quandoq; gustare, præsertimq; sinapi cibū fastidienti non fuerit alienum. Cæterū eximios pedū tumores quos œdemata Græci dicūt, anthyllis quæ in aceto maduerit, foliaq; brassicæ in latū super deligata discutunt. Item Cimolia creta ex aceto illita, similiter alumen cū aceto proficit. Rectē etiā pedes malorū medicorū, quæ Citria alias dicuntur, in aqua decoctorum iure lauantur.

† Hic locus sic legitur in ueteribus libris manuscriptis, ἔξωθεν δ' ἐοικάνθη, καὶ βαλαντίς, καὶ κυτίνω, καὶ σμυρνίῳ κόμῃ, καὶ μαράθρῳ σπέρματι, κοινῇ τε καὶ ὥς ἀνμίσγειν ἐθέλης μετὰ φοινίκων καὶ οἷν παλαιῷ καταπλάσεις, &c. Quæ lectio magis probatur quòd cytinus accommodatior sit huic medicamento, q̄ cytifus.

De Nutrire. Cap. II.

DELIGI nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate nec uetula nimium, nec adolescens, ita ut iunior quinque & uiginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neque conuenientibus neque auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnū est infanti commodū, si nutrix non multo antè pepererit, maiusq; si masculum. Vitanda ei sunt, admodum siccantia, falsa, acria, acerba, acida, amara, & ualidè calefacientia. Item odores tum foedi, tum suaues præter modum, condimenta, aliaque acria nocent. Ad hæc uenere nutrix abstineat, manus, humerosq; molendo texendoque exerceat: puerum ulnis gestet, treis iam menses quatuor uel natum.

De

*De lacte Nutricis.**Cap. II.*

LAVDATISSIMUM lac est, moderatū spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Cōmendatur & quod in unguem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neque subito neque tarde uidetur defluere. Iam uerò in hunc modum probari potest: infusio lacti in uas uitreum coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur. in quo postquam concreuerit, inspicietur, num casei portio minor quàm seruū fuerit. hoc enim lac inutile est, contrarium huic, concoctu contumax: probatissimum quod utraque habet mediocria.

Quomodo lac uitiatum corrigatur. Cap. IIII.

LAC uitiatum hoc modo corrigi debet, si crassius fuerit, pituita uomitu elicietur, qui optime oxymelite epotocitatur: laboribus etiam cibum præcedentibus eadem ex tenuabitur. Tunc nimirum in cibo conducunt, origanum hyssopum, satureia, scandix & thymus, item raphani momentum, uetusq; salsamentū cum oxymelite. At si acius tenuiusq; lac euaserit, multis quidem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sapæq; & uini dulcis potu, reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, uinum dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. Iisdem cucurbitula quoque defixa abundè præstitit. Medicamenta uerò etsi lacti generando proficere quidem aliquid sciam, non tamen frequenter ipsis uti præceperim, ut quæ uiolentius consumant. est autem foeniculi radix, & semen, prisanæ incocta: item cytisi folia ex uino nigro aut prisanæ: melanthium in passo & anethum, pastinacæ radix atq; semen, quæ calida prius irroratis admouenda sunt. Omni uerò lacte uitioso, siue crassum, siue acre fuerit & foetidum, prius emulso, puer mamillis admouendus est. Lac autē acre nunquam ieiuno adhiberi debet, foetorem eius uinū odoratum & cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato lacte tertio uolumine in capite de mamillis tractabimus.

*Educatio pueri.**Cap. V.*

PRIMUM infans recens natus melle nutriri debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimum ter, cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod obla-

tum est concoquere, tūc iā & cibus solidior rectē datur qui nō ipsum repleat. At si fortē imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior aut statim & torpidus magis euadat, uenter intumescat, infleturq; , & urinæ aquosiores reddantur, quæ repletionis notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abundē autem fuerit, duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

De pustulis puero abortis quæ Exanthemata dicuntur. Cap. VI.

Pustulis quæ p̄ puero per cutē ueluti efflorescunt, Græci ἐξανθήματα nominant, primū sanē nullū facessere negotium oportet, ubi uerō probē ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, balneis, quibus injiciatur myrtum aut lentiscum, aut rosa. deinde rosaceo aut lentiscino utendum: ceratoq; cum cerussa, ad hæc nitro abstergere lenius expedit nam ualentiora non sustinebit. Optimum uerō est nutricem dulciori uictu uti. Laudatur autem maximē si puer etiam ipse neq; pleniore, neque nimis tenui cibo alatur. At si uenter ipsius nō respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquerere oportet: si ne sic quidem descenderit, terebinthinæ instar ciceris injicies. Humectata aluo, milium potissimum offerre conducit.

De tussi & grauedine pueri. Cap. VII.

Quod si quandoq; tussicula aut grauedo puerū affligat, melitismi dicti adhiberi debent. Conuenit igitur puero liberaliore aqua calida loto caput ipsius melle copioso calido illinere, deinde digito linguam leniter premere: multum enim hoc pacto pituitæ uomitu egeret.

De gingiuarum pruritu. Cap. VIII.

Purietibus gingiuis fomēto utēdū est, & liberali unctio-
ne ex oleo discoctor in quo ceræ momentū eliquarū sit.
† In margine alterius exemplaris manuscripti hæc uerba leguntur, ὁ δ' αἴσιν μὲν ἐπὶ περισσότητι σάρκε τοῖς οὐλοῖς ἐπὶ φουμένῃ οἰκία ὁ δ' αἴσι. Idest, Odaxesmus est superuacanea quædam caro adnata gingiuis similis dentibus.

De dentium ortu. Cap. IX.

Dentiunt septimo quidem mense pueri experiuntur autem tunc inflammationes gingiuarum, maxillarum, & tendinum, aliquando etiam conuulsiones Tunc igitur

tur puero nihil dudū, quod mādi postulet. digito aut in lauacro gingiuarū continenter contrectari, & gallinaceo adipe uel leporis cerebello emolliri debent. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxillæ delicatis lanis puris contegentur, oleoque dulci & calido fouebuntur. idemq; meatibus auditorijs instillabitur. Cæterum plenius infantem tunc alere, & calida lauare oportet: & si alui profluuium experiatur, tentabimus eam epithematis quæ præcipuè sistunt, contrahere, inspergendo lanæ cuminum, aut anethum, aut apium.

Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summatim † calidè desiccare. At si uenter nihil reddit, melle in glandis figuram coacto inferius leniter irritabitur, aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro conuulsionibus puerorum optimè uidetur auxiliari heliotropium in aqua elixum, si puer in hac lauetur. confert & irino aut cyprino, & sycionio perungere, & uniuersum calefacere. Cum autē exortis dentibus digitos mordet uulneratq; bene faciet radicem iridis derafam, nec admodum siccam, ore continere. Hoc remedium ulceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum melle illitum adiuuat. Gingiuarū autem pruritus, ueteris salsamenti caro lenit.

† In ueteri codice hoc loco duplex est scriptura: prior enim καὶ ὁλως θερμαίνεν καὶ ξηραίνεν Posterior καὶ θερμῶ ξηραίνεν, calido desiccare.

De oris ulceribus quæ Aphthæ dicuntur. Cap. X.

Oboritur puero etiam ulcus quod aphtha uocatur, nūc subalbidum, nunc subrubrum, alias crustæ modo nigresces, quod omnium periculosissimū & lethale est. Remedio erit, iris cum melle, & sicca inspirata Item rosarum folia contusa, earumq; flos, crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdē, & simul & priuatim singula melle tincta: adhæc mulsa, & mali punici dulcis succus ꝑficit.

Ad femorum intertrigines. Cap. XI.

Femorum intertrigines myrtus arida iuncus angulosus, & rosæ inspersa iuuant.

Ad aures humentes. Cap. XII.

Aurium humiditates lana ex alumine imposita, aut mulsum, aut uinum uetus instillatum, aut crocum ex uino detritum, desiccant.

SYriasis, est inflammatio partium circa cerebrū eiusq; mē-
branas: concavum in ea fit sinciput, concavi itidem cum
pallore oculi, accedit & corporis totius siccitas. Succurrit
huic malo vitellus oui sincipiti cum rosaceo, romenti modo
impositus: sic tamen, ut continuè renouetur.

Aliud ad Syriasim.

† Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci
heliotropion, latini solarem nuncupant, cucurbitæ ramenta,
cucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem,
aut hortensis solani succum cum rosaceo.

† In ueteri codice hic locus sic legitur, κατὰ τὴν βρογχίτιν
ἐπιτιθέναι χρὴ ἡλιοτρόπιον καὶ ῥιζὸν καλὴν μένιν. sed legendum su-
spicamur ut est apud Aetiū ἡλιοτρόπιον σκορπιούρεον καλὴν μένιν.
Id est, heliotropij quod scorpiuron uel scorpioedes dicitur.

*Ratio uictus infantium, atq; reliquarum deinceps
ætatum, ad usq; declinantes. Cap. XIII.*

POSTEAQUAM lacte nutriri infantes desierint, liberiore eis
modo & suo ingenio hilariter uiuere permittemus: exer-
citia autem & alimenta leuiora. Ab anno sexto & septi-
mo, tum pueri, tum puellæ, literatoribus blandis humanisque
prædentur, tales enim cum animi remissione & gratia docent.
Animi autem relaxatio ad probam corporis educationē plu-
rimum adfert momenti. Duodecimum annū egressi, ad gram-
maticos iam & geometras mittendi sunt, corpusq; eorū exer-
cere oportet. A quartodecimo usq; ad primum & uigesimum,
mathematicis disciplinis & sapientiæ studio incumbunt: exer-
citijs pluribus propter corporis robur credentur, ut & animo
& corpore laborantes, à libidinis impetu coerceantur: his etiā
uinum circuncidendum est. Aetate florentibus educatio abso-
luta tum animi, tum corporis congruit, eoq; exercitijs omni-
bus, præsertim quibus quisq; assueuit, utendum cibo pleniore
& ualenti. Declinantibus autem remissa competit & animi &
corporis educatio. Exercitia enim qualiacūq; fuerint pro ho-
rum ratione imminuere oportet: alimento detrahendum, ut
quorum habitus iam frigescere incipiat.

De

LIBER I.

De frictione præparatoria, quæ parasceuaſticè dicitur. Cap. XV.

ANte exercitationē corpus mediocriter calefacere oportet frictione linteis adhibita, deinde nudis manib⁹ oleo intinctis perfricare, usq; dum bene incalescat emolliaturq; colore uiuido rubescat, & in tumorem attollatur.

De exercitatione. Cap. XVI.

EXercitatio motus est uehemens: uehemētia autem finis est, respiratio crebra. Id uerò cōmodi præstat, quòd parteis instrumentarias morbis non opportunas efficit, & functionibus obeundis ualidas: præterea ut alimenta fortius attrahant, promptius immutent, & liberalius reficiantur, caloris beneficio quem illa excitauit. adde q̃ meatus expurget, recrementa, propter ualidam spiritus motionē, expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus membratim digestionem adiuuat, † non debet crudi incoctiq; siue cibi, siue humoris copia, in uentre, aut uasis cōtineri. periculum enim est, ne priusquam probè fuerint concocti, in uniuersas animantis particulas distrahantur. Vnde manifestò liquet exercitationē cibum præcedere oportere. Notæ autem quæ opportunitatem laboris subeundi ostendant, ex urinarum colore petuntur: erenim aquosa nondum coctum humorem qui ex uentre distributus est, significat: rufa autem & biliosa, iampridē elaboratum esse notat: mediocriter pallida, concoctionem modo factā indicat. Tunc igitur ad exercitia ueniendum est de positis prius recrementis: tū quæ in uesica, tū quæ in aluo cōtinētur.

† Veterum librorum alter habet hanc scripturam δει μήτε πλῆθος ὠμῶν καὶ ἀπέπτων, μήτε σιτίων, μήτε περιττωμάτων, μήτε χυμῶν, &c. Id est non debet crudorum & incoctorum neque ciborum, neq; excrementorum, neq; humorum copia, &c. Quam lectionem in meliorem esse faciliè quiuis ex secundo libro περὶ ὑγιεινῶν intelligere potest.

De exercitationem generibus. Cap. XVII.

OMnis exercitationis commune est, q̃ animali ex ipso caloris augmentum excitat. Singulæ autem exercitationes proprium habēt officium, ualida sanè, hoc est, uiolenta musculis & neruis robur præstaret, cuius generis est

quum quis fodit, & maximo onere sublato, aut eodem loco manet, aut paululum procedit: item acclivis ambulatio huius quoque generis existit: praeterea per funem manibus apprehensum scandere, aliaque plurima consimilia. Celeris autem exercitatio citra robur violentiamque peragitur: id genus sunt, cursus umbratilis, armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum quae per corycum & parvam pilam fit exercitatio. Composita autem ex ualida & celeri, quando quas ualidas diximus ijs omnibus ut uehementibus uti licet, motus modo celeritatem adicias. Praeterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia cruraue laborant: per alias spina tota, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri uero oportet quousque corpus in tumorem attollatur & rubescat, motus prompte aequabiliter & continue aedat. Inter haec autem sudorem cum calido uapore mixtum cernes. Pausandum uero ab exercitatione tunc primum est, quum aliquod horum fuerit immutatum, nempe si contactior corporis moles uidebitur, ilico desistendum est: similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiam quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conueniet. Itidem si in sudore ulla qualitatis eius, aut quantitatatis mutatio accidat: quum enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictione apothera pica adhibere, ut pedotribus facitare solent.

*De generibus frictionum.**Cap. XVIII.*

INter frictiones, dura ligare corpus potest: mollis, soluere: quapropter quae supra modum resoluta sunt, duriter perfricare oportet: quae autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore praeditus sit, neque molliter, neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet uterque excessus uitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimat: modica uero & mollis, e contrario implet. Porro tres quantitatatis frictionum differentias, si tribus quae a qualitate ducuntur, iunxeris, nouem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim una iuxta quantitatem, nempe multa, si tribus quae a qualitate sumuntur, duram dico, mollem, & mediocrem, adiungatur, treis secundum duritiem differentias efficit: modica rursus si eisdem tribus addatur,

datur,treis alias procreat . At mediocris qualitate eisdē tribus iuncta,alias treis progignit,ut in formula subiecta uidere licet.

Q V A N T I T A S

Q V A L I T A S

Multa	}	&	}	Dura
Multa				Mollis
Multa				Mediocris
Pauca	}	&	}	Dura
Pauca				Mollis
Pauca				Mediocris
Mediocris	}	&	}	Dura
Mediocris				Mollis
Mediocris				Mediocris

De uocis exercitatione. Cap. XIX.

INter uocis exercitationes suavis lenisq; modulatio nihil ad sanitatē tuendā proficit: grauioris autē uocis sonus utilis habetur, eoq; exercere eum oportet. Ita enim aer copiosissimus inspiratu in corpus attractus, thoracē, uentrē, & meatus totius corporis diducit, dilatat, aperitq;. Quapropter ipsa lectione humiditates quæ redundant, excernit. fortius igitur legentibus, magis & per sudores: lenius autem, per latentem totius corporis perspiratum. Accidit enim propter extenuationē multa recrementa, nempe sputa, mucos & pituitam, per secretum excerni cōsumiq;. Ijs uerò qui propter frigiditatem exalferi desiderant, quodnā aliud præsentius remedium esse potuerit, quàm functio quæ respiratione peragitur? Consiliū igitur est, hos frequēter legere, ut toto corpore relaxato, fusaque carne, arteriā & alios spiritus trāsitus studiosè rarefacientes, per grauiiores uocis actiones modulētur. Vti autē oportet uocis officio neq; temere, neq; inconsideratè: sed quū nec uitiolis corruptisq; humoribus repleti sunt, neq; magnæ & euidentes stomachi cruditates apparēt, ad uocis exercitationē accedēdū est, ne corrupti uapores per corpus largius distribuant.

De lassitudinibus ob exercitationem. Cap. XX.

VLcerosa lassitudo ab excrementorum tenuium simul & acrium copia contrahitur. Tensoria nullum quidem excrementū, cuius ratio aliqua sit habenda, in corpore cōtineri indicat, sed in musculis nervis quæ affectus quāquo

quo tendi videntur, residet. Ea uero quæ inflammationis specie præ se fert, in qua nimirum ceu contusas, aut inflammatione obsessas partes sentimus, tunc solet incidere, quum musculi impendio excelsi, aliquid ex circumfusis sibi recrementis attraxerunt. Est & alia quædã præter has quarta affectio, quæ oritur, quum musculi supra quàm par est, siccantur, ita ut uestibus exutis squalens corpus contractumq; appareat, atq; ad motus pigrum. Remedium ulcerosæ lassitudinis est, si quæ redundat, euapores frictione multa molliq; cum oleo copiosiore, quod omnis astrictionis sit expers. Altera lassitudo in qua tensio sentitur, hoc pro curatione desiderat, ut relaxetur. sanè relaxatur quod distentum est, pauca & molli frictione, eaq; ex oleo dulciatq; egelido: item intermissione omnino, quiete, balneis temperatis atq; in calida, mora longiori: adeò si bis tæne ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lassitudinis inflammatoriae curationis consilium, ad tria dirigitur, nempe superuacanei euacuationem, extenti remissionem & inflammationis refrigerium: itaq; & oleum copiosum tepidumq;, & frictiones molliissimæ, & lenta in temperatis aquis mora, eiusmodi lassitudines persanant. pari modo & multa quies, unctiones assiduæ. Quarta affectio nihil sanè à priori consuetudine immutari postulat, nisi calidiorem aquam quæ sensim contrahat: altero die, apotherae exercitationem. protinus autem in lauacra frigidi solij exilient,† omnes autem qui lassitudinibus laborant, cibo boni succi refici debent.

† Vetus codex hanc scripturam habet, ἐν θύρῃ δ' ἐκβάντες οἱ κεκοπῶμένοι δέονται τροφῆς. Id est simul atq; balneo excesserint oleo indigent. Quam lectionem Copus sequitur, sed scriptura quæ Orosius restituit ἐν χύμῳ δ' ἀπαντες δι' κεκοπῶμένοι δέονται τροφῆς. melior est.

De cute astricta.

Cap. XXI.

ASTRICATIO, quam Græci stegnosin uocant, accidit, aut obstructis, aut densatis meatibus. obstructio quidem ex copiosis crassisq; humoris crudis concoctionemq; non expertis, oritur: densatio autem, ab ijs quæ refrigerant, aut astringunt, aut desiccant. Acprehenditur sanè iam dictus affectus, statim ubi se exuerint, ex colore albo, & curis tum duritie, tum densitate: tum q; in ipsa exercitatione

citatione uix incalescant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ ualentiore exercitio, balneisq; , calidioribus petenda est. Mora uerò in frigido folio diuturna non fit. imò nec ipsa aqua nimium fit frigida. Vbi uesteis sunt induturi, ungentur aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abundè etiam sanat oleum anethinum, præsertim si uiride fuerit anethum, oleumq; ex populo nigra confectum.

De spontaneis lassitudinibus. Cap. XXII.

QUONIAM ulcerosa lassitudo ex acrium recremen-
torum uitio contrahitur, siquidem paucus omnino
uitiosus humor fuerit, apotherapiæ exercitatio suf-
fecerit: si copiosior, & altius in corpore redundarit, eiusmodi
malo obnoxius, nec exercitationem, nec ullum omnino
motum iniungemus, sed quiete. somnoq; recreatos absti-
nere cibo totū diē cogemus, deinde uesperis pinguiter unctis,
temperatoq; balneo lauatis, cibū boni succi & forbilem modi-
cum dabimus, non tamen à uino eos arcetes. hoc enim semi-
crudos humores, si aliquid aliud, cōcoquit. Si ergo his peractis
symptoma conquieuerit, ad consueta munia paulatim redu-
cendi sunt: sin in posterum etiā diem remaneat, de ualencio-
re iam remedio considerandū est. Si enim uires constent, duo-
rum alrerum, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhiben-
da, sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quòd si ui-
res inualidæ sint, sanguinem dimittere haud quaquam oportet,
sed deiectionem mediocrem tentare. At si crudi humores
omnino fuerint, neq; sanguinis detractio, neq; purgatio, neq;
exercitium ex usu est, imò ne mouere quidem in totum, aut
lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, ci-
bis, potionibusq; , & medicamentis, quæ extenuent, incidantq;
sine manifesto calore, reficiendi Pro cibo igitur oxymel, modi-
cum ptisanæ, nonnunquam, & mulsæ exhibebitur. Quoniam
uerò præcordia eiusmodi omnibus turgida, inflataq; sunt, ac
facile quicquid assumpserint in flatum conuertitur, satius fuerit
cum cibo piperis aliquid offerre. Vtilius autem erit, & medica-
mento quod diospolites dicitur, uti: item diatrion pepereon,
simplici: utilissimumq; ipsis est oxymel. Potui sumet apomel,
præsertim ubi coacuit, uinaq; leuiter acescentia. cibi erūt qui
siue calore attenuent, cuiusmodi est capparitis si ex oxymelite.
aut

aut oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exercitijs oboritur, copiam innuit solidas corporis parteis distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse præsidium quum sanguinis copia subest, aut uenam incidere, aut malleolos scarificatu sauciare. Quæ uerò inflammationem repræsentat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus, tribusue diebus eodem tenore consistit, sed protinus febrē accendit uehementissimam, nisi sanguinis detractioe malo prius occureris. Præstiterit autem, si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrahare: ac primum quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur: secundo autem, ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturque, bonæ fortunæ beneficio opus habent.

Viētus senum ratio. Cap. XXIII.

Senectus quum sicca, frigidaq; existat, per calefacientia, humectantiaq; corrigi debet. Frictio itaq; adhibenda est, citra lassitudinem: imbecilliores ter die cibo refici debent: ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico: septima uerò hora ubi frictionum, exercitationesq; ipsis congruas, & balneum fuerint experti, primum sanè quæ aluum emolliunt, assument, deinde pisces, aut auiculas, hinc in cœna ea quæ optimi succi sunt, & ægrè corrumpuntur. Non prohibeo item uinis ex melle preparatis uti præcipuè quibus de calculo in renibus creato, aut etiam podagra suspitio est, quando petroselinū uino rectè iniicitur. At si quādo pituita in uentriculo contracta, necessitas est, aliqua quæ eam incidant, deligere, protinus ad humectantem uictus rationem, digrediendū est: ac fici maturæ ante alium cibum ipsis exhibētur: per hyemem uerò caricæ, si nullum in dextra præcordiorū parte symptoma accidere sentiant: At quia serosa pituitosaq; in senili corpore excrementa colliguntur, urinam quotidie promouere consilium est, & aluum subducere, præsertim oleo quod ante cibum absorbeant. Clarum uerò est, omnia olera ante cibū ex oleo, garoq; sumi oportere: item oliuas muria seruatas, quas halmadas dicunt, & damascena. Quod si uenter magis astrictus nihil deiecerit, & mercurialis herba, & cnicū abundè sunt. benefacit etiam resina terebinthina, interim unius auellana

na

nae, interim duarum triumve magnitudine sumpta. Iam oleū quibus alius contracta est, per clysterē utilissimè infunditur.

E De rugoso corpore. Cap. XXIIII.

Rugat corpus erui farina, uiti albæ mista.

Aliud sinegma quo continue corpus abstergitur.

FICI pingues simul cum bryonia contusæ, farina erui, combusta sepia testa cum mellis momento affuso.

Quomodo corpus suauiter oleat. Cap. XXV.

VT corpus bene oleat, eidem unctioni cupressi comam aridam contusam admisceto, aut piceæ cortice. Meminisse uerò debes, ut manè postquam corpus uestimentis menierint, pauxillum casia aut sabinæ herbæ degustent.

Quomodo habitus recalescat. Cap. XXVI.

VVando quidē uerò habitui senū succurrere oportet, utatur dū lauat, puluere calefacienti, aquæ indito qui constat, nepita, sampsocho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, fæce combusta, nitro, pumice, pro cuiusque ratione: item sinapis, herbæ pediculariæ, & cocci gnidij momento. à balneo, acopo quod calefaciat utatur, uinū fuluū uetus potet, sumatque propoma ex mulso pipere, ruta, & consimilibus

Quomodo color malus emendetur. Cap. XXVII.

COrpus declaratū pallidū uita læta & cibus gratus emendat, miscetur autē huic radícula, porrum, & uiride cicer. Iam mali punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bonū colorē efficit. Proficit et oleū cui bryoniæ radix diutius sit incocta. idē & corporis cutem intendit, erugatq;. Ijs autem, qui corpori nitorem conciliant miscere cōuenit pastillos, qui sunt ex cuiusdā abstergentis farina, bulbo, narcisso, & bryoniæ radice. bene colorant, si copia datur, tū radix, tum semen amaræ amygdalæ in aqua elixa, qua pro lauacro utitur.

Ad liuores. Cap. XXVIII.

Luescere senum corpora prohibemus, si cutē ipsorū crassam, & iniurijs haud faciliè opportunam, habitumque calidiorem reddiderimus. Vt autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigruerit uti conueniet eandemque fomentis per spongas decocto raphani aut absinthij immerfas, adiuuare.

Quomodo

Quomodo dentes ab iniuria asserantur. Cap. XXIX.

Dentes ab interitu uindicabis, si primum caueas ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, adhuc ne continuè uomas, deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum quòd durum nimis sit, palmulas uix fragiles, adhuc omnia glutinosa, quæq; adeò frangi contumacia sunt, ut denteis commoueant. insuper uitare oportet, quæ denteis stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida. Conducit itidem secundum cibum denteis purgare.

Quomodo grauis auditus corrigatur. Cap. XXX.

Ad grauem auditum corrigendum, uincit primum meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autem linteum dropaci intinctū ipsis demittere, atq; prius expressum retrahere. summe enim meatus purgat, & simul auditum auribus reddit. Deinde aliquo erui in star inserto, meatum ad diem obturbabis: postea ipso exempto quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis, sinapi, & ficis contritis factum penicillum ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleum, quod in asphodeli radice excauata efferbuerit.

*De oculorum caligine.**Cap. XXXI.*

Ne caligine oculi corripiantur, quū in aquam frigidā te mergis, illos diu in eadem apertos esse cōueniet. hinc enim robur uisui adijcitur, Lēctione uerò nō te fatigabis, uino crasso & dulci abstinebis. similiter cibus qui in superiore uētre diu remorantur, cōcoctu difficiles, & qui humores lentos, crassosq; generant: itē cauebis erucā, porrū, & omnia quorum acrimonia sursum effertur. Vitare etiā oportet supinum incubitum diuturnū, frigus uentos cōtra oculos flantes, fumū, & puluerem. Iam uerò aquā oculis instillare quotidie ad mensem totum, iuuat. quæ in hunc modū præparatur, fœniculum uiride fictili uasi extrinsecus picato, cum aqua cœlesti demittitur, deinde exempto fœniculo quod reliquum est repones.

*De repletionē.**Cap. XXXII.*

Purimum noxæ ciborum repletio conciliat, quamuis n. probè quippiam uenterculus concoquat, uenæ tamen nimium repletæ, laborant, distenduntur, rumpuntur, obstruuntur,

struuntur, flatu implentur, & ualde grauantur. deterrimum autem habetur in morbis, uenas esse repletas. at uentris repletio si urget, interim uomitu quod redundat, interim per aluum excernitur: in totum inualidior hæc, ea est quæ uenis accidit, non tamen & ipsa admitti debet, sed si quis impendio plura assumpserit, statim eum uomere oportet. periculum etenim est, ne obita concoctione uenæ repleantur: magisque si intemperantius cibus continuè assumptis, nullam deinde uacuationem experiatur, uomitu, igitur sollicitari debet prius quàm cibi corrumpantur. At si aliquid eum impediat, aluus soluta frequenter succurrit. sin minus illa fluxerit, certè diutius dormire & potui aquam calidam frequenter sumere, consiliū est. Vbi iam abundè concōxerit, præsertim aluo largiter fusā, lauacris fomenti sūque adiuuare, salsamenti parum ac potionem dilutam exhibere oportet. At si neq; descenderit aluus, neq; celeriter obita est concoctio, sed corpus uniuersum graue, ad motus pigrū, & sommolentum fuerit, mens præter rationem quodāmodo torpescat, uenarum repletionem esse cognoscas. Qui uerò præter hæc lassitudine premuntur, eos conquiescere dum uentriculus ingesta concoquat, deinde laboribus iuanire expedit.

*De ebrietate.**Cap. XXXIII.*

Ebrietatem uomitus repentè obortus discutit: item aquā & mulsam liberalius superbibere uincit, atque sic uomere, usque dum plurima reiecerint, ac stomachi uellicatus obtundatur. à uomitu solium ingressi copiosè unguentur, reliquo tempore conquiescent, & accuratè & cooperti diutissimè dormient, quousque temulentia discutiatur.

*Quibus cibi corrumpuntur.**Cap. XXXIII.*

Cibis in uentre uiciatis, si quæ corrupta sunt deijciuntur, maximum ad sanitatem est compendium: sin minus, ijs quæ leniter subducunt aluus irritanda est. Huiusmodi autem malo affectis uomitus ante cibum, uini dulcis potu excitatus, conducit. Nullum prætereà cibum uel nidorosum, uel graueolentem, uel in totum corruptioni opportunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni succi sunt deligere. Iam per interualla temporis mediocria alium subducere, ex ijs quæ mediocriter purgant, ita affectis confert.

De

De Venere.

Cap. XXXV.

Veneris hæc sunt commoda, repletos inanit, corpus agile præstat, in augmentum promouet, & uirile magis efficit. Quantum uerò ad animum spectat, in impeditam intelligentiæ uim dissoluit, iratos mitigat, eoque melancholicis coitus, si quid aliud, remedium est accommodatissimum: item alio modo insanientibus integritatem sensuum restituit. Iam ex pituita morbis uenus est utilissima: cæterum alij etiã cibum respuentes, eius cupiditatem hinc recuperarunt: alij, continuis per somnum ueneris imaginibus liberati sunt. Porro natura ueneri idonea est calida, & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minimè uerò coitum excitat uictus qui siccatur refrigeratque, ætas senilis, tempus autumnale. Quapropter uictus ratio humida calidaque adhiberi debet, mediocritas, & laborum, & ciborum. Quemadmodum uerò moderati labores, ita etiã concubitus ipse mediocris conuenit. Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam, eoque cibi potissimum ualentis materiæ utiles sunt: ex piscibus autem polypodes. ut qui alioquin etiam ad uenerem incitare credantur: his adduntur, molli cute præditi: ex oleribus autem, orminum, erysimum, eruca, & rapum, quæ in medicamentorum uicem dantur: ex leguminibus prosunt, faba, cicer, ochri, & dolichi, & pisæ, quæ præterquam quòd largiter corpus alunt, flatibus etiam replent. Ruta igitur quia flatus discutit aboletque, ideo etiam ueneris ardorem obtundit. magnificè autem probouas, ut quæ humectent, & spiritu sanguinem repleant, qui in uenerem proritat. Quum igitur concubiturus es, nimiam satietatem, cruditatem, lassitudinem, cauebis: item ne uomitus, aut purgatio præcesserit. similiter repentinum alui profluuium: inueteratum enim fluorem uenus deficcat. At uehementis coeundi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim ij quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exercitationem, balneum, moderatumque cibum, uenerem exercere ita enim uiribus conducit, & frigus abortum minus efficitur. Tempus autem concumbendi opportunum est, secundum cibum, ut supra dixi, antequàm somnus inuadat, lassitudo siquidem ex coitu contracta, obdormienti statim remittitur. Id uerò tempus etiam liberis procre-

procreandis accommodum est, tum alijs de causis, tum quòd mulier consopita, genituram facilius retinet,

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus, καὶ πνεύματος ἡμιπλάσι τὸ σῶμα, δὲ ἡ ἐξοργὰ πρὸς ἀφροδίσιαν. Idest, corpus flatu implent, qui ad libidinem excitat. Qui sensus simplicior est.

Ad eos qui uenerē exercere nequeunt. Cap. XXXVI.

Naturalia cōtinuè pingui ungentur, cui adiectum sit narcissi radicis momentum, aut cocci gnidij, aut pyrethri, aut herbæ pediculariæ, aut seminis urticæ, aut uiticis. Præbibere autem ante uenerē oportet piper, aut satyrion aut erucam, aut cnicum, aut simul omnia. esse confert ante cibum bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillæ marcidæ modicum: item compositis aduersus hoc uitiū inscriptis remedijs utendū est: item subinde lasciua legere competit.

De ijs qui immodice coierint. Cap. XXXVII.

Quoniam ex immoderata uenere corpus ratiū, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est admouere nimirū quæ dēsent, calefaciant, humectēt, cōfirment. Qui igitur immodico cōcubitu exhausti sunt, uestimētis calidis operti cōquiescēt, sōnoq; satis indulgebūt, donec corporis cōtentio sublidat, & illi ab imbecillitate sese recollerint.

Si semen genitale redundet. Cap. XXXVIII.

Nonnulli semine copioso & calido collecto, in uenerem prouunt: quod cū in coitu egresserint, corpus inualidum & stomachum resolutum obtinent, extenuantur siccanturq; ob quā causam si rursus à cōcubitu abstinerint, capite grauantur, & anxij fiunt, deinde statim ueneris insomnia experti eodē modo afficiunt. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamēta quæ id corrumpāt, offerri debēt, & balneo lūbos oleo rosaceo, melino, & omphacino perungere oportet. Satiū autē est oleū cera additā, ne defluat, crassius efficere, miscereq; succū aliquē refrigerantē, nempe semperuini, solani, cotyledonis & psillij: ac horū quidem per estatē, reliquis autē anni tēporibus, tum aliorum, tum lactucæ succū: item lini semē quod aqua fuerit incoctum. nam hoc quoque refrigerantem succum exhibet. Ad hæc la-

PAULI ÆGIN.

b main

mina plumbea lumbis subiecta, ueneris insomnia cohibet. Iam herbae refrigerante ui praeditae si cum ruta substernantur, & teneris uiticis surculis, idem praestant. Praeterea semen uiticis & rutae in cibo sumptum. Cauendum uero est, ne lumbis uehementer refrigeratis, tenes offendantur.

Si perfrictio nocuit.

Cap. XXXIX.

QUI frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbent: cyprino aut irino peruncti. postea ubi modice incaluerint, piper, myrrhā cū uino dulci odorato & ueteri assumēt, aut liquorē cyreniacū cū uino uel aceto, aut pyrethrū castoriumue ex aceto: cibo aut calidiore recreandi sunt.

Si insolatus adussit.

Cap. XL.

SI qui uero exusti in sole sunt, his locis aeri expositis decumbendum est, perfundendaq; frigida, facies, manus, & crura: si sita conficiuntur, frigidam aquam qui assuerunt, bibent. atque haec paulatim, & non una uice ac subito facere expedit. cibum assument modicum, qui facile in membra distribuatur, humidiorē potius quam† solidiorē.

† Vetus scriptura hoc loco habet, σκληρότερον, id est, duriorē, ἀντί τῆ παχυτέρας καὶ σφικτωτέρας, quibus nominibus medici cibum solidiorē significant. uix unquam inuenitur σφικτωδέτερον in hac significatione.

De pituita in superiore uentriculo redūdāte. Ca. XLI.

† **Q**UOD si in aliquem interdum incidas fastidientē, qui quidem cibos ualentis materiae auersetur, & si assumere cōpellas nausea afficiatur, sola uero acria appetat, & ijs quide oblectetur, sed uentris inflationem experiat, nauseetq; ac paululū ructibus solis leuetur, interim uero & ipsi cibi quos assumpsit, praesertim in acorē conuersi, uitientur, omnino intelligendū tibi uenit summā curationis existere, ut pituitā à uentriculo abstergas. Ego quandoq; ita affectū noui, qui raphanis ex oxymelite sumptis, incredibili cassioris pituitae copia uomitu egesta, integræ statim sanitati restitutus sit.

† Hic locus sic descriptus est in ueteribus libris. Εἴ τιμι περιτέτχης ποτὲ τὰς μὲν τῆς τροφίμων σιτίων προσφορῶς ἀποσφριζόμενος, ἀποσίτω αὐτὸς μόνοντι. Id est, Quod si aliquem incideris, qui cibos ualentis materiae auersetur, atque non alatur. ἀπόσιτος enim uidetur positum ἀντὶ τῆ ἀτροπῆς.

Quomodo

Quomodo facile quis uomat. Cap. XLII.

Quoniam ualidè uomentibus multa solent absurda su-
peruenire, cōmodum fuerit quomodo quis facilè uo-
mat, exponere. Erenim uomitus pituitam inanit, ca-
put leuat, & ne qui auidius nonnunquàm cibū ingesserint cru-
ditate laborent, item ne qui uinum liberalius sumpserint, of-
fendantur, prohibet. At quæ offerentur, neq; acerba, neq; sic-
ca erunt, sed partim dulciora humidioraq; partim acriora. Cō-
mendatur ad hæc raphanus, eruca, fassamentum uetus, origa-
num uiride, cepæ momentum & porri. Promouet uomitus
etiam ex leguminibus prifana cui mellis aliquid additum sit,
ferculum ex fabis frefis confectum, magisq; carnes ipsarum. ue-
rū non solum cremores ipsarum, sed ipsas quoque integras
deglutire oportet, eoq; uomiturus non diu mandendis ipsis
immorabitur, omnia uerò per coctionē mollia flaccidaq; erūt.
Iam constat, uina dulciora deligi oportere, ut quæ in stoma-
cho magis supernatent, atq; eam potionem tepidiorem assū-
mi. Cōfert etiā amygdalas melli intinctas comedere, ac placen-
tas gustare: item peponis & cucumeris semen maceratū detri-
tumq; cum melle assumere, radicemq; cucumeris contritā ex
melle. At qui ualentioribus uti uolunt, narcissi bulbo aquæ in-
cocto, uinū temperant. Mouet autem uomitiones iritium quo-
que unguentum, si digitis eo perunctis, irrites. Porro uomen-
tis interest, ne cesset uel intermitrat, usque dum omnia eiece-
rit: à uomitu os colluat, faciemq; posca aut aqua abstergat.
id nanque dentibus conducit, & caput releuat.

*Quæ sanis aluum subducant, & quæ urinam
moueant. Cap. XLIII.*

Veterum nonnullis satis esse ad secundam ualetudinem
tuendam uisum est, si aluus quotidie & urina pro inge-
storum tum cibi, tum potus copia, sine uitio & abunde
responderet. ac quum uacuatio iuxta assumptorum propor-
tionem accidebat, commendabant: sin minus, promoue-
bant, urinam quidem scandice, apio, asparago, petroseli-
no, aniso, nepita, origano, absinthio, graminis carduique
radice, cytiso, adiantho, omnibus in aqua elixis, quorum
b 2 decoctum

decoctum cum uino potui exhibebant. hæc enim per urinam sanguinem repurgant, unde non parum utilitatis percipitur. Alium adiuuabant terebinthina: ex qua oliuæ magnitudinē dormituri deglutiendā offerebant. At quum magis subducere eam cogitamus, rheu momentū admiscebimus. Accōmodata deiectioni sunt, oua sorbilia: ex oleribus, beta, malua, itē cochlearū ius, atq; hæc fortè abundè erunt. Efficacior est herba mercurialis, in aqua cum sale elixa comestaque, eiusq; decoctū potuit datum similiter folia sambuci. idem præstat polypodij radix duarū drachmarum pondere, salsamēto inspersa, aut etiā in ptisana sorpta, adhæc serum lactis cum sale aut melle, ad treis heminas quatuorve assumptum: ueteris quoq; gallinacei ius, tum per se, tum cum cnici drachmis duabus nonnunquam & aloe trium cicerum instar secundū cœnam rectè assumitur. Præstantissimum uerò est epithymū in uino post mediocrem cœnam potum: qui uehementius uacuare desideret, manè epithymi drachmam ex oxymelite, uerno tempore ebibat.

De clysteribus.

Cap. XLIIII.

IN quibus uenter ægrè descendit, & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia non sustinet, clysteribus utendum est, quum pituita quidem in intestino residet, ijs quæ sunt decocto caricarum, betæ, nitri, syluestris cucumeris radicis, melle, oleo chamæmelino, aut anethino: quum siccitas magis urget, ijs quæ constant, althæa, fœnu græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo interim etiam oleum per se dimidiæ heminæ mensura iniectum, abunde proficit. non tamen continuè id faciendum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

De glandibus.

Cap. XLV.

VTimur etiam glandibus subinde stercoreis excernendi gratia, & in quibus id quod per clysterem indurum est, non egeritur. Finguntur autem glandes ex sale tosto, melle, & nitro: item thymus discocto melli additur. Fiunt etiam ex resina terebinthina, & nitro: interdum & cocco gni-dio modico. Sed quia uellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitque resolutionem expertis, & ijs qui ex perfrictione inflationes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ceræ

re commiscetur, ac naturalium relaxationibus aptum est præsidium. Infantibus autem etiam salis grumus ano imponitur. Fit quoq; glans ex ficu cum nitro.

De ijs quæ per os & nares caput euacuant quæq; eisdem partibus delinuntur. Cap. XLVI.

Hvmores in capite residentes per sputa uacuamus, quod si modicè facere uouerimus, piper cum mastiche temperabimus: si largius uacuare libet, pyrethrum aut herbam pediculariam mandî præcipientur. item anemonæ omnis radix mansa pituitam prouocat, capparisq; radice cortex. Itaq; huiusmodi remedia serosum excrementum uacuât, crassam uerò lentamq; pituitam, sinapi cum oxymelite gargizatum, aut sapa in qua origanum, aut hyssopum sit incoctum. Ego autem sapa cum sinapi, & oxymelite misceo. At si cerebrum muco purgari desiderat, acris remedijs, quorum nonnulla etiam sternutamenta mouent, euocabimus. Itaque anagallidis utriusq; & anemonæ cuiusuis, & betæ, succus per nareis purgat: item cucumeris syluestris foliorum succus naribus ipse & per se & cum betarum decocto succoque infunditur. sternutamentum uerò crudis humoribus qui in thorace, pulmone, & capite continentur, non expedit. Quod autem orillinetur tale est: sapa cum betæ succo palati regionibus & columellæ delitus bene facit, idem etiam per nareis purgat, melanthio uerò quod facillè paratur, ad narium illitionem subinde usus sum, interim aceto acris pridie macerans, deinde postriedie cum aceto rursus læuigans infundensq; naribus. Nonnunquam oleo ueteri idem melanthium derritum, similiter illeui. Sic igitur & Archigenes eo in narium obstructione usus est, priori autem, ex aceto, Crito in morbo regio uti solebat.

Quæ mensis ducunt. Cap. XLVII.

Quæcunq; urinæ ciendæ sunt, eadem omnia mensis ducunt, nempe brassicæ radice decoctum potum, persicæ radix, ruta, chrysanthemum, dictamnû, & erucæ semen: item quæ ori uulue subiiciuntur, mensis commouent, ut ruta cum melle trita, aut porri succus, aut allium tritum subiectum, aut myrrha cum uino læuigata, aut leporis coagulû.

b 3 Quæ

Quæ sudorem mouent. Cap. XLIII.

Sudorem eliciunt chamæmelum aridum tritumq; oleo inspersum, si summæ cuti ualidè infricetur: seseli, pyrethrū, cachry, anysum, similiter oleo inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cum oleo efficax est: adhæc salis flor oleo temperatus, & liquor cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotusq; ciceris magnitudine: Pari modo nepita & pota cum mulsâ, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

De aere. Cap. XLIX.

Laudatissimus aer est, qui exactè purus: is autem nimis erit qui non ex stagnorum, aut paludum uapore turbidus exurgit, neq; ex profundo quodam specu pestilentem aurâ exhalante prouenit: ita qui ex cloaca quadam magnâ ciuitatē expurgante turbidus exit, uitiosus est. Quinetiam nebulosus similiter sanitati nō facit, quemadmodū item qui in cauo loco altis undiq; mōtibus inclusus, nullā aurâ recipit. Hoc igitur modo uitiosus aer omni ex æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ: sicut optimus prodest. At qualitate uarians aer colore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate, nū similiter uniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aer temperatus utilis: intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

De aquis. Cap. L.

A quarum præterea & uirtutes & uicia cognita habere expedit, ut quæ ex multiplici ipsarum usu magis ferè quàm omnia alia ad quamlibet uictus rationem requirantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullā aut gustu, aut odore qualitatem repræsentat, sed protinus bibēdi suauis est, & uisū pura limpidaq; , quum uerò etiam à præcordiis statim descendit, melior alia quærenda non est. Nam quæ in præcordiis residet diutius, uentrē ferit, inflat, grauatq; , uitiosa censēbitur, huiusmodi aqua neq; citò calefit, neq; refrigerat, sed quæ in ipsa relixantur, tardissimè peiusq; decoquuntur. Præstat itaq; talem aquam experimento discernere. Qui uerò notis quoq; eam uolet agnoscere, iis quæ dicentur attendat, quæ enim ad septentrionem spectat: à sole auersa, tardè permeat, ægræ concoctionis lentè calefcit & refrigeratur: quæ autem ad orientem erumpit, ac per meatum quendam, aut terrā colatur

latur puram, eademq; citissimè calefit, iterumq; refrigeratur protinus, hanc optimā esse existimandū est. Probatūr itē quæ æstate frigidior, hyeme calidior est. Nōnulli & pondere aquā examinant, leuē præstare credentes, hoc igitur si aliis à me cōmemoratis accedit, commendatur, uerū sola hæc bonæ aquæ nota non sufficit: At imbrium aqua auctore Hippocrate leuissima est dulcissima, limpidissima, tenuissimaq; eò q̃ sol leuissimum & tenuissimū attrahat, ac id nō ex alia aqua solum, uerū ex mari quoq; & corporibus: quapropter etiā omniū prōptissimè cōputrescit, ut quæ diuersis ex qualitatibus sit cōflata. Nemo autem aquā putrefactioni opportunā deterrimā esse existimet, nā mutationis facilitas uirtuti potius, quam uitiō tribuitur. Quæ igitur aqua optimæ notas habet, si prōptē etiā putrescat, ea cēsebitur saluberrima, & si quū mutari incipit, occasione raucedinis, tussiculæ, & grauitatis uocis iis quī biberunt præbeat. Ac inter imbriū aquas. æstiuā quæ tonitru decidit, præstantior est, quā quæ nimbis demissa est. Ex glacie & niuibz aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimitur. Porro palustrem foediq; odoris & absurdas recipientem qualitates, rectē decoques, atq; ita meliorem redditam potui dabis uino temperatam: si adstringit, dulciori: aliam uerò acerbiori. Nonnullas percolare expedit, nempe limosas salsas, & bitumen referentes. At frigidæ nemiū à cibo assumi debent, non tamen subito, ac una uice. Non desunt qui cibos & potiones aduersus aquarum uitia inuenerint: ac alii cicerum decoctiones præbunt, uel eadem quoq; edūt: alii caualidem similiter cum pisciculo quodam elixam, item fœniculum reliqui betam & cucurbitam sale conspersam cū uino dilutiore præsumunt.

*De lauacris.**Cap. LI.*

F Rigidam lauationem ita quidem laudo, ut non iis qui nullo uictus delectu agunt, ex usu esse dicam, uerū solis illis qui accurate uiuunt, & laboribus, & cibis sicut expedit, utentes. Porro multis qui amplius interdum refrigerari desiderant, abundē est natāre per æstatem, si iuuenes sint, carnosī & frictionibus ante excafacti. Sint autem qui aquam ingredientur, neque uenere, neque alio quodammodo lassī, neque cruditatē sentiant, neque uomitu,

aut aluo inaniti, neq; uigilijs defetigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigidae lauacro utatur. Calidum uero balneum & optimum & tutissimum est: lassitudinem soluit. humorum repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emollit, flatus ubicunq; decubuerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & uiro & mulieri, & puero & seni, & priuato.

De balineis naturalibus. Cap. LII.

Naturalium balneorum alia nitrum, alia salem, alia alumen, alia sulfur, alia bitumen, alia aes, alia ferrum repraesentant: nonnulla composita ex his omnibus reperiuntur. Itaq; aquarum naturalium uis est quae deficcat & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisq; affectibus maxime conducit. Iam uero quae nitrum, & salem obtinent, capiti, thoraci fluxione tentato, stomacho humentiori, aquae inter cutem, tumoribus laxis, oedemata Graeci uocant, qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodatae. Aluminate sanguinis reiectioni, stomacho uomitioni opportuno, immoderatis mulierum purgationibus, continuisq; aborribus, utiles existunt;

Sulfurata neruos emolliunt, calefaciuntq;, & dolores mitigant, stomachum uero eneruant euertuntq;. Bituminatae caput replent. instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt: calefaciunt autem continue, & temporis processu emolliunt. Quae aeris naturam occupant, ori, tonsillis, uuae, & oculis praecipue conferunt. Ferri uirtutem sortitae, stomacho & lieni sunt utiles. Oportet autem in aquam sine tumultu, & lente descendere, quo uirtus corpori relaxato accedens immergatur.

Quae uictus ratio quolibet anni tempore sit utilis. Cap. LIII.

Non alienum est, pro singulis quoq; anni temporibus uictum instituere. Ac hyeme quidem pluribus uti laboribus, plus esse conuenit praesertim diebus aquiloniis. Nam austrinis laborare quidem similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Summatim humido tempore corpus omnino siccum reddere, quemadmodum in frigido, calidius: carnes calidas comedere & olera, plus uini bibere oportet. Verum autem ineunte, alius uomitu, alius per aluum euacuari debet, alius

alius sanguinis demissione, prout cuiusq; consuetudo & uoluntas fuerit. Per æstatem à laboribus conquiescendum, ciboque demendum est, qui rectè frigidioris erit naturæ: potione largiore utendum, ac omnia fieri debent, quæ ad refrigerationem humiditatemq; conferunt. At in autumno, quoniam prorsus inæqualis inordinatusq; est, & omnigenos morbos inuehit, magna uictus habenda sollicitudo est: frigus uitare, concubitu & frigida potu prorsus abstinere expedit. itē frigidus auroræ aer, meridianusq; ardor rectè cauebitur, poma affatim assumere noxium est, ut quæ non copia tantum obsint, uerum etiam uitiosos procreent humores, & inflationes. Etenim præstantissima ipsorum, nempe ficus & uua, flatu pariunt corrumpuntq; cibos, nisi ante alios præsumantur: ita uerò neq; inflant, neque corrumpunt. Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere, omniaq; peragere oportet, ceu hyeme aduē tante. Nihil mali autem fuerit post æquinoctium uacuationē ex commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum in corpore retentum, hyeme facessat negotium.

Victus eorum qui in laboribus uitam agunt. Cap. LIIII.

SI quis in laboribus uitam transigit, cōsiderandū est, priusne is exerceri consueuerit, an nullo exercitio se credens, mediocriter † eiusmodi consuetudinem ferat, ita ut non morbo implicetur, continuè, facili præditus perspiratu meatuum, eiusmodi enim corporis naturam ad aliā consuetudinē traducere non oportet, imò nec eos qui ex longiore temporis interuallo ægrotant. At si assiduè quis morbo conflictari uidetur, in humorum quidē redundantia *πληθωρίαν* græci appellant, eò per totam salubrem uictus rationem, consiliū diriges, ut humorū mediocris sit † copia: in eorū uerò prauitate *κακοχυμία* græcis dicitur, ut optimos efficias. Qui igitur humorum redundantia laborant, in balneum deduci, deinde frictionem adhibere, & paululum dimoueri prius debent. Qui uerò eiusmodi facere antea sunt aggressi, ijs hæc eadem paululum augere, cibo autem detrahare, eumq; imbecillis materiæ ingerere consulemus. At qui prauos humores colligūt, non uno consilio tractantur, quoniam neque una uitiosi humoris species

cies est. Nonnulli si quidem frigidiorē magisq; pituitosam colligunt alij calidiorē biliosiorēque, quemadmodum alij melancholicam magis accumulānt. Quapropter singuli, cibo potuq; abstinebunt, quæ collectam ipsis humorum colluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est præsidium, alui subductio.

† Vetus scriptura est *ῥαδίως*, id est, facile: non *μετρίως*.

‡ Ante hoc uerbum in manu scripto est uox *ἀεί*, id est, semper, quæ omīssa uidetur à librarijs.

Proficiscentium uictus ratio. Cap. LV.

Facillimè quis profectiōem inibit, si inunctus sit, & nō fortiter incedat. Præterea ad proficiscendi facilitatem conducit per æstatem fascia mollis digitos sex, aut septē lata, quinq; autem cubitos nō minus oblonga, lumbos ad ilia usq; cōplexa. Item baculus ad iter utilis habetur. Etenim per decliuiā præmissus, corpus quod præceps ruit ceu cōto cuidam innixū retinet, quum ascendendū est, ipsi innitentes facilius in accliuiā corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, unctio & pauxillum cibi cuiusdā æstiuī, potioq; modica eo tēpore conuenit: à prandio antè quā iter arripiamus, conuiescendū est. Si verò necessitas abeundi fuerit & sitis urgeat, tenuis polenta ex aqua cū salis momēto bibetur: æstus ardorq; solis caueri debet, cui nec corpus nudū exponere sed cōtectū esse oportet, ne ex itinere siccescant indurescat. Hac. n. ratione & minus lassatur, & nullū ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quū frigus urit, antequā itineri te accingas uentre subducto, & unctiōe adhibita hyemaleis cibos copiosè assumes, potiōnē modicā. Cæterū fascia longiore nō solū lumbos, sed spinā quoq; & pectus rectè inuolues. Requiescenti autem, si interea uehemēs frigus urat, neq; ungi, neq; cibum potumue assumere præstat, neq; alio quodā modo refici debes, si inibi mansurus es. At si secundum longas profectiōes, aliosq; ualidos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, non aliter quā lassū curabit. minus enim sic periculis erit opportunus.

Nauigantium uictus. Cap. LVI.

Vomitionibus quibus nauigantes premuntur, primum oborientibus nec facilè, nec utiliter succurrimus: ut quæ omnino magna ex parte præsidio esse soleāt. A uomitu
autem

autem cibi non copiosi, nec quilibet offerri debent, sed aut lenticula uti sicca, decoctaq; cui pulegij modicum sit adiectum, aut panem ex uino aquoso, & odoro maceratum ingerere oportet: potione uti modica, eaq; uel ex uino prorsus aquoso, uel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emollescat, conueniet: mox in tenuem puluerem redigere, inde ficare, postea in uas fictile condere. At si diutius crebriusq; uomitus urgeat, cibo magis subtrahendum est, eademq; potione modica utendum, uel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium comaduerit: item aqua cum polentæ polline aut uino odorato, eoq; aquoso cum illius polline similiter, recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouentur, aut thymus, aut pulegium. Mare nequaquam aspicendum est, usq; dū in nauibus uersari assuescas. Aquis porro cura adhibenda est, ne turbidæ, foedi odoris, ac salis existant.

Quomodo extenuetur corpus. Cap. LVII.

QUum immodicè corpus plenum est, extenuare ad atque imminuere oportet. Quia ergo calidior reparatione & siccior gracile corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere uoluerimus inducimus. Didicisti autem citas exercitationes, uictum extenuantem, similiaq; medicamenta, & animi curas, temperamentum siccior & calidius, eoq; corpus gracilius efficere. Quæ igitur uictus ratio extenuet, nulli non cognita est: medicamenta uero uehementiora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum ipsis corymbis, aristolochia rotunda, tenue centaurium, gentiana, polium, quæque ad urinam ciendam ualentiora sunt, uti petroselinum: singula namq; hæc, & per se, & cum aliis omnia, humores abundè extenuant, inaniuntq; corpus. Quinetiam sales ex crematis uiperis largiter extenuare solent: ipsaq; adeo theriace. digerit autem, extenuatque oleum cui radix syluatici cucumeris, hibiſci, gentianæ, panacis, & aristolochiæ sit incocta, si illinatur: sic polium & centaurium. At cibus non statim à balneo dari debet, sed prius somnus est indicendus. Præstaret etiam aquam balnei ex iis esse quæ digerant, si quidem fonte sua scaturienrem habeamus, qualis est Mitylenæ: sin minus, salis florem aquæ marinæ commiscebimus. Vino utemur

mur tenui & albo. Cæterum frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idem abundè efficit. Adhæc oportet cibi minus quàm pro exercitiorum ratione ipsos assumere: iuuat etiam obæsos insolatus, præbire autem non debent, sed epulas semel tantum die sumere, magis expedit. item corpus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrum extenuat, modicum uerò probam corporis nutritionem excitat. Postremò extenuat & medicamentum, quod recipit piperis & petroselini duas portiones, assari & anisi dimidiam. Hoc & urinæ & aluo promouendæ efficax est.

Quomodo tennes impleantur. Cap. LVIII.

QUum extenuatos implere uolumus, uinum quidem crassum, cibis autem crassi succi, exercitatio modica, frictio mediocris, & ut summatim dicam omnia prædictis contraria expediunt. Commodum est iisdem & pice diebus tribus quatuorue interpositis, oblini. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricare debet, deinde frictione dura nō tamē multa cutē cogere, quod densa duraq; euadat. Expedit igitur ijs qui pallido sunt colore præditi, nec alimentum sentiūt, iram animiq; motus excitare.

De partium attenuatarum curatione. Cap. LIX.

EXtenuantur plerunq; partes nonnullæ, uel diuturna ipsarum quiete, uel deligaturæ modo quo confracta fasciātur. Itaq; uirtus partis extenuatæ firmari, sanguisque ad eā elici debet copiosus, frictione moderata, aptoq; motu, & calētis aquæ mediocri superfusione. Hæc sanè tantisper faciēda sunt, dū rubescēs corpus attollatur, cessandū uerò prius quàm collabāt. Iam & picationē prædictis membris, adhibere cōgruit. Quū autem frigidiorē partē senseris, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodā medicamine oportet. Vsum aliquādo & thapsia, nūc cum melle, nūc cū cerato illinēs.

Optimi temperamenti notæ. Cap. LX.

TEmperatissimus homo est, cuius corporis cōpositio omnium extremorū exactè mediū occupat, nepe gracilitatis, crassitie, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, in uniuersum naturæ ac animi functiones hēt inculpatas: medius quoq; est glabri & hirsuti, nigri & albi: pilos in pueritia rufos magis q̄ nigros hēt: in uigore, è p̄rio.

Interpe-

Intemperatorum corporum notæ. Cap. LXI.

Corpora moderato calidiora citius dentient, increſcēt-
 que ſimiliter: tangentibus autem calidiora, munusque
 pingua apparent: colore ſunt rubido, pilis nigris, me-
 diocriter hiſpidis, & latis uenis. At ſi quis ſimul & pinguis, &
 craſſus latiores uenas habeat, is ob conſuetudinem, non na-
 tura pinguis euasit. Frigidioris temperaturæ nota eſt, ſi ad ta-
 ctum frigidius apparet corpus, glabrumque ſit & pingue, color
 unà cum capillis rufus, ſi multa ineſt frigiditas, liuens quodam-
 modo & plumbeſ, uenæ anguſtiores: ſi gracilis eſt eo tempera-
 mento præditus, neque neceſſariò talis, ſed ex conſuetudine
 factus eſt. Sicca autem temperies durior eſt, græciliórque tem-
 perata, atque hirsuta, durities igitur à ſicca temperie omnino
 ſeparari nequit, gracilitas autem non modo naturaleis tempe-
 raturas, ſed etiam ex longa conſuetudine acquiſitas comita-
 tur. Indicium ſiccitatis eſt, ſi corpus ægrè mouetur, ſiccum, &
 ſqualidum à ſiccantibus euadat. Humida temperies, cætera
 quidem temperatæ ſimilis eſt, ſed mollior, corpulentiorque, ac
 ab hac ſeparari nequit, mollicies, quemadmodum, & craſſitudo
 non inſitum modo temperamentum, comitatur, ſed etiam ex
 longa quadam conſuetudine conſtituitur. peculiare uerò hu-
 miditatis ſignum eſt, corpus maximè hirsutum, facilis pilorum
 capitis prouentus, ijque nigri ſunt, & per iuuentutem copioſi:
 proceſſu temporis caluitium ſequitur, uenæ latæ ſunt, ſicuti &
 arteriæ grandes, ſimulque uehementiſſimè pulſant. prætereà
 totum corpus ualidum, articulatum, maſcuſum, pinguedi-
 nis expers apparet, cutis dura, & nigrior. Frigidum humidam-
 que temperaturam teſtatur thorax anguſtus, ſicut etiam to-
 tum corpus glabrum, cutis tenera & alba, capilli, ſubruſi, præ-
 fertim in iuuentute, hac præditi in ſenio non calueſcunt, ue-
 rùm ſtatim timidi, puſillanimes, pigri, uenis latentibus, craſſi
 pingueſque & femoribus, & muſculis indiſtincti, inarticulati,
 bleſique fiunt. At ſi humiditas frigiditasque magis fuerit ad-
 aucta, color unà cum pilis rufas uidetur: ſi plurimum increue-
 rit, liueſcit. Porrò calidum ac humidum temperamentum
 mollius carnoſiusque, optima temperie exiſtit: auctum am-
 pliſſimè, putridis affectibus opportunum eſt. Quum autem
 paulo quidem humidius, multo autē calidius fuerit, eo donati
 mollio

molliores paulò, corpulentioresque temperatis existunt, non paulò uerò hispidiores, imò etiam ad tactum calidiores apparent, nigri ipsis pili existunt, & caro pinguitudinis expers. Quod si paulò quidem fuerit calidius, multo autem humidius, mollis his caro, multaque existit, & color ex rubro, & albo commistus, tangentibusque paulò calidiores apparent. At si frigiditas pariter cum siccitate ex æquo augebit, corpus erit durum gracile, album, non musculosum nec articulatum, pilisque uacuum, tangentibus frigidum deprehenditur: pinguedo tamen, graciles licet eiusmodi existant, per carnem dispersa est, color autem & capilli frigiditati proportionem respondent. Quod ad animi mores pertinet, pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi temperamentum efficit. Ac, ut semel expediã, in coniugatis temperaturis semper euincens qualitatis notæ superare solent.

De capitis formatione.

Cap. LXII.

Exiguum sanè caput prauam cerebri structuram propriè notat: magnum uerò non necessariò bonam testatur. Si nanque tale insit uirtutis, materiam probam, multamque efformantis robore factum est, bonum est indicium: si ex solius materiae copia, non item. Verum distinguere ea conuenit figura, & ijs quæ ex illo processerint. Figura quidem, si concinna, aptaque fuerit, hæc enim semper bona est constructio, ijs autem quæ ex illo procedunt, si optimè sit disposita, & si neruosum genus ipsi integrum, bene habitum, ualens, sique oculi acriter cernant. In acutum fastigiata capita, deficientem in fronte, uel occipite habent eminentiam, aut magis quam decens est, auctam. Plerumque igitur, ut magnam, ita has quoque deprauatas comperiemus sit tamen, sed rarò ut nonnullæ ex his bonæ proueniant, cum formas scilicet uis, non inualida fuerit.

Temperaturæ cerebri notæ.

Cap. LXIII.

Cerebrum temperatum moderatas habet, & animi functiones, & excrementa, minimeque ab omnibus exteris offenditur. Talium pili capitis in infantia subrubi, pueritia subflauii apparent: ubi ad adoleuerint flauescunt, medij quodammodo inter crispas exactæ ac simplices nec tamen facile caluescunt. Si uerò calidius temperato extiterit, omnia quæ circa caput existunt, & calidiora, & rubicundiora apparent, oculorum uenæ sensibilibus apparent, capilli his in lucem

cem æditis protinus in capite oriuntur. Ijs autem qui multò sunt calidiores, nigri, ualidi, & crispì: qui non multò, ijs flauì primum, deinde nigri proueniunt, procedente ætate caluescunt, interim his recrementa sunt exigua, & inculcata fruuntur ualetudine: capite uerò à calefacientibus cibis, potu, odoribus, & foris accedentibus implentur grauanturque, modicus somnus in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus ad modum. Frigidius autem quàm conuenit cerebrum fatentur, excrementa copiosiora per meatus ei peculiareis manantia, capilli recti, rufi, firmi, & facilè à frigidioribus causis læduntur, destillationibus, & grauedinibus continuè infestantur, oculorum uenæ latent, somno maximè premuntur. Siccioris cerebri nota est, si nihil excrementi emanat, sensuum acrimonia, uigiliæ, capilli sunt robustissimi, statim ab ortu, ac ijs crispì magis, uerùm ex facili caluent. Humidioris autem, capilli simplices planique, & nequaquam caluitium experiuntur, sensus turbulenti, excrementorum copia, somnus multus & profundus. Calido, & sicco cerebro præditi, recrementis carent, exactos sensus obtinent, uigilantissimi sunt, facilè caluent, primum uerò capilli celerrimè ipsis proueniunt, & optimè habiti, plenissimi que, nigri, calidi ad tactum capitis, rubrique usque ad uigorem apparent. At si calori humiditas accesserit, ita ut utraque paululum excedant mediocritatem, colorati calidique sunt, uenæ oculorum grandes, excrementa pleniora, mediocriter concocta, capilli recti, subflauì, caluitium haud facilè experiuntur, uerùm capita ipsorum calefacientibus, humectantibusque implentur, grauanturque. Vbi uerò humiditas, caliditasque accreuerit, caput morbidum euadit, facileque ex calidis & humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamento præditi, uigilare diu nequeunt, dormientes autem imaginibus, per insomnia torquentur, oculi carigant, non exactos sensus obtinent. Frigida uerò simul & sicca temperamenta cerebri, frigidum decolorque caput efficiunt, oculorum uenæ non extant, à frigidis causis promptè offenduntur eoque inæquali ualetudine fruuntur, sensibus per adolescentiam exactis inculpatisque, processu temporis subito contabescunt: summatim circa omnes capitis partes cito consenscunt, capilli à natali die uix erumpunt, exorti non aluntur, rufescuntque humidum frigidumque temperamentum cerebri, reddit

reddit soporosos, somnolentos, sensibus uitiosos excrementarios, frigori opportunos, capita habentes quæ facile repleantur, destillationi, grauedini obnoxios, non tamen hi caluitum experiuntur.

Ventriculi temperatura notæ. Cap. LXIII.

Ventriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati sitiant, & modico sint contenti potu, largiore grauentur, fluctationes experiantur, uel id quod redundat in uentriculo supernatet, cibusque delectentur siccioribus. Humidiorem notant, si nulla sitis urget, & largior humor non molestat, cibusque placent humidiores. Calidior natura uentriculi melius sanè concoquit, quàm appetat, & dura potius, quæque difficulter possint immutari, calidis cibus, & potionibus oblectatur, neque à frigidis quicquā incommodi percipit, si modicè utatur. Frigidior, appetendo quidè ualet, concoquendo minus, præsertim si contumacia frigidaque alimenta assumpserit, quæ facile in eo acescunt, frigidis quidè gaudet, sed immoderatus assumptis promptè offenditur. At intemperies ex morbo contractæ, hac ratione ab insitis differunt, quòd contraria sibi, non similia appetant. Si igitur uenter probè concoctionem obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si nidorosos ædæ ructus, immodicum etiam feruorè igneum fatetur: si acidus, contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos propè concoquat, immodicum: si pices concoquat, illos minus imbecilem. quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum: biliosi nidrosus, graueolens, aliasque extraneas qualitates ructant. Communiter autem utrisque nausea superuenit. uerum si uitiosi humores in concauo uentriculi spatio supernatent, uomitu reiiciuntur. qui autem corpore uentriculi contenti, tunicis eius adhærescunt, frustra eum ob inanem ad uomitum nauseam conturbant.

Pulmonis notæ.

Cap. LXV.

Non modo uentriculus sitim uel adfert, uel arcet, ac frigida calidaque; potionis appetentiam facit, sed etià quæ in thorace continentur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Verum qui ob horum caliditatem sitiunt, largius inspirant, expirantque longius, item sentiunt in thorace ardorem: non sicuti qui in uentriculo subter præcordia illum experiuntur.

† Quia

† Quinetiam si biberint, non statim sit ire desinunt, ac frigida potio magis quam calida admodum sitim ipsorum restinguit: frigidus autem aer inspitatus refocillat, quum nihil uentriculi uitio sitibundos soletur. Hac ratione qui è contrario affecti sunt, à frigido inspiratu sensibilem molestiā percipiunt, quòd maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adeoq; pituitā scretu & cū tussi reiiciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, & pituita, quemadmodū humidi excrementicij sunt, & obscuram raucamq; uocem efficiunt: ac recrementa ipsis interueniunt, ubi aut uehementius, aut acutius loqui studuerint.

† Hæc uerba ita leguntur in uetusto codice. καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες, ἔκ, αὐτίκα πάνονται, καὶ τὸ ψυχρὸν ὀλίγον ποτὸν ἱκανοῦσιν αὐτῶν μᾶλλον τὸ δίψος, ἢ περὶ τὸ πολὺ θερμὸν. Id est. Quinetiam si bibant non statim sitire desinunt, ac frigida pauca potio magis quam multæ calidæ sitim ipsorum restinguit. Qui sensus huic loco magis conuenire uidetur.

Cordis notæ.

Cap. LXVI.

Cordis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus ne lox & creber, itidem audacia, insanaq; ferocitas: thorax ipsis hirsutus, præsertim pectora existunt, ac præcordiorum regio his uicina: magna uerò ex parte totum quoque corpus calidum, nisi iecur ualide renitatur. Quinetiam thoracis latitudo calorem notat, nisi & hic cerebrum ualde resistat. Porro cor frigidius, pulsus habet mediocribus minores, ac qui tale habent, † timidi natura sunt & pusillanimes, negligentes pectore glabro. Cor siccius pulsus edit duros, iram excitat nō procliuem, sed feram & quæ non facile queat placari, magna uerò ex parte, uniuersum corpus reddit aridius, nisi iecur repugnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad irē prōni, sed quæ facilè pacari possit, ac totū corpus humidius, nisi iecur resistat. Calidum & siccū cor ostendunt pulsus duri, magni ueloces, & crebri, item respiratio magna citata & frequens. hoc donati corde, maximè hirsutum pectus, nec non præcordia obtinent, impigri tractandis negotiis, furibundi, temerarii, moribus tyrannicis: etenim ad iram procliues, quæ non facilè conquiescat. Si autem humiditas cum calore superauerit, tales minus hirsuti sunt, quàm commemorati, prompti autem functionibus obeundis, neque tamen fero animo, sed ad iram

PAULI AEGIN.

c piono

prono duntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisq; pulsus quidem molles, mores autem pusillanimes, timidi, & pigri: talium pectora pilis uacant, ac nequaquam iram retinent diu, quemadmodum neq; ad eandem procliuēs sunt. Frigidum & siccum cor pulsus duriores & exiguos efficit. huiusmodi corde donati minimè omnium iræ sunt obnoxij, sed ubi semel eam conceperint, diu retinent: pectora ipsorum omnium maximè pilis uacant.

† Auctor earum annotationum in Paul. Aeginetam quas Cratander formis expressit anno 1543. & Orosius locū hūc peruerterunt. Ita enim legendum putant, ἀτολμοι καὶ ἀμεληταὶ cūm ex fide exemplaris uetustissimi artis paruo Galeni (ex qua totus hic locus desumptis est) quod Aldus sequutus est, legendum sit μελληται. μελλητης. n. significat ἡπερβετικόν, id est, cunctatorem. Et μέλλησις uel μελλκομῶς, id est cunctatio propria eorum est, qui cor frigidum habent ut scribit Gal. lib. 2. περὶ κρᾶσεων. Quod autem Orosius ex Oribasio legendū putat καὶ ἀτολμοι εἰσι καὶ λιθαργοὶ καὶ ἀμεληταὶ, æquē magnum uitium in ea scriptura. Nam pro λιθαργοὶ omnino legendum est ἀργοὶ, id est, pigri (Nam λιθαργὸς affectus est cerebri potius quā signū, quo cognoscas cordis frigidā intemperie) pro ἀμεληταὶ uerò legendum est μελληται, ut iam ostendemus. Ferè. n. fit ut curiosi hi διορθωταὶ, παραδιορθωταὶ inueniantur.

Iocinoris temperatura nota. Cap. LXVII.

IEcoris calidi notæ, uenarum latitudo, flauæ bilis copia, per ætatis autē uigorem, etiam atræ, sanguis calidior, eoq; totum etiā corpus existit, nisi cor obstiterit, præcordia & uenter pilis obsita sunt. Frigidioris indicium, uenæ angustæ, pituita copiosior, sanguis, totusq; corporis habitus frigidior, nisi à corde incalescat: præcordia & uenter pilis uacant. Siccus iecur testatur, sanguis crassior minusq; redundans, uenæ duriores, ac uniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, uenæ molliores: sic etiam totum corpus, nisi cor restiterit. Calidi simul & sicci indicia sunt, præcordia maximè hirsuta, sanguis crassior simul & paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis uigore, atræ, uenarum latitudo duritiesque: pari modo & totum corpus calidum siccumque. Siquidem

Siquidem calor à corde procedens, frigiditatem à iocinore prouenientem potest euincere, quemadmodum & frigiditas caliditatem, siccitatem uerò non potest cor humidius ad contrarium perducere. Constat autem quòd si in idē utriusq; principij temperamenta concurrerint, totum omnino corpus, illorum ratione affici. At humidum simul & calidum iecur, minus q̃ calidam & siccum præcordia efficit hirsuta, plurimum uerò sanguinis, uenas grandes, habitum humidum & calidum, nisi cor obsistat. Quod si utraque qualitas longius à naturæ modo recesserit, morbis qui ex putredine uitioq; humorum habent originem, corripiuntur: idq; magis, si plurimum humiditas, parum calor increuerit, ac humoribus uitiosi fiunt. Cæterum humidius frigidusq; glabra habet præcordia, sanguinem magis pituitosum, nec non uenas angustas, totumq; corpus similiter afficit, nisi cor ad contrarium deducat. Frigidum simul & siccum iecur corpus efficit, modico sanguine, uenisque angustis, & frigidius, præcordia glabra, nisi & hic cor superaauerit.

Testiculorum temperatura notæ. Cap. LXVIII.

Calida testiculorū temperatura, ad libidinem procliuis est, foecunda, & masculos procreat, parteis genitales celeriter hispida efficit, ac uicinas etiam attingit. Frigida contrā. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen progignit, estq; foecundissima, ac celerrimè ad libidinem iam inde ab initio animal incitat. Tales itaq; testiculi hispida statim genitalia, eorumq; uicinam efficiunt, sursum, usque ad umbilici regionē: infra, usq; ad media femora. ac eiusmodi temperamentū abundè uenerē commouet, sed celerrimè satiatur, & si cōpellas, offenditur. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus tales reddit. copioso autem semine magis abundant, nō tamē magis q̃ alij appetunt, minus autē frequentiori concubitu læduntur: si autē utraq; & humidū & calidum impense creuerint, non sine noxa à uenere abstinent. At humidi frigidique temperamento testiculi, uicinas parteis glabras reddunt, ac tarde concumbere incipiunt. neque ad actionem excitantur, † aquosum, tenue, & inualidum semen, ac foemine efficax proijciunt.

c 2 Siccum

Siccum frigidumq; temperamentum, alia quidem similia predicto, crassius autem semen & planè exiguum progignit.

† Scriptura uetus huius loci est, ὁ δ' αὐτῶν δὲ καὶ λεπτόν αὐτοῖς τὸ σπέρμα καὶ ἄγονον ἐστὶ καὶ θηλύγονον, Semen ipsorum est aquosum, tenuēq; ac infœcundum. quem locum ita legendum esse facilè ex arte parua Gal. atq; adeò ex re ipsa intelligi potest. Sed id erratum Orosius prius emendauit.

Quæ prætermissa sunt.

Cap. LXIX.

Singulæ corporis nostri partes peculiarem quādam & temperaturam & uim sortitæ sunt: omnium uerò notas hoc loco exponere necessarium nō esse duco, quum infinitæ prope modum sint. & nos compendium scribere proposuerimus. Porro de iis egimus, quæ potissimum totum corpus consortiū quadam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & uia considerare præcipimus, temperamenta ipsorum tū ab excrementis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quæ superueniunt dignoscetes. Tempestiuum igitur est, ut oratione conuersa, doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

Quomodo calida intemperies corrigatur. Cap. LXX.

Quum itaq; incalida intemperie bilis superet, si per inferiora descēdit, notū est omnibus, nullū oportere negotium facessere: si ad superiorem uentriculum tendit, uomitu euacuare, qui post exercitationem ante cibum factam aquæ potu cietur. Utilius autē exercitiū ipsis est, quod non uelox ac ualidum est, sed remissius tenuisq;. Nonnulli uehementer calidi nequaquam exercitationem requirūt, uerū obambulatio balneumq; ipsis sufficit, iisdem lauacris quoq; secundū cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione uictus humectante indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiis ualentium & multorum abstinentia. Quare per æstatem citius lauare, & à cibo rursus debent frigida hos potius iuuare. Venus autem siccis temperamentis maximè est inimica: cauēda ipsis lassitudo, insolatus, sollicitudo, & uigilia. Humidæ & calidæ natura intemperies in pueritia morbis patent rheumaticis, plethoricisq;, & præterea ijs qui putredini feruntur accepti. Itaque pluribus egent exercitiis, exacta in uentre concoctione

coctione excretioneq; per urinas . quapropter si etiã ante cibum bis tẽrue lauent, utanturq; aquis natura calidis, magnum sentiunt præsidium. Porro defluxionibus prospiciendum est, lauacris, multa exercitatione etiam ante cibum, urine, aluiq; excretionibus Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam uti, & purgationibus, cibis boni succi, & uino quod urinam moueat,

Quomodo frigida intemperies emendetur. Cap. LXXI.

INter frigidas intẽperies, tres numerantur differentia, ex quibus sicca est deterrima quod enim processu tẽporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit Itaq; humectare eos & calefacere oportet, quod cõmodè fiet exercitijs mediocribus, cibo humido & calido, uini calidioris potu, somno pleniore, cura tamẽ adhibita, ut quæ in corpore recrementa quotidie procreantur, oĩa euacuẽtur. Cæterũ uenus oēs sicciores, & præsertim qui præterea frigidi sunt, offendit : solis autẽ calidis humidisq; tuta Porro uitiosa quoq; frigida tẽperamẽta sunt quæ humiditatẽ habẽt cõiunctã, & hæc potissimũ rheumaticis corripuntur morbis, prodest ipsis balneo abstinere, largius exerceri, uictus tenuior, unctiones mediocriter calidæ. Qui autẽ frigidiores natura sunt mediocriter uerò sicci humidisq; tẽperamento, horũ calor suscitari firmariq; debet, ac in humiditatis siccitatisq; totius uict⁹ specie, media deligi debet.

Quomodo sicca intemperies in uentriculo, ueluti exemplo, deinde & aliæ corrigantur.

Cap. LXXII.

INtemperies sicca, alia est, ubi solida similariũ partiũ substantia reddita est siccior, quæ nihil in medicina spei habet, alia cũ substantia, quæ ex humore cõcreto cõstat, est colliquata: tertia præter has cũ propria humiditas unde partes nutriũtur omnino est absumpta : quæ cõtinetur in oĩbus animalis partibus, toris modo eis inspersa, hanc igitur particulis sine nutrimento inferere, nulla ratione queas, ideoq; difficillima est omniũ eiusmodi affectuũ curatio. At quæ in exilibus arterijs uenisq; cõsistit siccitas, curationẽ recipit, si singulas similarium partiũ, propria humiditate, humectantis alimenti auxilio re-

pleas. Balneum igitur temperatum conuenit, in quo diutius uersari hominem expedit: inde statim lac exhibere asininum, quod recens mulctum fuerit, & pauxillum mellis tepidi adiectum habeat: postea conquiescere ad secundam usq; lauationem permittes, tum modicè fricabis simul & pinguius, utiq; si lac quod sumpsit, iam omnino confecit, id quod tum ex ructu tum uentris mole licet conijcere. modicum uerò temporis inter primam & secundam lauationem, interuallum erit, ut quatuor, aut quinque; æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurimum. Quinetiam post unamquamq; lauationem, hominem, priusquam se uestiat, oleo perungemus: ac si quidem lactè oblectatur, post secundam quoq; lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter incoctam, aut chondrum ptisanæ modo præparatum. hinc ubi rursus conquierit, ad tertiam reducendus est lauationem, aut ilico ad coenam. Sit autem panis præparatus illi purus, & qui curiosè in furno sit coctus. obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus, & ut paucis alimenti summam complectar, concoctu sit facilè, nutriens, minimeq; glutinosum & excrementitium. potus, uinum aquosum & album, purum, & quod minimam, si diluitur, aquæ mixturem sustinet, oligophoron Græci nominant, modicæ astrictionis particeps: atq; hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica uerò non tam exacto uictu indiget, & plenior cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas priori similis, copuleturq; ei frigiditas mediocris: in qua ad calefacientium materiam transeundum est: ac commemoratis modo adijciemus: in lactis quidem usu, mel copiosius: uinum autem minus aquosum priore dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora, idq; non naturalibus modo ipsorum temperamētis, uerum recentibus etiam qualitatibus, exhiberi debent. Nardino præterea unguento ungendus assidue uenter est, aut mastichino. At uerò si cum siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam & uix emendabilem cēseto: eisdem uerò utere, & melle per se discocto despumatoq; uinū autem eliges antiquius. Optimum sanè medicamentum talibus est, quo picatores assidue utuntur. & illinere eo uentrem cōueniet, ac post auellere etiamnum calidum. Cæterum iuuat eos probè carnosus puellus una sic accubans, ut semper abdomē

men contingat. Iam uerò multæ siccitati moderata caliditas iuncta esto. In eiusmodi sanè intemperie primum curationis modum seruabimus, ita ut mel prorsus nō degustetur, uinum uerò exhibeatur quod minimè sit uetustum. Porro cibos tepidos, lactis modo offeremus, & uentriculū oleo tum crudo tum melino perungemus. Verūm hos uehementer admodū refrigerare periculosum est, quandoquidē hæc affectio, febris quodammodo naturam, ubi calor superarit, imitatur. Fingamus itaq; rursus calidam intemperiem præpollere, huic autem adiunctam esse humiditatem talem, frigida aquæ potu curabimus, huc optimè facit usus ciborum astringentium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida sola intemperies est, siccantes cibi, ita ut non calefaciant, aut refrigerent ualidè, auxiliantur adhæc consuetæ potionis penuria. Si cum frigiditate humida urget intemperies, optima remedia sunt, oīa acria. misceri autem his debent etiam quæ sine manifesto frigore astringunt. optima simul his est exigua potio, eaq; uini ualidè calfacientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatū curantur. Quoniam uerò sæpè in ipso uentriculi sinu contentus humor, interim autem in ipsas uentriculi tunicas absorptus, intemperiem procreat, non alienum est de his differere. Prior itaque affectio si semel radices egerit, purgatione per uomitum faciliè conquiescit, si autem rursus ex alia quapiam alijsue particulis confluerit, exactam requirit dignotionem, curatio uerò statim subsequetur. Etenim uniuersam eam parti affectæ oportet accommodare, cura adhibita, ijs quæ recipiunt, ne faciliè quæ confluunt, admittant. Fiet autem hoc astringentibus & ijs quæ totum corpus ad bonam habitudinem perducunt. At uitiosos in uentriculi tunica humores mediocriter purgantibus educemus, cuiusmodi est aloë & ex ea confectum medicamentum amarum quod hiera picra dicitur. Verūm quibus lenta simul pituita uentriculo impacta est, ijs prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissēcent. deinde purgatio tentanda. Quòd ad uomitum sunt idonei, ex sumpta radiculara uomant. Sin nec lentus humor sit nec crassus, utiq; abundè est à ptisanæ cremore uomuisse, item à mulsâ. proficit & absynthii succū in mulsâ bibere, reliquarum uerò partium intemperies haud absimiliter curare oportet, ita ut humoribus idoneos effluxus inuenias. Nam si particula sensibilem, efflu-

xum non habeat, redundantem in ea uel saniem uel humores, quemadmodum si id quod continetur, spiritus sit flatulentus, euaporatu discutere ac uacuare conuenit.

De alimentorum facultatibus. Cap. LXXIII.

QVum de alimentorū facultatibus sermo, pars sit operis quod de sanitate tuenda praecipit, proximum est ut iam dictis eum subnectamus, ubi prius quam particulatim ipsa persequamur, pauca quaedā praelibauerimus. Quippe alimentorū uireis, si quid aliud, perceptas habere conuenit. Quae igitur attenuandi uirtutem obtinent, meatus aperiant, uiscosa adhaerescencia abstergunt, crassa incidunt extenuantq; Quod si diutius ea in cibo adhibeas, serosa biliosaq; contrahes recrementa, ac si uberius ingeras, sanguis atra bile uitiosus redditur. Quare cōtinuus ipsorū usus praesertim biliosis temperamento uitari debet, conueniunt enim solis ijs, qui pituitam, humoremq; crudū, lentum, & crassum collegerunt. Porro quae incrassandi uiribus cōstant, ualent is admodū materiae sunt, & si in uentriculo ac iocinore decenter fuerint concocta, boni succi sanguinem producant, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt crassi duntaxat succi, ut lenticula: alia uiscosa, sicuti maluae quibusdam utraq; contingunt, nepe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine praedita. Itaq; uictus extenuans ad sanitatē tuendam tutior quam qui incrassat, existit. Quū uerò imbecillis sit materia nō robur nec uireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnūquam ualentis materiae cibum, quū inedia quaedā pressit, mediocriter exhibere. praesertim uerò citra periculū assumunt, qui se exercent, & quantūlibet dormiunt, omnes autē quibus ante cibū exercitari nō licet, crassi succi alimēta euitabunt. Imò neq; in otio degentes eiusmodi cibos assument. Porro quemadmodū summum otii maximè ualeitudini tuendae obest, ita mediocris motus summū adfert praesidiū. Ceterū cibi inter eos qui incrassant & attenuāt, medii, omniū sunt laudatissimi, ut qui mediocrē substantia sanguinē procreant. Talis itaq; cibus corporibus nostris cōgruit: qui autē uitiosos humores gignit, noxius est, eoq; semper cauere debet. Iam & uaria ciborū genera assumere, cautio est, praesertim si ex diuersis constent facultatibus.

ingesta

ingesta enim concoctionem non, ut par est, sortiuntur.

De oleribus.

Cap. LXXIIII.

LActuca manifesto & refrigerat & humectat, eoq; somnū accerfit. ut autem inter olera ualenter nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intibum frigidi humidiq; temperamenti, sed minus quā lactuca existit. Malua refrigerat quidē, sed non euidenter, magis autē humectat: unde etiam aluum subducit, idq; propter genuinam eius uiscositatē. Beta ui absterforia uentiē subducit, eoq; stomachū largius comesta erodit, iecoris lienisq; meatus aperit. Brassica bis cocta si edatur, aluū cohibet: semel autem nō tamen uehementer cocta, cū oleo & garo, uel sale comesta, magis subducit, quemadmodum succus ipsius etiā lenticulæ efficacius purgat. Hac magis adhuc marina brassica aluū emollit: manifesto salsa, & subamara: idē præstat halimon, amphoris autē salsæ qualitatis particeps, aluum subducit, magis quā brassica stomacho conducit, ceu astrictiōis modicæ compos: lac & semen producit. Blitum & atriplex humida quidem & uentrem soluunt, sed parum alimenti præstant. Omnia spinosa ut scolymos, attractylis, eiusq; generis alia stomacho præter cinaram conducunt, quæ cū dura euaserit, improbū succū procreat, quapropter optimum est, incoctam cum oleo, garo, & coriandro assumere. Apium, hipposelinum, sion, & smyrnium, omnia urinæ ciende sunt, sed smyrnium aromaticum spirat, magis acre, urinæ ducendæ proficit, & mulieribus mensēis cōmouet: apia suauiora sunt, ideoq; stomacho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax, ob quod libidinem & capitis dolorem, quā cephalæam dicunt, excitat. Nasturcium, ocimum, & sinapi, calida quidem & acria, sed maximē nasturciū: concocta uerò difficilia, stomacho inimica, & uitiosi succi. Vrtica extenuat, uentrem subducit, modicē alit. Gingidion simile est scandici, astringentis & non parum amaræ qualitatis particeps. præterea stomacho cōgruit, ut etiam cibum fastidientibus cū aceto assumptum, proficiat: parum uerò alimenti corpori ministrat. Porro syluestria dicta olera maximē uitiosos gignunt humores. Capparis cibi cupiditatem proritat, iecocis lienisq; meatus aperit, pituitam subducit. Vtendum uerò ea est ante cibum alium, ex oxymelite aut oxelzo.

De

*De asparagis.**Cap. LXXV.*

B Liti, lactucæ, atriplicis, maluæ & betæ, planta quidē humida est, asparagus autem siccus. Contra, raporum, sinapis, radiculæ, nastorcii, pyrethri, brassicæ omniumque aliorum quæ calida sunt planta quidem sicca, asparagus autē humidus est. At à spinosis stirpibus palustris & hortensis, asparagi, item qui à bryonia decerpuntur, stomacho quidem utiles sunt, & urinam citant, sed inualidē alunt. At si probè coquantur, magis quàm ij qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Consimili modo & chamædaphnes asparagus agit.

*De ijs quæ radices esculentas habent.**Cap. LXXVI.*

N Apus & rapa si bis coquātur, nihilo minus quàm reliquæ stirpes alūt, cōtinuē autē assumpta, crassum succum procreant. Bulbi astringunt, abstergūt, cibi cupiditatē mouēt, stomachū cōfirmant, & uiscosos pectore humores eliciunt: bis incocti ualētius quidē nutriunt, sed nihil emolliunt, amara ipsorū qualitate sic abolita, præterea semē genitale augent, libidinemq; excitāt, si largius utare. itē inflationes & tormina, pariūt. Quod si ex aceto cū garo & oleo edātur, suauissimi sunt, flatus nō generāt, ualēter alunt, cōcoctu faciles. Pastinacæ uerò, dauci & cari radices quidē minus q̃ rapa nutriunt, calidæ autē aromaticæq; manifestè sunt, & urinā cient: Si uerò immoderatus utatur aliquis uitiosos humores gignunt & ægrè cōcoquūtur cōi radicum ratione. Nōnulli syluestre pastinacā daucū nomināt, efficaciore ad urinā ciendā uirtute præditū. Radicula quæ græcis raphanis dī extenuādi calefaciēdiq; uireis obtinet. sumitur rectè ante cibū ex aceto & garo, alui ducendæ gratia: secundū cibum, nequaquam. Cepas, alliū, porrum, & ampeloprasum acri uirtute donata, corpus calefaciūt, extenuāt, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt: cruda, oīno nihil. Atqui alliū magis meatus referat, humoresq; discutit. Sunt autē porris sicciora ampeloprasa, utpote syluestria. In totum oīa cruda olera, si edātur, peiores quàm cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitii continent. Verū quæ cōdita, uel muria uel oxalme reponuntur, stomacho profunt & appetitiā excitāt, crudos humores incidunt, sed ægrè cōcoquuntur: & si abutare, uitiosos succos gignunt.

De

De tuberibus & fungis. Cap. LXXVII.

TVber humorem de se reddit qualitatis expertē, sed frigidiorem & crassi succi. Fungi uerò frigidi pituitosi & mali succi sunt: in his ipsis minus nocētes boleti sunt, qualitatis expertes, si probè coquantur. Qui uero ammanitæ dicuntur, secundū ab his ordinē obtinēt: aliis fungis abstinentum, pleriq; siquidē ipsorum lethales: Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edātur, periculi occasionem frequenter præbent.

De frumentaceis. Cap. LXXVIII.

EX iis quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, uerū elotus, prauus habetur, quoniā promptè crassescēs, cōcoctionis experts permanet. probatur magis cremor chondri, si totus probe ptisanæ modo fuerit decoctus. Alica in cæteris chōdro quidem respōdet: sed aluū magis astringit. Triticū, elixum sanē, cōcoctu difficile est, & inflationes creat: ubi uerò concoctionem expertum est, alimentum præbet ualentissimū. In panem autem coactum minus inflat, minusq; ægrè concoquitur, utpote fermēti & salis particeps. Inter panes firmissimus est filigineus, deinde ex simila, tertius à quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston quasi dicas cōfusaneū appellāt. Sordidus panis minus quidem nutrit, sed magis per aluum deiicitur. Amylum parū alimenti præstat, quemadmodū & panis elotus, Ordeū frigida facultatis est & absterforiæ ptisanæ modo incoctum, humectat; torrefactū, quemadmodū in polentis fit, deficcet. Polenta per æstatem ante balneum cum aqua pota, siti medetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza difficilior concoquitur flatusq; magis quàm panis ordeaceus gignit: melle autē adiecto aluū citat. Avena & calida est, & imbecillis materiæ. Milium & panicum refrigerant, siccant, pauxillum nutriunt, & aluū cohibēt. Omnino aut milium panico est præstantius. Oryza uix concoquitur, parū nutrit, & uentrē retinet. Porro ptisana in hunc modū coquitur: uni eius parti aquæ quindecim & olei momentum adiciuntur, ubi ebullierint acetum quoq; addes, quum iam exactè cocta fuerit, sal tenuis superiniicitur, in quibusdā porrum & anethum ei miscēt. Cæterum auena chondrusq; in ptisanæ modum decoquuntur.

De

*De leguminibus.**Cap. LXXIX.*

EX leguminibus lenticula uitiosum succum, & melancholicum perducit, imò etiam, praesertim bis cocta, aluum cohibet. decoctum uerò ipsius cum oleo & garo potum aluum proritat. at quia inflationes mouet, satureia, uel pulegiū admiscendum est. Fabae leues sunt, inflant & abstergunt. Aegyptia autē faba humidior nostra est, & excrementicia: Pisum laxum quidē, non tamen adeò flatuosum est. Cicer inflat, abstergit, genitale semen auget, libidinē incitat, & calculos confringit: frictum, minus quidem inflat, sed aegrè concoquitur. Lupinū concoctioni rebelle, haud facile per aluum trāsmittitur, crudi humoris efficax. Foenugræcum si ante cibū sumatur, calefacit, & aluum mouet. Ochron & phaselū macerata donec etiam radices succreuerint, ex garo ante cibū sumpta, aluum subducunt, ac plus quàm foenugræcū alimēti exhibēt. At phaselū & dolichon integra cū filiquis uiridia comesta, excrementicia magis reddūtur.

*De temporarijs fructibus.**Cap. LXXX.*

CVcurbita refrigerat humectatq; , & uentrem subducit, sed parum alit. Pepon totus uitiosi succi est, frigidus, humidus, & uomitioni dicatus: non coctus, bilem generat. semen eius urinam citat & calculos in renibus confringit, ac in totum, abstergit uehementer. Melo pepon omnia quae de pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone frigidus, humidusq; est, sed acius cit urinam, difficilis cōcoctu & uitiosi succi, etiam si concoctus fuerit. Summatim omnia poma refrigerant humectantq; , imbecilliter alunt, & uitiosum humorem progignunt.

*De arborum fructibus.**Cap. LXXXI.*

FIcus & uuae inter omnia poma principatum obtinent, ut quae minus uitiosos humores generent, & magis nutrians. Inter haec ipsa ficus probioris succi sunt, ualentiorisq; materiae aluo, & urinae ducendae, renibus purgandis, idoneae, praesertim admodū maturae. Idem praestant carices, quam inflationes & sanguinem non probum pariant: eoque frequentius usurpatae, pediculi procreant. Vuae, si non descendunt, non quidem concoquuntur, uerū etiam crudum humorem generant: si autem deiciantur, moderatiores sunt. Vuae passae alijs calidiores sunt, stomacho gratiores, ualent

ualentius alunt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ aliâs
sycamina Græcè appellantur, impensè humectant, mediocri-
ter refrigerant, ac ante alios cibos præsumpta, uentrē soluunt,
non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cera-
sis, dulciora quidem aluum subducunt, uerū stomacho ini-
mica: quibus inest astrictio minus quidem stomachum lædūt,
sed non uentrem citant. Atque hæc ratio tum in uuis & mo-
ris, tum in aliis compluribus seruatur. In uniuersum, astrin-
gentia si prius ante alium cibum aut eduntur, aut bibuntur,
aluum comprimunt. quibus autem ob imbecillitatem uenter
non respondet, ij molliendi uirtute prædita, nempe olera aut
piscēs, aut id genus aliud præsumunt: deinde astringentia, quæ
dum ipsum firmant, deorsum propellunt, & ad excretionem in-
citant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidem suc-
ci est crassique, & ad nutriendum ualens, non tamen ex facili
concoquitur. Persica prauī succi, acidiq̃ue sunt, & faciliè cor-
rumpuntur. eoq̃ue primum exuberi debent, quod protinus
deiciantur, nullamq̃ue in uentriculo diutius immorata, corru-
ptionem sentiant, præcocia, duracina & armenia, persicis præ-
stant, neque enim acescunt, neque similiter corrumpuntur, ac
sunt etiam gustu gratiora. Malorum, dulcia sanè aliis calidio-
ra sunt, & faciliè in corpus distribuuntur, præcipuè uel assa, uel
elixa: acida, magis refrigerant, & humores uentriculo im-
pactos incidunt: austera stomachum firmant, & uentrem re-
primunt, atque his magis cotonea. Idem præstant pira gran-
dia maturaq̃ue, præterea etiam ualentius nutriunt. Mala pu-
nica frigefaciunt, & parum alimenti præbent. Mespila forba-
q̃ue uehementius astringunt, eoq̃ue aluo fusæ accommodan-
tur. Palmulæ, nisi admodum sint pingues, stomacho profunt,
uentrem retinent, crassos, glutinososq̃; humores gignunt, capi-
ti faciunt dolores. Ex oliuis, druppæ stomacho aduersantur,
crassi humoris efficaces: muria conditæ, & colymbades, si an-
te cibum sumantur, appetentiam faciunt, & aluum subducunt,
ac magis quæ ex aceto & oxymelite præparantur. Inter nu-
ces, iuglans, auellana minus nutrit, stomacho gratior. Nux
uiridis humidior est, & uentrem citat: arida, si ubi in aqua
commaduerit membrana ipsius interior adimatur, consimi-
lem uiridi potestatem obtinent. Amygdala incidendi extenuan-
diq̃ue uiribus pollent, ideoq̃; uiscera & thoracem expurgant;
idq̃ue

idque efficacius amara. Similiter & pistacia, uerum iecur efficacius obstructione liberant. Damascena ante cibum sumpta & cruda, & in mulsâ elixâ uentrê soluant. Syrica ægrè coquuntur, stomacho noxia, modicique alimenti. Siliquæ ægre conficiuntur, aluum cohibent, & humores creant uitiosos. Sycomora manifestò & frigefaciunt & humectant. Citrei mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est: caro ualenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax: interior pars siue acida, siue aquosa fuerit, abundè refrigerat. Glandes non minus quàm frumentacea alunt, sed concoctu difficiles, crassi succi, & tardè permeant. Castaneæ omni ex parte his præcellunt.

De animalibus, & primo de uolatilibus.

Cap.

LXXXII.

A Nimalia quæ uolatu nituntur, minus quidem quàm quæ pedibus fidunt, & præcipuè quàm sues, alunt, sed promptius concoquuntur, magisq; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina & phasianus. At turdi, merulæ, & exigui passeræ, inter quos sunt etiam à turribus ubi nidificant pyrgitæ appellati, durius alimentum præstant, atque his magis adhuc, turtur, palumbus, & anas: sed multo durius, concoctu difficilius, magisque fibrosum pauo exhibet. Anserum uerò & struthiocameli caro excrementicia, ægrius quàm omnia commemorata concoquitur, si alæ excipiantur, quæ non minus quàm aliarum auium probi succi existunt. Porro gruorum caro fibrosum durumq; præbet alimentum. In totum iuniora ueteribus humidiora sunt, promptius concoctioni parent, ualentiorum cibum præstant, atque per aluum faciliè descendunt. Similiter elixâ ab assis, & in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & montosis proueniunt, citius concoquuntur, minusque excrementicia sunt, quàm quæ in paludibus nutriuntur:

De ouis.

Cap. LXXXIII.

O Va gallinarum, phasianorumq; omnibus præstant. Anserum & struthiocamelorum praua habentur. Ex omnibus autem recentia ueteribus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimenti habent: sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates læuigant. Reliqua omnia ad concoquendum, rebellia, tardè transeunt, & succum gignunt crassiorem, præter ea quæ pnieta dicuntur, hæc autem sunt si cruda immergantur
in

in aquam calidam cum garo, uino, & oleo, & in uasē mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia uerò quæ fartagine frigūtur deteriora sunt.

De pedestribus animalibus. Cap. LXXXIII.

INter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius quàm alij cibi alimentum præbet, eò quòd gustu & odore familiaritatem cum humanis corporibus sortita est, ut non nulli qui imprudenter humanas carnes gustarunt, cognouerunt. Alimentum uerò quod ex illis contrahitur, uiscosum est, & non facilè in memoria potest distrahi. Ouilla excrementicia prauique succi est. Caprilla acris est malumq; succum efficit. Deterrima hircina, siue succi bonitatē, siue concoctionem respicias. Bubula melancholicum humorem facit. Leporina crassi succi est, sed minus quam ouilla & bubula. Ceruina dura est, & concoctioni rebellis. In totū, iuniora uetustis humidiora, mollioraq; & ad concoctionē faciliora sunt. Hoc modo etiam castrata non castratis, bene habita macris præstant.

De partibus animalium & sanguine. Cap. LXXXV.

SVMMA corporis particulæ neruosæ sunt, citra pinguedinem, & excarnes, eoq; glutinosæ, exigui alimenti, ac ad aluum mouendā efficaces, si excipias quæ uolatu nituntur, ob nimiam siccitatem. Rostra & aures cartilagosæ, & ad concoctionē sunt pertinaces. Lingua, est fungosa laxa uel exanguis: parū alimēti habet. Glandulæ suauēs sunt, & friabiles, sed mammarū, præcipuè scropharū, quum lacte scatent, dulciores habentur, hæ autē non minus quàm carnes alunt. Renes & testiculi gustu insuauēs & concoqui difficiles. At saginatorū gallinaceorum testiculi & suauēs sunt, & probum corpori alimentum præstant: quemadmodum taurorum, hircorum, & arietum concoctioni resistunt, & uitiosos creant humores. Cerebrum pituitosum, crassi, uitiosiq; succi, lentè transit, concoctioni aduersatur, stomachum lædit, & nauseam excitat: si autem probè coquatur, plurimum exhibet alimenti. Medulla pinguis, & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adeps pauci alimenti sunt, & stomacho nocent. Cor & iecur crassi succi, agrè concoquuntur, & lentè transeunt. At suillum iecur
alijs

aliis præstat. Lien tum uitiosi succi est, tum melancholicum humorem efficit. Pulmo facilius quidē, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorē cibum præbet, pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, uulua, intestinaq; dura, concoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia sicciora, quā domestica alimentū exhibent, minusq; excrementiciū. Sanguis quilibet, uix concoquitur, præsertim crassius, & melancholicus, qualis nimirū est bubulus. Leporinus utpote suauissimus cōmendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere, quidam uero, & cum aliis uisceribus. nonnulli & iuuenis porci sanguinē edūt. Caprillū uerò nonnullos comedisse, etiam Homerus testatur.

*De lacte.**Cap. LXXXVI.*

Lac coctum probè nutrit, gingiuis autem & dentibus nocet. quapropter ubi assumptum est, primum mulsū, deinde uino astringenti os colluere oportet. Item caput tentat, præcordia, uentremque inflat, calculos in renibus gignit. Ac humidius, minus quidem alimenti præbet, sed magis aluum proritat: crassius autem è contrario, magis alit minus descendit. At caprillum lac, mediocre consistentia est, sicut ouillum, crassius: & quod statim à partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius, deteriusque efficitur.

*De lactis potione.**Cap. LXXXVII.*

Qui lac potare uoluerit, ab aliis abstinere cibis debet, donec concoctū fuerit, & inferius descenderit. Satius itaq; est manē recens mulctū bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, ut quod laborantibus necessario acescat, sed lentè obambulare satius est, & interea uigiles conquiescere: hoc. n. pacto quamprimum per aluum descendit. Vbi deiectum fuerit, aliud bibendū est: ac si hoc quoque descendat, aliud. Initio itaq; purgat utiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quæ in uentre cōtinetur: mox, uenas ingreditur, ac optimè nutrit, atq; non amplius deiecitur. Porro in biliosis fluxionibus, & quum syntexes, hoc est colliquamenta corporis ad uentrē concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autē primum lentè paulatimque ut pars descendat, pars consumatur, deinde magis, ac magis incoquetur, cura adhibita, ne aduratur, aut in casum coalescat. quod optimè fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitando id quod

quod recesserit undiq; abradamus. Agitabitur autem ferula leui & tenui: & si quid oris ollæ inferuescat, hoc quoque spongia adimere oportet, id. n. subinde etiā reliquū lac corrumpit. Eo igitur modo quo dixi, lac coquēdum est, usq; dum æquabiliter crassius dulciusq; crudo euaserit. Quod in eo tenue est & sero sum, calculis marinis ignitis in id demissis, ebibit cōsumiturq;. Atq; hoc alui fluxionibus, præsertim biliosis est accōmodatum.

*De lacte scissili.**Cap. LXXXVIII.*

Serosa lactis portio à caseo discernitur, si uehementius ad ignem largiorem citra fumum excoquatur, deinde colo, aut panniculo exactè traijciatur. Porro miscetur sero mel lis momentum, aut oxymelitis, aliorūmve, daturq; subducendi uentris gratia, ætate quidem florentibus ad duos sextarios: iunioribus, non minus sextarios. Quod uerò marinis calculis ignitis aut ferro candenti demisso lac incrassatum est, intestinorum torminibus & alui profluuijs recte exhibetur.

*De caseo.**Cap. LXXXIX.*

Omnis casus acris est, sitim facit, ægre concoquitur, uitiosos succos, calculosque generat. Laudatior est recens, laxis, mollis, suavis, & modici salis particeps: qui secus habet, pessimus est.

*De piscibus.**Cap. XC.*

Omnes pisces frigidioris, humidiorisque temperamenti esse, nulli non constat. Omnium uerò optimi sunt. saxatiles, ad concoquendum prompti, bonique succi, modice humectant, ubi non duram carnem occupauerint. Verū ex non saxatilibus, pelagij, multum ab ij uariant, qui in limo nutriuntur, uel in fluuii ostio, sed omnium deterrimi qui uel in stagnis uel mari stagnante uiuunt. Particulatim uerò capito, si pelagius fuerit, mediocriter suavis est, minus concoctioni rebellis, & boni succi, sanguinem uerò gignit tenuiorem imbecilliorēq;. similia & lupus præstat. Mullus qui & ipse pelagius est, alijs piscibus durior est, fragilis, concoctu facilis, ualidæ ad alendum materiæ, suavis & pinguedinis expers.

*De testaceis.**Cap. XCI.*

Generatim pisces qui testa conteguntur, Græci uocant ostracoderma, salsum crudumque humorem producant.

Ex his ostrea mollissimam carnem obtinent & facilius descendunt. Chamæ uerò, purpuræ, ungues, spodyli, buccina, cochleæ, atque huiusmodi alia dura. Ac quæ molli testa integuntur, malacostrata græcis nominantur, nempe gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, concoctioni repugnant, sed alimentum præbent & uentrem comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquantur. Omnibus uerò crustatis inest succus, aluo subducendæ utilis, eoque etiam terrestribus cochleis. Ac quum hæc duram carnem, concocta difficilem, ualentis materiæ & succis uiriosam sortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendam adhibent. Echini modice frige faciunt; exigui alimenti, & urinæ ciendæ efficaces.

De mollibus, quæ malatia dicuntur. Cap. XCII.

Molles cute pisces, utpote polypi, & sepia, loligines, dura carne & concoqui difficiles sunt, præcipue polypis, salsum humorem modicum obtinent: concocti autem non parum alimenti corpori exhibent.

De cartilagineis.

Cap. XCIII.

Cartilagineorum, quæ selache Græci dicunt, torpedines, pastinacæ, mollem suauemque carnem occupant, quæ celeriter descendit, facile concoquitur, & probe alit. Raia, leuiria, squatina, atque eius generis reliqua, duriora sunt, concoctioni renituntur, & ualētius nutriūt. In summa, quibus dura caro est, & ægre concoquuntur, & plenius alunt: ubi uerò concocta fuerint, copiosum solidumque alimentum præbent.

De cetaceis.

Cap. XCIII.

Cetacea, utpote balneæ, uituli marini, libellæ, delphini, & præterea thynni, duræ, concoctu difficile & crassi succi carnem habent. Sale condita eiusmodi moderatiora efficiuntur, iā qui ex alijs piscibus humidiores habentur & magis excrementicij, ad condituram magis sunt accommodi. Talis autem in condituris est differentia, qualis & piscium, unde conficiuntur.

De uini uiribus.

Cap. XCV.

Qui sanitatis tuendæ curam susceperit, eum quoque uini facultates cognititas, habere expedit. In uniuersum itaque uinum omne nutrit, uerum rubens & crassum, magis: boni

boni autem succi non est efficax. Item dulce & ipsum quidem impense nutrit, sed stomacho nocet. Austerum stomacho quidem amicum est, uerum aigre in corpus distribuitur, leuiusque alit: hoc autem minus, album. Præstantissimum est colore fuluum. Porro uetustius nouo magis & calefacit & desiccatur. hæc igitur uini sunt facultates ueluti summam expositæ. Cæterum uinum calorem genuinum refocillat, unde concoctio melior, & sanguis probus euadit, cibum per omnia corporis membra, ut quod facile penetrat, deducit. Quamobrem ex morbo emaciatos reficit, corpusque ipsorum auget. Etenim cibi cupiditatem facit, pituitam extenuat, bile per urinam educit, & bonum colorem conciliat, animo læticiam, uoluptatemque parit, & robur adijcit. Harum itaque commodatum moderata uini potio, immoderata uero contrariorum occasionem præbet, eoque temulenti, animo turbantur, desipiunt, & graui somno quæ cataphora dicitur premuntur qua de causa immodica uini potio diligenter uitanda est, quanquam longiore temporis spacio interposito liberaliter bibere conducatur. ita namque urina largius & sudores promouentur. Vincit autem mox uomere, assumpta prius mulsa. quod ne palulum quidem ab eo noxæ percipiatur. Qui igitur potationi indulget, alio cibo non admodum repleti debet, sed inter potandum brassicam elixam esse, & bellaria, præsertim amygdala assumere, ut quæ capitis dolores leuent, & uomentibus nihil adferant molestiæ. Præstaret autem absinthij dilutum ante potionem bibere, ut quod omnium maximè crapulæ discutienda sit efficax. At si quis rosionem à uino sentiat, frigidam bibet: insequenti die, absinthij rursus dilutum, obambulatione itidem, frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

*De melle & mulsa.**Cap. XCVI.*

MEL coctum ualentius nutrit, quam subducatur aluum: non coctum, è contrario, ac frigidis humidisque temperaturis conducit: calidis, in bilem uertitur. Mulsa uero non admodum biliosis utilis est, ut quæ in bilem degeneret. Itaque in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabitur: ijs qui uiscera habent affectibus opportuna, incommoda est. Cæterum hoc modo præparari mulsa debet. Octupla aquæ portio melli admiscetur, incoquiturque donec spumare desinat, spumam uero continenter ab ea tollere, simul atque orta est oportet.

*De somno.**Cap. XCVII.*

Prostea quàm omnia quæ ad uictus rationem spectant, sumus executi, superest ut de somno, eo quòd omnium possidemus magna ex parte inititur, disseramus. Itaq, somnus uirium animalium (ut ita dicam) requies est, utili humiditate cerebrum madefaciente proueniens. Qui si recte ineatur, multa præstat commoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intenta laxat, animi uerò ægritudines obliterat, rationem uitiatam corrigit. Porro tempus somni optimum est à cibo. sed diurnus haud omnibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgentes, subinde acidoructus ædunt, & flatibus replentur. Nonnulli uerò fluctuatione uentris infestantur, nisi uel ex consuetudine, uel sufficienti somno usi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioque animum in somnum deducens, absolutam molitur concoctionem. Item post somnum nocturnum plurima parte ad excretionem recrementorū instigamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum uentris contractione deprehenditur, secundum quam uigilantia non inutilis, ut quæ recrementorum ex concoctione deiectionem molitur.

*De uigijs.**Cap. XCVIII.*

Vigilias quæ laborantes iam affligunt, ex dolore, aut febre, aut acutiore quodam casu oboriētes, secundo libro de febribus persequemur. quæ autē sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob mœrorē, aut curā, aut quandā animi ægritudinem uigilauerit, primū id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauium sonorum auditu mens à sollicitudinibus abducēda est, id quod nonnulli leni aquæ murmure machinantur. qui. n. sic permulcentur somno faciliè capiuntur. Præterea balneis præsertimq; uespertinis quum bene concoxerint utentur, ciboque humectanti utpote lactuca & id genus alijs. nonnunquam nigri papaueris folia uiridia obsonijs admiscebunt. Piscibus ad concoctionē promptis, uino largiore tenui & nō uetusto recreari debent.

ment. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo pa-
 uaueris capita, aut mandragora sint incocta. item anethinum
 non uetus somnū accersit. Noui autem qui post lassitudinem
 quiete subito succedente, somno caperetur. Adhæc uenus mo-
 derata idipsum præstat. Alii caput aut pedes refrigerantes, fa-
 cilè somno corripiuntur. At si ex cibi copia uitioe stomacho
 grauato uigilauerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quē-
 admodum rursus alii præter consuetudinem inedia preissi, aut
 modico cibo sumpto, uigiliis sunt infestari, cōsiderare id, ac cau-
 sam succidere, oportet.

*De sopore uehementi quæ cataphora græcis ap-
 pellatur. Cap. XCIX.*

AT si è contrario alti uehementesq; somni, quæ catapho-
 ra dicitur, urgeant, ab assiduis lauacris & refrigerate un-
 ctione abstinēbimus, medicamentis pituitam per os eli-
 cientibus utemur, atq; in totum ad calidiorem uictus rationē,
 sicciorem imbecillioresq; ipsos traducemus, quandoquidem
 huiusmodi affectio à frigidiore, ut plurimum & humidior ma-
 teria cerebrum imbuenēte, accidit.

*Dioclis Epistola ad ualeitudinem tuendam
 conscripta. Cap. C.*

DIOCLES ANTIGONO REGI.

QVoniam tibi omnium regū literatissimo esse conti-
 git, & multum iam ætate prouecto, ois philosophiæ
 disciplinarumq; mathematicarū peritia excellere,
 existi mai eā philosophiæ partē quæ ualeitudinis tuendæ præ-
 cepta tradit, laud alienā à regia maiestate fore: eoq; tibi per-
 scripsi, unde morbi hominibus oriātur, & quibus signis præce-
 dentibus, quomodoq; ipsis succurrere cōueniat. Quēadmodū
 enim in cælo nunquam tempestas ingruit, quam non indicia
 quædā præcedant, quibus nautæ cæteri q; probe periti homi-
 nes certiores reddātur, ita humanā naturā nullus inuadit mor-
 bus, quem nō signū aliquod denuntiarit. Tu itaq; si ijs quæ à
 nobis dicentur, animum attendas, exactā illorū cognitionem
 indipseris. Hominis corpus in quatuor parteis diducimus, ca-
 put scilicet, thoracē, uentrē & uesicam. Igitur ubi caput mor-
 bo cōflictaturū est, hæc plurimi notæ solent præcedere, uertigo

d 3 capitis

capitis dolor, superciliorum grauitas: aures sonant, tempora
faliunt, oculi mane illachrymāt, caligantq; nares oppletæ odo-
rem nō sentiunt, dentiū gingiuae attolluntur. Quū ergo ex his
aliquod accidit, caput purgari oportet, nullo quidē medicamē-
to, sed uel hyssopi uel origani summitatibus tritis, quæ in ollu-
la cum musto, aut sapæ hemina dimidio deferbuerint, atq; hoc
absorbens ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex alto
deducet, eaq; capitis affectuum curatione, nulla leuior est alia.
Optimè facit etiam si sinapi, mulla calida dilutū, ieiunus ab-
sorbens gargarizet, pituitamq; ex capite eliciat. Caterum ca-
put operimentis prius calefacere oportet, quo pituita liquefa-
cta, prōptè effluxioni pareat. Siquis hæc signa neglexerit, hu-
iusmodi ægitudines solet experiri, lippitudinem, glaucoma-
ta, aurium uomicas ac eruptiones, in ceruice strumas, cerebri
cariem quem σφακελὸν græci uocant, grauedinem, anginam
nyctilopa, teredines, uuam, capillorum defluxus, capitis ulce-
ra, & dentium dolorem. Quum autem à thorace morbus na-
scetur, totū corpus incipit sudare, thoraxq; lingua fit crassior,
sputum salsum, aut amarum, aut biliosum existit, dolor costas,
aut scapulas sine occasione inuadit, oscitatio frequēs, uigiliae,
suffocatio, sitis ex somno, animus tristior: pectus frigidum, bra-
chia & manus tremiscunt. Succurrendum est prudenter hoc
modo, uomitus quātoptime fieri potest, post cœnam sine re-
pletione, sineq; medicamento citari debet: utiles sunt & uo-
mitiones ante cibum, quas Græci syrmaismos appellāt. Opor-
tet autem eum qui sic uomet, radículas tenuis præsumere, na-
sturtium, erucam, sinapi, & portulacā, mox aqua tepida super-
bibita, uomere. At si huiusmodi indicia contemnantur, hi mor-
bi solent obuenire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, fe-
bres acutæ, phrenitis, lethargus, febris ardens cum singultu:
Quod si à uentre morbus orietur, hæc erunt signa, uēter prius
cruciatur, turbaturq; cibus & potio amara uidentur, genua gra-
uantur: lumbi nequeūt: fæcti, totumq; corpus etiam sine oc-
casionē laborat, crura torpent, febriculæ exiguae affligunt. His
itaq; cognitis, uentrem prius emollire oportet, non medica-
mentis, sed uictu. Tutius enim est uti ijs quibus nullus error
committi potest, utpote betis mullæ incoctis, allijs elixis, mal-
uis, lapatho, mercuriali herba, & ex melle confectiōibus. Om-
nia siquidem aluo subducendæ sunt. Si quod è signis intenda-
tur,

tur, cnici succum omnibus decoctis admiscere oportet, ut quæ suauiora & sine periculo sint. Iam & læuis brassica in aqua largiore cocta, eiusq; succus ad heminas quatuor potus cum melle & sale, utilis est. uel ciceris, aut erui decocti aquam eodem modo ieiunus utiliter bibet. Qui nullam eiusmodi signorum rationem habent, ij his morbis tentari solent, alui profluuium, intestinorum torminibus, eorumq; læuitate, ilio, coxendice, febre tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo articulari. A uesica qui nascuntur morbi, hæc dabunt signa: pleni ex cibo modico esse uidentur, inflationes uentris urgent, ructus, pallor totius corporis, somni graues, urina liuida & uix erumpens, naturalia tument. Quum itaq; huiusmodi notæ apparuerint, odoratis urinam cientibus tutissimè occurrere malo oportet. Itaque fœniculi apiiq; radices, uino albo odorato madefacito, atq; huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singulis diebus propinabis cum aqua dauci, smyrnii, helenij, quodcunq; horum habuerit, nam omnia proficiunt: adhæc aqua ciceris macerati cum uino idem efficit. Qui hæc signa negligunt, hos morbos expectent, aquam intercutem, lienem magnum, iecoris dolores, calculos, renum cruciatus urinæ stillicidium & uentris tumorem. In omnibus huiusmodi indiciis infantes sanè leuiori, adultos, acriore curatione tractabimus. Cæterum anni solstitia in quibus hæc solent ingruere silentio prætermittenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta conueniant, paucis exequemur, auspiciati ab hyemali.

Solstitium hyemale.

Solstitium itaq; hyemale usq; ad uernum æquinoctium auget in hominibus destillationes humiditatesq; ac, ppter ea calidioribus uti cibis, parciore potu, sed metaciore, atq; ex origano bibere oportet, nec non ueneri indulgere. Numerantur dies ad æquinoctium, nonaginta.

Æquinoctium uernum.

Hoc tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis sanies sanguinis, usq; ad uergiliarum ortum, eoq; tunc maximè succosa acriaq; assumi debent, corpus exerceri, & uenus. Sunt autem ad usq; uergiliarum ortum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

HOc tempore bilis amara augetur, amaraq; sanies, usq; ad æstiuum solstitium, dulcia omnia tunc quæ aluū moueāt, conueniunt, uenus quā parçissimè exercenda, hinc ad solstitium æstiuum dies quinq; & quadraginta existunt.

Solstitium æstiuum.

HOc anni tempus atram bilem ad usq; æquinoctium autūnale promouet, quapropter aqua frigida atq; odoratis omnibus utendum est: uenus perniciofa: aut innocentius saltem quæ de ea præscripsimus adhibeto. Porro sunt ad æquinoctiū autumnale, dies tres & nonaginta.

Æquinoctium autumnale.

HAec anni pars pituitæ copiam generat, tenuesq; defuxiones, donec uergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere, atq; acerrima, maximeq; succosa assumere, uomitum rarissimè citare, exerceri, atq; concubitū uitare. Numerantur ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta.


Vergiliarum occasus.

HOc tempore pituita ad usq; solstitium hyemale in hominibus redundat, quam ob rem acerbissima quæq; , uinum suauissimum, assumere oportet, pinguibusq; uti & exercitari. Sūt autem ad solstitium hyemale dies quinq; & quadraginta.

FINIS LIBRI PRIMI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.



PAULI AEGINETAE
LIBER SECVNDVS,
DE FEBRIBVS.
IOANNE GVINTERIO
Andernaco Medico Interprete.

CAPVT I.



BSOLVTIS de ualitudine tuenda præceptis, exequi aggrediemur, quomodo eos, qui morbis iam cōflētātur, restituamus, à similaribus utpote simplicioribus morbis exorſi. quales nimirum sunt, quos febriles appellant. Rurſus igitur nos Oribasij cōpendio, qđ ex Galeni sanè potissimū, & aliorum præterea complurium cōmentariis est excerptū, utentes paucula quoq; ab illis omiſſa adiungemus.

Quot & quæ principalia in morbis potissimum febrilibus perquirenda. Cap. II.

PRimū quidē perquirere cōuenit, morbus salutēne pmittat, an mortē mineat & si polliceat salutē, utrū acutus sit, an lōgus. Hæc sanè ī aliis quoq; magnis affectibus cōmodē quærunt. Tertiū quoq; nūquid una uice crisim experturus, qđ febrib⁹ potissimū peculiare est, an particulatim soluet.

Ex Galeni commentarijs, quale morbi principium dicamus. Cap. III.

NEq; enim capitis dolores & febris idē existunt, quēadmodum neq; uigilia, & cibi fastidiū totiusq; corporis grauitas, aut sensus lassitudinis: uerū unūquodq; harum

rum licet à febris sit diuersum, ipsam tamen denuntiat. porro febris inuadens, praesertim acuta, neq; nos potest, neq; imperium aliquem latere. Sed finge, si placet, etiam latere, miraculum tamen iudicauerim, si hora amplius ægrum subter fugerit. Quamobrem illud tempus morbi esse principium dicemus, quo manifestò febricitare incipientes decumbant.

Vnde cognoscendum, morbusne sit sanabilis, an perniciosus. Cap. IIII.

Lethales notæ sunt, facies cadauerosæ, nares acutæ, oculi cōcaui, reliquæq; ab Hippocrate cōmemorata: si hæc neq; ex uigilia, neq; euacuatione, neq; inedia acciderint. Itē in p̄p̄inquo mors est, si ægri lumē refugiūt & illachrymant, nō ex quadā à foris accidēte causa, neq; tñ oculis peculiari uitio obnoxiiis. Adhæc si alter ex his minor appareat, quæque in ijs alba esse debēt, rubescāt, aut liueāt, aut nigricēt. Aut si pituita ipsis inhærescat, perq; somnū alba oculorū appareāt palpebris extrorsum nō cōmissis, nisi ea larga uacuatio expresserit, aut ex cōsuetudine ipsis hoc acciderit. Iā illa mortis sunt indicia, dētibz stridere, aut desipere, aut in ueste floccos legere, aut festucas carpere. Attendēdumq; est ad in cubitū: nā si eger supinus cubat, & ueluti resolutus, uel si etiā deorsum à lecto ad pedes delabāt, extremā imbecillitatē fatetur. Multo adhuc peius est, frigidū spiritum ex naribus, & ore elidere: itē pulsus languidus creberq; & deficiēs: item si æger ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem præfagit. Si igitur omnia, quæ retulimus indicia, aut plura ex his appareant, aut etiā pauciora, sed ualida, nullumq; salutis argumentū affulserit, periculum mortis ineq̄itabile signat. Cōtra spirandi facilitas, pulsus uegetior, mēs, sibi cōstās, bene erga cibū oblatum affici, adhæc facies iacentisq; habitus, sani similis, bona indicia sunt, & salutaria. In uniuersum quæ a naturali habitu maximē abhorrēt, pestifera sunt. quæ uerò ipsi respondent, salutaria. Cæterū præfagia ex urinis, deiectione, & sputo, paulo post exequemur.

† De signis longæ ualeitudinis. Cap. V.

Quatuor notis morbi dignoscūtur: ipsorū motu, ægro tantis habitu, pulsu, febriū specie. Motu quidē in eum modum: si quatuor particularis accessionis tempora, ocyus & breuissimo spatio inuaserint, peracutus erit affectus, cuius

cuius extremus terminus est. Septimana, magna uerò ex parte quarto die crīsim experitur. At si lōgius quidē quā hic afflīxerit, sed duodecim horarū spaciū nō excedat, acutus prēdicat qui intra quattūdecimū diem potissimū iudicat, si uerò in plures horas prorogetur, ut initiū dūtaxat, & incremētū longiore tū diei, tū noctis tēpore absoluat, talis morbus longus existit. at si particulares accessiones morbus nō habeat, sed inde ab initio ad usq; finē cōtinuet, tanquā una sit accessio, ueluti in continuis, etiā hunc nimirū acutis adscribes. Aegrotantis habitus hoc pacto deprehēdūtur. Si quidē facies, & totū corpus reliquū collabat, acutū morbū præsagire est. Si prorsus nihil emacrescit, lōgus erit. quippe copia materiæ lōgiore spatio cōcoquenda signat. Ex arteriarū motu ita diuineris. Magnus pulsus, uehemēs, citatus, creber, acutū morbū indicabit, prius, longum. A febriū specie hunc in modū, quatenus calidæ & urētes, acutum signant morbū, mitiores autē & ueluti delitescētes, diuturnū.

† Hic titulus sic legitur in uetusto Cod. πῶς ἐξαγγινώσκωμεν δὲ καὶ χρόνιον νόσημα, id est, de signis acuti & lōgi morbi. Quī quidem titulus huic capiti maximē conuenit.

Quomodo præsciemus, an morbus iudicium subiturus soluendusue sit. Cap. VI.

Hoc quoq; præsire licet ex ijs quæ modo sunt nobis dicta, nempe ex febrium specie, & tempore. Forſan autem totum ex febrium specie. Siquidem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionibus solui solēt. Mitiores, leuiorēsq; prorogantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpūt. Hinc liquido constat, non solum quādo morbus soluetur, sed etiam quo pacto, acuti enim potius per excreta iudicantur: quemadmodum rursus longiores, per abscessus.

De diebus decretorijs. Cap. VII.

Dierum decretoriorum alii de ægris frequenter, cum fide, salubriter, perfectē, manifestō, & insigniter iudicant, alii contrario his modo. Tertius decimus medium quendam inter utrunque dierum genus ordinem habere monstratus est. Ac sunt ex ipsis, qui uel exiguum naturæ impetum nactim de morbo possunt decernere: quemadmodum septimus, & quartus decimus: pleriq; uerò, nisi in uehementibus naturæ motibus, morbos neutiquā possunt per crīsim soluere. Verūm

Verum nec uniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec oēs mali, pari rōne sunt mali. item nec cerro ordine bonitatē malignitatēue obtinent. Qui igitur primi sunt ordinis, nepe bonorū numero cōprehenfi, hunc in modū se habent. Præstantissimi oīum sunt, septimus, & quartusdecimus: mox nonus, undecimus, & uigesimus: deinde decimusseptimus, & quintus. hos sequitur quartus, post hūc tertius, & decimusoctauus. His cōtrarij, ad secundū ordinem referūtur: pessimus, quiq; cū periculo, nec clarē de morbis iudicat, ac ueluti ex aduerso septimo diei opponitur, sextus est. Huic cōsimiles, octauus, & decimus: secundū quos duodecimus, sextusdecimus, & decimusnonus habētur. Medius horum est, & tertiusdecimus, nec ita repudiandus, sicut ordini secundo ascripti: nec tā feliciter morbum potest soluere, quā qui ad primā classē pertinet. Atq; hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorū uerō ordine boni sunt, tertius, quartus, quintus, undecimus, quartusdecimus, decimusoctauus, uigesimus: mali autem sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, decimusnonus. inter hos medius consistit, tertiusdecimus. Porro ex his decretorijs nonnulli quoq; aliorum sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatorios, eō q̄ iudicia alio die decretorio futura prænunciēt contemplandaq; exhibeant: exempli gratia, quartus, iudicium septimo die futurū præmonstrat: dum uidelicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares uacuationes molitur, aut significationes prius nō factas, aut concoctionis notas repræsentat. Iam uerō Galenus etiam sexti, licet nō boni, quartum esse iudicem asserit. Undecimus quartidecimi index est, septimusdecimus autem, uigesimi. Itaq; ad quartūdecimū usq; diem ualentissima de morbis fiunt iudicia proximē succedunt, qui usque ad uigesimum habentur. Qui post hunc ad usque quadragesimum porriguntur, paulatim uehementiā remittunt. Primæ dignitatis sunt, uigesimusseptimus, trigessimusquartus, & quadragesimus. Hos sequuntur, uigesimusquartus, trigessimusprimus, trigessimusseptimus. Qui uerō dies reliqui à uigesimo ad usque quadragesimum intercedunt, omnes iudicii sunt expertes. Sicut qui post quadragesimum habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & abscessu, quā crisi morbū finientes. Atque alios quidē à quadragesimo die Hippocrates omnino negligere uidet, sexagesimi uerō,

uerò, octuagesimi, centesimi, & centesimi uigesimi rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mēibus, alios septem annis, alios, ut uerisimile est, duobus & tribus annorum septenarijs iudicari tradit.

Decretoria indicia in morborum principio esse praua. Cap. VIII.

Concoctionis signa nunquam sinistrè apparent. quippe omnis concoctio, naturæ uincentis opus est, eoq; semper securitatem pollicetur. Decretoria uerò signa aliquando incommode apparent, propterea quòd crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala contingens, uti prius in capite de iudicatorijs diebus est comprehensum. Neque igitur per initia, neq; in augmento ipsa commodè apparent, sed ubi morbus inclinauerit, quo tempore natura morbo ualentior est.

Quemadmodum futurum iudicium prænosendum sit. Cap. IX.

Si accessiones urgeant, præueniantq; tempus consuetū, & multo fiant uehementiores, ac tertio quoq; die significationem sui præbeant, tum cōcoctionis signa in urinis, aut deiectionibus, aut sputis cernantur, sine mora plane morbus iudicabitur. Sin accessiones lentè moueantur, eademq; hora inuadant, ac quotidie affligant, longiore tēporis spatio interposito morbi solutione expectabis. Itē ijs qui ob rigores uehementer febricitāt, fieri nō pōt, ut morbus ante soluat, q̃ illi fuerint leniti. si. n. rigor nihil remittat, haud quaquam morbus ad statum peruenerit, multoq; minus inclinatio ipsius speranda est.

Quomodo instans morborum iudicium agnoscat. Cap. X.

An te quamlibet iudicationem ægrotus grauiter excrucietur. Atque si inter diu illa continget, noctu affligitur: si per noctem futura est, inter diu exagitur. Ac superueniunt symptomata, utpote capitis dolor, quē prius non sensit, præterea collum simul dolet, præcordia fursum conuelluntur, spirandi quædam difficultas repentina oritur, aliaque graua accidentia, quæ superiori tempore non percibebantur, apparent. Atque his obuenientibus, si pulsus non concidant, sed sublimius attollantur, uehementioresq; fiant, adhuc si dies decretorius

decretorius indicetur, isq; potissimum ex illorum ordine, qui probè decernunt, non iudicium modo futurum, uerum salutiferum quoq; expectato. Neq; de terrere in his te debet, si ægrū delirantem, exilientē uē conspicias. Etenim & hæ succorum ad superiora tendentium notæ sunt: sicut è diverso inferiora petentium, aliæ, puta imi uentris rosio, circa umbilicum tormina lumborum dolor, uentris murmuratio. Est cum alia quoque in dicia consimilia deprehenduntur. Adhæc si per hæmorrhoidas uacuari laborans consuevit, etiam huius uacuationis circuitus unā incidit, repetitq;. Pari modo in menstruis, si mulier est quæ laborat, † non absurdum fuerit per talem uacuationem morbi fieri iudiciū. Iam sudores tum ex corporis madore qui præcessit, ut uerissimile est, & præsertim in die contēplatorio erumpentes, tum ex meatuum ad apertione prænoscenti sunt. Ac quæ per superna uacuationes futuræ sint, ex his maximè intelligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposita, etiam ægrotantis facies intuenda est. Item si qua partium ipsius palpitet, aut uenæ in temporibus pulsant, aut gena, aut nāsus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes uacuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam sine uoluntate illachyment, aut splendor oculis obduci imaginentur, ac naribus ueluti scabendi studio manus admoueant: tunc quidem non amplius morari, sed iam adesse fluore sanguinis uidebis. Vbi enim semel ac iterum scaberint, erumpit. Rosio uero stomachi, & labri inferioris tremor, trisim per uomitiones futuram subinde nuntiarunt. Atque de his abundè est. Accedit ipsis, ægrotantis ætas & natura, quæ spem nostram confirmet. prætereà anni tempus, & præsens aeris status. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ calidæ, aut sanguinis copiosi compos, multo magis sperandum est. Quod si etiam antea, uel æger, uel sanus, ut supra dictum est, uacuationem sanguinis expertus fuerit, hoc uel solum ad profundendi sanguinis spem exhibendam satis est. Iam uerò si anni tempus æstas est, aut si non æstas, certè calidus aeris status, ac sæpè illo tempore per sanguinis profluum crism sustinuerunt, corpusque sanguine redundet, quod *πληθωρικόν* nominant, & consuetarum excretionum sic retentio, hæc quoque spem tibi auxerint. Similis porro, & in reliquis uacuationibus ratio habenda est. At si horum nihil apparuerit, sed æger in aliquo decretoriorum, qui post uigesi-

mum

num maximè sunt, dierum grauius morbum ferat, idque cum consistit, ac dolores quidam in articulos aliquos decumbant, aut iuxta aures alias ve particulas hèreant, aut dolores quidem minimè infestent, uerum sudores, particulares continuè ex particula quadam erumpant, per abscessum crissim excipere oportet. Ac in illa potissimum particula abscessus se promet, quam cunque uel sudores, uel dolores, uel tumores exerceant.

† Hæc ita leguntur οὐδ' ἐν ἀτοπῶν διὰ τῆς τοιαύτης κενώσεως προσδοκᾶν γίνεσθαι τὴν κρίσιν. i. non absurdū fuerit per talem uacuationem expectare morbi solutionem: sed hæc leuia sunt.

*Quemadmodum optimum iudicium peractum
agnoscamus. Cap. XI.*

SI uacuatio competens post concoctionem accidat, & febris crissim experunti soluatur; ægerque alijs liberetur accidentibus, & coloratio euaserit pro uacuationis ratione, pulsusque uegetiorem acceperit, ac tum insurgendo, tum sese erigendo fortior sit redditus, quodque omnium securissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsecuta sit, ea sanè laudatissima iudicatio habetur. Quod si horum aliquo deficit, tantum ab optima abest, quantum id ualeat, quo deficit.

De pulsibus ex Galeni commentarijs. Cap. XII.

PULSUS motus est, quo cor & arteriæ attolluntur, submitunturque. Vfus ipsius duplex est. Et enim eleuatione Græci Διαστολὴν appellant, qua arteria ueluti explicatur quodammodo, ac patescit, frigidus aer ingreditur, uitale robur euentilans recreansque; ex quo etiam animalis spiritus habet originem. Submissione, συστολὴ Græcis uocatur, qua arteriæ extrema ad medium sui confidunt, conuicentque; fuliginosa recrementa expelluntur. Cæterum hæ arteriæ, oblonga sunt uasa, uenarum modo concava, sed duplici tunica muniuntur, tum prædicti motus gratia, tum quod sanguinē, spiritumque continent. Originem trahunt ex corde, sed per totum corpus membratim distribuuntur. Omnes igitur, & eodem pulsandi modo inter se, & cum corde conueniunt. Quamobrem ex una ipsarum, omnium rationem queas colligere, nō item omnium ex æquo motum percipere. Sed earum quæ ex carnes corporis
partes

partes perreptant, promptios. quæ carnosæ subsunt, obscurius. Porro ijs quæ per brachiale excurrunt omisissis, nullam, aut congruentius, aut usu commodius attigeris. Primum pulsum genus ex motus tēpore sumitur, ut quod elevatione arteriarū, atq; submissione examinetur. Differentiæ ipsius sunt, citatus pulsus, tardus, & mediocris: quoniam omne quod motui est accommodatum, aut celeriter, aut lentè, aut mediocriter pro temporis ratione mouetur. Citatus est, qui exiguo tempore multum spatij motu emetitur. Tardus, qui longo tēpore, paruum interuallum perficit. Mediocris, qui medium quendam motum inter citatum & tardum, peragit. Alterum genus distoles quantitate constat. Quoniam enim quodlibet corpus tria sortitur interualla, longum, latū, profundum, arteria autē corpus etiam est: ipsam quoq; tribus constare interuallis, necessum est. Verū in naturali animantis habitu, mediocriter ipsam undequaque eleuari reperies. Contrā, cum animal præter naturam habuerit, nonnunquam in aliqua horum distantia deficit, aliquando excedit. In quo statu, meminisse conuenit, qualis pulsus naturalis fuerit. si latitudine maior inueniatur, latum uocabis. si longitudine, longum, si profunditate, sublimem. Liquet autem contrarios quoque ipsis, & naturali minores, ad eum esse modum appellandos, arctum, breuem, & humilem. at inter eos qui omni distantia æqualiter in statum naturæ contrarium uertuntur, quicumque hac ratione immixtus est, paruus: quicumque auctus, magnus nominatur. Tertium genus pulsum, ad uirtutis robur exigitur. Differentiæ ipsius tres sunt, uehemens, languidus, & mediocris. Vehemens quidem est, qui tangentis manum ualide percutit. Languidus, qui inualide, & imbecilliter. Mediocris, horum medio consistit, quem nonnulli naturalem esse putauerunt. Nam ira & exercitijs uehementiorem fieri pulsum asserunt, qui à naturæ habitu recedit, quorum dictis Galenus uenit obuiam, non constantem inquit, sed promptè mutari eum pulsum, qui ex causis non naturalibus uehementior euadit. Pulsus igitur uehementior, qui non expeditè mutatur, is nimirum naturalis, & moderatus fuerit. Quartum genus, instrumenti constitutione constat. dico autem arteriæ corporis statu. differentiæ huius quoque tres sunt. Vel enim instrumentum durius est, quē natura exigit, ac pulsus uocatur durus. Vel mollius,

lius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Quintum genus, ex quantitate humoris infusi arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, uacuum, & mediocris: quoniam totum uas, aut plenum est, aut uacuum, aut mediocriter repletum. Plenus itaque est pulsus, ut Archigenes definit, qui arteriam pleniorē repræsentat, & occursum eius humiditate plenum, uacuum qui aeris modo arteriam excitat, ut digitorum impressione loci inanitas occurrat. Hæc igitur quinque pulsuum genera, uno arteriæ motu constant. quoniam uerò caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodammodo magis euidenter apparet, dignati sunt quidam etiam hoc pulsuum genus Sextum commemoratis an numerare. Ad reliqua uerò genera, tum quæ ex uno, tum quæ ex multis pulsibus sumuntur, pertinet quod quietis tempore constat, & quod rhythmo, & quod æqualitate, & inæqualitate, insuper quod ordine & inordinatione constituitur. Quod itaque quietis tempus spectat, Septimum à primo numeratum diuiditur in frequentem, & raram, & moderatam. Nam cum arteria duplici ageretur motu, qui ex contrarijs constat particulis, necesse est ut duplex quies cum ipso coincidat. Altera quæ post eleuationem, ante submissionem est: altera quæ secundum submissionem, eleuationem præcedit, quæ etiam quies plerisque imperceptibilis esse uidetur, ut inter duos motus quies aliqua media existat. Cui itaque longum quietis tempus est, is rarus dicitur: cui breue, creber: cui mediū, moderatus. Octauum genus pulsuum ad rhythmum pertinet. Est autem rhythmus summum quidem dispositio, aut temporis ad tempus proportio. In pulsu autem, secundum nonnullorum sententiam sanè, temporis motus, ad quietis tempus, ut eleuationis, & submissionis, ad aliquam quietem interpositam. Secundum aliorum uerò opinionem temporis motus, & quietis, ad motus quietisque tempus, aut motus ad motum, nempe eleuationis ad submissionem, aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorē proportio. Differentiæ rhythmī principes sunt duæ, pulsus boni rhythmī, & nullius rhythmī. Porro uocatur pulsus nullius rhythmī, num qui nullum rhythmum obtinet, id. n. fieri non potest, sed malo rhythmō præditus, quemadmodum nullam habere uocem nullam ceruicem, eum dicimus qui malam ceruicem malamque uocem sortitus est. Cæterum pulsus cui nullus rhyth-

PAULI AEGIN.

c mus

mus adest, triplex differentia existit. Alius siquidem est pararhythmus, mediocrem boni rhythmī peruersionem obtinens. Alius heterorhythmus, id est, alterius rhythmī, qui longius à bono recessit. Alius ecrhythmus, qui omnino bonitatē rhythmī corrumpit. Veluti cum puer significatur, peculiaris quidē puerili ætati secundum rhythmū pulsus eurhythmus appellatur: qui ad uigentē ætatem pertinet, heterorhythmus: qui nihil huius seruat, ecrhythmus dicitur. Nonum pulsuum genus est, quod in omnibus prædictis inuenitur æqualitate & inæqualitate cōstans, quod uel in uno pulsu spectatur, uel in pluribus id quod à collectione plurium, systematicum quoque uocant, de quo prius tanquā manifestiore dicendum erit. Aequalis itaque pulsus est, qui consequentia par est siue magnitudine, siue robore, aut uelocitate, aut reliquorum aliquo, aut etiam omnibus. Inæqualis, qui consequentia impar est. Si enim subsequentes uniuersi pares magnitudine qualicūque inciderint eiusmodi pulsus æqualis uocatur. At si primus, secundus, & tertius pares fuerint, quartus autem impar: talis nimirum magnitudine inæqualis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens, & coincidens. Non solum enim post unū aut etiam plures magnos unus minor apparet, sed nonnunquā totus quoque motus omnino aboletur, & pulsus deficiēs appellatur, sicut alter huic contrarius coindicens, cum expectata quiete in medio tanquā superuacaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo, & quartus tertio pari modo, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus myurizontas & myuros nuncupant, nomē à figuris, quæ in mucronem definiunt transferentes. Qui quidem perpetuo, ex ipsis imminuuntur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectionem finiunt, ac uocamus ipsos myuros deficientes. Qui uerò cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum defierant paruitate, hanc perpetuò conseruant. Quidam uerò augescunt rursus, uel in parem priori magnitudinem redeunt, uel ad minorem, uel ad maiorem, ij myuri recurrentes dicuntur. Iā uerò & in unius pulsus inæqualitate myuri pulsus fiunt, de quibus suo loco paulo post tractabitur. Huiusmodi sanè quædā est pulsuum inæqualitas, quæ systematica appellatur: Atque uno in pulsu depræhenditur, uel in una arteriæ particula, uel in diuersis accidit. quem
admodum

admodum in motu, exempli gratia, in una quidem particula arteriæ inæqualitas dicitur, cum aliter inceperit, ac aliter desierit moueri circa unum digitum arteria, incipiens quidem citatior, desinens autem tardior, uel è contrario. Atq; hoc triplici modo accidit, uel motus continue manet, uel intercidit, uel replet, & ueluti bis percutit. Si igitur manens continuus & non intercisus, à celeritate ad tarditatem transferit, aut è contratio, impar citatus græcè *ἡμιστάχυς* eiusmodi pulsus, & est, & dicitur. Quòd si quiescat, & quiete interpollata postmodum uelocior appareat, Caprizans appellatur, ex capra animâte sumpta translatione, quæ saliendo sublimis in aere consistit, & secundum quendam motum inopinatum priore citatione molitur. Porro si ab eleuatione recurrerit, & ante submissionem absolutam, secundo manum tangētis ferierit, dicrotus huiusmodi pulsus appellatur simile quippiam in incudibus fieri cernas licet, quippe mallei, simulatq; semel manu in ipsas incusseris, recipiatur, incudum renixu, & secundum rursus, uel etiam tertium feriunt. At qui non solum inæqualitas quæ uno ictu in eademq; arteriæ particula accidit in motus tempore, potest fieri, uerum & illa quæ uirtutis robore constat: non autem ea, quæ distantiarum quantitate comprehenditur. Nullo modo idem pulsus eadem in particula magnus & paruus queat effici: neq; in alio genere, sed in diuersis particulis. porro in uarijs arteriæ particulis unoq; in pulsu duplex fit inæqualitas nunc quidem cum motus manet continuus, & arteria iuxta quosdam digitos citius mouetur, iuxta quosdam uerò tardius nunc autem cum motus quoq; interciditur, ut nonnulli quidem digiti motum apprehendant, nonnulli uerò non. Ac iuxta eleuationis quantitatem in pluribus quidem particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo genere sunt myuri uno in ictu inclinantes, quos Græci uocant *ἐπικλινέυκτας*, & *περικλινέυκτας*. Si namq; interna digiti parte magnus occurrit pulsus: & curuatus inde iuxta rationem minuitur, ut in exteriori quæ ad ægrotantis pollicem spectat arteriæ parte, minimus idem appareat, myurus uocatur ad muris caudæ similitudinē, uel meiurus quæ caudæ modo imminuatur. At si iuxta medios digitos magnus occurrat, curuatusq; utrobique minuat, minor apparens, hunc Archigenes *κεκλινέυκτα* quasi dicas latinè inclinante, & *περικλινέυκτα* appellauit, manifesto significare uolens eleuationis breuitatem, cum extremorum utrorumque ueluti inclinatione. Nō. n. ut abscisis uniuersim

ac subito, utrinque partibus, sed ueluti inflexis in arcum contractus est, utpote myurus, hoc est imminutus magnitudine utriusque in partibus. Ac cum secundum magnitudinem inaequalitas, id quod maturius est, aut tardius, assumpserit, tum undosus, tum uermicularis, pulsus oriuntur. quod si id quod in situ est, acceperint, conuulsorij & turbulenti, ut uocant, constituuntur. exordiendum igitur est ab undosis, in quibus non simul apparet in tali inaequalitate arteria omnis eleuari, sed pars illius alia primū, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus continuus maneat in modum undarum sese eleuantium. ac nonnulli undam in rectum tendentem obtinent. quidam in latus inclinantem, & alij in breui longitudinis distantia, altitudinem magnam habent, alij contra, aliquid latitudinem, aliqui angustiam. Similiter etiam celeritate & robore inaequales sunt. Undosus totus in paruitatem cessans, uermiculans appellatur, uermis gressui assimilatus. Quemadmodum uero undosum pulsum minorem factum uermiculans excipit, ita uermiculantem formicans ubi motibus multis abolitis in unum eundemque per quam exiguum deserit. Vocatus hic quoque est à formicae animantis similitudine, tum ob paruitatem, tum ob motus speciem. Est. n. formicans admodum exiguus, ut quo minor alius non extat. Pari modo languidissimus omnium creberrimus non tamen citatus, ut Archigenes existimauit. Huic confinis est Hecticus. quemadmodum enim febris, sic etiam pulsus Hecticus est, qui nullam magnam mutationem subit, sed perpetuo consimilis manet, trahitque ut ab initio incepit, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum conuerso. Porro conuulsorij pulsus utrinque ab extremis sursum retrahi, tendi, & conuelli uidentur, ceu chordae cuiusdam tensae sensum praebeant: at in turbulenti nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriae particulae quaedam sursum ferantur, uno eodemque tempore, ac motum ipsarum spiculis rectissime assimulaueris: quae ualidius emissae, celeriter feruntur uibrata. Serratus pulsus est cum alia pars arteriae elata, alia minus, ob duritiem nimirum ipsius esse uidetur. Ceterum pulsus hic est turbulenti quippiam possidet, ac citatus quidem est, creberque, non semper autem magnus. Decimum genus pulsuum ex inaequalitate profectum commemoratis succedit, quod ordine, & in ordinatione constat. Nam ordinatus & inordinatus inaequali in circuitum paritate: & prorsus imparitatem diuiso, ex utraque sectione

secciónē originē trahunt. Ex circuituū paritate ordinatus: ex absoluta uerò imparitate inordinatus. etenim pulsus æqualis omnino est etiā ordinatus, siquidē subsequētia parem ipsum dicebamus: inæqualis autē non oīno inordinatus est. Si nanq; paritatē corrūpat, circuitū uerò seruet aliquē, ut in eleuationis quātitate, uerbi gratia, si duo magni, & unus paruus sit: deinde rursus duo magni, & unus paruus, atq; sic deinceps, uocabitur inæqualis quidē, sed ordinatus. At si præterquā quod paritatem corrūpat, ne ordinē quidē aliquē inæqualitatis cōseruet, cū inæqualis tū inordinatus talis est: similiter in aliis quoque generibus se habet. Inordinatorū quidē, alii sunt ex toto inordinati, ne uel exiguū quendam circuitū cōseruantes, alii uerò secūdū circuitus ordinati. Quatenus. n. cōtinuam ordinationē nō habēt, inordinati uocabūtur: quatenus aut diu circuitum quendā tuentur, secūdū circuitus, ordinati uocari queāt. Exempli gratia, si contingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exiguos: quatuor magnos, & pares exiguos, & rursus tanquam reflectentes duos magnos, & duos exiguos: tres magnos & totidem exiguos: & deinceps similiter. scire uerò conuenit, inter alios quidē contrarios singulos, quēdam esse medium. Aequalis autē & inæqualis mediū nullum, neq; ordinati, neq; inordinati: nisi uoles secūdum circuitus ordinatum medium dicere ordinati & inordinati. Cæterum aliorum omnium mediū, secundum naturam sunt, præterquam uehementis & languidi, ut à nobis ostensum est. Inter hos autem æqualis solus secūdū naturā est, reliqui præter naturam, inæqualis ordinatus & inordinatus. Hæc pulsuum genera uniuersa sunt, & generales ipsorum differentiæ. Nonnulli uerò his etiā alia duo annumerarunt. Primum à situ arteriæ sumitur, quatenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrossum deducta esse uideatur. Alterū quo maturius, aut tardius: ex quorum numero undosos turbulētosq; pulsus esse diximus, ac nos compendii gratia simplices solum differentias prodidimus, ex dictis autem si coniungamus has. facile erit etiā cōpositas inuenire. † Porro opportunum erit deinceps, causas quoq; pulsibus conuenientes exponere, quas comitatur etiam præfagiū ab ipsis desumptum, ac initium à magnitudine capiemus, quoniam hæc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, uel propter usum urgētē, qui calor est in corde exuperās, externæ
c 3 appetens

appetens refrigerationis, & ueluti euentilationis, aut propter corporis gracilitatem, ut posterius ostendetur. Porro augefcit calor, aut ex causis naturalibus, utpote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter calida, anni tempore, regione, & temperamento calidiore. Aut causis non naturalibus, ueluti aëre qui nos ambit calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibis uino, medicamentis calfacientibus. Aut causis naturæ contrariis, puta intemperie calida, aut humorū putredine, aut ira, aut similibus. Discernes uniuscuiusq; pulsū hoc discrimine, q̄ causæ naturales magnitudinem ipsius faciunt stabilem, & quæ difficulter mutari queat. Reliquæ uerò, ex facili mutabilem, ut etiam manu adhuc adnota frequenter, aut certè paulopost subsidat. Iā uerò pulsibus, qui sane ob balineas calentes magni sunt, molities quoq; accedit, quemadmodum iis, qui ob calidam & præsertim cum siccitate intemperiem magni existunt, durities. Exercitatis uerò mediocriter, aut perfricatis, nec duri, nec molles sunt, medio statu præditi. Pectoris autem regio, multo calidior est, quod iam & iratis accidit. Ex cibo autem magnis, aut uini usu, aut ita, præter magnitudinem etiam uehementia inest. Qui uerò occultare iram student, aut aliud quid præter medici permissionem factum, uerbi gratia medicamen calidum sumptum, eundem medicum simulatq; manum attingat, interrogantem celare uolentes, iis præter magnitudinem manifesta quoq; oboritur inæqualitas. Ad hæc ægrotantis mores & consuetudo non mediocriter ad pulsus dignotionem faciunt. Consuetudo quidem, si medicaminum appetens sit si & rudis mores, si opinionis eximendæ peritus & calidus sit. Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem adhuc submissionē magis citatam habet. Verum ad magnum pulsū efficiendū, non solum usus abundè est, sed etiam uirtutis ministerium desideratur, instrumentiq; commodatio inter siccitatē & molitiē. Aucto igitur cordis calore propter quālibet causam ex cōmemoratis, primum quidē magnus pulsus efficitur: ubi uerò magnitudo usui nō suffecerit, statim etiā celeritas ipsi accidit. At si ne sic quidem satis fuerit, mox frequētiā assumit, parui autem, tardi & rari pulsus, itidem à contrariis fiunt. Sed quādoq; à magno citato & crebro ad contrarios fit mutatio, usu nimirū postulante, non amplius id quod in pulsū primum factum est, id etiā primum cessat, uerū quod postea acquisiuit, id primum

primum abiicit, statim quidem rarus euadēs, deinde tardus, postea quoq; exiguus. Sin autem tarditas prauitasq; accreuerint, ē contrario raritas in crebritudinem trāmutatur, ut per eam utcunq; usui fiat abundē. Hæ igitur magnitudinis, celeritatis, frequentia, & contrariorum ipsis pulsum causæ habentur. At iungetur ipsis ea quoq; pulsus immutatio, quæ una solum distantia constat. Itaq; latitudo sola augetur, dum humiditas potissimum, uel secundum naturam, uel etiā ab exterioribus causis redundat, quemadmodum sublimitatis pulsus ob instrumenti molliem uirtute ad hoc opitulante, longitudo à siccitate, & carniū circumpositarum emaciato palam efficitur, reliquis distantijs collapsis. Non enim arteria longior, quā postulat natura fieri potest, ac propriè magis pulsum huiusmodi gracilem appellaueris, quemadmodum ipsi contrarium secundum latitudinem solam, & profunditatem adauctum, amplū. Contrariis autem horum affectibus pulsus nonnunquam incidit, & in aliqua, aut aliquibus distantijs prohibetur, humilis, aut arctus, aut breuis apparens, cū talis non sit, sed ob pinguedinis cuiusdam, aut carniū, aut mēbranarum oppositarum crassitiem apparens. interim, etiā totus paruus uidetur, cum re uera paruus non sit, & languidus similiter. Quid opus est uerbis: sæpe absoluta pulsus defectio quibusdā esse putatur in omnibus arterijs, cum uerè non sit, & maximè ijs qui negligentius ipsum tangunt, sed cum motus ob carniū copiam delitescit, re uera obscurus existent, non enim extrema pulsus defectio homini potest accidere, quoad uita fruatur, quemadmodum igitur rursus in locis ex carniū, etiam parui pulsas, magni esse uidentur. Corpore itaque uehementer emaciato, arteria spinam perreptans, sæpe tangentibus abdomen, motum repræsentat, ac nonnulli etiam ex his, quæ prius in artubus nō erāt, conspicuæ. Quamobrem omnibus causis diligenter attendendum censeo, ne dignorio ipsorum nos lateat. Pulsus autem uehemens uirtutis robore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote usus dissolutus, aut instrumenti durities. Languidus autem pulsus, imbecillæ uirtutis & solius soboles est, aliud licet nullum adfuerit. Si quidem uehemens omnibus causis ad sui generationem indiget, languidum etiam sola imbecillitas efficit. Qui igitur per initia uehemens est, ætates anni tēpora, regiones, & tēperamenta moderata comitatur,

languidus immoderata. Porro qui à languore in uehementiā incidit, uirtute uindicta ab imbecillitate prius occupante efficitur. Vindicatur uero, aut ex his quæ in ipso corpore continentur, ueluti humorum concoctione, uel excretionem uel ira: aut ab exterioribus, nempe uino, cibo, exercitijs, ac alijs quæ intemperiem corrigunt. Vires dissolunt, inedia, uigiliæ, uacuationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime animæ defectiōnem inferentes, ac omnia quæ intemperiem faciunt. Quidam uero ex rudibus ac in exercitatis, durum pulsum uehementem esse putauerunt, quod discrimen exercitatum, tum ratione, tum tactu, nunquam latuerit. Nam uehemens magna ex parte cū magnitudine in sublimitatem attollitur, tactum ualidè percutiens: durus magnitudinem non recipit propter arteriæ contumaciam: fit igitur durus, ob instrumenti duritiem, quā refrigeratio immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione profecta, aut conuulsio generat. Statim uero duritiem etiam paruitas, & celeritas nonnunquam, & frequentia magnitudinis loco propter usum sequitur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quam humidiores reddunt ex iis quæ secundum naturam sunt, humectiores cibi, balnea frequentia, somnus multus, uictus copiosior & animi oblectatio, ex his quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutem, & reliqua pituitæ uitia. Plenus pulsus, aut humorum copiā, aut ciborum, aut uini potionis abundantiam indicat, quemadmodum uacuis contraria, aut enim inediam, aut uacuationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multam in corde caliditatem, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quampiam arteriarum uiolento motu incalescentium, dispositionem fatetur. Archigenes uero tradit arteriæ locum propriè in cathis calidiorem deprehendi, quemadmodum in iis, qui conuulsionem cum graui animi in somnum delatione quam cataphoram appellant. At rhythmus, de quo disputatum est, si par sit motu & quiete, probam totius corporis temperiem præ se fert, quantum ad se pertinet, uel non magnam à bona declinationem, sicut in ætate puerili, & corporibus alioquin temperatis. Ac si longius quietis tempus fuerit eo quo motus peragitur, calorem præpollere notat, quemadmodum in ætate florētibus, & his proximis, ueluti igit in corporibus senilibus æqualiter frigidis, diuturnius motionis tempus est quam quietis.

Notare

Notare autem oportet rhythmum inæqualitatem mensuræ esse
eius quæ celeritate & frequentia consistit. hanc autem ueluti
materiæ rationem ad rhythmum obtinere. Iam uerò deficien-
tes, coincidentesq; pulsus fiunt, uiribus oppressis, & ueluti ag-
grauatis, sed coincidentes minorem offensam, deficientes ma-
iorem significant, ac in uniuersum uirtus oppressa grauataque
pulsus mutat ad inæqualitatem inordinationemq; tum aliam
quamlibet, tum eam quæ uehementia & magnitudine cõstat.
Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (uel
enim in systematica, ut uocant, inæqualitate, uel in ea quæ uno
fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidem extremam uirtu-
tis internitionem notant, repetentes autem recurrentesq; , &
ipsi quidem imbecillem, sed repugnantem adhuc resistentem
que, & renuentem indicant, in uno autem ictu myuri & incli-
nantes, quos $\epsilon\pi\iota\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\sigma\upsilon\kappa\omicron\tau\alpha\varsigma$ uel $\pi\epsilon\pi\iota\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\sigma\upsilon\kappa\omicron\tau\alpha\varsigma$ appellamus, ma-
ximè ijs fiunt, qui paulatim contabuerunt, inflammationibus
non solutis, præterea plurimis quomodocunq; tabescentibus,
dum partes quæ circa arterias habentur, emarcescunt. Porro
inæqualiter citati & caprizantes, febriles potissimum calores
comitantur: uerum si pulsus eleuationis principia dissoluens,
extremum ipsius acceleret, & submissionis initium, putredinẽ
exuperantem notat, natura fuliginosis recrementis excernen-
dis incubente. Sin autem è contrario submissionis initium dis-
soluerit, ac eleuationem uero magis instet, calorem præpol-
lere scias, qui refrigerationẽ desideret. Comitatur hæc in fe-
bri etiam crebritudo plurima ex parte, interdum magnitudo
quoq; nisi uirtutem instrumenti duritia impediat. Cum autẽ
hec in arteria intenditur, & uirtus nõ sit inualida, pulsus sit qui
à bis feriendo dicrotus appellatur. Porro undosus humidio-
res potissimũ affectus sequitur, atq; his magis aquæ subtercu-
tem genus, quod Anasarca uocant, itẽ lethargos, & peripneu-
moniam. At cum uirtus dissolui inceperit, sed paululum adhuc
resistat, undosus in uermiculantem decedit, ubi extremè col-
lapsa fuerit, etiam hunc formicans excipit. Hecticus aut pro-
priè contabescens & alioqui emarcescens sequitur. Cõuul-
sorius fit, quũ neruorũ origo inflammatoria quadam affectio-
ne cõflictatur, sicut in phreneticis, & acuta epilepsia correptis,
quando etiã moriuntur, adhuc calẽtes, qui hoc uitio sunt occu-
pati, cõtrario his modo quos syncope inuadit, illi nanq; uehe-
menter

menter etiam frigidi, adhuc uiuunt. Turbulentus autem pulsus efficitur, cum usus magnam eleuationem requirit, ac uitale robur eam potest creare, solum uero arteriae corpus praeduritie, in magnam attolli diastolen, ut in magnis inflammationibus, obstructionibusque diuturnis, impotens refragatur. Pulsus ferratus in totum index est inflammationis, & praesertim partium quarundam neruosarum: quinetiam pleuritidi peculiaris est: remittens quidem, leni & ex facili concoquenda: intensus autem difficili, & concoctu peruicaci: quae cum imbecilla quidem uirtute, subito in periculum praecipitat: cum ualida autem longo tempore concoquetur. Vel enim in uomicam transijt subinde, uel marcida tabes ipsam excepit. Iam uero sciendum uenit, in ordinationem comitari inaequalitates. raro siquidem inuenire est inaequalem pulsum, ordinatum. Minores offensa, inaequales pulsus & ordinatos: maiores, inaequales & inordinatos procreant. Haec igitur simplices pulsum causae sunt & praesagia. Ex his etiam compositas, ut in sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud negotiosum est inuenire.

† Rectior est haec scriptura quae in uetusto codice est. ἔξῃς δ' αὖ ἐν λέγειν καὶ τὰ αἰτία τὰ τρέποντα τῆς σφυγμῆς. Porro opportunum erit deinceps causas pulsum immutantes exponere facile enim fuit librario scribere πρέποντα pro τρέποντα.

De deiectionibus. Cap. XIII.

Aluus optima est: mollis, cohærens, & eodem tempore quo in secunda ualitudine assueuit, reddita. Talis nimirum est quae leuiter ruffa est, simul & conuenienter spissata, non nimis foetida: quae talis non est, mala censetur. Quae igitur colore similis cibo ingesto cernitur, & tenuis, & non exucata & celeriter descendens, cruda est. At mere ruffa, initio quidem biliosiorē morbum indicabit. sin autem in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denuntiat, uiridis æruginosae bilis nota est, nigra, uel atræ bilis, uel sanguinis cuiusdam indidē adusti, liuida, refrigerescere quodammodo, & emori non parū interiora significat oleosa pinguisque, corporis pinguitudinem consumi innuit: quemadmodum rursus uiscosa, pingui cum sit deterior, animantis particularum consumptionem praese fert. Nimis foetida haud exiguan fatetur putrefactionem. Porro in omnibus hisce, si alius qualitate cibo assumpto non

pro non respondeat eodem iam modo affectio quoq; confiderabitur. Omniū deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiens.

*De urinarum notis.**Cap. XIIII.*

Quemadmodum in deiectionibus, ita in urinis quoq; regula sanorū usi, de ægrotis indicia sumemus. Urina igitur præstâtissima est, quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subflava. nimirū uero hæc & crassitiem moderatā habet. At cū triplex turbidarū urinarū sit differentia, (uel enim redditæ tales, paulopost subsidunt, uel consimiles perpetuo manēt: uel puræ excernūtur deinde uero turbantur) praua quidem existit tertia ordine dicta, moderata benigna q; prima: medio utriusq; cōsistit secunda: summè cruda est, exactè aquosa, uel uti desperatæ concoctionis uenosi generis accidens. Quando autem celeriter descēderit, diabetes, ut Græci appellāt, efficitur. Verum hæc sanè inter urinas crudas deterrima est, succedit autē ipsi, tenuis admodū & aquæ modo exalbida. Huic uicina est alia urina, quæ multis in morbis apparet, tenuis admodū, & albæ propinqua. Subpallida uerò hanc sequitur: quæ pallida quidē modo erit, & subrufa, cōcoquitur autem tam quantū ad colorē ipsius attinet. Tantū uerò crassitie ipsam ab aquosa recessisse oportet, si probè concoqui debeat, quantū etiā colore, sin aut hec secundū naturā adamussim seruat, subsidens album, leue, æquale, & copiosum reddit, exactæ nimirum concoctionis nota fuerit: largius autem crudū, humorem, expurgari signat. Iam uerò si urina crassa modicè fuerit, habeatq; subsidens aliquod, non cruda, iam ex toto erit. Si. n. subsidentia parti farinæ crassiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut uiridia, aut foedi odoris, habeat, præterquàm q̄ quæuis huiusmodi in cruditate est, etiam mortis periculum aliàs ostendit. Porro boni coloris urinæ quæq; simul, uel subsidentia alba, leuia, & equalia representent, uel nebulas quasdam similes, uel suspensa, omnium urinarū sunt laudatissimæ, & præcipuæ, quarum subsidens, tale extiterit. Deinde commendatur urina cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulæ tales apparent. Ac, ut uno uerbo expediam, quæ urinis probè innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

De

De sputi notis. Cap. XV.

Sputum subflauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solum cruditatē, malū uero nullum insignius denuntiat. At sincere flauum, rufum, spumofum, uiride, glutinosum, rotundum, atq; his adhuc magis nigrū, prauū est. Si tenim præter sanguinē, quisquis alius humor syncerus est, prauam ostendit affectionem, caloris flammei sobolem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt: flauæ, aut nigræ bilis, difficilia. Cæterum quomodo ipsa ædantur, inspicere simul expedit. Nam si promptè excreentur, liquido constat talia quidem esse salubria. contraria uero periculum testari absolutam itaq; concoctionem fatetur sputū leue, album, æquale: & substantia neq; liquidum, neque ualdè crassum. Summæ uero cruditatis nota est, si nihil prorsus expuitur. At si expuatur quidem, sed tenne, languidæ concoctionis argumentum est, Sin autem Sincere rufum, prædierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut æruginosum, aut atrum, summam perniciem portendit.

De febribus diarijs dignoscendis curandisque. Cap. XVI.

Diaras febres, urinarum in primo die concoctio, calorisq; suauitas seu propriæ ipsarū & inseparabiles notæ testantur. Verū à prima febris solutione, certiorē habiturus es earū cognitionē. Quippe arteriarū in hac motus ei qui in secūda ualitudine fuit, ex toto respōdet, cū nulla ex aliis febribus in naturalē statū reuertatur. iam uerò quod facillè morbum fert æger, maximū & id indicium est. Opportuni sunt id genus febribus, in quorū corpore quod defluit, halituosum nō est, sed mordax & acre, fumi instar. Hi autē sunt calidi & sicci tēperamento: breuiter, biliosi, quos *πικροχολαί* Græci uocant, qui igitur ob lassitudinē febricitarūt, pinguiter simul ac molliter fricādi sunt, in balneumq; ducēdi. Quibus siccitas febrē intulit, fricādi hi quidē minus, sed lauādi sunt liberalius. Quos curæ mœores, uigiliæ & ira exercuerūt: lauare quidē nō subinde oportet, uerū oleo copiosiore tepido, cui minimè astringēs uis insit, tū paululū fricare, tum ex cōsuetudine lauare conuenit. Ab insolatu uisti, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauationem minimè, uerò aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quæ refrigerent & rosaceū & omphacinum

omphacinum sine sale confecta: eadem uero fincipiti uehementer refrigerata super fundere oportet, & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Si quis ex frigoris iniuria febrem concepit, etiam is in remissione lauandus est. At si cum grauedine, & destillatione febrat, priusquam hæ concoquantur, lauatiōi non committetur. Porro qui ex æstu Solis febricitant, ij, etiam cum hæc adsunt, lauandi sunt; qui autē ex frigore, ijs quoque caput mediocriter calefacientibus perfundendū est, cuiusmodi irinum est, & nardinum unguentum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, uictusque bonis procreandis succis idoneus. At cui propter inedia, febris contracta fuerit, ei opus est statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducī, & repente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, diutissime in calidi solij aqua immorari. Simulatque exierit, ac sese recollegerit, denuō balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox ptisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium uerò communis esto uictus species, quæ & boni sit succi, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & aspectu, & uiribus aquosum. Oportet autem in primæ febrium accessionis insultu nonnunquam aliquos horum nutrire, in quibus corporis intemperies ad calidius, siccusque transiens, febres accendit. Quī ob bubonem hoc est inguinum inflammationem febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed ulceri, quod bubonis occasio fuit, prospiciētes lauant, ubi accessio declinauerit. Cæterum à uino ipsi sunt arcedi, donec inflammationes inguinum fuerint, solutæ, & tenuiore uictu enutriendi.

De putridarum febrium agnitione. Cap. XVII.

Putridæ febres dignoscuntur eo quod nulla ipsas exterior causa præcedat: item quod à rigore incipiant, neque insolatu, neque uehementi frigore prægressio. id quoque peculiare est febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessione per exiguos quidem ipsos & inæquales obtinent: hoc enim singulariter huiusmodi febrium est proprium. maxima autem putrida

tridarum febrium nota est etiam qualitas caloris, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Similiter ad ipsas propriè spectat etiam urinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnū uerò & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres repræsentant.

Curatio febrium putridarum. Cap. XVIII.

SI uires sint ualidæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinē dimittes protinus, modo cruditas in uentre non existat. At si uires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes: cuius uacuatione, putrida per urinas, aluum, & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os uentriculi capeffant, etiam per uomitum: alioquin non oportet ea præter naturam irritare: cæterum deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandoq; ualenter, prædictas uacuationes moliri possunt, ueluti prisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apijq; radix in aqua potabili concocta. Cum aluus nihil deijcit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est uerum totum corpus rarefacere prius non expedit quàm uacuatum fuerit: ubi uacuaueris, rarefacias utiq; licet, medicamento tepido calore prædito, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore uinum aquosum potui datum, uniuerfas promouet uacuationes: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrū. Quod si uerò febris magnitudine obstiterit, neq; uino utendum, neq; lauacro, neq; unctionibus rarefaciendi uirtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commodè bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & uires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa planè euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Prætereà si bona corporis habitudine sit æget, tum status cœli calidus ac siccus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haud quaquam lædetur: sin autē mediocris existat febris, & uires inualidæ sed cum notis concoctionis, ijs qui ita habent balneum prodest, & uini potio. Tum uerò ex unctionibus eæ quæ rarefaciunt.

De tertianarum agnitione. Cap. XIX.

TERTIANA febris cum sit flauæ bilis cōmotæ soboles, protinus ab initio rigorem, haud exiguum infert. hoc discrimine à quartanæ rigore uariat, quod pungere uideatur, & cutem

& cutem conuulnere. In quartanis autem, accessionis insul-
tus uehementem perfrictionem habet. Quotidianas uerò ne-
quaquam rigor præcedit: sed solum perfrigescunt. Cæterum
tertiana etiam exactum pulsum ordinem obtinet. si uerò ue-
hementi in statu affligit, & hominē perurit, ac paulò post con-
sistit, calorque æquabiliter per omnes corporis partes diffundi-
tur. Et si manum inijcis, primo quidem contactu, calor copio-
sius & acris occurrit, ueluti cum uapore quodam erumpens,
sed paulò post à manu remanente uincitur. Vbi portione æger
fuerit recreatus, statim copia uaporis calidi per cutem emer-
git, sudorum nuntia. Bilis uomitio superuenit, aut aluus solui-
tur, perque urinam biliosa redduntur. Præterea ad integra-
tem tertiana desinit, ubi accessionis tempus, horarum non plu-
rium duodecim expedierit. Febrem igitur quæ intra duode-
cim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ
uerò diuturniorem accessionem habuerit, illam simplici uoca-
bulo tertianam nuncupamus. quæcunque autem longissimè
productam accessionem seruauerit, exiguum uero interual-
lum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

*Curatio tertianæ.**Cap. XX.*

EXquisitam tertianam, ut quam flauabilis procreet, hu-
meſtare oportet ac refrigerare. & sanè quod in uentri-
culū confluit, uomitionibus, & inferius elicere. Itē per
urinas, & sudores deducere idipsum conuenit. Aluus itaq; mol-
libus clysteriis euocatur. urina potionibus, in quibus apium, &
anethū maduerunt, & si concoctionis signa deprehenderis, ma-
gna iam confidētia etiā absynthiū dabis. Balnea uero ex aqua
calida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neq; sal, ne-
que sinapi adijci, sed ægrum oleo quam maximè calido perfu-
sum in solium descendere oportet. At qui balneis admodum
gaudent, eos etiā si bis die laueris, haud peccabis. Vbi uerò con-
coctionis notas perceperis, tūc, uel si sæpius laueris, nihil offen-
des. Porro uinū priusquam morbus concoquatur, ex toto cir-
cuncidendū est. simul atq; uero cōcoqui inceperit, tenue, aquo-
sum, modicum, primo die exhibendum. Cibi humeſtantes, refri-
gerantesq; utiliter assumuntur. A melle abstinendum, sinapi,
falsis & acris omnibus uinis autē admodum uultis, & na-
tura calidis Cæterum nihil miri est, si in hominibus primi exer-
citis, in ediamque, expertis, nunc autem ordine conuerso otio-
sis

sis ciboq; usis pleniore, bilis maxima ex parte mixta pituitæ reperiatur. Cuius rei gratia complutes tertianæ, aut citra rigorem fiunt: aut perexiguus ipsis oboritur, unde etiam animaduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neq; cibus aliquis liberalior tertianis spuris ante concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, oua, & consimilia.

Curatio tertianæ nothæ.

Cap. XXI.

L Auare in tertianis spuris per initia salubre non est, sed quando iam concoctionis notæ apparent, neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abunde est. Quies autem, & præcordiorum fatus ipsis conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atq; si sanguinem detrahare opus est, neque hoc omittere oportet. Tota uerò uictus ratio erit, non quæ refrigeret in totum, humectetq; uerum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maximè uerò conduxerit ipsis ptisanæ cremor pipere iniecto. uel hyssopum quoq; nonnunquam uel origanum, uel spica nardi, aquæ mulsæ admista, incocta q; potui exhiberi, & alia quæ urinæ ciendæ sunt, præterquàm ea, quæ nehementer calefaciunt, exiceantq; Potissimum uerò absinthium, post septimum diem porrigi debet. Iam & oxymel eporum, multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ moliter uentrem subducunt. Porro uomitus secundum cibum, is quibus hæc febris in uetustatem incidit, utilissimus est.

Quartanarum cognitio.

Cap. XXII.

Quartana inuadit multa cum perfrictione, ut quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem uerò feruoremq; febrilem tertianæ modo non obtinet, imò nec bilis uomitus eam comitatur. Adhæc si urinæ tennes, albæ, & aquosæ fuerint, quartana erit febris. Eximia uerò ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus, Cæterum in autumno potissimum incipit, erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur aliquando etiam plurium dierum interuallo, iuxta quosdam circuitus accessionem habet.

Curatio quartanarum.

Cap. XXIII.

Quartana laborans leniter tractandi sunt, neque medicamenro ullo forti sollicitandi, neque uacuatione, nisi

ne, nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, cum uenam diffecare conuenit. Victus eis offertur optimus, qui non inflat, & uenter his quibus uti consueuit, emolliri debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia quidem mollibus, deinde uerò acribus utendum est. A suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus, siccantq;. Vinum utile est tenue, album & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum per dies aliquot assumptum medicamentum diatrion pipereon, id est, quod triplici constat pipere, uel quod diospoliticon appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quotidie sumitur. In morbi statu uictus ægro tenuissimus præcipietur, statim uerò etiam ut diu conquiescat, iniungendū est, tum uisceribus prospiciendum per ea quæ emolliunt, relaxantq;. Insecutis diebus medicamenta conferunt, quæ urinam cient. atq; si concoctionis notæ apparuerint, cum fiducia tunc quoq; ijs uti expedit, quæ atros humores uacuant, idq; non semel duntaxat, uerum etiam sæpius. Porro secundum ualidam purgationem, & medicamentum quod uiperis constat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiare, omniū probatissimū, quod succum cyreniacum recipit.

*Quotidianæ agnitio.**Cap. XXIIII.*

Quotidiana haud quaquam cū rigore primo statim die inuadi sed procedēte tempore perfrictio magis quam rigor oritur. Aegre uerò incalescit, & diurnum habet incrementum: imò neq; adurit ægros, neq; multū, & crebro spirare compellit, neq; efflare, uel frigidam bibere. pituitosi autem uomitus hic accidunt, & quæ per aluum uacuantur, frigidiora, crudiora, aquosiora cernuntur: totum corpus crudis humoribus redundat: sudores minimè primis diebus erumpunt, neq; ad integritatem uenitur, cutis ægrotantibus albicat, urinae uel renues sunt & exalbida, uel crassa, turbida & rubra.

*Curatio quotidiana.**Cap. XXV.*

Quotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum ijs quæ urinā probe eliciunt, ac uniuersa uictus species incisoria esto, circa statum uerò uentri culi habēda est rō, præsertim ipsius orificij, deinde ægris iubēdū est, ut à radícula & cibis assumptis uomāt. Itidē urantur ijs quæ

PAULI AGIN.

f pitui-

pituitam subducunt, idque tamdiu quam febris cessauerit.

*De hepialo febris & rigore qui ægrè potest excale-
fieri.*

Cap. XXVI.

SI uitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, non-
dum putrefacta toto in corpore exundauerit, rigorem qui
ægrè excalefieri potest, sine febre excitat. In febribus enim
quæ humoris uitio accenduntur, putrefactio maximè febrilem
calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamen
rarò fit, ob immensam frigiditatem quotidianæ febris causa
redditur. Quando uerò non tota æqualiter, sed ex dimidio ip-
sius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes, nonnullæ uerò non
putruerint. Hepialum febrē hanc facit: in qua simul & rigent,
& febricitant. Particulæ quidem humoris eius necdum putre-
dinem expertæ, omnibus uenis, uel etiam reliquo corpori com-
municatæ & sparsæ, rigorem creant: putrefactæ uerò febrem ac-
cendunt. † Dicta est autem Hepialos per translationem à fa-
le: dico autem mari, quod tranquillum quidem apparet, in prin-
cipio autem difficile turbulentumque erat. Vel ab Hepios,
quod est molliter & alexinin, quod signat calefacere, quasi di-
cas, quoniam blande & leniter calefacit. Atque hæc febris cum
ex quotidianarum genere existat, utpote ex pituita nascens, il-
larum curationi subiicitur speciali, nisi quòd tanto commemo-
rata quotidiana calidioribus magisque incidentibus præsidij in-
digeret, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uerò
rigor multo magis calefacientia requirit. Itaque medicamen-
tum ex triplici confectum pipere, ex calaminthe præterea, &
quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item
ex castoreo, similibusque præparata remedia conueniunt. La-
tius autem diffusiusque explicatam curationem horum repe-
ries in capite quadragesimo quinto de rigore & perfriktione.
Insuper Lypyriæ & Tiphodes, quæque præter commemoratas
febres dicuntur cum sint ex relatarum numero, etiam curatio-
nes, tum in illis expostas, tum exponendas postulant.

† Locus hic multò rectius in libris manuscriptis quam im-
pressis, quos interpretes sequuntur, exaratus est. Sic enim legi-
tur in antiquis cod. λέγεται δὲ ἡπιάλος ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς
ἀλδός, λέγω δὲ θαλάσσης, ἡπίας μὲν φαινομένης, χαλεπῆς δὲ κατὰ
τὰς ταραχὰς αὐτῆς ὑπαρχούσης, non κατὰ τὰς ἀρχὰς. quibus
uerbis

uerbis significatur mare esse molestum & difficile cum turbulentum est & agitur.

De febribus continentibus. Cap. XXVII.

Continentes finitimæ sunt singulis intermittentibus: tertianæ quidem exacte ardens, quæ causos dicitur: quotidianæ, ea quæ singulis diebus accessionem habet, non autem ad integritatem desinit. Sic etiã quartanæ, ea quæ quarto die accedit. Exactus nanque causos: cum omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine uariat, quod non cum rigore inuadat, neque ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præse fert, quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ quarto quoque die accessionem habet, uerum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaque febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta. Quum autem ne declinatio quidem accedit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acumine ab ipsis uariat.

Agnitio febrium continuarum quas synochos greci uocant, & curatio. Cap. XXVIII.

Continuarum febrium, synochos greci appellant, origo ex sanguine est, nunc efferuescente, nunc putrefacto propter obstructionem. Qua propter accessio ipsis adusque finem una est. Indicia uero sunt, pulsus maximi uehementes, citati, crebri, æquabiles, non mordaces. Urinæ non multum adeo à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousque deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum ueniunt discrimen. At si quid per uenæ sectionem uacuare prohibuerit, alijs uti remedijs oportet, quæ meatus recludunt, copiam materiæ uacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum autem euidentes humorum concoctionis notas in ipsis uideris, neque in principe particula inflammatio quædam, aut tumor œdematis speciem repræsentans, aut scirrus fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut in hanc noxa procumbat, cum fiducia frigidam propinato: maximè si æger eius potioni assuenerit.

*Ardentium agnitio.**Cap. XXIX.*

Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua, aspera & nigra, uentris rosio, deiectiones pallidæ, sitis uehemens, uigiliæ nonnunquam etiam delirium.

*Ardentium curatio.**Cap. XXX.*

Horū alterutrum fieri necessarium est. si perfectè morbis solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extingui. Excernuntur itaq; per sudores, uomitiones, & imum uentre. Extinguuntur aut frigidæ potu: quo morientes febres, causas appellat, ex toto curamus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit: neq; mulsæ duntaxat, uerum aquosa mulsæ exhibitæ. Nā qui huiusmodi morbis confluantur, sola potione sustentandi sunt. Porro balneum illis solum usui est, qui citra tumorem inflātorium, aut erysipelatium, ardenti febre laborant. Quod si uerò concoctionis noctæ percipiantur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore, febrim ardentem conceperunt, his est inutile. Verum ipsidem prisanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

*Februm quibus ex affectu erysipelaceo origo est,**curatio & agnitio.**Cap. XXXI.*

Febres quæ ex Erysipelaceo uiscerū affectu procreantur, his notis agnosces. interna feruēt immodice, dolor urget uehemens, præterea sitis excruciat, & ardor immoderatus. Summatim ex indicijs accerrimæ bilis cum pauco sanguine putrescentis deprehendes. Hunc in modū curabitur. A balneo in totū abstinere decet. Aqua frigida per morbi statū uehementi, hoc est frigidissima utendū est: per initia nō itē. Extrinsecus uero refrigerantiā imponetur: & si nihil hæc promouerint, etiā intro eadē sumere ægri cogentur. Maximè ipsis conueniunt lactucæ, & quæ parē his facultatē obtinent à foris & ipse lactucæ succus idoneus est, adeoq; intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi uirtute prædita. sed præstātissimo parte plurima utimur. Nam liquorem refrigerantis alicuius expressum pilæ cū portulaca injicimus, deinde cōtusa exprimimus. cum usus exigit, modico polentæ mixto hæc in aqua frigida mersa, refrigeramus. Linteum uerò duplicatum in ea intinctū extrinsecus aut ubi calor sentitur, præcordijs obtendimus, non diu adherere sinentes, uerū aliud frigidum eius loco applicantes. Iā uerò

to & oleum omphacinum medicamini nonnunquā miscemus.

Hæticarum febrium agnitio. Cap. XXXII.

Hætica febris non in humoribus, & spiritu solū, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc absq; dolore consistit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare se existimant: neq; enim calorem percipiunt, cū uniuersæ ipsis particulæ æqualiter sint excalfactæ. Duplex hæticarum febrium species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit quæ prorogantur adeo ut tempore corporis ipsius cordis madore absumant, uel etiam multo adhuc permanente. Quæ uero manente etiamnum humiditate fiunt cordis corpus occupantes, inde potissimū accenduntur. Vnam sanè ipsius generationem prodidimus. Reliqua uero est cū statim ab initio inuadit, primam originē diarijs similem, ex mœrore, ita lassitudine maiore, una cum exustione in sole, sortita. Hæc igitur non difficulter cedit remedijs. Quæ uerò ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *μαρasmus* deuenit, omnem respuit curationem. Atque hæc sanè cognitu est facillima: oculi siquidem præter modum concaui eam testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, tum dispositio quædā squalida, uiuidi ipsorū coloris flos emarcuit, frons sicca est & intenta. Quinetiam conuiuent plurimū, hac occupati, quemadmodum dormituriens. uerū affectio, somnus non est, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt & quid. n. aliud præter ossa & cutē solam habent? Nam si denudatis ipsis uentrem inspexeris, neq; intestinū, neq; uiscus ullum superesse tibi uidebitur: præcordia sursum conuelluntur, & cutis ipsis extrema reficcata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurſu lāguida, paulopost acris & rodens erumpit. quousq; igitur humiditatis aliquid reliquū est, hætica solum febris dicitur. Cum uero periclitat̃, ne nihil amplius humoris superſit, absolutus iam marcor constituitur.

Hæticarum febrium curatio. Cap. XXXIII.

Hætica febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorum rodentium gratia. Maximum uerò remedium huius est, uictus humectans. Conuenit igitur quàm maxima prisanae cremoris halicæq; sorbitionibus, & pane præterea adiectio agrū nutritū, moderato frigida potu curare: si neq; inflammatio quædā, neq; humorū putrefactio subest, atq;

est, atsi magnam inde offensam fore coniecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem imposiris, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea uerò hoc morbo obnox iis, quolibet tempore sunt idonea.

De semitertianis.

Cap. XXXIIII.

QVandoquidem tertiana cū rigore, quotidiana uerò citra illū inuadit: quæ ambarū mistura cōstat, horrore inducit, qui minor quidē res est rigore, maior autem perfrictione. Quapropter cū horror equali ab utrisq; extremis interuallo, mediū amborū rigoris nimirū & frigoris occupet, quod cōtemperatis inuicē extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur uel enim duæ accessiones in idē tempus concurrūt, uel statim ab initio ambæ inuicē iunguntur. Qñ igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris ē non-nihil per accessionem assumit. Protinus aut talis calidior est & ardentior, tum vomitionē quandā bilis, aut deiectionem, aut madorē adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidē summa exercēt, pauci uerò horrores: neq; tñ sitis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua, insultus quidem accessionis cū horrore accidit. At cum ex pituita proueniēs febris præcelluerit, depressiones pulsuum sunt, & horrores. Si uerò calidior præualeat, subito ac una uice incalescunt. Talis sanē est exacta semitertiana, ex æquiuallente duarum febrium, puta tertianæ intermittētis & quotidianæ continuæ tēperatura proficiens. Non exquisita uerò uel bilem largiorem, uel pituitam causatur, quæ iam magis etiam curationi renititur, cum modicus humor à copiosioris dominio artisq; auxilio expedite uinci possit. Si enim pituita sit superior, præsidij maximē utemur quæ in quotidiana exposuimus: sin autem flauabilis, ijs quæ in tertiana comprehēsa sunt: In totum ei quod urget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

De morbis publicè grassantibus. Cap. XXXV.

PUBLICè grassantes cōmunesq; morbos nomināt, qui multis simul obueniunt, quorum ut generatio, sic etiā causa cōis est. Cibiq; igitur cōes prauī, illiusmodi morbos cōmunes pariunt: item aqua uitiata potio, exercitia immoderata,

rata, labores quibus quisq; assueuerat omitti, inedia, repletio, idq; dum fames grassatur, aut fecundus annonæ prouentus est. Item regionum naturæ, cōes subinde morbos intulerunt, quæ nonnunquā palustres sunt, aliquando barathrum habent uicinum, quod uaporem exitiosum prauumq; exhalet. Hæc quidē nō continuē accidere consueuerunt. Taer uerò nos ambiens, tēperamenta corporū cōmutat, uel calidior impendio, uel frigidior, uel humidior euadens, siquidē in alias causas neque oēs simul incidimus, neq; eis toto die immoramur. aer autem qm̄ omnibus circūfusus est, & per inspiratū attrahitur, ut animalium corpora, pro tēperamenti ipsius immutationibus simul afficiat, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex unoquoq; aeris statu futuros præfagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, cōtrarium immoderatis circūfui aeris temperaturis uictū accommodās. Itaq; corpora morbo alicui ex propria intemperie uicina, hæc à simili circūdātis nos aeris tēperamento deprehenduntur. Quæ cōtrariā cœlo temperiē obtinent, præterquā q̄ nullam offensam experiuntur, etiam meliora fiunt, dū repugnans aeris immoderatio temperamenti immoderationē punit, ac qui hoc nouit, secundam ualitudinē tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerātia scilicet, nunc calida: aqua quidem superinfusa refrigerans, itidem ocio, ciborum inedia, & potu largiore: calefaciens autē, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parciore. Præterea lignorum aceruatum constructorum incendio haud mediocriter aerem ad calidū & siccum mutaueris, si tūc humidus fuerit, quo modo Acronem agrigentinum fractitalle ferunt.

In antiquo codice hac aliquanto explanatiora sunt in eo enim hæc uerba ita leguntur. ὁ δ' ἐπερίχων ἡμᾶς ἀήρ, τρέπει τὰς κράτεις, ἢ τοι θερμότερος ἢ μέτρωσ, ἢ ψυχρότερος, ἢ ξηρότερος, ἢ ὑγρότερος γινόμενος: Id est, Aer qui nos circumstat uel calidior, uel frigidior, uel siccior uel humidior temperamēta immutat. Quam huius loci ueram esse scripturam uel ex ijs quæ de eadem re scribi Aetius intelligi potest.

De pestilentia ex commentarijs Rufi.

Cap. XXXVI.

Pestilentia grauiſſima omnia superueniunt: nihilque in hac sicut in alijs morbis singulis occultatum. Etenim

f 4

delirium

delirium accedit, & bilis uomitio, praecordiorum intentiones, labores, sudores largi, extrema algent, alui profluvia urgēt biliosa, tenuia, & flatulenta, urinæ cernuntur aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, mala habent subsidientia, suspensa pessima, nares destillāt, pectus ardet, lingua torrida est, siticulosa, remissa, torquent uigiliae, conuulsiones uiolentæ, aliaq; multa praua. † At si quis pestem uenturam praenoscet, ex malignorum anni temporum, & uitæ studiorum ad sanitatem haud conducentiū animaduersione, aliorumq; animalium praecedente interitu, his apud se consideratis, & illud praeterea perpedito cuiusmodi sit praesens anni tempus, qualisq; uniuersus annus. Inde si quidē qualis uictus ratio esse debeat, optimē deprehendes: utpote cum anni tempus, si quidem rectē ortum est, ex sicco humidū nunc euaserit necessum est uictus ratione desiccare, ut humor superfluous absumatur. item uentris quoque habenda est ratio. Quibus superior uentriculus pituitam continet, uomitionibus sollicitare: quibus autem sanguis inundauerit, secare uenā oportet. Iam per urinas purgatio, aliaq;, & totius, corporis, proficiunt. Quod si etiam aeger ardore aestuet, & flamma usq; ad pectus pertineat, haud abs te fuerit refrigeria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; non paulatim, nam magis hoc pacto incendit, uerum una uice ac semel, ut flammam extinguat. In quibus autem ardor interiora occupat, summa uero inalgescunt, cutis in superficie frigida percipitur, praecordia contrahuntur, uenter colliquata, partim supra, partim inferius transmittit, uigiliae urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrahatur, † ac si alio quopiam modo ab internis foras poterit elici. Iam uero & haec potio utiliter praesumitur. Aloës partes duæ guttae ammoniaci partes duæ, myrrhae pars una. Haec in uino odorato contrita instar dimidia fabae exhibentur. nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui hoc potu pestem non superauerit. Haec quidem Rufus memoriae prodidit. Galenus autem tradit ad pestilenciales putredines bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiam Theriacem ex uiperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Romam inter necino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interiisse scriptum reliquit.

†Simplicior

†Simplicior & meo quidē iudicio huius loci sensus uerior est in exemplaribus manu scriptis. Sic enim ea habent, σὺνείδοι δ' ἂν τις μέλλοντα ἔχειν τὸν λοιμὸν προσέχων ταῖς τεώραις, &c. id est, conijciet, autem quispiam futuram pestilentiam, si attentē consideret temporum &c.

†Quod est in impressis καὶ θωπεν, in manu scriptis magis explanatum est, ἐκ τῆ βάθους, id est, ex profundo.

De ijs qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. XXXVII.

Nonnulli, febricitate incipiunt, ubi magnam crudorum humorum copiam ore uentriculi simul offenso, congesterunt. His & præcordia inflātur, & os uentriculi uastiore mole, quā pro naturæ modo cernitur: adhæc color ipsis ab albidius, aquosiusq; magis est, mutatus. quibusdam ad nigrius. Nulli taliū sanguis mitti sine maximo dispendio solet, et si uacuationem desiderent. Verum nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, utpote quos etiam sine his syncope subito adoriatur. Ratio igitur medēdi talibus est, quā frictione molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac primum à superiore crurum parte deorsum, idq; linteis nō admodū mollibus, sed modicè asperis. Deinde tota brachia ab humeris usq; , & superiore parte deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi uero artus omnes abundè calidi uidentur: & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante uteris, ab astringētibus autem abstinebis. per hyemem uero etiam digerētium usus erit, quod genus est ficionium, & chamæmelinum. Cum iam artus plurimum perfricueris, postea oleum detergetur, inde ad spinam dorsi transitus est: hæc q; tota perfricabitur similiter, ab hac rursus ad crura te conferes: & hinc ad brachia exinde rursus ad spinam. ita toto die facies. Porro mulsa, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima, cauendumq; ne uel cibum, uel sorbitionem, uel aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tribus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas dixi partes ordine perfricans. Sin autem robore mediocri sit, & alius sua sponte commodè non deijciat, cum fiducia aliquid ab inferioribus partibus infundes. Quod si maior iusto recrementorum impetus ad aluum citetur: principio quidem percoquere

coquere mulsam amplius oportebit: minus enim ea subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidē sistēda, alius sed exhibendus pro aqua mulsā ptisanā cremor est. Si uero fluere pergāt, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsu uires collapsas ob imbecillitatē didicerimus, panem ex uino diluto exhibere conueniet: utiq; si nec uenter nec iecur inflammatione laboret quando si hac infestentur iam corpore crudis succis referto, nulla planē medicina periculo subtrahit. Sin autē quandoq; crassi abundē humores deprehendātur, oxymeli pro mulsā continuē exhibebitur. Ergo si aestas sit, & aeger calidi tēperamenti frigidāq; potioni asuetus, frigidum huic oxymeli dabis, sin hyems sit, calidum omnibus. Sanē balneum his est aduersissimū. Porro ijs quos syncope iam premit, si partes modo commemoratā inflammatione uacent, panis exhibebitur modicus, isq; ex uino quod celerem in corpus digestionē adiuuet, statimq; ad frictionem ueniundum est, quā pro tradito quoq; iam modo administrabitur, uerum quibus ex flaua bili, quā os uentriculi, infestet, syncope incidit, is frigida offerenda potio est uinum tamen tenue, fuluum & uetus.

De his qui ob prætenuēs humores syncope opprimuntur. Cap. XXXVIII.

Qui tenuium humorum uitio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notā illis contrariā testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continuē. Porro ad exitium spectare existimandi sunt, si uel iecur ipsorum, uel uētriculum inflammatio obsedit, uiribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sanē nutrire est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quā priorum rarefacere, & frigidum ipsis aerem accersire. Vngendi sunt præterea astrictorijs unguentis. tum cibi ijs dandi, qui non admodum promptē diffuant, non aqua mulsā, non ptisanā cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fructus austeri, qui non faciliē corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane. Vinum ijs aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum.

De

De reliquis occasionibus, quibus syncope succedunt. Cap. XXXIX.

Reliquæ occasione, quæ syncopas concitant, quatuor sunt numero: dolor uehemens, uigiliæ, immodica inani-
nitio, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si placet, addas, nempe principiorum intem-
periem. Celerrimè igitur cor affectum in perniciem præcipi-
tatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

De dolore. Cap. XL.

Itaque dolor stupidus ex frigida oritur affectione. Pulsati-
lis autem dolor magnæ inflammationi peculiaris est. Sin-
autè tanquā à palo impacto, aut ueluti a terebro forari pu-
tes, crassi intestini species doloris est. Punctorius autem, circa
mēbranas cōstituitur. Pertundens uehemētissimis nō hetero-
cranijs solū, sed cephalæis quoq; accidit. Est autè pertundens
dolor, cum à parte primario affecta, ceu à radice subito in ui-
cinas perfertur. Porro distendentes utrinq; neruorum dolores
sunt, cum & laborāt, & ad utraq; extrema tēdūtur. minimè ue-
rò in latitudinē porrectos nerui dolores percipiūt. at tenuos,
stupefacientesq; dolores mēbrana quidē sub cute porrecta in-
ducit, quæ uerò inter carnē hærescit, tanquā diuellētes crucia-
tus excitat. multæ si quidē existunt inæqualiterq; inhærescūt,
& ipsam carnē amplectūtur. Mēbranarū uero quæ ossibus cir-
cūdantur, profundi sunt, ipforumq; ossium tanquā dolentium
imaginē repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus dolo-
ris occasio fieri apparet, præcedēs uictus ratio uenit inspiciēda,
fuerit ne præter cōsuetudinē otiosa, aut cibus homo usus sit lar-
gioribus, ijsq; ex ualēti materia, uel solita excretio sit retenta.
Nā si ex aliquod, uel oīa quoq; appareāt, doloris causa est re-
pletio: ac quā citissimè homo uacuari debet. Sic. n. licebit tibi
maxima cū securitate ijs uti remediis, quæ fluxiones dolenti-
bus particulis incūbentes repellāt. Si igitur sanguinis sit copia,
quod distēdit, ueluti in inflāmatione oriri solet, protinus si ui-
res patiūtur, sanguis dimittēdus est, per magnā uenā patientē
particulæ propinquā. Vbi autè uitiosus humor dūtaxat affligit,
purgandus est. Si utraq; coeant, ambabus utere uacuationibus,
sanguine prius emissio. Quod si his peractis dolor etiam re-
manet, constat profecto in ægrotante particula impactū esse,
quod

quod afficit. Patet uerò curationem ipsam per digerētia quoque medicamenta esse moliendam. Pari ratione, & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: auxiliātes simul in his potius tum extenuantibus cibis, tum per sedē iniectionibus, item cataplasmatibus irrorationibus atq; fomētis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles grauando, contundendūe dolorem excitet, moli eidem est mēdendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & uiride sicco magis.

Ad syntexes, hoc est corporis colliquamenta. Cap. XLI.

QUum per uentrem aliquid non ex esculentis, poculentisq; uerum ex ipsius corporis substantia excernitur, humore in aluum ipsam cōfluente: qui quidem flauæ bili continuē per uomitum, & infra erumpenti cōsimilis est, odoris autem foeditate ab ipsa differt, tum q̄ deiectus rufus magis, & crassitie glutinosus, interim uerò oleosus appareat, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nō nihil etiam ex ipsis solidis partibus absimitur. In hac perniciosissima febre frigida potio utilis est, quæ ex fonte frigidissima petitur. Huiusmodi quoq; esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci, & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes, rectē offeruntur.

De uigijs in febris. Cap. XLII.

AT uero eorum, qui immodicis torquentur uigijs, crura & brachia uincire. † quo tēpore somnū captare solēt, iubemus, & excitari. nonnunquam palpebras aperire, si conuiueant cōpellimus, donec abundē fatigentur. Inde subito uincula soluimus, lucernamq; tollimus, & altā esse quietē iniungimus. si nihilominus uigiliae pertinaciter urgēt, ubi accessio remiserit, frōs nigri papaueris capitū decocto illuitur, naribusq; offert papaueris albi cortex torrefactus detritusq;, & mādragoræ radicis leuigatæ tantundem cum uino, & rosaceo maglagmatis forma fronti applicetur, serpillōq; cum meliloto in passo decocto. Hoc etiā in accessionibus est utēdū, uel trita papaueris capita excipiētes pane cū rosaceo, uel eiusdē cerato illinimus.

minimus. Cibus quodammodo sit magis accuratus. Adijciatur autem forbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. † Oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint uirida, quantum tribus digitis potest comprehendi: sin minus, tria quatuorve papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinetur. Iam linctus ex papaueris capitibus compositus, & præsertim ex sapa, mensura cochlearij, uel unius, uel dimidij potus, somnum frequenter accersuit. In quibus autem caput non facile humoribus repletur, & uigiliæ infestant, utere in declinationibus etiam tali suffitu. folij amomi, costi, arnabo singulorum uncia: carpobalsami drachma, styracis, amomi, ammoniaci, bdellij scythici, mandragoræ radicis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

† Hæc uerba sic leguntur in uteri codice, ὑπερβαλλόντων δὲ ἀγρυπνούντων, σκέλη καὶ χεῖρας δεσμεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ καὶ ὅν ἐπὶ τῶν ὑπὸνείωθαι ἐρέπεσθαι κελεύομεν καὶ ἐγρηγορεῖναι διόκειν τε πολλὰς μῦσαι ἀναγκάζομεν τὰ βλέφαρα, id est, eorum uerò qui multis uigilijs torquentur, crura & brachia iubemus, quo tempore somnum capere solent, ligari, & excitari, palpebrasque sæpe aperire & claudere cogimus donec, &c. Qui sensus magis concinnus est.

† Id sic legit in antiq lib. τοῖς δὲ λαχάνοις συνεκείσθω μήκωνος μελάνης, simul coquatur & ferueat cū oleribus pauperis nigri.

Curatio soporis noxij, qui cataphora Græcis dicitur. Cap. XLIII.

Frons posca lactis modo repenti abstergitur, & summa ualide ligamentis excipiuntur. naribus admouentur quæ incisoriam facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ ualenter dorso, & spinæ defiguntur. Si uero morbus his non cedit remediis, etiam quæ sternutamēta excitant obiciuntur. Ciborum materia sit sit, quæ incidat, diuidatq; ueluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febris. Cap. XLIII.

† **S**I capitis dolor in febris affligit, post conuenientem febrium uacuationē in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo,

rosaceo, cui etiam aceti pauxillum sit admixtum: si aestas sit, & febris ardens, frigidus: sin hyems, neque febris ardens, calidus, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygonij-
que succus, per aestatem etiam papaueris capita uel ipsum papauer: quemadmodum hyeme peucedani momētum. Quod si uerò dolor in fronte perseveret, sinciputq; pilis car eat, hoc quoque obducendum est ueteri polenta, & polygonio, uel pane similiter & rosis, uel modica myrto, uel serpillio. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum igneus sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, uel ipsum per se inuisum coctione redactum, & continuè mut-
tum. Item coriandrum similiter cum polenta, & aloe cū ace-
to illinitur, myrrhaq; & ammoniacū pari modo, necnon cro-
comagma. Pulsatiles autē dolores ruta, mentaq; cum panem
diffiat, rosaceo quoq; superaddito. Atqui si dolor commemo-
ratis auxilijs non eliditur, primum caput ad cutem attondere
oportet, deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foue-
ri, mox cucurbitulae occipitio agglutinari, & summæ partes de-
ligari debent, permulceriq;. Iam uerò hirudines recte affigun-
tur. Cæterum si defluxio quædam à capite, uel grauedo oborta
capitis dolorem suscitauerit, ijs utendum est auxilijs, quæ ad-
uersus hæc suo loco perscribentur Sin autem à stomachi regio-
nibus uapores sursum tendentes caput offenderint, etiam ho-
rum ratio habenda est, ueluti præceptum à nobis est.

† Vera scriptura huius loci est, μετὰ τὴν προσήκυσαν τῶν
περιττῶν κένωσιν, id est, post, conuenientem excremento-
rum uacuationem, facilis enim fuit librarii lapsus.

Quomodo stomachi curam habere conueniat.

Cap.

XLV.

SI stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus obline-
tur, quod genus palmulae sunt, uinum, polenta, crocus, ma-
stiche, & aloe. aspergiq; debet oleis ex absinthio, melino,
mastichino, nardino, & uino. At si ardorem experiatur, miscen-
dum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitae succus, lactu-
cae, portulacae, solani, sereos, † & uuae immaturae. Sin autem in-
flammatorium quiddam in uisceribus appareat, etiam relaxan-
tia quaedam adiungenda sunt: asperfusionibus, oleum chamæme-
linum, cyprinum, adipēs gallinae, aut anseris, bdellium, uel am-
moniacum,

noniacum, & similia. cataplasmatibus autem, apii semen, fœnugræcum, althææ, chamæmelorum flos, & ut uno uerbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium, amarāque, tum astringentem.

† Hic locus integer est in ueteri exemplari: sic enim descriptus est, οἱ ἐν κολοκύνθῃς τε τὸν χυλὸν, καὶ θριδάκινῃς, καὶ τῆς ἀνδράκινῃς, καὶ τῆς τρήχινῃς, καὶ τῆς σέρεος, καὶ τῆς ὀμφακός, οὗτος μὲν γὰρ οὐ φύχει μόνοι, ἀλλὰ καὶ τύφει, idest, ut succus cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani, sereos, & uuæ immaturæ. Hic enim non solum refrigerat, sed etiam adstringit

De immodica perfrictione in febribus, & rigore.

Cap.

XLVI.

Rigori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere non oportet: nec concertationem naturæ dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, promptè remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut perfrictione (ex frigidiorē uero, copiosaq; maxime pituita nascitur) primum quidam artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino, aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiā piper oleo admiscebis, uel cachry, uel adarcen, uel castoreum. molliterq; totum corpus infricabis. Porro ne faciliè oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hęc rigor non possit excalferi, ualentioribus quoque ex his factis acopis, necnon dropacibus, & sinapismis uti consilium est, aliāque fomenta ritè admolari. Item acriora ex iis quæ admouentur naribus, commodè faciunt, calaminthe, pulegium, & hyssopum. Potui dabitur ante accessionem mulsā, in qua piper, & ruta sit incocta, adhæc liquoris cyrenaici cocto melle formati instar milii duabus horis ante accessionem præstabis. Similiter & liquoris silphi. Adhæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico componitur, multis fuit auxilio. Iam uerò in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferunt, ut Archigenes memoriæ prodidit. Galenus autem ante accessionem, cutem abrotano infricandam præcipit, uel calamintha arida, uel cunile tum foliis, tum floribus, uel costo, uel pyrethro. utroque horum cum oleo

oleo. unde fiet, ut uel nequaquam, uel certè minus rigeant.

De sudoribus.

Cap. XLVII.

Sudores, in crisi erumpentes excipere oportet, quandiu satis uacuatum fuerit, adiutareque calore mediocri, & quiete, adeò ut neque abstergantur, quoniam alius quoque alium elicit. item calido clystere in aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in remissionibus morborum apparentes idem quod in crisi provenientes, administrum capient. Itaque præsidia quibus sudores euocantur, libro superiore, capite quadragesimo octauo abundè sunt comprehensa. Cum uerò sudores largius eruperint, tunc abstergendo, leuandoque operaimenta recreare conuenit. Etenim lassant, supra modum excident, ut in syncopen frequenter ægros perduxerint. Tenui uelamine madidoque debent esse contacti, perflatus aeris frigidior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio. In super myrtus nigra in pollinem coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, piceæ cortex, electrum, & polenta cum uino astringente, particulis sudores recipientibus imponantur, faciesque posca per spongiam aspergatur. Archigenes etiam calcem non restinctam, & floces uini combustas, tum in his, tum in rigore, quem nullus euincit calor, assumit. Ambæ siquidem inquit, recalescentes, siccantur. Media uerò corporis loca delinenda succo plantaginis, uel coriandri, uel portulacæ, uel brassicæ præcipit, ut undique concretæ, sudores reprimant. † Per somnum uerò creta cimolia aqua dissoluta, dorso, & thoraci subiecta proficit. Totum uerò corpus rosaceo perungitur, uel melino, uel myrteo, uel lentiscino, uel ceratis quæ ex his confiunt. Nam magis sunt his idoneæ reunctiones, quæ latentes meatus obstruendo, humidi exitum prohibeant. Patet autem omnibus, quòd cibus quoque sicciior his conuenit, & uina mediocriter astringentia. Cæterum largiore potu, & præsertim humidior, tum crebris per aluum iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agitandum, in frigidioris aeris statu, & summæ his partes potissimum refrigerentur. Qui per ualidam expressionem sudores fiunt, (hi autem uel ob dolores excitantur, uel conuulsiones) facile curantur, † si extrema deligentur, calfiant, & per laneos panniculos reficiantur.

† Scri-

† Scriptura quæ in ueteri exemplari multò melior & synce-
rior est. Sic enim habet. ἐν δὲ τοῖς ὑπνοῖς κίμωνας ὑδατι διαλυ-
θεῖον πικνόμενα ῥάκη ὑποβάλλεται μεταφρένω, καὶ θασακί.
Id est, panni pinguefacti cimolia dissoluta aqua subiiciuntur
dorso & thoraci. librarius enim indoctus ex ῥάκη, fecit θρά καὶ.

† Concinnior sensus est in ueteri codice. ita enim in eo scri-
ptū est. καὶ θάλλει τῶν ἀκρῶν καὶ ἀποφύξει διὰ ῥακιδίων ἀραιῶν
κίφας θρασπεύειν, id est, leuiter curare oportet extremorum
deligatione fotuque ac exiccatione per pannos raros.

De tussi in febris.

Cap. XLVIII.

T Vssi in febris, præsertim cum rigore obuenientibus,
occurrere conuenit. Nam tussis intentione, febris quæ
inclinabat uires resumit, ac redintegratur. Aduersus hanc
formulæ medicamenti ex melle cocto coactoque, hypoglottia
uocant, offeruntur. Linguae autem supposita, unde nomen
habent, eliquescent: & quod spirandi impedit facilitatem, di-
scutiunt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio
quod paulum accessionem præcedit. datur etiam hydromeli
discoctum. Quibus autem de neruoso genere metus non est,
temporis processu exhibebis cum fiducia & oxymeli. sin minus
hyssopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Itē casto-
reum cum febris ardens non est, neruoso quoque generi cōfert.
Adhæc linctus ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine, li-
ni, amygdalis amaris, & urticæ semine plurima uero ex parte
cibis quoque; hæc simul adiungentur. Ac resina quoque terebin-
thina in ouo exhibetur. Extrinsecus aut thoraci, & locis arte-
riæ uicinis, lana sulfure imbuta imponatur, ac pingue, oleum ve-
rutaceum esto, uel irinum, uel anethinum. Præterea deligatu-
ra ualida in longum porrecta, tussim exactè cohibet: dico au-
tem per medias partes extremasque. Non ratione caret, & uua
syluestri quæ staphis agria dicitur, tussis gratia uti, simul cum
domestica, aut cum mastiche mansa. summa debent infricari,
permulceri, & ligaturis intercipi deinde rursus soluenda est in
contrarium retractio. At si propter febris acrimoniam tussis
concitatur, utendum est gargarizationibus ex aqua tepida,
necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum de-
cocto, uel rosarum, uel dulcis radiculae. Visceribus autem, uel
etiam cordi ipsi injiciuntur quæ modice refrigerant.

PAULI AEGIN.

g De

*De sternutamento .**Cap. XLIX.*

Sternutamenta febribus sæpe incidentia , molestant . Etenim caput replent, & uirtutem arguunt . Nonnullis sanguinem quoq; eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda . Quare aduersus ipsa remedijs pugnandum est . Cohibet itaque sternutamentum irruens, nali, frontis & oculorum perfricatio, item oscitatio, studiosa palati, frictio, ructus, ilium intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summarum partium mollis contrectatio, maxillæ musculorū perunctio, calentis olei in aures infusio, puluinem calidum mento subiectum . Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis. Mentæ autem malorum, & polentæ odor conducit. obtundit enim sternutamenti elisum: Idem spongiæ ex mari uacua efficiunt. Vbi uerò cupiditas sternutandi oborta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies accommodetur, & continue acriorum odorum experientia, & mentis remissio.

*De cibi fastidio .**Cap. L.*

Quibus uitiosi humores fastidium procrearint, iis illa & esculenta & proculeta dare conuenit, quæ huiusmodi succos uel abstergendo per uomitiones, seu per aluum excernere soleant, uel attéperando, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, qui totius operis optimus est, cōprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibum respuant, quoniā omnis facultas ex particularum intemperie infirmatur: conuenit in ter peramenti speciem, contrarijs medicari. Plura de fastidio, in stomachi uitij libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autē, statim per initia cibi cupiditas, ijs quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum uerò polenta in aquā mersa, uel posca, uel diluta uini potione . Aut cuiusdā odorati pomi, & astringentis decocto, item perunctione odore grata, & moderata totius corporis frictione, ac blanda contrectatione tum faciei collutione, aquæ sorbitione modicæ. Iam stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendū quodammodo conuertitur, præsertim, ubi biliosum quid aut acidum sursum eiecerit. Secundū primos dies, † cataplasmatibus quoq; à foris stomachus ad cibum sollicitetur, ex palmulis, malis cotoneis, œnanthæ, absinthio & aloe cōfectis .

Cibi

Cibi autem præparentur plures simplicesque, & frumentacei : qui alterius quoque generis uarietatem quandam habeant non tamē ab ijs multum recedant, qui in febr. bus dātur, in quibus & poma conueniunt, quæ non ex facili aceſcunt, neque nimium dulcia ſunt, ſed matura, neque ad ſatietatem exhibenda, uerum ſolum quod ad aliorum ciborū cupiditatem excitandam ſufficit. Præſto autem ſint ægris dum alentur familiariffimi, qui tum corripere eos, tum inhortari queant. Porro febribus ſolutis, ſi in uitium recreatione perduret ſaſtidium, etiam ſiſarū cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, ſaſamentum, bulbi, & quicquid ad bonitatem ſtomachi facit, accommodetur. Necnon & illud ipſum in memoriam reducatur quibus cibis per ſanitatē maximē uſi ſint. itē ambulationes, geſtationes, uociferationes, dropaciſini, frictiones & exercitia adhibeantur. Præterea abſinthii ſucci potio, uel aloes, acetiꝑ, ſcilitis inſtar myſtri abſorbſtum, in id uehementer efficax eſt.

† Simplicior ſcriptura eſt, καὶ κατὰ πλάσματος ἐφωθεν ὁ ἀόμαχος ἰαρεῖν δῶ, id eſt, cataplaſmatis à foris ſtomachus curetur. Nam quod eſt in exemplari typis expreſſio ἐπετρεφέν δῶ omnino deprauatum eſt.

De grandi fame. quæ græcis bulimos dicitur. Cap. LI.

SI uerò in grandem famem, quam bulimon appellant Græci (dico autē cum minus quàm par eſt, cibos corpora ſentiunt) ſaſtidium deuenerit, hiſce reficiemus, tum aliis, quæ naribus admouentur, tum ſuillis carnibus aſſis, & hædinis. In ſumma omni bus, quæ nidoſum odorem repræſentant: ſæuitia ſane febrium præterita, extremæ partes deligari. ipſiꝑ; excitari debent, maxillas pungendo, & crines, uel auriculas uellendo, recollectis autē, panis ex diluta uini potione, uel aliud quippiam diſtribui facile exhibetur.

De canino appetitu.

Cap. LII.

ET ſi hoc ſymptoma febribus non adeo ſuperueniat, ſed nonnunquàm ſecundum ipſas, attamen gratia cognationis, quam cum ſaſtidio habet, nil fuerit mali, etiam de ſimmodico appetitu, quum ambo naturæ modum excedant, ſermonem inſtituere. Quoniam igitur à pituita potiffimum

acida constituitur affectus, iis utendum est, quæ hanc incidant, abstergeantque. Talia autem sunt maximè, dulcia, falsa, † & alioquin derergentia calida. Vinum igitur ipsis recte datur copiosum, ex eorum numero, quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habentur colore fulua aut rubra, astrictionis expertia. Verùm dulciora potius propinantur, etiam non sitientibus. At cum ad prandium uenerint, primùm ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerum, aut astringens sit adiectum, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste non pugnent, attramen impotentem ad cibos animi impetum dissolunt. Inedia uerò spissitudinem pituitæ stomacho inhaerentis absumit, minuitque. Iam falsamenta ipsis commodè exhibentur, ab his uina commemorata liberaliter assumpta prosunt: quod ubi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

† Codex manu scriptus habet, καὶ ἄλλως τμητικὰ θερμαίνοντα. id est, & alioquin incidentia calida. qui sensus huic loco conuenit, quanquam σμηκτικὰ etiam recte legi potest.

De siti.

Cap. LIII

Sitim admodum longam fieri existimabis, ex siccitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in uentrem deferitur, & siccitatis quidè remediū est somnus, caliditatis autem uigiliæ. Nonnulli uerò sitibundi ex uino, ciborumque caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem potiones appetunt, quemadmodum & cibos, præpollenti in eis humorum uitio respondentes. Cæterum siti pressos inextinguibili quandoque uidimus, ex quorū numero etiam mortem oppetierunt, tum qui uiperas dipsadas deuorant, tū qui uino ueteri sese inebriant. adhæc qui in nauigio ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi fuerunt. Verùm sitim in febribus placare solet, aspersio ex oleo frigidissimo, uel rosaceo cum impetu salientis modo super caput deturbata. Optime facit ad sitim nigræ lactucæ semen commanducatū. item glycyrriza appellata, adhæc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor: tragacanthum soluitur ouorū crudorum recentium albumine. & cum fuerit dissolutum contritumque, cucumeris semini prius leuigato adiungitur.

tur. Postquàm emollieris, pilulæ formantur, in umbraq; siccantur, ex his una sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim saliuâ solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorû, uel pirorum, uel mespilorum, uel pampinorum uitis, uel mali granati succus sorbitioni datur.

De lingua scabritie. Cap. LIIII.

Humectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris ut in ore teneant dato: melius autē facit myxion cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluatur, uel spōgia undiquaq; abstergitur, deinde rosaceo illinitur. iam ipsum rosaceum melle cōtemperatum, in id ualde efficax est. & portulacæ succus in ore retentus. item rhu obsoniorum mulsæ admixtum bene facit. insuper Damascena, & myscii (hoc autem est myxa) ossa ore retenta & linguæ circumdata. His adde etiam lactucæ cauliculum Archigenes autem tradit etiam salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem melleum, lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinē deuoratum, uehementer posse humectare. Cæterum in latus decumbere p̄tdest, nam supinus cubitus exiccat. item os conuigere. hiatus enim madorem absūmit. Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

De nausea. Cap. LV.

Cum sine cibo assumpto nauseabundus æger efficitur, cuius licet, arbitror, ratiocinari prauos humores uentriculum infestare. Nonnulli uerò turbantur, sed nihil euomūt, humore ipsis tunicis imbibito. Pituitosos itaq; succos concoquere oportet, seruādo ægrū in quiete, inedia, & somno. tenuiores autē uomitus eiicit, qui nōnunquā ex ptisanæ cremore, uel mulsâ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuatā desiderāt, quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autē praua in tunicis absorpta, picra ex aloë utilis est, uerum quæ astringūt, haud mediocrē noxā cōciliant, quēadmodū rursus, cum humiditas multa citra malitiā inest, astringentia quidem quā utilissima sunt: medicamentū uerò ex aloë in marcorem perducit. Cū uerò frigiditas humori adest. astringentibus misceri etiam debēt calefaciētia. Nota est frigidi affectus, quod neq; sitim, neq; ardorem eo detenti experiantur.

† Hic locus sic legitur in ueteri, ὅταν χωρὶς τῆ προσενεχθῆ-
ναι τὴν ἐμετικὴν ναυτικῶς ἢ ὁ κάμνων γίνηται, id est, cum æger si-
ne assumptione eorum, quæ uomitum mouent, nauseabundus
fuerit. Quæ scriptura clarior est.

De bilis uomitione.

Cap. LV I.

Bilem uomentibus cataplasma applicandum ex est pal-
mulis, malicorio, galla, uino incoctis, uel posca, pane si-
mul contrito. Item acacia, hypocystis, balaustium & rhu
cataplasmati adiungantur. Præter hæc cucurbitula admota ma-
gnificè auxiliatur, cum largiore flamma. Cibum uero frequen-
ter paulatim dabimus. † In his autem qui atram bilem uo-
munt, & inflationes stomachi experiuntur, spongas aceto quâ
acerrimo calente madidas imponito, uel hederæ folia uino in-
cocta applicato

† Vetus codex hanc scripturnam habet, ἐπὶ δὲ τῶν χολὴν μέ-
λαιαν ἐμούντων καὶ φυσωμένων τὸν στόμαχον καὶ τὰ ἔντερα καὶ
τὴν κοιλίαν, i. in his autem qui atrâ bilē uomūt, & inflationes
stomachi, intestinorum & uentris experiuntur spongas, &c.

De singultibus.

Cap. LV II.

Singultus oritur uel ex repletione, uel inanitione, uel suc-
cis acrioribus stomachū erodentibus, quibus per uomitio-
nē redditis, cessat. Pleriq; uero medicamentū diatrion pe-
pereon assumentes, si statim uinū superbiberint, singultiunt. Quod
autē nonnulli etiā cibo intus corrupto singultu infestentur, cui-
libet notū est, iam nō pauci rigore correpti, singultiunt. Vo-
mitū itaq; ijs qui ex repletione, aut rosione stomachi singultu
cruciantur mederi abundè comperimus, calida uero, ijs qui ob
perfrictionē. At quum ab humorū repletione singultus origi-
nem habuerit, uiolenta indiget euacuatione, quam sternuta-
mentum præstat, ob inanitionē uero creatos singultus sternū-
ratio nō finit, datur autem singultientibus ruta cum uino, uel
nitrum in mulsâ, uel sesili, uel daucum, uel cymīnū, uel gingi-
ber, uel calamintha, uel nardus gallica. Hæc sanè singultus ex
ciborū corruptione, aut frigore, aut repletione cōtracti, auxilia
sunt. qui autē ex frigidorum uiscosorumq; humorum copia sin-
gultum experiuntur, castoreū tribus obolis potui sument ex po-
sca, idem cuti impositū una cum oleo ueteri sicyonio adiuuat.

Insuper

Insuper acetum scillites, uel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, præsens est remedium.

De aluo in febribus astricta, & cita.

Cap. LVIII.

QUæ crescentem aluum proritant, libro priore quantum res exegerit comprehendimus. quoniam uero eadem quoq; liquida febribus incidit, in præsentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem præcipitanti sunt. Principio igitur excipiemus quæ egeruntur, nullo remedio occurrentes ut quæ à corruptione & cruditate emanent. Sin autem uacuatio modum excedat, cohibenda aluus est, & si quidē acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris cōuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & ptisana sorbitiones. balnea his post morbi concoctionem sunt idonea. Cum uerò pituitosiore & fluida erumpunt, contra sicciores calidioresq; cibi erunt, quatenus febres permittāt. Huius generis habentur, quæ ex cōdimentis calidis confiunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud cōpulerit. Porro ubi cōcoctrix facultas infirmatur, astringentibus tū cibis, tū remediis utendū est: cibis sanè, in quibus maximè malum granatum, aut mala cydonea, aut pira, aut mespila sint iniecta, uel etiam hii pſis, & uino tenui odorato astringente: remedijs autē cataplasmatibus, nimirū ex polenta, palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & cōsimili materia. Cæterum considerandū uenit, quibus potissimū particulis cataplasmata debeāt imponi. dico autem stomacho, aut imo uentri: nonnūquam & circa lumbos applicamus. Cruentitas autē excretiones reprimunt ex thure cōfecta, desiccantq;, uel subtilior portio polentæ cū thure, uel manna uino macerata, uel posca. Porro acriorē humiditatem etiā iniectione per aluum, edulcare cōpetit, nunc ipsa aqua, nunc ptisanæ cremore, uel chondri, uel oryzæ, uel tragi, idq; nō semel uerū sæpius. Postea uerò adiungentur etiam rosæ siccæ, uel myrti. nonnūquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo uinoq; tenui astringenti, uel rosarum decocto inditum uel sedi quoq; subiectum excernenti cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus. Agathium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immitatur.

*De sanguinis distillatione, & eiusdem ex naribus
profluio. Cap. LIX.*

Quoniam sanguinis distillatio totius corporis, aut capitis redundantiam innuit, per contusionem, uel densitatem eueniens: largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam, ratioq; est inde ipsam moliri, unde natura proclinauerit, his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus thyphæ, ut mos est, narium uasa conuulnerare: oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Spontanea uerò in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi fiant, excipere cōuenit. sin autem sanguis inmodicè erumpat, sistere conandum est. Primū itaq; extremæ partes ualidè deligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Videtur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere, æger non expurget narium foramina, neq; locum irriter, uerū sanguinē concrefcere sinat. nasus spongia, quæ in posca maduerit, refrigerat, ac obturamen ex panniculo naribus profluentibus demittatur, medicamento quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam curationem inter remedia unicuiq; loco affecto conuenientia libro subsequēti uerbosius persequemur.

Si anima deficiat. Cap. LX.

Qui ex cholera, alui profluio, aliisq; multis, & uniuersim factis uacuationibus, resoluuntur, ijs aqua frigida aspergitur, & nares cōprehenduntur, os uentriculi infricatur, uomitus præcipitur, stomaachus turbat, uel digitis immis, uel pinnis. præterea pluribus uinculis ualidè deligari debent. Cū per imas particulas uacuationes fiunt, brachia: cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospicienda est & figura sine dolore sursum uergens, & cucurbitula defigetur, quæ ad particulas retrahat situ contrarias uacuationem experiūtibus. Curat etiam uinum aqua temperatum resolutiones ex subitis uacuationibus ortas, nisi uiscerum inflammatio, aut uehemens capitis dolor, aut mentem turbans aliquis affectus, aut febris ardens, in cruro morbo prohibeat: in his siquidem magna uinum adfert incommoda. Et si æstus fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigida assueuerit, frigidum uinum

uinum exhibebitur. sin contraria euenerint, calidum. At si ex sudoris copia anima deficiunt, cutis densanda est, quemadmodum à nobis prius est dictum. Tum ut frigidus aeris perflatus accedat, prospiciendum est. Porro in uentriculum defluxionibus nihil horum conuenit, præterquã ipsi uentriculo stomachoq; corroborantia admouere, & affectos in balneum ducere. Hoc siquidem illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, uerum sanguinis profluuia, & sudores uehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, uino ciboque abstinebunt, item balneis, si febricitent. Potio autem mulsæ datur, in qua uel thymus, uel origanum, uel pulegium uel hyssopum sit incoctum. Propitium uero iis est & oxymeli. At si propter humores uitiosos in stomacho contentos anima defecerit, iubendi sunt uomere ab hydrelæo, digitis aut pinnis in os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleum quam laudatissimum ipsis propinabitur. hoc enim & aluo ex inferioribus partibus infusum, subinde uacuat. Iam uero absinthium ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti antea in capite de eodem comprehensum est, summaque perfricare oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur: qui perfrixerunt, medicamen diatrion pipereon, ipsumq; piper assumant. Qui uero ob caliditatem largiorem, æstumue, aut lentã in balneo moram animo deficiunt, curantur frigida aspersa, & si ad uentum conuertas, stomachi frictione, uini cibiq; usu. Sin autem propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit perfrigescantq; artus fricare ualenter iubeto calefacere & deligare. Adhæc uigilias in ediamq; præcipito. Ea uerò & ante accessionem faciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusue horis ante accessionem, cibus offeretur, uel chondri cremor, uel panis ex aqua simul cum mali grauati nucleis, aut malis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam uinum dabitur. item iis qui subito animam perdunt, his remediis succurrendum est, ac ubique causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accadat, atque contra hanc pugnandum est. Nonnunquam uero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, uel etiam mortem minatur.


Quomodo

*Quomodo ulcus circa os sacrum proueniens
curetur. Cap. LX.*

ET hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno
decubitu superuenit. Cum itaq; sacri ossis regio incipit
rubescere, circulum ex lana iustæ magnitudinis, parti
subijciemus, postea rosaceum, uel myrteum ceratum,
quod argenti spumam, aut cerusam habeat super-
accommodabimus. Inflammatione autem
oborta, cataplasma ex pane cum solano,
uel polygonio, uel plantagine, uel
tenera brassica applicatur. Si
ulcus serpat, lenticu-
la cum malicorio
in star cata-
plaf-
matis induci-
tur.

FINIS LIBRI SECVNDI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.






PAVLI AEGINETAE

I IBER TERTIVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete,



DE PILORVM AFFECTIBVS.

De alopecia, & ophiasis, & caluitio. Cap. I.



QVEM AD MODVM stirpiū nonnullæ succi defectu inarescentes contabescunt: nonnullæ uero alienis à natura sua humoribus infectæ: emarcent, haud dissimili ratione id ipsum quoque pilis usu uenit. Etenim Caluitiū, humidi penuria fieri cōsuevit: prauitatē aut, uitioque succi, Alopecia, & Ophiasis, figura tantū inter se differētes. Quā in Ophiasis, partē oblesā, serpentis modo glabrā, ostendit: alopecia, quæ uulpes cōtinuē infestet, sic appellata est. Itaque coniecturā de humore, qui superat, ex cutis colore facientes, uacuationē medicamēto purgante prius moliemur: deinde loco uitiatō auxilia inducemus. Si igitur color ad nigrius, albidiusue mutatus fuerit, Antidoto Hiera quod pituitæ educēdæ, humorique, melancholico est. utemur: sin ad pallidius, catapotia ex aloë exhibebimus: singulorū autē ipsorū descriptionē in lib. de medicamentis cōpositis inuenies. Vbi corpus iam totū inanieris, medicamēti quod pituitā per os extrahit, apophlegmatismō Græci uocāt, usus erit, ex aceto, sinapi, & melle: isque non semel, uerum

uerum crebrior. Satius autem fuerit, si etiam in aceto origanū uel pulegium, uel thymus, uel hyssopū cōmaduerit. Cæterum in aliis quoq; capitis affectibus eadem utemur curandi ratione: primum humorem, qui præpollet euacuantes, uel purgatione, uel etiam sanguinis emissionem, si eius subest redundancia, dein ad præsidia quæ parti extrinsecus iniiciuntur, transgredi conuenit.

De alopecia.

Cutis nitro confricata, linteoq; aspero, lanæue potius deter-
sa, & iterum defricata, adeò ut ruborem contraxerit, uerbe-
naca in Sole ex aceto detrita, illiniť. Aut alcyonio primæ aspe-
ritatis combusto, reductoq; in puluerem cū oleo ex lucerna
inungitur. Aut arūdinis radix, aut amygdalæ amaræ cortex tor-
ridus, oleo, uel adipe ursina exceptus inducitur. Hæc itaq; sunt
mitiora medicamina, uerum ex euphorbio, thapsia, & adarce,
oleo leuigata laurino, uel pice liquida, uehementiorē uim repre-
sentant. **ALIUD.** Erinaceorū marinorū testa ignē experta cū
adipe ursino excepta, loco prius nitro exterso illiniť. **ALIUD.**
Piperis, stercoreis ouilli sicci, erysimi, ærucæ seminis singulorū
drachmæ quatuor, ueratri albi drachmæ treis, murium sterco-
ris drachma. Excipiuntur felle taurino, aut hircino, aut suillo.

Aliud experientia probatum ad alopeciam.

MAndragoræ, radicis, mali terræ, ari radicis, ceræ, picis liqui-
dæ singulorum uncia octo, axungia porci subrumis, nerii
herbæ medullæ modicū. Axungiam, & nerii incoquito, donec
herba intabescat: deinde exēptam proiicito: & reliqua axun-
giæ adiungito, incoquitoq; mox ceram, & picem liquidam.
Utitur in sole audacius. Vbi iam ulcera ad cicatricē uenerint,
caput uulpeculæ urito, & alcyoniū, anchusæq; nigræ folia om-
nia contrita super inunctioni inducito, ut capiti pili succrescāt.
ALIUD. Muris capitis combusti pars una, testarum marinarū
tantundem, cum axungia porcina. omnia in fictili coctis uti-
tor inspergens etiam ex ipsis siccis aliquid.

*Medicamentum ex thapsia ad omnes in-
ueteratos affectus.*

Evphorbii, thapsiæ, baccarum lauri singulorum uncia,
sulfuris ignem non experti semuncia, ueratri tantun-
dem, ceræ uncia sex, laurini, uel ricinini, aur ueteris olei
quod

quod satis est. In ualidioribus etiam uti uincit nasturtij uncia, alcyonij combusti uncia: iisq; nō solum ad Alopecias, uerum etiam ad omnē diuturnam perfrictionem. Summatim in Alopecijs cutis prius nitro est extergenda, infricandaq; & frequenter pili nouacula radendi. Si quidem plerisque noui ex sola infricatione, frequentique rasura pilos prouenisse.

Quomodo caluitium abigatur, & pili crescunt.

Ex Critonis commentationibus.

TEPORVM uentriculi quinque arefacti diligenter olla subtili friguntur. His adijcito, myrtorum, myrti summitatū, acaciæ fructus, acaciæ succi, rubi canini, æqualem modū, adianthi uncias tres. Hæc omnia accuratè resiccata in pollinem coguntur, & subtili cribro incernuntur: deinde adipis urfini libris quatuor, & phocæ totidem admistis denuò tunduntur. Excepta pixide plumbea reseruantur. Cum usus postulat, quolibet oleo aromatis imbuto diluuntur.

Quæ pilos conseruent.

POLYTRICHI hærbæ pars una, ladani partes duæ, uino myrteoq; oleo exceptæ in usum adhibentur. **ALIVD.** Anemonæ flos tritus cum oleo inungitur: idem uerò, & nigrefacit. **ALIVD.** Verbenacam rectam unā cum radicibus torrefactā, tusamq; tenui cribro incernito, mixtam oleo ut sordium habeat spissitudinem æreo uase reponito. Cum liquefeceris, utitor inuicem olei similiter.

Aqua pilos augens, eosdemque denigrans.

AQVAE pluuiialis sextarij sex, rhus alexandrini sextarij tres, polytrichi uncia quatuor, hærbæ sabinæ tantundem, ladani uncia, myrti uncia, cucurbitæ aridæ tantundem. Si nito ad dies uiginti uitreo uase cōmadescere, bis mouens quotidie rudicula tedacea. † In sequenti tempore in aquam pilos singulos tingens, utitor quotidie. Item semen althææ in balneo illitum pilos conseruat, augetq;: pari modo oleum inunctum, in quo semen ipsum althææ decoctum est, uel simul impositum.

† Vera scriptura est in antiquo cod. τῇ δὲ ἐπιέσῃ καταβάπτων ἐς τὸ ὕδωρ τὸν κτένα χρῶ καὶ ἔτω πόσι καθ' ἑκάστην ἡμέραν, id est, in sequenti die pectinem in aquam intingens utere, atque ita fac quotidie.

Quæ

Quæ medicamenta pilos extenuent.

Ficus foliorū, uitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarū buccinorum, terræ cimoliæ singulorum mina. Omnibus in nouam, crudamq; ollā coniectis, lutoq; oblitis, in camino coquito, tertioq;, adiciens aphronitri minæ semissem, gallas immaturas numero triginta. In puluerē redacta excipito, ac utitor. **ALIUD.** Aphronitri minæ septē, pumicis tosti minę quatuor aluminis fissi, iridis siccæ, myrti syluestris nigræ, gūmi, bryoniæ radicis singulorū drachmæ quatuor, lupinorū crudorū in pollinem detritorum, congii pars quarta: Vtere absque pingui.

Ad fluentes pilos.

Aloe ex uino nigro austero illinitur, uel purpuræ tegmina ex oleo cocta, uel myrrha, & ladanum cum uino, myrteoq;, uel caprillum stercus in testa combustum ex oleo leuigatur ac cuti prius rasæ inungitur.

Quomodo pili crispi fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleopatræ libris, quos de capillis crispis faciendis prodidit.

Cap. II.

Capite prius deterso, spondyli radix cū mero pilis inungitur. **ALIUD.** Nux pinea recens ad cinerē usq; comburitur, iniectaq; pilæ teritur, myrteum unguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atq; sic pili rasō capite abstersoq; delinuntur. **ALIUD.** Myrti, & betæ pari mensura cum oleo pilos abstergens utitor. **ALIUD.** Gallæ uiginti numero, adianthi uncia duæ ex aqua marina in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo urina prius deterso, uel lixiuio, & aqua calente abluto, oblinetur medicamentū ad biduū, per quod ubi ipsum retinuerit, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo inungi. Id tenerū crispumq; & nigrum efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

Quæ canos arcent, & eosdem denigrant.

Olei, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarii tres, spicæ nardi drachma, unguis odorati drachmæ quatuor, iunci rotundi floris tantundem: incoquantur cum oleo. seorsim habebitur. Acaciæ succi uncia una, uino soluta leuigataq; diligenter. Vbi uero tertia pars olei fuerit relictā, hanc per colato, & acaciæ mixtā in fidelia excipito, ac utitor quotidie pilos inungens. **ALIUD.** Nucum uiridium corticis uncias tres, ilicis ra
ici

dicis tantundem, uini nigri sextarios tres, ad tertias decoquūto, ac ubi id quod reliquum est, expresseris cum olei myrtei sextario iterum subiges, usus eius quotidianus.

Aqua pilos denigrans.

GAllæ sextarius unus, rhus coriarii sextarii duo, myrtinigræ totidem, cyperi foliorum æqualis mensura, cinaræ manipulus, papaueris nigrorum in floribus capitulorum tātundem, aquæ lacustris sextarii duodecim. Omnia multis ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illinuntur, absterfis, scatisq; crinibus. Ac cimolæ terræ acetabulum cum uiua calce pari mensura inungitur. Hæc autem succo betæ elixæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia tegminis gratia super accommodantur. ac ubi satis adhæserint, in balneo abluuntur.

Vt ruffi capilli tingantur, & flauescant.

MYrrhæ pars una cum salis floris altera, accuratè teritur. ubi sordium facta est crassities, caput prius detersum medicamento inungitur. siniturq; per noctem, & diem, postea tunc ablui præcipies. **ALIVD.** Lupinos crudeos cum aqua illinito. **ALIVD.** Argenteæ spumæ drachmam, terre creticæ drachmas quatuor, calcis uiuæ drachmā. Ex aqua mellis crassitiē faciēs inūgito, & betæ foliis adiectis ad duos, tresve dies abluito.

Vt pili nigri flauescant.

FLoces uini in balnei sordes mittuntur, & spissitudine cerati facta sub somnū illinuntur, & mane pili flauescunt. **ALIVD.** Cyperi folia succo herbæ lanariæ fruticis madescunt. Et diluto, uteris.

Quæ capillum reddunt colore aureum.

ALuminis, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctorum utuntur, Romani uocant herbam rubiam, drachmæ octo, è cinere lixiuii quo pilearij utuntur sextarii quatuor. Lixiuuium cum thapso contrita incoquito. ubi dimidia portio relicta fuerit, humorem exprimito quo alumen, sandaracham, & crocum dilues. Deinde uase uitreo condes. Vbi usus uenerit, pilos prius absterfos illinito. postquàm uerò combiberint, ablues decocto scœnogræci, hordei, & cumini, aquæ prius tepidæ superfusa, quod sufficit, ad hæc saponis quantum satis est adicies. **ALIVD.** Flores uini ustæ unā cum oleo balanino, pilis oblinuntur.

nuntur. **ALIUD.** Sapone gallico cum aqua in singulis balneis pili absterguntur.

Aliud ualde generosum.

RHVS rubri sextarius, gallarum libra una, Selydri uncia duæ, herbæ aurû colore imitantis (quam Romani rubiam uocant) uncia duæ, polytrychi fasciculi duo, absynthij unus, lupinorum quibus cortex sit detractus cyathi duo, aquæ sextarij septem. Omnia in uitreum uas coniecta, dies nouē finito comadescere: quotidie bis rudicula agitans cum usus exigit, auferes quod satis est. & hoc spongiam madefaciens, pilos confricato, humectosq; combibere finito. ubi siccati fuerint, sapone calida aqua soluto, abluuntur.

Quæ pilos albos faciunt.

VERBAsCI candidi flos combustus aceto mergitur, & in saponem miscetur. **ALIUD.** Verbasci seminis, aluminis, raphanorû corticis singulorum drachma. Contundito, & glutini quod ex tergoribus bouum confit, ταυροκόλλην Græci uocant, drachmas quatuor misceto.

De capitis affectibus cutem infestantibus, porrigine, quæ pityriasis dicitur. Cap. III.

PORRigo, quæ pityriasis Græcè dicitur, est, cum tenues, & furfuraceæ squamulae ex capitis, uel etiâ reliqui corporis superficie citra exulcerationem resoluuntur. Id autem euenit uitioso corporis humore, salsaue pituita, aut bilioso, & melancholico sanguine caput subeunte. Itaq; corpore toto (ut dictum est) euacuato, subscriptis remediis utemur. Cimoliam aqua prius maceratâ beræ succo miscebis illinesq; & tantisper ita permittes, donec inaruerit. Deinde postquàm ablueris, thus ex uino oleoque detritum perunges: die in sequenti staphida agriam, hoc herbam pediculariâ ex oleo inunges. **ALIUD.** Nitri, fecis concrematae, myrobalanorum, singulorum libra, herbæ pediculariæ libra una semis uino dilutis caput abstergitur. sin autem reliquum corpus piuritu uexetur, siccis. Ad humidiores uero pityriasis, muria, uel lupinorem decocto caput abluendum est. hoc enim subinde sum expertus.

Ad psyracia & exanthemata capitis.

PSYDRACIA exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata uero cutis

cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrūque uicium præsidij infra positis exteritur. Argenteæ spumæ, cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum uiridium toridem. ex aceto myrteoq, oleo leuigata cuti illinuntur. **ALIVD.** Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis à capite abscedit, oleæ folia elixa cum melle cataplasmatibus modo inducuntur. **ALIVD.** Argenti spumæ, cerusæ singulorum drachmæ duodecim, sulfuris uiui drachmæ octo, cerato myrteo excipiuntur.

Ad hulfuscula capitis densa rubraque.

Hæc papillis sunt similia, ex quibus sanies eliquatur. Capite prius nouacula raso, & aqua nitroque absterfo, sulfure uiuo ex hominis urina contrito utitor. Vel cretam sutoriam *μελαντηριαν* uocant Græci, cum aceto inungito.

*De manantibus capitis ulceribus, quæ acores
græce dicuntur, & fauis.*

Inter capitis uitia, quæ in cute oboriuntur, unum est quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia ulcera, tenuissimis cutem foraminibus perforans: per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malū specie est, quod à faui similitudine *κυστιον* à Græcis nominatur, quod magis amplis foraminibus constat, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apium fauis, continetur. Origo est ex nitrosa salsaque pituita. uictus igitur ratio ex cibis boni succi constare: omnia acria & salsa uitari debent: præsertim si inflammationem affectus respiciat. postquam corpus superfluo decenter erit leuatum, derasis capillis caput fouendum bis terve die, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, uel rubus, uel lenticula, uel amari lupini, uel asparagi radix. Quum uerò plus saniei emanat, salicis folia cum aqua, uel lenticula, instar cataplasmatibus applicantur. terra autem cimolia uel cretica, uel samia, uel pompholix, uel spodium, uel argenti spuma, uel cadmia, uel charta combusta, uel etiam medicamentum ex charta Xerion, omnia ex aceto inducuntur. Smegmate uerò hoc utendum est, sulfure uiuo, & perdicij herbæ, saponisque æquali pondere. Composita hæc sunt, argenti spumæ drachmæ duodecim, rutæ foliorum drachmæ octo, herbæ pediculariæ quam staphida agriam Græci uocant, drachmæ quatuor, chalchanthi drachmæ duæ. Aceto

PAULI ÆGIN.

h myrteoque

myrteoq; in sordium spissitudinē coacta illinuntur. *ALIVD.* Sandicis drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ quatuor, sulphuris ignē non experti pondo drachmę duæ, pollinis thuris drachmæ quatuor, ex oleo ueteri iunguntur.

Aliud ad achoras.

AD achoras recrementū argenti, uel molibdenam contritū oblineto. *ALIVD.* Ad achoras & humidæ scabies, rhododaphnæ, rosarum uncię quatuor, sulfuris uiui uncia quatuor picis liquidæ, & picis aridæ utriusq; uncię tres, cerę selibra, olei myrtei quantū opus est. in pueris autē, lacte soluta illinuntur.

De ficis.

Ficus, nominant eruptiones, ulcerosas, rotundas, subduras, rubentes, quas dolor etiam comitatur. Fit uerò hoc malum plurima ex parte in capite, nascitur tamen & in reliquo corpore. Probatur maximè contra hos alumē fissile, æris flos tostus, & glutinum pari mensura cum squamæ æris duplo. Teruntur ex aceto illinunturq; . Præstans etiam remedium est menarum capita, combusta, elixiquē bulbi, & cinis aceto mixtus.

Aduersus capitis & menti ficosa exanthemata, xyraphium.

Misyos drachma una semis, chalcitidis drachmæ duæ semis, squamæ æris drachma, aluminis fissi, drachma. Bene loto, hoc medicamen aridum impositum dimittitur. Die in sequenti rursus pars lauatur, spongiaque detergæ idem applicatur. Decidit enim ramentum crassissimum. Et si diebus subsequētis idem fiat, sine cicatrice breui confanescit. Cæterum medicamen hoc non mediocriter adhæret.

Ad capitis pediculos.

LVpinorum in aqua coctorum diluto, caput detergeri iubetur, uel herba pedicularia, uel sandaracha, uel utraq; contrita ex oleo ueteri, seu aceto illinitur, uel piperis momentū, ne exulceret cū oleo, aut hederæ succo cū melle, † aut minio synopico cū aceto, aut cedrino liquore, aut pice liquida cum alumine, aut baccarum lauri expresso, aut oleo raphanino. Ego pediculariam ex aceto oleoque tritam inunxi, ac semper quod uolui, sum affecutus.

† Græcus codex manu scriptus ἡ σίμησις, id est, uel sinapi cū aceto, quæ scriptura uerior est.

De

*De capitis dolore, quem græci κεφαλαλγίαν
uocant. Cap. II II.*

Capitis dolor qui græcis dicitur κεφαλαλγία, symptoma est grauissimū, ac nunc ex sola intēperata qualitate oritur, nunc ex nimia humorū copia. Interim ex utraque causa: interim uero ex primaria causa, nēpe solis æstu extrinsecus, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehemētissimi igitur capitis dolores ex efficiētibus qualitatibus nascūtur, & potissimū ex calida: qui uerò ob siccitatē cōtrahuntur, nō æquē uehemētes existunt. Humida qualitas sui ipsius respectu, nullū plane dolorē cōciliat, nisi caliditati, aut frigori, aut humorū copię adiuncta. Itaq; de eo capitis dolore qui cū febris est eo loco explicatum est, quo febrīū curatio exposita est nūc de cæteris dicēdum est.

De capitis dolore ex insolatu contracto.

Qui ex insolatu capite dolēt, eorū cutis tactu calida est, & primo statim manus iniectu aridior apparet: oculos habēt rubētes, frigidis asperginibus, & inunctionibus oblectantur, sentiuntq; ab ipsis præsiidiū. Cæterū curatio his conueniet, etiā ea, quā dolori in febribus præscripsimus. Si dolor perseuerat, infrascriptis utēdū est cataplasmatibus. prodest frōti & tēpibus inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdū cū amygdalis, uel rosis, siccis, aut teneris, uel cū mentha cui pulegiū sit adiectum, uel panis cū perfici folijs facit ēt ocymū ex aceto & rosaceo tritū, uel hederæ corymbi in aceto elixi. Iā farinā triticeā cū rosaceo leuigatā, uel serpilli ex aqua decocto miscere cōuenit, uel cardamomū torridū leuigatumq; ex aceto & rosaceo: uel fermentū cū rosaceo, uel iridē aridā cū aceto. Sed mutantur continue singula: nam si diutius adhæreant, inefficacia redduntur.

Pastilli ad capitis dolorem ex intemperie calida.

Croci drachmæ quinque, chalchanti drachmæ decem, aluminis drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ septem, omphacij drachmæ tres, chalcitidis drachmæ tres, gummi drachmæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin etiam uigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur.

De ijs quibus caput ex frigida intemperie indolescit.

† **A**T si frigus nocuit, cōrraria ijs qui ex solis æstu dolēt, affectos signa testātur. Etenim facies ipsorū non cōcidit,

h 2 fed

sed colorē decoremq; amisit. Item frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Verum horū agnitionē tum uictus ratio, tum reliqua concurrētia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, uel irino, uel nardino, uel etiam opobalsamo, præsertim si recrementa fuerint crassiora uiscosaq;. Frons autem cū hoc liquore, tum ijs medicamentis debet illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinū subtilius propinandū: corporis motione & balneis uti calidis præcipiendum, interim à radícula uomitu. In quibus autē qualitas citra humorū copiā diutius persistat, hoc utendū est medicamine. Piperis albi drachmæ duæ, crocomagmatis drachmæ duæ, euphorbij recentis drachmæ octo S, stercoris columbini drachma una S, aceti acerrimi quantū satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata.

† Locus hic sic legitur in ueteri græco exemplari. τοῖς ἐπὶ ἐγκανσει κεφαλαλγῶσιν ὑπεναντίως ἔχει τὰ τε σημεῖα, καὶ ἡ θεραπεία τῶν ἐπὶ ψύξει. idest, signa & curatio eorum, quibus caput ex frigore dolet, sunt contraria signis & curationi eorum, quibus caput ab æstu dolet.

Si biliosus humor dolorem inuexerit.

NOtæ horum per similes ijs, quos ob solis æstum dolor affligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. interim etiā os inā marefcit. Porro affectus hic ætatibus potius uigentibus, & tēperaturis calidioribus, uitę sollicitę, & bilem flauā coaceruantibus solet accidere. Quamobrē balneū temperatū his, in unctiones, aquæ potus, & uniuersa uictus ratio humidior, bonique succi adhiberi debet. Biliosus humor absynthij diluto, uacuabitur: uel aloe, aut ipsa Picra, antidoto per se, aut cum modica scāmonia, aut catapotijs quæ ex aloe constant. Inungenda frons, aut crocodi pastillo, aut trigono, aut quodā simili.

Si caput consortij lege indolescat.

SI caput consortij lege cū toto corpore afficiatur, cura adhibenda, ut contra intemperiem, & superantem materiam pugnemus. & si copia quidem premit & maximè in uenis, sanguis mittendus est: sin autem magis qualitas urgeat, purganti utendum medicamine. Quod si particula laborante aliqua simul condolescat, ueluti iocinore, aut uentriculo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi calida afficit intēperies, panis ex aquo-
fo uino

so uino exhibetur, uel etiam ex chondro sorbitiūculæ. Extrinsecus uincit superfundere, quæ modicè refrigerent, uiresq; con- firment, sicut à me prius cōprehensum est. At si glutinosi, cras- siq; humores in stomacho infarcti, capitis dolorem concitent, hos quoq; amoliamur potu oxymelitis, tum simplicis, tum Iu- liani. Insuper medicamentis ex hyssopo & origano, & his ad- huc calidioribus magisq; incidentibus. Iam uomitus à radicu- la utilis, superfusiones calidiores, & cataplasmata.

De capitis dolore ex uino.

SI uinum adhuc incoctū in stomacho fluctuet, tepentis aquæ potu uomere dolentem iubebis. Quòd si etiam post conco- ctionem caput indoleat, refrigerantibus, repellentibusq; ute- mur, quale est rosaceum priuatim sumptum, & cum aceto, uel hederæ succo, uel brassicæ. Quin & ipsa brassicæ folia in aquā calidam demersa, & capiti circumdata ligataque, naturaliter ebrietatem arcent. eiusdem decoctæ eius in id efficax est. Item lenticula hos adiuuat, potissimumq; uētriculo humidiorē prę- ditos. Adhæc alica, malicorium, & mala ipsa, piraq; , tum aquæ potio, utiliter assumuntur.

De capitis dolore ex ictu.

QUI ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi sum- ma omnino cute percussi sint, sanguis statim emitten- dus est, & conueniētes aspergines capiti sunt adhibendæ. Oleo- que dulci irrigandum ipsum sanisq; contegendum. Vino ci- boq; pleniori, præsertim si febris adest, ægros coercere expedit: Et tota curatio ceu ad neruosarum partium inflammationem & præcipuè membranarum cerebri quas meningas appellāt, adaptabitur. Si uerò & uulnus factum fuerit, huic quoque de- center medebimur.

Malagma ad capitis dolorem.

CERÆ drachmæ septem, amygdalini olei uncia tres, terebin- thina drachmæ octo, æruginis rasæ, cimolia, chalcitidis sin- gulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ tres, æris usti, squamæ stomomatis singulorum drachmæ duæ. Si uidetur pau- lo esse durus, amygdalino emolliendum.

De cephalæa, & hemicrania.

VTERq; hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis uini potu, & implē-
h 3 tibus

tibus caput odoribus excandescit ex acuiturq; . Ac alijs totum feriri caput in hoc dolore , alijs alteram ipsius partem dūtaxat excruciarī uidetur, quos etiam hemicranicos nominant. Quibus sanē intra caluariam malū consistit, ijs dolor ad oculorum radices porrigitur : quibus extra est, circa ipsam caluariam indolescunt. Quapropter dolores cum grauitate molesti, plenitudinem testantur cum erosione infestantes, uel humorum, uel uaporum acrimoniam : qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem : qui cum tentione, si quidem grauitas & pulsus nō adsit, spiritus tenuis, & flatulenti redundantiā innuit, si cū pulsu, membranosaē partis inflammationem : cū grauitate uero, copiam intra membranas cōtineri. At si putridus etiā humor, calidior euaserit, & cum febris simul capite dolitant : febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorē parit. Quū igitur corpus totum succis æquabiliter omnibus redundat, quod plethoricum dicitur : uenā secare si uires patiantur, & acrioribus, uti clysteriis conuenit. Inde si adhuc sanguis uidetur exuberare, etiam uena nariū adaperita, quantum satis esse uidetur, detrahes. Mox hiera, quam exacueris, intenderisq; exhibēda, deinde pituitæ eductionibus, apophlegmatismos uocant, utendū est, tum ijs quæ per nares uacuant, ἐξήμα græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterij succus cum lacte infusus, uel etiam aridum elateriū inspiratum, succusq; cyclamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Medicamentū quod naribus inditur ad ueteres cephalæas lippitudines & morbos comitiales, melanchij drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ quatuor, elaterij drachmæ quatuor. Tūsa, oleo sycionio, uel irino, uel cyprino excepta, ut cerati fiat spissitudo, narib. demittunt.

*Medicamentum quod pituitam extrahit,
naribus inspiratum.*

Cyclamini sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem in uicem nitri elaterium indideris, magis proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus inspirabitur. Porro epithemata quoq; capiti admoueto, & inunctiones : ubi morbus in neuastatem magis inciderit.

Epithema ad cephalæam.

Vnguenti irini, peucedani, castorei singulorū drachma, baccharum lauri drachmæ duæ, rutæ summitatum drachmæ quatuor.

quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasoq; capiti, toti ipsi imponitur. Mulier quædam in hemicranicis hoc etiam quod sequitur epithemate usâ, mirandū in modū inclaruit. Radicē cucumis sylvestris uiridem minutim cōcisâ, absinthiumq; cum hydrelæo incoquebat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partem affectâ irrorabat. radicē uero & absinthium, in puluere contrita oblinebat. Atq; hoc solo medicamēte, hemicranicos, id est, altera capitis parte dolentes, & cum febre, & sine ipsa, curauit. At si malum maximè increuerit, ut dolorem ferre nequeant, utitor medicamentis etiam quæ lenire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

Vnguentum ad cephalæam.

Liquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymę papaueris, anisi, alterci quod hyoscyamū græci uocāt, croci, myrrhæ, scamoniz singulorū drachmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum usus postulat, ex aceto uel posca illinūtur iis, quibus humores crassi, uel spiritus flatulentus dolorē fecit. Iā dropax & sinapisimus iisdē benefacit: & pastillus ex taphia. Iā qui ex atramento scriptorio fit mirificè eidē causæ medetur, quo post hæc utendum est sicut in opere de compositis docebitur. Quin & istud mirabilem in modum ad hemicranicos ex crasso glutinosoq; humore dolercentes efficax est. Euphorbij portio una cum pari castorei modo aqua excepta auriculę demittitur qua parte indolescit, inde balneū adeundū, ubi paululum immorati ipsum assument, & cōsuetō more lauabunt. Sic quidem expertum est, uerum non alienum absurdumq; fuerit, & oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Item quod medicamē ad coxendices inscribitur, etiam longo capitis dolore laborantes, & hemicranicos ex toto per sanat.

Ad hemicraniam ueterem.

Alliorū drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axūgiæ ueteris drachmæ duæ, cātharidū drachmæ duæ. Vesperī illitum finito p noctē adhærere. Mane rupta papula, malagmate, quia liquidū est, πικρυγέδι appellāt, ei medeberis. ALIVD. Baccarū lauri qbus cortex sit ablatu, drach. duæ, rutæ foliorū, drach. duæ, sinapios, drachma. Aqua dilutū oblinito. At iis q frigori patuerūt, utilissimū est infra scriptū medicamentū ut plerūq; semel ante balneas illitū, confestim affectui medeatur, & ægrotātes

h 4 omnino

omnino sani post lauacrum euadant. Olei sabini pondo, ceræ quadrans, euphorbii uncia. Hoc dimidiæ frontis partinempe qua temporum musculus habetur, delini debet. Qui uero frigoris iniuriam non senserunt, ijs gallæ, & crocomagmatis parē portionem cum uino detritam iniugito. Sed qui ex calidis uaporibus, uel succis capite dolitant, ijs medicamēta quæ euphorbio constant, non applicabis.

Apophlegmatismus, id est, medicamentum quod saliuam mouet contro cephalæam.

Sinapeos contriti & in succū redacti ex aceto & melle drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. Tusa, cribrataq; misceto, & in sole gargarizato. Porro si ob biliosum humorem, aut quandam intemperiem orta Cephalæa diutius prorogetur, eorū usu ueniet quæ in sermone de dolore capitis cōprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus adhibitis, sed suspicio sit humores per arterias in caput esse distributos, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balinæ naturales rectè adhibentur.

De phrenitide.

Cap. VI.

Phrenitis, membranarum cerebri, quas meninges græci appellant, inflammatio est, nunc quidē ipso quoq; cerebro simul eam experiunte, nunc autem calore præter naturam in eo consistente. Causa morbi est, uel sanguis superās, uel biliosus humor: nonnunquā & flaua bilis perusta, adeo ut in nigrā degenerauerit, quando etiā grauissima phrenitis nascitur. Aliquando cerebrū septi transuersi cōsortio dolens, ex neruis qui in ipsum sparguntur uitiū cōcipit. At quæ mentis alienatio in ardentissimarum febrium statibus accidit, quæq; ex stomachi consensu exoritur, phrenitis non est, sed hoc solū, puta delirium. Comitantur propriè phreniticos uigiliæ quidem plurima parte: interdum uero & somnus turbulentus accedit, ut consurgant, exilient, & furibunde uociferentur. Quibus sanguineus humor morbum fecit, ij cum risu insaniunt: quibus flaua bilis ferociter, quemadmodum quibus atra uitiū contraxit, tam immaniter sæuiunt ut coerceri nequeant, omnium quæ dicunt, faciunt uē, obliuiscuntur. Oculos habent sanguineo colore tetricos, ac perfricant: interim aridos, interim lachry-

lachrymātes, uel lemis, hoc est crassiore pituita oppletos. Lingua est aspera, & sanguis ē naribus destillat: floccos festucasq; colligunt, febri per totum morbi decursum acuta conficiuntur: sed quæ in alto maligna delitescat. Pulsus ædunt exiguos, languidos, & quadantenus etiam duos. Respirationē magnā & raram, cum cerebrum primariò afficitur. At si phrenitis sepi transuersa, quod græci phrēnas uocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia fursum conuelluntur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri uitio insaniunt, facies incalescit, & subcruenta est, uenæ repletæ. Quod si humor pituitosus sit temperatus bilioso, uti causam, ita appellationem quoq; compositam habet. Nam uigilans coma, nominant, in uniuersum quidem cū biliosus superauerit, quippe tales ægri uigiles phrenitide laborant: cum uero pituitosus præpollet, contra in grauiorem ueluti somnum quem coma uocant græci, deferuntur. Atq; hoc malum antiquiores Galeno medici, Cathocon uocauerunt.

Curatio phrenitidis.

Quod si uires ægri patiantur, sanguis protinus ē cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens brachium non porrigat, aut si porrigat, metus sit secundū uacuationem, sanguinis profluuij, dum manū æger subinde ob mētis turbationē iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est auferemus: itē clysteriis utemur, ex hydrelæo, uel rosaceo cum ptisanæ cremore. Si uigiliæ urgent, rosaceū, uel oxyrhodinum in caput dandū est. Aliquādo calida ipsum aqua prius superfundendū: & medicamentū quod ex papaueris capitibus uocatur diacodyon exhibebitur, nisi uirtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnum conciliandū superius scripta sunt, huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum tēperie moderato: & uariis quibusdā picturis libero, ut quæ tales deterreant. Quò amici quidā gratissimi ingredientur, & commodū incident, qui nūc blande ægrotum alloquantur, nunc acerbius corripiant. Cibus primum esto aqua mulsa, deinde ptisanæ cremor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci porione, ut apomelite, uel hydrosato, uel rhodomelo, uel dulci hydromelo. Nam uinosum hydromelum, quod in paruis uasculis ex Cibyra apportatur, repudiandum, ut quod grauiores uino no-

xas in talibus excitet, & maximè in capitis affectibus, idq; ante concoctionem. Panis quoq; aqua lotus rectè exhibetur, intubi, lactucæ clixæ. Si multus feruor conficiat, etiam cruda hæc dantur. Item cucumeris medulla, peponis, duracini, & similiū. Aquæ frigidæ potu coercendi sunt, potissimum si septum trāsum consortii lege malo dedisse originem deprehenderimus. Quod si urina ipsis, ut consentaneum est, delirij uitio cohibeatur, † fota adhibito calente hydrelæo & inferiorem uentris ab umbilico regionem, ἡτρον græci uocant, & uesicam superfundemus, deinde digitis manus, loco innixis ad reddendū urinam incitabimus. Reliquum corpus ipsis decumbentibus calido oleo perungi debet. Etenim in quiete, quoad eius fieri licet, seruari debent, ita ut siquidem prædiuites aliqui fuerint, per famulos contineantur: sin minus, uinculis constringantur. Nam inordinata motio uires conuellit. Iam uero alia etiam de causa pedes, prius foti, deligaturis constringi, manuq; contractari debent, nempe quò humores deorsum reuellantur. Porro si longior affectus, & contumax fuerit, ab iis quæ soporem accersunt, καρωτικά græci appellant, abstinentum: ea uerò quæ digerendi facultatem obtinent, capitis perfusionibus miscenda, scilicet mentæ succus, uel serpilli uel calaminthæ, uel turbæ. Tum iis quoq; utendum quæ naribus inseruntur. A septimo die si uiscera sentiant inflammationem, cataplasmatibus ex lini semine, & hordeacea farina cum hydrelæo leniemus. Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarificatione, tum his ipsis, tum occipitio, & spinæ accommodabimus. Si corpus squalidum perustumq; esse coniecturaueris, febrisq; adsit, etiam balneis utendum aquæ potabilis, & unctione liberaliore. Vinum tenue & aquosum, quod ὀλιγοφόρον appellant, uiribus recolligendis propinabimus, nullam inde mentis turbationem, ut est uerisimile, futuram suspicantes. Aut enim nulla sit cum morbus declinat, aut certè si sit, ex facili subsidet. Processu autem declinationis, gestatione corporis uti expedit, & congrua uirium recreatione. Sed ita phrenitici se se recolligent, ut ebrietatem, ciborum corruptiones, & in primis solis æstum caueant.

† Hæc sic leguntur in antiquo codice, ποιήσαντες ἀλέαν καταντλήσωμεν θερμῷ ὕδατι καὶ ὕδρελαίῳ id est, fota adhibita calente aqua, aut hydrelæo.

De

De inflammatione cerebri. Cap. VII.

Cerebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, ut capitis futuræ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diuturnus, multus angor, rubor in facie multus cum tumore molli: oculi fiunt emissicii, caput inturgescit, Qui hoc malo impliciti sunt, sanguinem ex cubito mittere, item ex naribus, & uasis linguæ subditis debet. Porro utitor & asperionibus quæ per inflammationes capiti adhibentur, & cataplasmatibus, quæ humectare, & maturare sunt idonea.

De erysipellate cerebri. Cap. VIII.

Accidit quoque erysipelas cerebro, quo laborans hæc patitur: capite dolet uniuerso, adeo ut flammis id uri putet. facies frigida est, & subpallida, os siccescit. Quare sic affecto sanguis detrahendus est, & potissimum ex uenis sub lingua sitis. Refrigerantia conueniunt: quibus in aliis quoque erysipelatis utimur.

De lethargo. Cap. IX.

Lethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa sit aliqua, locum eundem quem phrenitis, nempe cerebrum, occupat: materia uero mali, contraria est. Nam ex pituita humidior, frigidiorisque; cerebrum madefaciente, contrahitur. Lethargicos comitatur febris lenta, non impensè acris erodensque; cum alto sopore, quæ cataphora Græcis dicitur, Pulsus his magni, rarique; sunt, & undosi, respiratio nimis rara & imbecillis. somno perpetuo præmuntur, à quo ægrè possunt excitari, & quocumque modo interpellentur, uix respondent: obliuiosi, mente capti, oscitant crebro, & hiantes, ore nonnunquam persistunt, tanquam claudere id obliti. Deijciunt per aluum copulures quidem, liquidiora: nonnullis autem contra ueter inarescit. Urinam reddunt iumentorum lotio similem. Quidam ex eis tremiscunt, & undiquaque desudant. Huic affectui respondet Carus, quasi dicas ueternus sopor ex eadem materiæ proficiscens: sed hoc discrimine uariatur. Febris Carum præcedit, eaque uehementior: Lethargum subsequitur: item quod Carus etiam alia comitetur symptomata. siquidem frequenter febrium accessionibus superuenit comitialibus, cerebri compressionibus, modo esse quidem in fracturis, modo autem membranae custode, quæ *μηνυγοφύλακα* Græci uocant, priorem cerebri uentriculum premente.

premente. Lethargus autem peculiarem quandam cōstitutionem obtinet : superuenit comitialibus.

Curatio lethargi.

Vires si permittunt, etiam hic uena secari debet: sin minus, clysteriis acribus aluū ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiam castoreum sit adiectum. Nonnulli in uicem olei, oxyrhodino cū castoreo utuntur: robur hinc capiti caloremque simul accersentes: reliquū uero corpus delinētes, & præcipuē extrema, olei ueteri: cū nitro tosto, uel pyrethro, uel pipere, uel cocco gnidio extergūt. Licet & cerato quod his & castoreo simul cōstet, uti. Porro naribus admoventur odorāda thymū ex aceto cōtritū, aut organū, aut pulegiū. Os ungi conuenit, & palati cōlū detrito sinapi, cū mellis momēto. Conantq; oportet pituitā indidē affixā digitis eiicere. Si admittant etiā apophlegmatismi usus erit ex oxymelite cū hyssopo, aut pulegio, aut orygeno, aut ipso quoq; sinapi. Potui exhibebit aliquid ex iis uix citō trāseūt præsertim diaspolites cochlearii, mēsurā cū posca. iis aut qui in uetustatē inciderūt, & tremuli sunt, castorei quoq; scrupulos duos, trēsue dabimus. Si humoris inest copia, nihilq; aliud prohibeat, scāmonia scrupulū, castoreo tēperatū exhibebimus. At si his affectus nō discutiūt, caput radēdū fouēdumq; est sale, milio, & similibus per sacculos adhibitis: Adhuc sinapismis uti in capite prodest, tū iis quæ p sternutamēta euocāt. Postea cucurbitulas occipitio agglutinare partim leues cū multa flāma partim cū scarificatione. Præterea ad naturæ excretionē frequēter sollicitare oportebit tū iniectionibus, tū iis quæ urinā mouēt. Inferiorē uētris ab umbilico regionē oleo rutaceo, aut sycionio cui sit adiectū castorei paululū aspergere fouereq;: Iā uerò ut deglutiāt crebrius admonebimus, cū calida aqua dulciū portionū, aliquam præsertim apomeli ex angustii oris uasculis, *βομβύλια* græci uocāt, instillātes. Quod si mediā infestet regionē qdā inflāmatio, hinc itidē medebimur supfusionib. & cataplasmatibus. Nari bus sinapi aceto tritū, uel castoreū ustū admoovere profuerit. Alimētū esto cremor ptisanæ, uel auenæ, uel alicæ cū oxymelite, uel salibus uel pulegio, nūc quotidie nūc uno die iterposito. A cibo uinciere debet: summa cedere multū oportet, cruraq; pūgere, nōnunq; pilos

illos et in ipsis uehementius euellere coniti, quod excitent. Iam memorum & crurum rubores excitati, *φαινίμυς* Græci uocant, subinde profunt. Cæterum ubi morbus inclinare inceperit, gestationibus statim congruis utendum, & ad balneum reducendi sunt. Victus qui uires recolligat, recreetque; decenter adhibendus.

De catocho, aut uigili comate.

Cap. X.

Huius morbi causam, ubi de phrenitide sermo est habitus sumus complexi. notæ, ut summatim dicam, communes quodammodo sunt phrenitidis, & lethargi. Sed pro materia abundante uariant, peculiare autem hæ. Detineatur eger supinus, extensusque; interim facies subtumescit, & molice lethargicorum modo liuet; interim rubore tineta est, & superior gena sursum conuelli uidetur, ac excedere, ut ne continere quidem æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi mortuus decumbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus. Vrina & aluus cohibetur, aut certe modice redditur. ac qui sanè mediocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutunt: qui uerò malo uicti sunt, ad nares regurgitant. Itaque affectus qui pituita bilem superante constituuntur à lethargicis discernimus, eo quod neque facies tumescit, neque liuida est, sicut lethargicis: præterquam quod paulatim etiam leuiter desudant. In iis autem periculum maius est, quibus peruigilium ad est continens, urinae non respondent, difficultas spirandi intenditur, sudores erumpunt, item quibus ad nares potus reorbetur. At si mulier hoc laborare uitio coeperit, ab ea quæ uulnæ strangulatu correpta est, hac nota discernes, quod naturaliter iacere uideatur, & inclamantes percipiat, excitetur, rursusque somno graui sopiatur. Est ubi dicunt catochon diuersum à uigili comare, quod simplicem non mixtam habet causam, nimirum frigidiorē sicciorēque; materiā, quæ posteriore cerebri uentriculo obstructo malum hoc excitarit. Ob quā etiā æger, si corripitur subito in illa permanet figura, qua correptus est, stans scilicet, uel sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc pressos morbo, catochos, uel catochomenos, quasi dicas occupatos, detentosque; nominauerunt: recetiores affectum catochen, & catalepsin, ueluti detentionem, & deprehensionem. Curatio prædictis quidem est, sed pro symptomatum ratione quæ superueniunt, euariat.

Curatio

Curatio catochi.

Hic quoque malo sanguinis missione succurritur, praesertim quibus facies rubescit, modo vires suadeant: aut clysteres iniijciendi partim qui pituitam pollentem eliciant, partim qui bilem abundantem leniant: pari modo aliorum quoque praesidiorum usus erit. Similiter aegros nutrire cōfert, interim diebus singulis, interim uno interposito. Porro affectus admodum periculosus est, si ex quodam alimenti, aut potus errato acciderit, qui statim ad uomitum cogendi sunt, ac parciores uictu continendi, alius irritari, ac uiscera resperfusionibus ex cumino, ruta foueri debent. Qui ex ebrietate uitium conceperunt, crapula dissoluta, humidiores cibo tractandi sunt, qualis est ptisanæ cremor. Præterea caput inunctionibus accommodis per æstatem frigidis, per hyemem tepidis obducetur. Si crapula nequitiam fuerit soluta, neque ad sobrietatem reditus est, desperatae ualitudinis aegrum longe fugere oportet.

*De memoriæ iactura, & ratiocinationis, item de caro
hoc est, ueternoso sopore, et fatuitate. Cap. XI.*

Memoriæ iactura partim per se, partim etiam cum aliqua ratiocinationis offensa accidit: quemadmodum, & mentis seu ratiocinandi facultatis noxa priuatim prius accidit, deinde memoriæ iactura insequitur. Verum cum utraque pars malè fuerit affecta, fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur, causam habent communem efficientem, nempe intemperiem. Quod si humida solum fuerit, memoriæ & ratiocinationis uitium creabit, torpores graues, animi sopores, cataphoras Græci uocant, longos, altosque somnos. Si uero humori frigiditas etiam accesserit, caros & lethargos: eodemque modo si sola quidem fuerit siccitas, uigilias tantum inducit: si autem calor accesserit siccitas, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemperies hæ nonnunquam obueniunt humoribus, nonnunquam cerebri uentriculis, uel ipsius uasis: uel utique in humiditate insparsæ, uel in ipsomet cerebri corpore, uel etiam temporum musculis tali modo uitiatas. At si quando humiores cum ipsis fuerint mixti, similem quoque morbum inferent: uerum simplex, an composita sit intemperies, efficiens, ex specie excrementorum condiscis. Quod enim memoriæ,

memoriæ, & ratiocinationis iactura, frigiditati soboles existat, compertum habemus: ea uero humiditati ne, an siccitati iuncta sit, ex recrementis, ægri habitu temperatura, uictus ratione, anni tempore, & loco deprehendemus.

Curatio.

SI frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet. rursus si mixta cum siccitate, humectare simul, & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit si siccitas accesserit, pariter humectare. si humiditas, refrigerare simul & siccare. In quibus autem sanguineum humorem deprehendis abundantem, uenam aperire, uel clysterijs acribus uti consilium est. deinde etiam hiera exhiberi debet, & apophlegmatismis uti conuenit. Item inunctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant, exiccantque, rosæ dico, myrti, lentiscus, aliaque similia: necnon toti corpori prospiciendum est. Quod si ex æstu, & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxyrhodo perfundendum, tum reliqua curandi ratione frigida, humecta; uti conuenit: cum in alijs tum in cibo & potu. Quod si caros fatuitati, uel obliuioni accedat, huic etiam prospiciendum est, ut in lethargicis prius comprehendimus, ubi & ipsorum discrimen explicitum est.

De uertiginibus.

Cap. XII.

Vertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusque humor cerebrum occupat: unde leui occasione protinus etiam concidunt, ueluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, ut rotas, uertices uel, aut quando etiam ipsi circumaguntur. Interim uero etiam calfacti capite, cum humores in eo contenti, uel spiritus quoque commouentur: interim prioribus cerebri uentriculis, dum caluaria confracta perforatur pressis, in quibus etiam uehementes oboriuntur cruciatus. præcedit autem in eis, quibus caput primario afficiatur, uehementis in eo dolor ueternosus sapor qui καὶ ῥος Græcis dicitur, & aurium sonitus. & quidam sanè olfactu læduntur, quidam uerò gustu. at quibus ex consensu uentriculi oris uertigines accidunt & stomachi rosio, quam cardiogmon Græci appellant, & nausæ simul comitantur.

Curatio.

Curatio.

Vertiginosos in accessione quidem medicamentis quæ odore mouent idoneis, excitare cõuenit. Item frictionibus uti, & id genus alijs. Vbi morbus remiserit, eius amoliendi gratia sanguis primũ mittendus est: deinde purgatio ex hiera præstanda. Interposito tẽpore acri clystere ex centaurei. uel cucurbitaræ syluestris decocto utendum est. Secundũ huiusmodi uacuationes caput ipsum cucurbitulis ad occipitium cũ scarificatione lancinari debet, mox apophlegmatismi, id est, medicamenta quæ saluã per os eliciant adhiberi, & sternutamenta moueri. At quos capitis calor, auriumque sonitus male hẽt, ceu uaporibus calidiorib. per arterias sursum elatis, etiã arteriæ sectio retro aures ijs adhibẽda est: ut in parte chirurgica sumus dicturi.

*De morbo comitiali.**Cap. XIII.*

Morbus comitialis, cum totius corporis sit conuulsio, cum principis animæ functionum noxa, partim sanẽ in ipso cerebro, partim uero in uniuersis huius uentriculis causam habet constitutam: ea modo est humor pituitosus, modo melancholicus, prætereà etiam ore uentriculi affecto consortii lege oboritur. quemadmodũ in colicis quoque sicuti cum de illis agemus exequemur, uel certẽ aliis quoq; partibus contagionẽ impartientibus nascitur, cùm aura quædam frigidior ad cerebrum ascendit, aliàs à crure, aliàs à manus digitis. Insuper uisus est quandoq; prouenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset grauida: à partu autem cessauit. Occupat hoc morbi genus maximẽ pueros, eosq; adhuc paruulos. deinde uero adolescentes, & iuuenes, minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales inuitus corporis, animique status: tristitia, eorũ quæ perceperant obliuio, turbulentæ insomniorum imagines capitis dolor, eiusq; repletio continua ob iracundiam maximẽ, & pallor faciei, & inordinatus linguæ motus: nonnulli ipsam quoque commordent. Quibus autem à stomacho uitiũ oritur, etiam palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio: Iam ex inedia seu cibo tardius assumpto, irritantur. Vbi uero symptoma iam institerit, ægri derepente concidunt, conuellunturque: interdum etiam exclamant uoce nihil significante at eximia, peculiarisq; admodũ nota ipsorum existit, oris spuma: cum alia communiter aliis quoq; mor-

morbis eueniant. Non desunt quibus etiam urina & stercus præter uoluntatem excernitur. nonnullis & genitura. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessio-um cōtinuatione, & symptomatis, uehementia. In pluribus autem longus esse solet: eoq; si non in pubertate, uel mens- truis purgationibus, uel per cōceptum solutus fuerit, aut si post hoc tempus contractus fuerit, sæpe usq; ad mortis diem proroga- tur, nisi congruam medici curationem consequatur. Coarguunt comitiales suffimenta, bitumen, uel lapis gagates, uel cornu caprillum, iecur hircinum comestum & iecoris tosti odor.

Curatio.

SI infans adhuc fuerit qui ægrotat: nihil moliendum est. nam ætate ad biliosiores, siccioremq; statum trāseunte, & uictu moderatiore adhibito, sua sponte plerunque morbus finitur. Conuenit autem uictus etiam solum tum infantium, tum nu- tricum rationē habere. Qui uerò post annos pueriles in mor- bum hunc prolabantur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui oleorum aspergine foueri, uinciri & in rectum dirigi de- bent. Deinde ore distento digitus demitti, aut penna oleo iri- no uncta, pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamētis quæ naribus adhibentur sensum mouere conuenit, ut peucedano, cyrenaico liquore, bitumine, pice cedrina. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utiq; è cubito mittendus est. At si ni- hil remittat accessio, summæ partes sinapismo delinendæ sunt: cucurbitula autem præcordijs defigetur. Quod si nec his mor- bus comprimitur, minimum in medicina spei superest. nihilo se eius tamen medicus animo confidente castoreum necessita- te adactus, & liquorem cyreniacum cum melle & aceto ori in- fundet. in anum centaurei decoctum, uel cucurbitæ syluestris dabit. ubi ad se redierint ex morbo comitiali uiribus ante re- creatis purgatione ex hiera uacuandi sunt hæc sanè est recen- tis & acuti morbi comitialis curatio. Deinceps quomodo in- ueterato succurratur, trademus. Itaq; ægrotos aquæ potu con- tinere diu expedit. aggredientes autem curationem, si nihil ob- est, sanguinem dimittere. Interpositis quatuor aut quinque die- bus corpusculum reficere, & sic purgante medicamēto euacua- re, præsertim ueratru nigro, uel cucurbita syluestri, uel certe scammonia. Porro ueratrum sine medulla tunsū cribratumq;

PAULI AEGIN.

i aquæ

aquæ mulsæ cyathis quinque, uel sex inspargere oportet, aut melle discocto cum piperis momento excipere. Cucurbitam uerò syluestrem, semine eiecto, sed quæ medullâ referuet, passo implebis, finesq; totam noctem commadescere: mane passum auferetur potuiq; dabitur. Vel etiam medicamento ex ueratro albo purgationem molieris: quod hæc recipit: baccarum lauri purgaturum, piperis albi, alypiados, euphorbij, ueratri albi singulorum drachmas octo. Hoc totum datur cum passo quod in cucurbita syluestri pernoctarit, probe uacuat per uomitum. Vbi uerò sat purgati sunt, ægri balneo credentur. Tertio die in præcordijs & dorso cute scalpello incisa cucurbitulæ affigendæ sunt. deinde complusculis diebus interpositis corpusculum reficiendum est, & Hiera diacolocynthidos assumi debet, postea capiti & occipitio cucurbitula agglutinari. Sequenti die panis coctus in mulsa, tritus autem cum amaris amygdalis, uel serpyllo, uel menta, uel calamintha, uel ruta superdandus: atq; id per triduum continuabitur. ab hoc, caput radendum est, & peucedani liquore, ex aceto diluto, in quo spondylion sit coctum perungendum: rursus interposito spacio corpusculum reficitur: & antidoti diacolocynthidos oboli nouem ex aqua mulsa exhibentur: & interpositis diebus iterum tres ex antidoto offerre conuenit. Inde medicamentis uti quæ sternutamenta citant. post quinque decemue dies castoreum ex mulsa præbetur: tempore rursus interposito in aluum dabitur centaurei decoctum & cucurbitæ syluestris: ab hoc iterum hiera offerretur mox utendum ijs quæ sal uam per os & nares educant, deinde sinapismus capiti inducitur. iam etiam acrium ciborum esus conuenit, cū opportunitas est, adhibitus. Auxiliatur his etiã oxymel scilliticum quotidie potum, & mel, in quo scilla intabuerit, instar cochlearij assumptum. Victus autem ratio est quæ incidat, extenuetq;. Capparis igitur frequenter esus, & fassamentum prodest. Fugere oportet carnes, legumina, uinum copiosius, uenerè liberaliorem, balnea, sinapi, & potum statim à balneo, præsertim uini meraci. Exercitia prosunt & frictiones, sed capiti post reliquas omnes corporis partes adhibitæ.

De ijs qui stomachi uitio comitiali morbo corripuntur.

SI stomachus primariò affectus, morbum inuexerit, sollicitudo habenda est, ut ex facili æger concoquat. Panis igitur accurate

accurate elaboratus ex nino téperato quod leuiter astringat, albumq; colore sit ad horam tertiam assumi debet. medicamentum uerò ex aloe bis, ter' uel singulis annis dare his expedit. **V**idi autem quandoq; puellum (inquit Galenus) neutiquam hoc tentatum morbo posteaquàm radicem glycyldis (dicit autem pæoniam magnam recentemq;) ex collo suspensam gestaret. Insuper agaricum opitulatur comitialibus, idem præstat sèssili, spondylii fructus, radixq; aristolochia rotunda ex aqua pota, non parum huc fuit, & continua crurum scarificatio.

De ijs qui à particula quadam morbum concipiunt.

In uasuro quidem symptomate, ubi particulam cōmunicare morbum, senserint, siue ea fuerit manus, siue pes, siue excipi ualenter debet quæ superposita est. Cum autē remittit. recreare corpus oportet, adurens quoddam medicamentum particulæ inducentes, cuiusmodi est lepidium, & diacantharidos dicta similiaq;. Ad hæc oxymel Iulianum comitiales uehementer adiuuat, particulatim materiā emolliens. Post omnia cōmemorata & Theriace, & naturales balineæ locū obtinēt. per totum autem uitæ curriculum, cauenda maxime cruditas, cibus ante concoctionē obitum, isq; crassi succi, tarda cibi assumptio, corporis exagitatio, uinū largius & potus à balneo, sicut cōprehensum est, maxime, meracus, præterea ualde uetusta, crassaq; uina, tū acria ex his quæ odore mouēt, & caput replēt, icōueniēs ē sublimi cōspectus, in balneo mora, & capitis ex sole exustio.

De melancholia.

Cap. XIIII.

Melancholia mentis quædam alienatio est sine febris, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentē occupauerit: alias cerebro ipso per se ægrotante, alias totius corporis consensu immutato. Tertia uerò melancholiæ species est, quam flatulentam & à præcordijs hypochondriacā appellant, ob inflammata circa stomachum præcordia proueniens. quæ modo aurā quandam maligniorē, modo substantiæ humoris partē ad cerebrū sursum transmittāt. Cōmunia omnium signa sunt, merus, tristitia, homines auersantur, alij se cedunt animalia quædam bruta esse, & uoces ipsorum imitantur: alij uasa fictilia, metuuntq; ne rumpantur. adhæc mortem hi experunt, illi eandem expauescunt, nonnulli semper rident, nonnulli plorant. Alij uerò putant à maiore quādā ui se inua-

di, & uaticinantur futura, non aliter quàm uates & diuinaculi quos græci *ἐνθεαδικοί* proprie nominant. Peculiares autem notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus, uel natura, uel etiam ex acquisito per sollicitudines quasdam, aut uigilias, aut prauorum ciborum esus, aut hæmorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex præcordijs melancholici existunt, eos testantur cruditates, acidi ructus, ardor, & ipsorum grauitas, tum quòd præcordia sursum conuellantur: interim etiam inflammatione conflentur. Adhæc quòd incipientibus, deinde maioribus effectis melancholica comitentur symptomata. quodque hæc leuentur, concoctione, uel alui excretionem, uel multis flatibus, uel uomitu, uel iuctu. Cum autem nullum ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrum primario affici in totum succi contagione melancholici fatentur. Porro si quando flauæ bilis supra modum exustæ in nigram fiat mutatio, insaniam, dictam græce maniam inferet, ob quam ferarum modo efferuntur insani, ut etiam eos qui imprudentius ipsis occurrunt, manu uiolenter tractent.

Curatio melancholice.

Qui igitur ex primario cerebri affectu melancholici sunt, crebris balneis, uictu boni succi & humido curantur una cum decet animi delectatione, sine alio præsidio, cum certe humor qui molestat nondum ob temporis longitudinem excerni cõtumax est, quãdo etiam ualentiora magisque uaria tentare oportet remedia. Itaque purgentur per initia epirhymo, aut aloë. Nam uel pauxillum ex his sumptum quotidie maxime iuat, & leuiter aluum subducit ubi uerò purgati fuerint, uti dictum est, absynthium propinabitur: nunc quidem herba ipsa in aqua macerata cocta; duorum cyathorum instar, nunc autem eius succi drachma semissis, cum aqua continue liquefacta. Aceti quam acerrimi modicum sorbitioni datur somnum inituro. Iam multa obsonia in id intincta, esse conuenit. præstantius autem fuerit aceto mixtam esse scillam, polium, & tenuem aristolochiam. At cum morbo quidẽ incipienti ex totius corporis affectus cõsortio, ut supra dictum est, incidis, corpus autẽ, uiribus constet, à sanguinis missione incipiendũ est: post hanc, uiribus

buis recollectis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucurbita syluestri, tū eo quod constat nigro ueratro, ac si hæmorrhoidibus, aut mensibus suppressis malū fuerit concitatū, illas adaperiemus, hos proritabimus. Laudantur etiā facultates, tū quæ urinæ ciendæ sunt, tū quæ per sudores purgāt. Sin autem præcordiorū offensionī morbus debetur, & horū habenda erit sollicitudo: ac fouebūtur ipsa decocto rutæ, anethi, absynthii, pulegij, agni seminis, & fructus lauri perfundēdo. Hæc etenim dolores quoq; leniūt & flatus discutiūt, oleo incocta, & sic affecta parti applicata. Cæterū præter hæc insint, cataplasmatibus etiā ea quæ flatibus discutiēdis faciunt. nēpe apiū, uel anisum, uel cuminū. Nil mali fuerit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam rosamarinum uocant. Cum & hæc admoues longū tēpore per diē & pasto & ieiuno adhærere fines. Vbi ademeris, aliud quoddā operimētū super accommodato, lanam scilicet latiorē Cucurbitulis ad flatus digerendos leuibus utitor: ad dolores uero inflammationesq; cū scarificatione. Porro adhibita curationi diligentia, nec sinapi obliuiscere, sed acribus sinegmatis, & dropacibus super dorsum, uentremq; uti conuenit. Quibus uitiū inueterauerit præsentissimum est remediū etiā citato per ueratrū albū uomitu purgatio. Victus oībus melancholicis conferet probi succi, & mediocriter humectās. Vitāda sunt, caro bubula ceruina, lenticula brassicæ cochleæ, uina crassa, & nigra: breuiter, quæ atrā bilē generant.

Curatio insaniæ.

Insanientes cōsimilē melancholicis curationem recipiunt. Propriā uero habēt, ut caput ipsorū tum rosaceo tum oxyrhodino perfundatur. Itē ex antidoto picra purgabimus, uerū sanguine prius misso: nec non hirudinibus in capite utemur. Vnicē ipsos iuuat hippomarathri radix, semenq; eius ex aqua potum. Insuper Brioniæ radicis drachma ex aqua quotidie assumpta. Sin autem delirantes purgantium medicamentorum potionē renuāt, misceri debēt ea nesciētibus ipsis, cibis nempe buccellis uel ficubus pinguibus, uel palmulis, interdum uero potionibus adiicienda sunt. † Ante omnia uero aut in lecto uinciendi, ne & sibi, & iis quibus incidunt mali quippiam inferāt: aut gestandi grabato intra lecticam quandam insaniētibus. *peculiarem* γέγραδον græci uocant, ex alto pensili.

† Plura leguntur in nostro codice, ita enim habet, πρὸ δ' ἐνέ-
παντων κρατέουσιν ὑπὸ τινῶν παίδων, ἢ σκιδεσμέουσιν, &c.
id est, ante omnia contineantur à seruis aliquot.

*De incubone, qui ephialtes græcè dici-
tur. Cap. XV.*

EPhialten, qui latinis incubo est, aliqui à uiro dictū asse-
runt, uel inde q̄ hoc malo correpti ceu insipientē ali-
quem se imaginentur Themison autē decimo episto-
larū uolumine à suffocando forte, Pnigalionem appellauit, Cō-
stituitur id uitij ex crapula, & cōtinua stomachi cruditate. Co-
mitatur eo detētos difficilis morus, torpidus in somno sensus,
suffocationis imaginatio, & ueluti quodā super incidente, op-
pressio, ita ut exclamare nequeāt hoc detēti, aut uocē edāt ni-
hil significantē. Nōnulli uerò etiā audire sæpe eum qui super
ipso incidit, ac uenerē exigere imaginātur, sed cōtractis eos
digitis fugere. Cura itaq; habenda est mali per initia, nā si diu-
tius prorogetur, continuē per noctem incidens, magnū aliquē
morbum nunciat, ut apoplexiā, insaniam. & morbū comitiale,
cum in caput huius uitij causa ferri cōeperit. Quæ enim comi-
tiales interdū, eadem ephialtici dormientes noctu patiuntur.
Itaq; cōmodū est sanguinis detractione & purgationibus uni-
uersum ægri corpus uacuare. Maximè his opitulatur, nigri ue-
ratri diachma, cui scammonia oboli tres sint adiecti, & non-
nulla ex odoratis, anisum, daucū, petroselinū. Iam hiera diaco-
locynthidos, strenue auxiliatur: est aut ea quæ ad Rufum au-
thorem refertur. Victus porro sit tenuis, nō qui inflationes pa-
riat. Succurrit ipsis & pæonia semen. Dandaq; continuē sunt
potui ex aqua grana eius nigra quindecim contrita.

De lycæone, uel lycanthropia. Cap. XVI.

Qui lycanthropia detinentur, noctu domo ægressi, lu-
pos in oībus imitātur, & donec dies illucescat, circa
defunctorū monumēta plerunq; uagātur. Hæ comi-
tes ipsoꝝ notæ sunt, facies pallida, oculi ad uidēdū imbecilles
& sicci, lingua aridissima, nulla in ore salua, sitis immodica, ti-
bia q̄ frequēter impingāt exulceratæ, adeo ut sanari nequeāt.
Tales quidā sunt notæ: speciē uerò melācholia lycanthropiā
esse existimare cōuenit, curādumq; in accessionis tēpore, san-
guinis ex uena ad animi usq; defectū detractione: item, cibis,
probi

probi succi, æger, & balneis dulcis aquæ sustinendus est. Deinde lactis sero per triduū usus, etiam hiera diacolocynthidos, bis tæue purgabitur. à purgationibus, Theriacè quoq; ex uiperis assumet, ac alia reliqua in melancholico affectu cōmemorata. Inuadenti iam morbo, asperginibus somnū accersere cōuenit, in id efficacibus, ubi somnus accesserit, nares opio illinuntur.

De amantibus.

Cap. XVII.

A Mores cerebri affectibus annumerare cū sint quædā cura, haud fuerit absurdū. Cura uero affectus est animi, ratiocinatione in motu laborioso occupata. Hæ sequaces amantiū sunt notæ. Oculi cōcaui nō illachrymant, sed tanquā, uoluptate pleni apparēt, cōtinens palpebrarū motus, & cū reliquæ corporis partes nō collabantur soli hi amantibus cōcidunt. Pulsus ipsorū propriè nullus est, ut quidā opinati sunt uerum, qualis eorū deprehenditur, qui crura cōficiūtur. Cum uero id quod amatur in mentē ipsis uel auditu, uel uisu, & præsertim repente uenerit, tūc pulsum animo turbato cōtingit immutari neq; naturalē æqualitatē, neq; ordinē retinere. Hos igitur & trister, & uigiliis torsos nōnulli qui dispositionē ignorarēt, balnei abstinentia, solitudine & tenui uictu consumpserunt, in quibus sapiētiores cū amantem deprehendunt, ad balnea, cōputationem, gestationem, ludos, fabulasq; animum abducunt. nonnullis merum incutere conuenit. Nam qui amorī semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, pro ratione uitæ quam singuli delegerint. In uniuersum mens ad alias curas abducenda est.

De apoplexia & hemiplagia, uel paralyfi.

Cap. XVIII.

Q Vando commune quidem neruorum principiū affectum est, eoq; omnes corporis particulæ motum simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur ita ut pariter principis animæ functiones sint oblesæ. Sin autem in altera capitis parte obstructio fuerit oborta, hemiplagia & paralyfis nominatur. Si uero unam quandam particulam talis noxa occupauerit, illius affectio particulæ dicitur. Quippe Hippocrates memoriæ prodit, apoplecton hoc est resolutum ipsi crus euaserat. Seruatur itaque in apoplectis modica quædam respiratio, quæ si permultum à naturali

naturali functione recesserit, maximam esse affectionem putabis si paululum, exiguam. Deterrima uero est respiratio, cum intermittitur, uel etiam ubi magna cum uolentia trahitur. Origo uitij est ex frigidioris pituita, quae principalissimos cerebri uentriculos uniuersae & subito repleat. Sin autem spinalis medullae principium quandoque totum huic conflictatur malo, omnes faciei subiectae partes resoluuntur, ipsa manente incolumi, eo quod sensum motumque partes quae ibidem habentur a cerebro excipiant. Si dimidia ipsius regio infestatur illarum partium resolutio quae dicitur paraplagia constituitur. Si odoratus uitiatu fuerit, uel ad priores cerebri uentriculos intemperie expertos, uel ad meatus ossium quae a percolando ethmoide dicuntur, obstructos, talis referetur affectio. Itaque iacet apoplecti, uoce inter mortua, sensus motusque expertes, citra febre. Praecedit hoc mali, capitis subitus, acutusque dolor, uenarum circa guttur extantium, sphagitidas Graeci uocant, toruli eleuantur, tenebrae oculi offunduntur: itemque splendoris eisdem oboriuntur, & extremarum partium sine ratione algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiendum stridores, urina ueluti aëruginea, atra, modica, & farinae crassiori similia subfidentia quaedam refert. Accidit autem hic affectus circa aetatem senilem temperaturis pituitosioribus, uictuque tali usis. At si iuuenes, & per aetatem infestet, magnam necessitatem fatetur.

Curatio.

A Poplexiae morbus, nequaquam, aut raro curatur, ut qui mortem minetur praecipite. Si uero etiam discussa fuerit, plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex uena detrahendus est, & sicubi remissionem quandam habuerint, detrahere conuenit eadem die, aut sequenti, alium autem acri clystere ex muria & melle comperatis ducere. Dein oleo copiosiore sulfurato totum corpus perungere, caputque chamemelino, uel anethino oleo, in quo spondylium decoctum sit uel calamintha: mulsaque instillatur, & ea quae odore mouet, naribus admoventur, uti opopanax, uel sagapenum, & galbanum, uel castoreum. Oporteret autem & ori per uim aperto digitum, uel pinnam oleo madefactam inferere, ut ea quae ipsi inhærescunt, eiiciantur. Cæterum sedes etiam iis quae flatu educunt, perungenda est: mulla uel oxymel

oxymel potioni dabitur Quinetiā apophlegmatismis ex thymo, uel origano cū aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibis mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si uox nondum redit, & uires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione deligentur: si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto penfili. assumi etiam debent crebrius quæ sternutamenta excitāt, & apophlegmatismi. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducentur. Caterum sermonis etiam sollicitudo habenda est. uetus apomeli cum micis panis, uel alica dabitur: mox paxillum ex hiera. Post uigesimalium primū diem balneo ægroti credentur. † Vinum tenerū calente aqua temperatum potui exhibebitur: ac reliquo tempore uires balneis & unctionibus reficiendæ sunt: degent autem ægri in locis si fieri potest, mari uicinis.

† Melius hic locus descriptus est in ueteri καὶ δινον παλαιὸν ὅσοι μὲν πίνειν, id est uinum uetus &c. quanquam hæc admodū leuia sunt cum nemo tam stupidus sit qui δινον ἀπαλὸν nunquam dici non sentiat.

Curatio resolutionis, quæ paresis dicitur.

AT si principis animæ functionibus liberis, omniū particularū aut quarundā remissio acciderit, etiā hic qui molestat humor, qualiscunq; ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoq; pars sit adiecta, dabitur: per initia drachma semissis, cū tantillo mellis, & aqua calente soluta, uel per se, piperis quoq; dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc una & semissis, postea duæ, atq; tres. Rursus totidē diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri uires sustinent, offerentur, mellis adiecto cochleario. Particulis autē, medicamēta quædā discutiētia, & ea quæ cutē possunt cruentare, imponūtur: addendo simul castoreum, aut piper, aut pyrethrū, aut cachry, aut euphorbiū. Prodest etiā eis oleū rutaceū, uel sycioniū, uel uetus superfundere. Cibi cōueniunt frumētacei, sorbiles, uel alioqui ad cōcoctionē expediti: nec recremēticei. Cucurbitulæ remissis partibus agglutinātur, si multæ fuerint, distinctim, si paucae, uni: post cucurbitulas delinūtur medicamēta ex pice, uel resina, uel manna. optimē autē facit cū artemisia simul incocta calamintha, & cunyla,

cunyla, & nitrum ex aqua modica, quæ inter coquendum absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe, uel polypodio, uel scammonia, uel ex pulve diacolocynthidos. unctio uero accommodata λιπαρματα græci à pinguitudine appellant, huiusmodi habentur uetus oleum, in quo scilla quadraginta diebus sub sole intabuerit. Si huius copia nō est, duas scillæ uncias in oleo coquito, illinitoq; uel cachry similiter præparatū, miscenda uero & ceræ uncia, ne illita diffluant. At si galbani, castorii, euphorbii, adarce, & nitri singulorum unciam semissem acceperit, multo erit medicacius. appositu etiam cōuenit. ranunculus herba incocta oleo, in quo per insolarum intabescat. Portiones erunt castorei circiter drachma: opopanax succus fabæ instar deglutitus. Mirificè facit etiā sagapenon ad erui magnitudinē, ex mulsā & castoreū cū opopanace. itē liquoris cyrenaici milij instar. Auxiliatur & antidotum ex triplici pipere, quod dyatrion pipereon dicitur græcis. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & apophlegmatismis. Post diē quartumdecimū solidioribus uti cibus expedit, & auxilio multum proficiēte, in balneū deducere. A trigesimo dropacem adferre cōuenit, & balineis cōmittere: reliquo tēpore sinapi cataplasmatibus modo obducere, in quibus & motus & sensus perit: attēdentes ne ideo quod nō sentiūt magis q̄ par est uratur. In iis aut qui sensus cōpotes sunt, cutis ruborē dūtaxat oportet excitare post tumorē factū ad lauacrum mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus à cœna cōueniet, & is qui radiculis assumptis cietur: item gestationes, sella, aut lectica, aut uiculo: postea ducetur ad balnea naturalia. Victus siccior utilis est, potio modica, & frictio. cibos igitur siccos esse debent, sitim quantam possunt sustinentes.

De iis qui laxatione, aut distentione resoluti sunt.

Quoniam resolutæ partes uel conuelluntur, uel laxantur: idq; uel à repletionē, uel inanitionē, attendendum rursus est, partim etiam sanguinem detrahi debere, partim nō. Deinde in relaxatis quidē mēbris adstringentia, iis quæ laxant miscere, & frictionē intensam moliri cōuenit. In cōtrariis, laxantibus dūtaxat utendū, frictione simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri paulū & fēcule cōtritū adiciat. foci erūt ex aqua uehementer calida, & potissimū marina, in qua decoctæ sint lauri, uel uicicis germina, uel samucus, uel aliquid huiusmodi.

modi. Si aut æstas fuerit et natationes in mari: rubores autem in cute excitati his maximè cōferunt. Itaque cedantur et particulæ ferulis, uel urticæ ramis. Quod si perleueret resolutio, carnem, quæ intra articulos resoluta est, attractam ferris oportet candentibus exiguis tenuibusque transmissis adurere. Cōtractis aut membris dropacem continuè superiicere commodum est.

De resolutione quæ unamquamque particulam obsedit.

QUæ à nerui diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est: quæ uero ab intēperie, uel humore quodam cōtrahitur, cōe quidem ex remediis cōmemoratis præsidium recipit. sunt aut peculiaria quædā singulis ipsoꝝ dicata, quæ subiungemus. In iis igit qui canū more cōuelluntur, æqualiter in oppositū capistrò appellato deduces. Profuerit etiā sanguinis detractio, ex uasis linguæ subiectis: itē cucurbitulæ priori uertebræ defixæ, tū apophlegmatismi & per nariū clysterem facta purgatio. Sciendum itaque est nō eam maxillā quæ peruersa esse apparet, sed oppositā resolutione infestari. Gutturē autē resolutō, cucurbitulas mēto agglutinabis, perungesque medicamentis ex castoreo, sagapeno, & liquore partico. auxiliatur et gargarizatio ex acribus. Vbi lingua resoluta fuerit, uenæ ipsius incidendæ sunt, cucurbitulæ mēto admouendæ & apophlegmatismis ex sinapi utēdum est, & linguæ exercitiis. Si uocis instrumenta resoluta sunt, thoraci præsidia adhibēda sunt, spiritus retentione, & uociferatu utēdum. In superciliis aut palpebrarum inunctiones similiter profunt, iam & sutura proficit. Vesica uero resoluta siue urina impediāt, siue præter uoluntatem excernat, inferiori uentris ab umbelico regioni, & ei quæ scrotum & anū intercedit medicamenta applicanda sunt: sedi aut immittendū est oleū rutaceū, uel sycioniū cū butyro, castoreo, galbano, uel opopanace, uel liquore silphii: uesicæ porro hæc per colem trāsmissa ualde profecerūt, uel sola etiā suffecerūt: ex centaureo autem, & colocynthide cum sycionio clysteres etiam intestinis utiles sunt, benefaciunt & medicamina urina cientia potui data, & castoreum consimiliter. In primis iis, qui nihil urinæ reddunt, per rectos siphones, quos catheteras dicunt, in uesicam medicamina infundentur. Præterea laxantibus insidebunt, & eisdem cataplasmatibus forma oblinentur.

Qui

Qui præter uoluntatem urinam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibis siccis, potione frigida utentur: ubi se recolligunt, summæ cutis ad ruborem usq; exasperatione, & lauacris sponte prouenientibus frigidis utentur. Eos aut qui resolutionem experti sunt ob spinæ uulnus, aut casum, aut uertebrae luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatetur, symptomatis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, iis quæ in uesica dixi, utendum: in eisdem partibus & lumbis: item quæ intendendi uim habent, usurpabimus. nō cōuenit autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ, aliaq; olera. Longanone uerò soluto, in quo nōnunquam citra uoluntatē stercus erumpit, nonnunquam cohibetur iisdem uti par est: interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti: aliàs astringentia, ut cupressi decoctum, lentisci, rubi: laxantia, ut adipem suillum, & anserinum, uitulinumq; & oleū: interdum rodentia, qualis est muria, uel cucurbitæ syluestris, uel similibus decoctum. Neq; enim quicquam sic motum promouet, ueluti uaria agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acopon oleo dilutum per inferiora inditur. Artus autem resolutionem experti, cum communi curatione flectantur, perfricentur, extendanturq; in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

De resolutione ob colicum dolorem contracta.

Nostra ætate colicus quidam dolor inruduit: ex quo præsertim superstites futuros consummata artuum motus priuatio comitabatur: tactus sensu, ut uidebatur, incolumi seruato, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, unde motus plerisq; spatio temporis sponte rediit. Qui uero difficiliore curatu extitere. etiam simplicioribus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. præcipuè autem efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum: item quod abiete constat. Sed quæ roborandi uim obtinent, ac modicè refrigerant, multis præclare opitulata sunt.

De conuulsionibus.

Cap. XIX.

Postquam de resolutione tractauerimus, proximum est, ut de cōuulsionibus agamus quoniam neruorum uterque affectus est: quare etiam de tremoribus dehinc dicitur. Cū igitur statim ab initio, uel nō multo post morbi principia

cipia ex orientes conuulsiones longius prorogantur, ex repletionem ducunt originem. Vbi uerò sudores largos, aut uomitū, aut deiectione, aut sanguinis profluvia, aut uigilias, & aut famem, aut motus, tum multos, tum uementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem cum fieri necesse est. At si uniuersum corpus, neruiq; ex febribus perardentibus inauerint, ac deinde ob siccitatem conuellantur, maximum sanè hoc malum est, & propemodum insanabile. Primum itaque partes quæ contrahuntur, ualenter uinciendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo, aut sycionio, aut ueteri, aut quodam ex hoc genere: tum aquā mulsam potui præbere. Eos autem qui ex inanitione conuelluntur, oleo, uel hydrelæo calido fouere competit, si nihil prohibet etiam ad lauacrum deducere, temperatoq; folio uti, cum oleo & frictione leuissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro & alica, unioque tenui & quod facilè distribui possit, aquoso, nisi febris adfuerit: tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumque accersemus. Iam uerò ex plenitudine, aut inflammatione, contractas conuulsiones curabis, si copiam euacues, inflammationem uerò proprijs ipsi præsidijs discutias. sit etiam conuulsio, cum uementes uehementius turbantur. Succurrit autem conuulsis acanthij radix, spinæ albæ, & ægyptiæ semen epotum, nonnulli centaurei tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui non modo potui dato castoreum, sed etiam à fortis cuti unà cum sycionio ilinito. Si uero malum hoc modo non finiatur, cucurbitulas cū scarificatione ad mouere prodest: si crura contrahantur, coxis, & postremæ uertebre: si manus conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius uertebre, tum ei quæ humeros superiacet. In uniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahuntur, graue symptoma existimandum est, quòd maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ uideantur. In his itaque sanguinis ex occipitio, & primis uertebreis detractio rectè adhibebitur.

De tetano eiusque differentijs. Cap. XX.

Tetanus, cum & ipse conuulsio quædam sit, procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, à frigido humore

re intus & foris infixo ceu congelatis: ideoq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verum cū particulę corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cum in posteriora, opisthotonos: cum in alterutram partē æquali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc uitia tētionem uocat, & contensionē musculorum ceruicis, neruorumq; , per quos caput inclinatur, tenuit & circumuoluitur. At si circa posteriores ceruicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si utrinque, tetanus nuncupatur. Causam tribuit musculis repletis spiritu, & aere crasso, nebulosoq; : quem impense frigidum, & concretum, eoq; ad motum contumacem affirmat, unde etiā sicca potius quā humida fomenta malo prehensis conuenire. Hæ quidem tetani differentię sunt. Curatio autem in his cum communis quædam sit, non euariat. Optimum itaque præsidium ipsis est febris, quæ per initia non fuerit, superueniens. Notæ horū sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescunt, adhæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, cum bullis quibusdam: item aluus succescit, uigiliæ magis urgent, crebroq; à conuulsionibus periculum est, ne lecto ægri excidant, quinetiam singultire incipiunt: indolentq; , alii capite, alii clauiculis, & lumbis, quidā ipsorum subtremuli quoque euadunt. Porro facit affectū (quamuis raro) lassitudo, humi dormitio, pōderis eleuatio, casus, uulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandē neruis offensam inferre possunt. Curatur, quo modo conuulsionem ob inanitionem generatæ, solent.

Curatio tetanorum.

Quibus ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo madidis sycionio, castoreoque cum ueteri contegendæ, aut uesicam quoque latam calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admouere, cum lancinatu. leues enim noxam quoque inferunt, item ceruicibus nonnunquam cucurbitulæ defigētur, & utrique spinæ parti, adhæc pectori, quā est musculosius, & præcordiis: interim uesicæ regioni, & renum. Porro liberaliter sanguinem auferre conuenit, modo non uniuersim id fiat, sed particulatim & per uices. Sudores lanis oleo madentibus

tibus abstergere, ne imprudentes refrigescant. Quod si tetanus in uetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere confert, non tamen diutius immorari: quippe in oleum descensus, maximè uires conuellit. Potus erit hydromeli spissus ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent. sin minus, tres obolos, uel minimum, obolum. At si quis ipsum ceu stomacho inimicum habeat suspectum, ammoniacum quoque exhibeatur, uel liquoris cyrenai ci instar erui discocto melli circumlitum deuoretur, & laserpicii radicis duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, uel ipsius decoctum exhibentur, uel myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopi quæ decocto: sed omnium securissimum expeditissimumque est duo, tria uel castorei cochlearia, partita ipsius quantitate, & per uices data. Non enim offendet etiam si secundum cibum ex eo quid exhibeas. Potus uerò ipse præter alia tum paulatim, tum modicè assumetur. Nam dum ægre potionem transmittunt, in nares ipsam propellunt, unde uehementer turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus iniicietur. frigidæ superfusionem, cum sit (quemadmodum ait Hippocrates) maximè temeraria, & eo quæ posteris, credo, uituperata, & nos damnamus, deuitemusque. Unguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ uncia duæ, folii, amomi, styracis, mastiches singulorum uncia: castorei, adaracæ, euphorbii, piperis singulorum uncia: spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

† Hæc ita scripta sunt ueteri codi. τὴν δὲ τῆς ψυχρῆς κατὰ χύσιν, ὡς ἰπποκράτης φησὶν τολμηροτάτην εἶσαν καὶ διὰ τὸ τοῖς μεταγενετέροις οἶμαι, παραλειφθεῖσαν, frigidæ autem affusionem (quemadmodum Hippocrates ait) quum maximè temeraria sit, & ob id à posteris prætermissa utamus.

Potio opisthotonicis accommoda.

PAnacis radicis, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur cicerculæ modo somnum capturis: benefacit etiam orthopnæicis. Porro uictus erit tenuis, qui expeditè distribuatur, & recrementis omnino uacet.

De

Tremoris origo in uniuersum quidem ex neruorum imbecillitate est, quod ætas senilis palam testatur: priuatim uero plures causæ ipsum efficiunt: nempe frigida in temperies, frigida potio, & præsertim in febribus intempestiue assumpta: frigidi, glutinosique humoris redundantia, & uini usus liberalior. Qui igitur ex erroribus commissis manifesto tremunt, à noxijs abstineant. At si perseverat etiam in febribus tremor, primum corpus totum oleo sabino perfundatur: ubi autem accessiones remittunt, ueteri, aut sycionio: summa uero corporis membra lanis mollibus prius tamen præuncta contegantur. Deinde cucurbitulæ à priori uertebra usque ad spinam, lumbosque agglutinentur, sic ut particulæ prius cū præcordijs cruda hordei farina ὀμάλυσιν Græci uocant, delinantur. Iam hæ quoque partes lanis ex ueteri, aut sycionio oleo respersi operiantur. Quod si febres inueterauerint, die uno interposito in oleum, aut hydrelæum tremuli descendant, utanturque frictionibus mollibus. Si longius prorogatur dispositio frigoris suspicione, mulsa, castoreumque potui dabitur, & calidis locis gestari debent. Cibus diductu facilis offeretur, primum sorbilis, mox uolatilium, & piscium, qui molli carne sunt præditi: febribus solutis lauandum est, sed uitari debet frigidum solium, uinique potio. Porro si crassorum, uiscosorumque succorum copia fuerit, uti conuenit iis quæ incidunt, extenuantque, uerbi gratia, rutæ ramusculo, spondylii, quantum tribus digitis comprehendi possit, castorei, & nitri singulorum obolis duobus: Datur quotidie cochleare unum cum oxymelite ad tres usque dies ieiuno, uel panacis, & piperis grana quinque ex mulsæ cyatho. Simplicia præsumpta trementes adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, althææ radice decoctum, damassoni foliorum drachmæ quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zosymi unguine, item acopis ad resolutionem conscriptis, unctionibusque & cutis ad ruborem usque exasperatione, phænigmon Græci uocant, utemur: præterea exertitijs, perfricationibusque. uero qui ex uini potu tremunt, uinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fuerint liberati.

Ocula

Ocularia, & primum de dolore ex Galeni commentarijs. Cap. XXII.

CUm in oculis uehementiores oboriuntur dolores, cōsiderato, quanā ex affectione corporis dolore ipsis in inflammationibus accidat. Vel. n. dum ab influentiū acrimonia uehementius eroduntur, uel quia tunicæ succis repletæ tenduntur, uel quod crassis succia, aut spiritibus flatulentis quodāmodo intenduntur, graues in ipsis dolores oboriuntur. Rosiones igitur purgantibus curare præsidij, noxium humorē uacuādo par est. item cādido oui liquore in oculos infuso. Vbi uero concocta iam fuerit inflammatio, corpusq; superfluis uacuum balnea ipsis aptissima sunt. Ex repletionē autē contractas inflāmationes sanguinis detractione, alui ductione, & parim inferiorum frictione persanare conuenit. Intensiones autem, toto prius corpore uacuo: item humoribus qui sursum tendūt, ad inferiora reuulsis, deinde loco iniectis remedijs, quæ discutiendi facultatem habeant. fomenta itaq; adhibenda ipsis sunt, & fœnugræci decoctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus oculorum uenulas intendit, sic tamen ut corpus totum plethoricam affectionem non præ se ferat, uini usus est, quod possit excalfacere, uacuare, & meatus aperire.

De perturbatione, & lippitudine quam proprie ophthalmiam græci uocant.

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, non ex corpore, sed ab externa causa aliqua proueniens, ut à sole, fumo, puluere, oleo: quare etiam occasione ipsius separata, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: uerum non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perque tres quatuorue, aut quinque dies plerunq; durat. facillime descutitur, si obseruentur oīa quæ foris accidētia turbare lumē possint, itē parciorē cibo, aquæ potu, aut inambulatione, & alio ex facili respondente.

De inflammatione.

Cum inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis uacuationem, perungendi sunt ijs quæ impetus humorum possunt repellere, & irritationem lenire, quale est, quod ad Neilum autorem refertur, diarodon, uel etiam Me-

PAULI ÆGIN.

k diacum.

diacum, Nardinumq; Vbi membrana adnata inflammatione ten-
tatur, medicamentis utemur, quæ græci ab uno die monemera
uocant, cum oui cādido infusis. Die insecuto nisi inflammatio
crescat, nardino delinentur: fotu ex meliloti decocto uti conue-
nit. ubi uerò crassus humor est, qui lippitudinē facit, medicamē-
ta accommodantur, quæ neq; infarciendi uim habent, emplasti-
ca græci uocant, neq; humores incrassent, sed quæ diffundere,
humectare, & excernere idonea sint, quale est Chiacū. At si hu-
mores in capite fuerint impacti, cucurbitulā occipiti admoue-
re oportet, uel scarificare, nel hyrudines fronti qua oculus dol-
let, adhibere, panemq; purum aqua maceratum cū modico ro-
faceo, aut polentis incoctis capitū papaueris decocto, similiter
cum rosaceo, superdare. efficaciore autem utendū est cataplas-
mate, ex croco, melilotis, palmularū carnibus, teneris corian-
dri folijs ouorum luteis tostis micis panis in sapā intinctis, ro-
facei momento, & papaueris capitum contritorū decocto. In-
terdum semen quoq; ipsius ad leniendū dolorem miscetur. Si
magna doloris necessitas est, etiam opij paupillū adijcitur: ubi
dolor abest, stupefacientia græci *ναρκωτικὰ* appellant uitari
debent. Quòd si mediocri inflāmatio infestet, aloen per se, uel
aqua uel oui albo dissolutā illinito. ut autē expeditius sit auxi-
lium, croci drachmas sex, aloes drachmas sedecim, gūmi drach-
mas nouē coniecta in unū aqua pluuiali excipito, fingitoq; col-
lyria. † Iā quæ uocantur diacrocu lippitudinū initiis sunt ido-
nea: in quibus uerò tumor œdematodes hoc est mollis cedens-
que & exalbidus habetur: tū circa palpebras, tū membranā ad-
natam sine tunicarū offensa, benefaciunt etiā liquida collyria
(Græci hygrocollyria uocant) & ex croco, & atramento futo-
rio & melle præparata. hoc autem est laudatissimum.

† Aliter hæc leguntur in antiquo exemplari, καὶ τὰ διάκρο-
κα δὲ προσαγορεύονται πρὸς τὰ τραχὺς ὀφθαλμῶν εἶσιν ἐπιτή-
δεια, id est, quæ diacroca appellantur oculorum conturbatio-
nibus sunt accommodata.

*Liquidum collyrium quod dolorem leuet ano-
dynon appellatum.*

CRetæ sutorie, mellis attici, succi fœnigræci singulorum pæ-
res portiones incoquito, donec mellis spissitudinem ha-
beant. deinde specillo duos angulos attingito.

Ad

Ad defluxionis impetum, qui epiphora græcis dicitur.

AD fluxionum impetus, per initia quidem conuenit inedia, Aquæ potus, & multo magis ueneris abstinētia: Aluus sub duci, facies posca aquosa collui debet. præsertim si feruens fuerit fluxio. sin minus, atramento sutorio cum melle frons & palpebræ delinantur. Nonnulli atramentū sutorio aqua dissolutū ad collutionem exhibent. Porro qui defluxu citra inflāmationem uexantur, uel etiā cum inflammatione quidem, sed ita ut supra os caluariæ affectus consistat, agglutinamentis utendum est in frōte: simplicibus sanē, uiridibus uitis folijs, uel rubi succo, uel portulacæ, uel cotoniorū cum polēta tenui, uel galla leui cum uino, & polentæ polline, uel cicuta, uel psyllio cū aqua, uel solano, uel cochleis cū testis suis in puluerē redactis, à tempore ad alterū tempus illitis: In uniuersum iis quæ astringunt, refrigerantq; Compositis autē his: pollen frumētaceus, & myrrha, uel thus cū oui aquato illinat, uel samia terracū myrrha, & manna similiter ut oui albor inungetur. In frigidioribus autem humorū cursibus sulfuris uiui, bituminis, picis, colophonix singulorum drachmæ duæ. item Musæ pastillus, & Aster, similiaq; probe repellunt. Iam uerò Theriace uino astringente dissoluta, fronti q; illita frigidos humorum influxu, sistit. quinetiam eadem pota uehementer his succurrit. Ipsi uerò oculo, lana, aut panniculus tenuis, oui albo madens imponitur, item caseus recens similiter oculo applicatus, acres maxime influxus cohibet. tum collyria à reprimendo dicta staltica, si illinantur, instillanturq; ex oui aquato idem efficiunt. At si in imo, & sub ossē hærescens humor longiore spatio duret post generales corporis uacuationes, medicamentorū usus est quæ per nares atq; os pituitam eliciunt, errhina & apophlegmatismos appellāt: caput radetur, & rubor in cutæ excitabitur. Porro in his etiā curandi rationes, quas in capite manu administramus assument, nempe Angiologiam arteriotomiā, hypospatismum, & periscyphismū, ut græci appellant: & in uertice usq; ad os adustionem. Iam cucurbitulæ occipitio incisa cute admotæ, impetum floris possunt reuellere. Fluxiones extra caluariā notāt, uasa in fronte & tēporibus distēta, & capitis ueluti uinculū, tū quod ex agglutimētis sicca præsidio sunt. Si hæc definit, & floris impetus protogetur, & sternutamēta nonnunquā moleste elidantur, humorem sub caluaria teneri, censendum est.

k 2 De

De chemosi.

CHemosin appellant, cū utrāq; palpebræ ex uehemēti inflā-
matione inuersæ fuerint, ut uix oculi ab ipsis cōtegātur, &
albū oculi nigro sublimius euaserit, rubrumq; ēt magna ex par-
te nigrū occupet. Curat uenæ sectione, medicamine purgāte,
collyrio diarodō albo, & qđ à cinereo colore uocat σποδιακόν,
cū lacte, uel oui aquato. Eodē uerò palpebras, tēpora & frōtē il-
linere oportet, tū fomentis & cataplasmatibus lenib. uti cū autē
remittit inflammatio, acriorib. quale est etiā uiride diarodon.

De hypophthalmatis, & emphysematis.

HYPOPHTHALMA uenarum adnatæ membranæ ruptura dici-
tur, ex ictu potissimum eueniens. Instillatur itaq; ipsis
sanguis palumbi, uel columbæ, uel calido lacte muliebri thuris
paululum conterens, uel muria, & præsertim ex sale cappado-
cico: forū utitor ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, œde-
ma uocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca conti-
nuis, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic spe-
cularium combustum, & stercus columbæ æquis portionibus,
uino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recens uel rapha-
ni cortex, uel uua passa sine acinis, singulatim ex posca, uel
mulsa applauntur. Eadem faciunt ad Emphysemata:

Ad emphysemata pruriginosa, & psorophthalmias.

EMPHYSEMA palpebræ tumor est, œdemati similis: psoro-
phthalmia autem pruriginosa eiusdē scabies, ex salso & ni-
troso humore contracta. Conuenit ipsos fuouere, posca, leni-
culæ decocto & rosarum. Hygrocollyriū autem hoc æris drach-
mæ sex, misyos tostī, myrrhæ singulorum drachmæ tres drach-
ma una semis piperis drachma uini Chij & passi cretici singu-
lorum cyathus unus, & dimidiū: incoquantur quoad mellis
spissitudinem habuerint. Hæc est Erasistrati compositio, quæ
panchryfos uocatur: facit etiam ad anginam, ulcera oris, puden-
dorumq; & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, som-
num inituri. Ab acidis, salis, & acris abstineant.

De sclerophthalmia, & xerophthalmia.

SCLEROPHTALMIA, durities oculi, & difficilis mo-
tus est cum labore, ruboreque citra humiditarem. foue-
re igitur ipsos crebro, spongijs aqua calida imbutis ex usu
est.

est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo: uel adeps anserinus. Frigida & quæ indurant uitanda: caput uelandum, ungendumq; alius ducenda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est siue fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & uictu prohi succi: utrisque uerò cōmuniter conueniunt medicamenta acria, ut uel lachrymas prouocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrati quoq; panchrysos, & quod dicitur Dicenteton. item cui nomen est Stratiotico.

De ectropiis.

Hic affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricem, aut ex crescentiam carnis nascens. In quibus igitur ex crescentia inueterauerit, æruginem rasam torrefactam conterito & admoueto, tuel plumbo usto cum sulfure uiuo, & loto utitor, uel utrisq; paribus & æruginē & plumbo. Nam ex cicatrice proficiens Ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

† Verior lectio est in antiq. ἡ πολὺ βδω κεκαυμένω χρῶ μετὰ δέικ & πύρε καὶ πεπύρεως, id est, plumbo usto utere, cum sulphure ignem non experto & pipere.

De ægilope, & anchilope.

Aegilops abscessus est, qui inter maiore oculi angulum, & nares fit: qui ruptus, si negligatur, usq; ad os in fistulā dehiscit. priusquā uero abscessus in ulcus erūpat, Anchilops uocatur. probe igitur faciunt glaucium & crocus una cū perditij herbæ succo imposita, crebro aut uariare oportet, & neq; in uomicæ eruptionem degenerabit. ALIVD. Halica cocta in aceto & probe trita, nō solum incipientes, sed etiam in uomicā mutatos persanat, rumpitq; & usq; ad os penetrat. Hoc usus non solum ægilopas, sed etiam anchilopas curabit. ALIVD. Ruta fatiua una cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, cocta q; & imposita pulchrè admodum ægilopas emēdat, & ad usque os permeat, initio erodens, postea non ita: ac mirum est, qd ne cicatricem quidem indecoram hoc præsidium relinquat. ALIVD. Cochleas cum testis suis tritas imposito. interdum aloē, uel myrrha admista. Præsidium hoc antequam ægilops in pus degenerauerit, & postea cum ruptus fuerit abscessus, eum desiccat. ALIVD. Cum manus opera ægilopa & anchilopa

anchilopa aduris, hoc utere cataplasmate, lenticulas decoquendo, & cum melle utitor ubi crusta exciderit, uuam passam excipiens liquida terebinthina, utitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricem inducit.

De trachomate.

Trachoma internæ palpebrarum regionis asperitudo est: harum intensio, ut ueluti incisuras habeat, *σύνκωσις* à fici similitudine græcis appellatur. Cum inueterauerit uitium, callosq; contraxerit, tylosis uocatur. Collyriis igitur utendum est tum eo quod ex uino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoq; hæmatite lapide, ex aqua loto subiectis palpebræ abstergentur: Hermatioq; cum Cygnarii modico. Adhæc diacroc collyrium pariter psorophthalmiis citra exulcerationem efficax est palpebræ inuersæ illitū. At si durior callus, his non cesserit remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepia testa, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod à palpebrarum rasura blepharoxiston græci appellant.

De chalazijs.

Chalazion, otiosi humoris in palpebra colluuius est in qua ammoniacum aceto detritum simul cum galbano inungitur, facit etiam terebenthina pariter cum cerato excepta.

De crithe tuberculo.

Crithe, paruulum abscessus tuberculū, oblongum, palpebræ cilio obueniens. Id cera alba foueri oportet: muscæ capite abiecto reliquo corpore infricari, uel hordei diluto perfundi.

Ad palpebrarum pediculos.

Expurgatis prius pediculis, marina tepida palpebras colluere oportet. Deinde medicamento subscripto cilium attingere: aluminis scissi partibus duabus, herbæ pediculariæ parte una, tritis utitor.

De madarosi, uel milphosi.

Hic affectus palpebræ pilorum defluuium est. Ad quod cura prius uniuersi corporis habita, smegmatis utere, quibus ab honestandis palpebris nomen est calliblephara. Terræ ampe-
litidis, croci gallicæ, ladani, singulorum pari portione contrita utitor. ALIUD Stimeos tosti lotiq; drachma, plumbi cōbusti & eloti drachmis quatuor, croci toridē nardi iudicæ drachmis tribus, in

bus, in puluerem redactis utitor. ALIVD. Palmarum ossium cōbustorum tribus drachmis, nardi gallicæ drachmis duabus: leuigatis utere. hoc etiam scabiosis oculis medetur. ALIVD. Neapolitæ ad palpebrarum defluuia, μηλφώσεις appellant, longosque palpebrarum affectus. Stimeos, cadmiæ, chalcitidis, miſyos xenici singulorum pares portiones. crassiuscule contundito, & melle respersa torreto: leuigatis utitor.

De ptilloſi.

Ptilloſis, palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda quibus accidit sæpe pilorum etiam defluuium. Præter prædicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdæ cōbustæ, & melle contritæ, inuguntur.

Ad superciliorum defluuia quæ madarosis dicitur.

Plumbum digitis oleo, uel adipe anserino unctis detritū illinitur. ALIVD. Hoc et subnigros reddit: nuces auellanæ exustæ simul cū adipe caprillo, uel ursino infricantur. ALIVD. Hoc efficax est et barbæ alopeciiis. Alterci drachmæ duæ, muscerdæ drachma, polytrichi drachmia irini unguenti cochlearia quatuor Tritis perbelle unguentum admiscetur. fotuq; prius adhibito illinitur. quod, si rasa pars ante fuerit, magis proficit.

De palpebrarum pilis oculum irritantibus τριχίασι appellant.

Pillis qui oculū pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranæ per se inungitur, uel cum cinere chamæleontis albi, uel sanguis cimum, uel fumarie quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, uel tellinarum salfarum cinis cum cedria, uel loti cinis, uel alumen liquidum quod phorimon appellant, uel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

Pilorum glutinans medicamentum.

Conglutinant pilos infractos bitumen, mastiche, colophonia, gummi, cochleæ par glutinosa.

De encanthide & rhyade.

Encanthis naturalis in maiore angulo carūculæ excrescētia est. Rhyas aut huius imminutio. Enchātidas igitur quæ aduersus ectropia dicta sunt, similibusq; urēdi nel exedēdi facultate præditis, hæc σκηπτικὰ illa καυτικὰ græci noīant, absumes, sed nō rotas, ne eius loco Rhyas sub nascat, uerū ad naturalē usq;

magnitudinē. Rhyadas, carnosā parte in totū, uel rudī manus opera, uel medicamentis absumpta, insanabiles existimato. Quod si pars ipsarum imminuta fuerit, iis quæ mediocriter astringunt, carnemq; creantibus reficitur: qualia sunt medicamenta ex croco, glaucio & aloe confecta. itē collyria diacrocū inscripta, necnon altercum prodest in uino coctum, impositūque, & aluminis ex uino pauxillon.

De ulceribus.

Ulcerum in oculis genus quidem unū est, differentia uero speciales diuersae. etenim in cornea membrana quæ græcis ceratoides appellatur, ulcus cauum, angustum, & purum, à fossula botryon græcis dicitur: quod aut latius botryo est, sed minus altum, cæloma nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens, ambientia cōprehendit, ut etiā in exteriorē pupillæ parte rubicundū, in interiorē candidū appareat. Epicauma ulcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. Iam uero alia plures ulcerum sunt differentia, de quibus dicemus cōmunius. Si igitur ulcus simul cū inflāmatione obortū fuerit, curationē ex iis quæ inflāmationem lenire possunt, & concoquere, moliemur, nō neglectis iis quæ ad ulcus propriē pertinet. Talia uerò sunt collyria, libanium, cygnus, & pelaria uocata, item aster & similia: insuper quæ ex amylo, terra samia quæ ἀμυλον dicitur & cerusa constāt: omnibus autem magis leniendo dolori esse Ilamonem nouimus, uerum diu ei insistendum non est, eo quod admodum stupefaciat. Laudatissimū uero & quod diazematōn a decoctione dicitur, ut quod stupefaciendi uim non habeat. At si cum fluxione ulcus infestari, collyrium aliquod illi admiscebimus, quale est diahydras, & Chiacum, præterea Cygnus fuluus & quæ repellendi sine rosione facultatem obtinent. Sin autē ulcera sordida fuerint, mulla mediocriter aquata, & fœnugræci decocto utemur per se, & cum aliis ad id dicatis collyriis. † Si acriora sint albis, seberiano & fœnugræci diluto: si non acria, diasmirnes, & nardinis. Purgata uerò ulcera medicamentum Cleo probe potest cicatrice obducere, eamq; præterea concoctorem reddere.

† Exemplar græcum typis expressum ita habet *δριμυτέρων τῶν ἐλκῶν*, id est, si acriora sint ulcera &c.

De

De oculi procidentia quæ προπτωσης dicitur.

Propositis tuniculæ quæ græcis ab uux acino ῥαγοειδης dicitur, procidentia est, quæ erosa ruptæue cornea tunicula accidit. Ea cum nondū creuit q̄ muscæ capiti similis sit, myocephalon nominatur. Cum uero amplius & eo usq; succreuerit, ut acinum uux repræsentet, staphiloma, quasi uuatio ducitur: ubi plurima facta est accessio, ut palpebras transiliat, melon, hoc est malū. Si uero obcalluerit, elos, id est, clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon ferè oculi procidentia degenerauerit, repellentibus cōstringentibusq; ipsum medicinis utendum est: Chio nimirum, Phæo, Nardino, & Theodotio: item eo quod dia thallias, & quod diaceratos uocatur. iam uero spōgiam leniter ipsis posca, aut uino adstringente, aut rosarū decocto imbutā, super dare cōmodū est, aut splenium. Principarum uero obtinet ad procidentias omniāq; ulcera, medicamentum cui nomen est Olympiacum, uel Olympus, cum succo oliuæ, uel polygonij, nel polij. Eadem hæc etiam clauis conueniunt & staphilomatis. priusquam inallescāt Vbi uero alborem, aut callum contraxerint, bullus remediis locus est.

De oculis pululentis.

Aliquando membrana à cornu dicta ceratodes, purulenta efficitur, nunc altius nūc in superficie, ita ut pus habeat unguis figurā, quæ causa est ut hoc etiā malū unguis oculi nominetur. Huc ergo spectat curationis ratio ut uel pus discutiāt, medicamētis mediocriter in id efficacibus quale est aqua mulsa, & fœnugræci succus, ex eoq; collyria, similiter libanium, & quæ ex thure cōfiūt, dia libanu inscripta, uel rūpatur uomica, & uehemētioribus repurgetur, quod genus sunt diasmirnes, & hygidion. At si pus in oculis citra exulcerationē coierit, etiā hoc liquido collyrio utendum est. Atramenti sutorii, croci singulorum drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis libra. Cæterū phlyctæna cū sit ceratoidis mēbranæ excreſcentia, ex humore quodā tunicas ipsius excoriante, purulentorum curationi subiicitur. Hygra, hoc est liquidū medicamentum ad suppurantes oculos quos hypopios uocāt: Bassi croci, aloes, myrrhæ singulæ uncia, uini quadrans, mellis optimi selibra. Crocus ex uino modico teritur, deinde alo & myrrha. Vbi crassitudinē acceperint, mel additur. Vnita in uitreo uase reponuntur: uti licet

uti licet bis quotidie, aut si necessitas urgeat, ter. Quando quidem oculum simul purgat, & carnem cicatricemq; inducit.

De cicatricibus & albuginibus.

QUæ per summa oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc nomine solo cicatrices dicunt, alij uerò nubeculas. Altius aut delirescentes, albugines, medicamentis absterforijs, extergentibusq; discutiuntur. Nebulas igitur anemonæ succus abstergit, & minoris centaurij succus cum melle. Vetusiores autem cedria extenuat: & æs solum aqua tritū modo collyrii, ad hæc quæ detergent collyria: quale est quod cornu ceruino cōstat, dia ceratos elaphiu dictū: item Rhinarium, Hecatombe similiaq;. Albugines uero nitrum cū oleo ueteri detritum diligenter, & inunctū probe, extergit. Item sepiæ testa cōbusta, cū melle leuigata. Inter collyria hoc bene, & leniter abstergit. Collyrium. Mamiræ, guttæ ammoniaci, myrrhæ trologdytidis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera, in collyrium coactis utitor, uel crocodili terrestris fimū ex aqua leuigatum illinito, in collyria redigens. Rectè autem sal capadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata dissoluens instillabis.

Quomodo cicatrices tingantur.

GALLÆ, acaciæ, singulorum drachmæ quatuor, atramenti sutorii drachmæ duæ illinentur. Collyrium autē hoc proficit, floris mali punici, cytinorum, atramenti sutorij, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, stimmios, gallæ, singulorum drachmæ duæ. Aqua teruntur: si flos mali granati desideretur, interius membranofum quod grana intercedit, misceto.

De ungui oculorum, quod pterigion græcis uocatur.

VNGUIS quod pterigion græci uocant, neruosa membranæ adnatæ excrementia est, quæ ab angulo quidem oritur, sed adusq; oculi coronā peruenit, ubi uerò supramodū fuerit adaucta, pupillā obtegit. Magni igitur & inueterati ungues solā manū expostulant. Recentiores uero & magnitudine mediocres, præsidij eliduntur abstergentibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus. inter simplicia igitur æs combustum, uel atramentum sutorium simul cū porcino felle pulchrè faciunt. Efficacius autem hoc est quod sequitur: atramenti sutorii pars una, gummi pars se missis: uino leuigata illinūtur. uel etiam

etiam collyria formantur, nonnulli uero caprinum fel melle mistum inungunt.

Ad unguēs oculorum, suppurationum, & hebetudinem. Oribasij.

Lapidis magnetis, æruginis rasæ, minii sinopici, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis attici cochlearij dimidium. Idem ualet aduersus albugines.

De carbunculo & carcinomate.

Carcinoma tunicæ ceratoidis affectus est: cui dolor adsit, dīstentio, rubor tunicarū, cruciatus punctorius ad usq; tēpora magisq; si moueantur, cibi torquet fastidiū, acribus irritantur, & excandescunt. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri lactis potione debet, item cibis frumentatijs & alioquin probi succi, omni acrimonia liberis. Collyria lenia infundantur, ut spodiaceum, feberianum & consimilia. †Cæterū bonæ totius, corporis tēperaturæ prospiciendū est. Carbunculus autem, & ipse malignū ac contumax ulcus est, crustatium aliās bulbo, aliās palpebræ, quemadmodum reliquis pariter corporis particulis accidit. Itaq; in bulbi carbunculis per initia quidem clystere primum, mox lacte discocto, mediocriter purgare conuenit. deinde spongia foto erui farinam, uel triticeam ex aquæ mulsæ decocto obducere instar cataplasmatidis, nōnunquam & iridem detritam applicare, & lacte oculum eluere. Si ulcera serpendo depascant, lenticula cum melle, uel malis cydoniis incoctis forma cataplasmatidis obducuntur. Si latius depascendo penetrent, foliis oleæ decoctis, uel malicorio in uino cocto leuigatoq; ex melle. At si cessent prosperere, crustaq; medicamento quod subiūgetur, imposito, exciderit, & ulcera sint pura, lutea ouorum tosta, leuigataq; cum croco & melle cataplasmatidis modo inducentur, quousq; ad cicatricem perueniant. Medicamentum autem est hoc, spodii drachmæ quatuor, myrrhæ nō nimis torrefactæ drachmæ treis totidemq; oboli. Detritis in uino amineo quousq; inaruerint, passum creticum uetus miscetur. Vbi leuigata sunt inuicem, liquida, pixide fictili excipiuntur, subiungunturq; que. Ad palpebrarum uero carbunculos malum granatum acidum, totū frustum statim concisum aceto incoquito, Vbi intabuerit probè, in lacte uoremq;

uoremq; detritum, illinito in lintheolum ac utitor, bis tēue quoridie immutans, noctu semel.

† Hic locus integrior est in nostris exemplaribus, in quibus ita descriptus est. προνοῖσθαι δὲ καὶ τῆς τῷ ὅλου σώματος εὐκτασίας πρᾶναι δὲ τὰς οὐδυνας τῶν κερκίνων ἀφέψιμα φακῶ ἐγχυματιζόμενοι ἢ χυλὸς πολυγόνου ἢ ἀρογλώσσου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ δὲ ἀνδράκωσις, id est, bonæ totius corporis temperaturæ perspicendum est. Carcinomatis autem dolores lenit decoctum lentis impositum, uel succus polygoni, uel plantaginis, uel portulacæ. Quam ueram esse scripturā ex Aëtio faciliè intelligi pōt.

De mydriasi.

CUm pupilla colore quidem nihil magis euariat, sed multo est quàm naturalis status exigit latior. interim ex toto uisum impedit, interim permultū, & oīa quæ conspiciūtur ab ipsis minora quàm sint uidētur esse, Mydriasis quidē affectus est, causa aut ipsi humor quidā excrementitius, itaq; curationē ipsius sanguinis emissionē à cubito, uel purgatione tentabimus: si minus, uenas in angulis oculorū diuidere oportet, deinde cucurbitulam occipitio admouere, & marina frontem, & oculos perfundere. si marina desideretur, muria, uel posca. Medicamentis aut ijs utendum est, quæ etiam ad pustulas conducunt.

De phthisi & atrophia.

Phthisis affectus est, quo pupilla sit angustior, obscurior, rigosiorq;. Res lumini obiectæ, in his maiores apparēt. causa uero est dēsatio, quæ siccitati potius fertur accepta. Sed phthisis ab atrophia hoc dignoscitur discrimine, qd illa angustio-rem pupillam, hæc totum oculum minorē, humilioremq; reddat. Mederi his conuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei, & oculorum fricatione: Adhæc aquæ in faciem superfusione & unguine quodam calfaciēte in caput dato, oculos autem medicamento, quod rarefaciat, & acriore oblinito, quale est infra scriptum. Ammoniæ drachma, crocomagmatis drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, æruginis drachma. Tritis in aqua, formatisq; utitor.

De nocturna cæcitudine quæ nyctalops dicitur.

Nocturna cæcitus, qui Græcis Nyctalops dicitur, uitium est quo per diem homo cernit, Sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito, & oculorum

& oculorum angulis uacuato, mox purgatione, uel per clysterem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicentur, aut sternutamenta prouocare oportet. Ante cibum hyssopus potui, uel ruta dabitur. Si his remedijs morbus non cedit iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo: oculi uero melle despumato illinentur, claudunturq; premendo liquamenta, contiuen-doq;. Alumilis combusti partes duæ, salis fossitij pars una. Trita cum melle sublinuntur. **ALIVD.** Iecur hircinum assatur, aquosa inter assandum sanies inde emanans collectaq; inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctique uapor oculis excipi apertis præcipitur.

De glaucomate, & suffusione quod hypochyma dicitur ex commentarijs Ruffi.

Glaucoma, & hypochyma ueteres unum quoddam malignus esse existimarunt. Posteriores autem glaucomata quidem humoris, qui ob similitudinem crystali *κενταλλοειδής* appellatur, uitia, præ humiditate in glaucium colorem transeuntis iudicarunt. Hypochymata humorum affusionem, qui inter tunicam ceratoidem, & crystalloidem concrescunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt: hypochymata autem curantur, sed non omnia, proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione. item iniectionibus acrioribus, ueluti ex centaurij, aut cucumeris amaræ decocto petitis, & alui solutione crebriore, cucurbitulisque occipitio cute incisa admotis. Cæterum aquæ potus toto uictus curriculo comperit, cibisque uti qui extenuant. Proderit autem temporis spatio, & apophlegmatismis diebus aliquot uti. Quibus uerò ceu culices, oculis obuersi perperam uidentur, ex quadam humorum prauitate, uel biliosioribus uaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde uel inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus utendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo, & feniculi succo. postea etiam compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaci, ueratri albi singulorum drachmæ sex. Alij addunt in mellis heminis octo. Nos autem tradit Oribasius, subscripto utemur, caucalidis succi, chamedryos, sanguinariæ singulorum æquis portionibus contritis.

Benefa-

Benefaciunt item collyria, & quod succo feniculi constat, & Protheus, & Thalasserus, & diaopobalsamu, & quæ ex his quæ parantur, præsidio esse solent. Insuper feniculi decoctum per initia superfusum adiuuat. item ex succis confectum, opobalsamo, melle, oleo ueteri, & similibus.

De glaucomate & suffusione, ex commentarijs Demosthenis.

FLoris æris oboli quinque, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatididis drachma: aphronitri drachma, salis floris drachmæ duæ, opobalsami drachmæ nouem. melle attico excepta offeruntur.

De obscuritate, & hebetudine.

Obscuritas, quam amaurosism Græci uocant, est totius cernendi uisus plerumque absque manifesto oculi affectu impedimentum. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorum lingua uocatur) obscuritas uisus est, ab occulta quadam causa proueniens. Curatio communis sanè est ei quam in suffusio diximus. Priuata uero est, ab angulis sanguinem mittere, hirudines admo- uere temporibus, inferiores partes perfricare. Procedente tem- pore etiam ijs quæ sternutamenta prouocant, utendū est, tum uomitu ante cibum, & inunctionibus, primum ex mellis, & olei æqua portione, deinde composito quod subiungitur. Cro- ci obolis duobus, fellis hyenæ drachma, piperis communis gra- nis octogintaquinque feniculi succi drachmis sexdecim, guttæ ammoniaci drachma. Contritis ad læuorem aridis ex succo, mellis cochlearia quatuor adijciuntur. Præparata excipito ærea pyxide & utitor. priusquam uerò illinantur oculi, in mari- nam calidam demersi fouebuntur.

De strabismo.

Infantès ab origine strabones curantur larua faciei circūposi- ta, ut in rectū uideant. Nam strabismus cōuulsiora musculo- rum qui bulbū mouent, dispositio est, & lucerna è regione po- sita, & non à latere elucēte. Præterea cū ad nares cōueniūt ocu- lis floccos rubros agglutinare uincit angulis qui circa tempo- ra habentur: ut uisu ad hos incōniunter directo, oculos emēdēt.

De oculorum expressione qui ἐπιστροφὴ appellatur.

Exprimuntur oculi nonnunquam, ut exerti perseuerent. qui- bus sanè strangulatus, mali causa est, ex cubito uenam inci- dere

dere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamento purgare ueratro nigro, uel scammonia. Ex doloribus autem cōtractas oculorum expressiones, quæ frequenter sanè etiā ex partu accidunt, uteri purgationes solunt: unde has promouere conuenit. in uiris autem post sanguinis. detractionē. si non remiserit uitium, cucurbitulam occipitio defigere commodū est. Lanam melle imbutam imponere, aut panni floccos cū aqua, superq; duplicatum linteum illigare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos, & polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

De confusione.

Confusiones ex ictu, curamus sanguinis detractione à cubito, totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam colombæ replemus: deinde lanam mollem in ouum cum uino, rosaceoque contusum demersam imponimus, illigamusque: sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusque idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur: quale est Chiacum.

De myopia si.

Myopiæ dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui prima natali die propinqua sanè uident, remota uero non item. Insanabilis est huiusmodi dispositio ut quæ ab imbecillitate spiritus uisorij proueniat. Cōtrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non uideant, procul distita assequuntur.

Auricularia & primum de auriū dolore. Cap. XXIII.

Aurium dolorem ex frigiditate contractum, ubi ex anni tempore, præcedente uictu, uel ægrotantis quoque percuntatione: an ob exteriorem causam acciderit, didicerimus, inde quòd dolor alte citra grauitatem, uel distentionem, uel ardorem fixus sit, calefacientibus curabitur prædiis, nempe oleo rutaceo, calido uel nardino, uel laurino calido, uel amaracino, uel phuliato, uel spicato, uel communi, cum euphorbio, uel piperi, uel castoreo, uel commageno, dicto unguine, uel liquore balsami in meatum auditorium instillato. Iam uero oleum in quo allium decoctum sit, uel cepa, instillatum auxiliatur. At ex calida conceptum intemperie

rie dolorem, in quo feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensione sensus est, contraria medicantur oui albumen subactum in aurem demissum, quemadmodum oculis adhibemus, lac muliebri cum quodam collyrio, quod dolorem lenit, uel succo perditij herbae, cum modico rosaceo: ipsumque rosaceum, uel oxyrhodium, uel succus solani, uel coriandri, uel hastulae regia, uel oleum in quo lumbrici, uel aselli qui sub aquaribus stabulantur, incocti, uel oleum amygdalinum per se, uel buccina uita numero tria, in eo decocta naturaliter proficiunt. Quod si glutinosi, crassique succi dolores fecerint, capitis, ipsiusque auris grauitas, & praecedentis uictus ratio testatur. sola uero citra grauitatem distentio ipsius auris spiritum flatulentum, cui exitus non patescit, indicat. Itaque in ambobus uitiis uetere medicamentis, quae aperiunt, inciduntque, cuiusmodi est aphronitrum cum aceto, & melle item fel ouillum cum oleo communi, uel amygdalino: praeterea porri & cepae succus tepidus cum melle, aut origanum tritum, cum melle & lacte muliebri instillatur. Ad uehementiores aurium perfrictiones fel caprillum cum succo porri inditur. Verum in iis quos multus dolor, longusque urget: & grauis simul auditus existit, haec quoque usurpari debent, cuiusmodi dracunculi succus est, arbrioniae, & similia. priuatim uero qui ob flatuosum indolescunt spiritum, cucurbita ex aqua calida fotu prius facto, circa aurem fixa strenue auxiliatur. At si grauitas, distensio, simulque calor, & dolor pulsabilis, aut etiam febricula oboritur, inflammatione aurem laborare censeo. Atque ante omnia hic sanguis emittendus est, † deinde fotu frequenti utendum ex oleo dulci calente per specillum lana inuolutum, meatui uero adeps anserinus, uulpinusue, aut medicamen basilicum cum rosaceo, uel cyprino, uel irino debet instillari: extrinsecus ea quae dolorem lenire, & concoquere possunt, cataplasmatibus modo superaccommodare. Si dolor uiolentus est, iis utere, quae leuiter sensum stupefaciunt: non enim mediocriter periculum est, quod cerebrum neruo per quem facultas audiendi erogatur inflammato. uicinum sit. Probe igitur hoc dolorem lenit, opii pars una, castorei partes duae, cum lacte muliebri, uel oui albumine, aut uino dulci tepido instillantur. Iam pastillus Crocodes, Aster, Philonis antidotum frequenter his pro fuerunt. uerum conuenit crebro fouen-

tem

tem aut oleo communi, aut ex quodam calido fomento lanā, hoc ipso imbutam in aurem conicere, sed ita ut partes inflammatione tentatæ quàm fieri potest minime attingantur. At si dolor in uetustatem incidit, ac in pus degeneraturus est, medicamento utitor, quod ex lini seminis succo conficitur, una cū rosaceo, aut chamæmelino solutum, instillatis. Cum autem aqua medicata, meatu recepta auditorio dolorem parit, si quidem copiosa fuerit, ore, uel etiam arundine ipsam exugere ratio est. Sin autem pauca specillo auricularia lana inuoluto extergens, oleum quoddam instillabis quod sit partium tenuiū, aut rosaceū, aut oui album, aut lac muliebre. Calida uerò omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus adhibentur.

† Hic locus magis expressus in ueteri exemplari, in quo ita est descriptus. δὲ δὲ συχνῶς πυριῶντα, ἢ τῷ κόνει ἐλαίῳ, ἢ τινὶ τῶν θερμῶν μύρων χρῆσθαι, ἢ καὶ ἕριον ἐν αὐτοῖς τέτοις βαβεργμένον ἐπιτιθέναι τῇ ἀκοῇ, id est, oportet autem assiduè fouere & oleo communi, uel aliquo medicamento uti, atque eo madefactam lanam auri imponere.

Ad ulcera quæ simul cum inflammatione affligunt.

Licium & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

Ad dolores maximos, pus & grauem auditum.

AMygdalinum quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opij drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma. Aceto læuigata instillantur. si dolor quidem exercet, rosaceo diluta: sin autem pus profluit, mulso, uel oxymelite: si grauius audiunt, aceto recentia ulcera glauciū solutū aceto, persanat: itē ex eo collyria, tū quæ appellātur diarodon, diacrocū, & diasmirnes quemadmodū rursus suppurantes citra dolorem ferri recrementum cum aceto diutius læuigatum.

Ad sordium duritiem.

Nitro aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumq; sordes deterse sunt nitrum aceto solutum cum rosaceo instillatur.

Aliud ad sordes.

Cardamomi & nitri exiguum, cum ficis pinguibus sine granis exceptum, & in collyrij formam redactum, auriculæ committitur. Tertio quoque die educitur. Copiosas enim

PAULI AEGIN.

I sordes

sordes extrahit, & abunde leuat. Proficit hoc etiam aduersus carnis excrescentias, longos dolores, exulcerationes, recipit aloes, thuris, myrrhæ, singulorū drachmam, myseos drachmas quatuor ex aceto in pastillos digeruntur, cū usus requirit aceto & rosaceo soluta instillantur, Item Andronis pastillus & Heræ, & musæ.

Ad diuturna ulcera.

Cedria melli admista illinitur. ALIUD. Myfi ustum & in puluerē redactū inspiratur. Per clysterē uerò auricularium eluuntur aures posca, uel oxymelite, uel mulso, uel decocto quorundam repellentiū (uerbi causa) lenticulæ, uel rosarum.

Ad aures cruorem fundentes.

Lentisci decocto auris illuitur, polygonij uerò succa cum paucissimo aceto instillatur, uel lycium, uel amurca, uel acacia, uel porri succus.

Si caro excreuerit.

Nitro ex aqua calida, simul cum squama æris, & sandaracha pari modo auriculam illinito. Vbi crustam, acceperint, mel le repurgato.

Aduersus aurium uermes.

Absynthij decocto, uel centaurij, uel porri eluuntur: capparis autem foliorum uiridium, aut fructus succus instillatur, uel cedrinus liquor, uel urina humana uetus, uel album ueratrū cum melle, uel calaminthæ succus, uel scammonia cum aceto, uel succus absynthij: oleum uerò meatui inditum usque ad superiora, exire ipsos compellit: potius autem est oxelæum. Eodem ad ea quæ auribus incidunt animalcula utitor.

Ad calculos & similia quæ in aurem inciderunt extrahenda.

Specillum auriculariū lana inuolutum in resinam, aut gummi, aut aliud quoddā glutinans medicamentum intingendum, idq; in aurem inijciendum, ac quod in ea est protrahendum. Si hoc modo nihil efficitur, oleum calidum continue instillato. At si ne sic quidē exciderit, aut comprehensum fuerit: a lijs quoque utitor modis: ut in parte chirurgica docebimus.

Ad sonitum aurium intra seipsas.

Si in febribus, aut harum crisi bus sonitus aurium euenerit: nulum

lum ei negotiū faceſſere oportet, quippe ſtatim magna ex parte finiuntur. Sin aut poſt morbum perſeuerauerit, abſynthij decocto ubi aures foueris acetū, roſaceumq; infundi debet, uel raphani ſuccus cū roſaceo, aut ueratri nigri cū aceto. Ad ueteres aut ſonitus, qui ex craſſis glutinoſisq; humoribus creatur, inde uerò illos cognoſces qđ nō ſubito, ſed paulatim increſcunt, naſcunturq; aceto, nitro, & melle aurē illinito. ALIUD. Veratri albi drachmæ duæ, caſtorei totidē, croci drachmæ tres, nitri drachmæ ſedecim. ex aceto contrita, in paſtillos digerito ac utitor.

Ad ueteres ſonitus, & tinnitus.

EVphorbium cum cyprino oleo leuigatum, calefactumq; ne uſurpato, in quibus autem ob multam ſentiēdi facultatem uapores, & ſtatus ſurſum diſtribui percipiuntur, caſtoreum, & cicutæ ſemen tritum cum aceto inſtillatur.

Ad grauem auditum, & ſurditatem.

QUæ ab origine quidem, uel etiam poſt natalem diē, ſed longiſſimæ, & abſolutæ ſurditates conſtituuntur, nullo remedio illidi poſſunt. Quæ uerò nō abſolutæ quidem, ſed diuturnæ tamē, & ipſæ curationē non recipiūt, aut certe difficillimam. Quæ ob bilioſum humorē ſurſum uergētem naſcuntur, uacuationibus per medicamenta bilē ducentia ex facili abolentur quidā etiam ſua ſponte affectu liberantur, bile inferius deſcendente. At ex crudis craſſisq; humoribus prognatas ſurditates, uel grauem auditum, uenæ incifione curato, aut omnino purgatione, ex Hiera, tum apophlegmatifmis & errhinis item balneis ſua ſponte ſcaturientibus, uel ex aqua marina. Porro in meatum ubi facultas audiēdi eſt, conuenit inſtillare, quæ ad ſonitus tradita ſunt. Priuatim uerò hæc: urinam & fel caprillū, aut ſeorſim fel, aut rutæ ſuccum cum melle, aut caſtoreū, cum oleo anethino: & hyſſopum medicamentum cum nardino unguine, uel caprillum fel cum galbano: uel quod recipit caſtorei drachmas duas, nitri, ueratri albi ſingulorum drachmam.

Ad contuſionem aurium qua θλάσις dicitur.

Hippocrates quidem nihil ipſis adhibendum præcipit. Cum uerò ſæpe ab ægrotis cogamur, utendum eſt his. Myrrhæ, aloes, thuris, acaciæ, pari ſingulorum modo: ex aceto inunguntur aut panis calidi pars interior cum melle in

pila contusa obducitur: aut hoc: bituminis, thuris, aloes, cochlearum carnis, bulborum polentæ per modus, ex aceto leuigata imponuntur. Quod si inflammatio oborta est, sesamum leue factum applicatur, uel chondrus, cum aceto coctus, laxiora autem esto cataplasmata, & citra deligaturam aut leuiter deligentur. & lana oleo imbuta auris aufractui demittatur.

De parotidibus.

Parotis glandularum iuxta ipsas aures affectus est, materia morbi illic eructante, alias à capite humoribus uidelicet in eo impactis: alias à reliquo corpore in febribus critico modo proueniens. Si igitur, alte adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiutari præsidij, quæ coactas sordes extrahant, uel etiam cucurbitula agglutinata, uel crebro fotuum usu. Nam si in altum recurrat colluuiēs, periculum haud mediocre subsecuturum est. Sin autem inflammatione tentata in tumorem fastigatur, è contrario iis quæ leniunt, & concoquunt, utemur cataplasmatibus, quale est ex farina hordeacea, & aut triticea, aut semine lini cum mulla, aut fœnugræci, aut althææ, aut chamæmelorum coctionem expertorum iure incoctum. item quod ex rumice, & axungia insulsa constat. at si exuperare sanguis tibi uideatur, prius ipsum uenæ sectione uacuabis: modo uires permittant. Tumore autem non discusso, medicamentis utere quæ puri mouēdo sunt, nempe farina triticea cum pinguium ficorum decoctū, uel oleo, tum medicamento quod ex polline, & quod ex fermento confectū est. Vbi iam ascessus, ad suppurationem spectarit, nel cute ferro discissa pus excerneretur, uel acri medicamento rumpetur, cuiusmodi existit smidion appellatum, & diascorodon, hoc est ex aliis preparatum. Cæterum mitiores parotidas etiam fotus ex muria discutit, item medicamentum diaperanu. Hoc sane etiam pus iam maturatum discutit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas parotidas buccinorum, aut purpurarum combustarum cinerem cum melle, uel axungia imponemus, aut ficus marina incoctas, uel marrubium cum sale. Induratas autem iam emollit & medicamen Mnasei, & Ariobarbianos. optimum etiam quod ex succo lini seminis præparatur. ante hæc autem obducere ammoniacum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liquida, uel seuo taurino,

no, uel bdellio, uel styrace, uel medulla ceruina.

De narium & olfactus uitijis. Cap. XXIIII.

Olfaciendi facultate oblata, si uox seruetur incolumis, ad priores cerebri uentriculos morbus refertur: qui aut ex intemperie sola noxam cōceperunt, aut etiam ex humorum copia. Sin autem uox quoq; mali contagium senserit laboriosior quodammodo reddita propter ossa quæ à colatu ethmoide græcè uocantur, obstructa, affectū rursus malis quibusdam succis contractum esse censeto. Itaq; cerebri intemperies, ubi ex notis sæpius à me dictis deprehensa fuerit, contrariis curatur remediis. humores autem apophlegmatissimis euacuare oportet: maximè uerò utitor medicamentis quæ per nares ualidè educunt, & quæ odore mouent tenuis substantiæ, quemadmodum in defluxionibus quas κατάρρεως græci uocant, adhibeto. Cum autē totius corporis humorū copię suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex Hiera uacuatur. Ita quoq; in polypode, & ozæna faciundū est, deinde loco ēt affecto inducuntur remedia. quin & Theriace pota sæpe magno fuit præsidio. Cæterū polypus, tumor præter naturā in naribus oritur, substantia respondens polypodis carunculæ: eiusdem uerò naturæ est & sarcoma. Ozena uerò ulcus est, putridum ex humorum acrium illuie creatum.

Ad polypodas & Sarcomata.

Squæmæ æris drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, ueratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In usu hoc est laudatissimū, nam tredecim diebus, insignè affert præsidium. benefacit & atramentū sutorium cum aceto. *ALIVD.* Malicorij drachmæ duodecim, atramenti sutorii drachmæ decē: chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubii, singulorū drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, ueratri albi drachmæ quatuor. sicco utitor. *ALIVD.* Diphrygi trito nares, linamentoq; ex ellychnijs contorto attinguntur, dilatanturq;.

Ad ozænas.

Misyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorii drachmæ sex, aluminis scissilis, gallæ, squamæ æris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma una, aceti sextarius: totum in

1 3 nase

uase æreo coquitur. Vbi ad mellis spissitudinem uenerit, ex carptis linamentis utitor. ALIUD. Aeruginem & æris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

Ad fœdum narium odorem.

MYrrhæ, acaciæ, amomi singulorum drachma. melle cocto excepta summo narium inter septo iubeto agglutinari. ALIUD. Amomi, myrrhæ, rosarū siccarum partes æquales, nardino unguento exceptas illinito. Item benefacit aduersus fœditatem odoris, & malagma hedychoë cum uino admotum.

Ad narium ulcera.

CERUSÆ libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi tantūdem, uel plumbi combusti. omnia uerò lota esto, excipianturq; uino, myrteoq; oleo.

Ad ulcera quæ uocantur glycea.

ARgenti spumæ drach. quatuor, rutæ nouellæ totidē, aluminis scissilis drach. duæ. Myrteo oleo acetoq; excipiuntur.

Quæ sternutamenta citent.

VERATRUM albū, uel castoreum, uel piper, uel struthium, uel simul omnia: non autem oportet inspirare, sed pinna, uel digito penitissimè, in nasum demittere ubi sternutamentū frequentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinū, uel rosaceum, uel glycelæum. Iam quæ odore mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimi stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia caput desiccandum est, smegmatis ex nitro & pumice factis, uel etiam asclepio uocato utendum, & Costantini sapone, & sale cappadocico, similibusq;.

Ad sanguinis eruptionem, è naribus:

SANGUINIS è naribus profluuium, quod febribus superuenit, secūdo uolumina inter illas sum executus. De eo aut quod alia quacūq; de causa accidit nulloq; sisti pōt remedio, in præsentia tractabimus. Chalcitidē cōtritā linamēto ex ellychnijs cōtorto, aqua imbuto, uel eo quod à genitalis humani forma priapicon appellāt exceptā, nariū foraminibus demittes. Vel testā ouī exustā admiscebis, & dimidiatā gallæ partē, uel lycio indico attinges. Vel fimi asinini cinerem inspirabis. Vel eius expressi succū instillato, uel molaris lapidis aceto extincti, uapor naribus attrahatur. Vel hoc quoq; medicamento obstruēt utitor,

utitor, Mannæ, thuris, partē unā, aloes partem dimidiam. Can-
dido oui liquore excipito: ac utitor, per linamentum ex elly-
chniis contortū, extrinsecus leporis pilis unctiōni impositis.
Vel funiculū lucernarū in nares conicito. Vel cucurbitulā le-
uem directē, quā sanguis profluit præcordiis magnā affigito.
præcordiis autē magnā, & perseveranter admoueto. Vel aures
ualidē obstruatur, frons spōgiis ex aqua frigida foueāt. Vel cu-
curbitula occipitio agglutinetur: cum sanguinis detractione:
interim etiā uenā incidere, si nihil prohibet, & summas partes
uinculis excipere. præsertim brachia, & femora, sicut in uenæ
sectione fieri solet. Eadem motu cōcuti iubeto, manu uerò fri-
catione, pedes autē obambulatione. Nam uenis indidem san-
guine repletis, nariū uasa deplentur. Item sponsia in poscam
frigidā demersa, naribusq; profluentibus à foris strictim admo-
ra: id quod requiritur, subinde perfecit: melius autē proficit
longo ex linamentis intortis penicillo naribus prius subiecto.

Ad faciei uitia.

Quomodo facies à rugis asseratur. Cap. XXV.

T Huris drachmæ quatuor, fuci quod φῦκος dicitur græ-
cis, drachmæ tres, argenti spumæ, piperis, singulorū dra-
chmæ octo, omnia ex ichthyocollæ contusæ diluto sol-
uuntur, in pastillos redactis utitor. ALIUD Eburnei scobis dra-
chmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portiones. Uti-
tor, quemadmodum est prædictum.

Ad faciei nigritias.

I Ridis, uel ptisanæ fresæ singulorum sesquiseptarius, salis am-
moniaci, cornus ceruini combusti, thymiamatis ammoniaci,
singulorū uncia duæ. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac
iterum aqua trita ante balneū illinuntur. ALIUD. Ptisanæ, erui,
thuris, iridis illyricæ, aphronitri singulorum choenices duo, co-
cti, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ uiginti.
Ouorum albumine. lacteq; asinino subigito, ac utitor ueluti
prædiximus. Benefacit etiam pastillus Peponatos.

Ad ephelidem & lenticulas.

T Erræ cimoliæ torrefactæ, semicōgius, aphronitri tosti, dra-
chmæ octo, erui farinæ elixatæ drachmæ quatuor, fellis
zaurini, eburnei scobis singulorū drachmæ octo. Leuigatis fa-
cies defricat. ALIUD. Fecis drachmæ decē, erui farinæ drachmæ

l 4 decem

decem, lomēti drachmæ decē uera tri albi drach. quinq;, aphro-
nitri drachmæ decē, alcyonij drachmæ decē, tritis abstergito.

Ad suggillata.

Per initia decocto fenugraci postea & meliloti oculi fouēs,
Nilei collyriū diarodon aqua solutū illinito: deinde diaf-
mirnes. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribit, cō-
bustū, perungito, uel hyssopum cū aqua applicato. Vel hyssopo
in panniculum illigato & calida aqua resperfa foueto: uel acri-
mura. item raphani corticē cum melle detritū impones. hoc
etiam ueteribus efficax est. Porro ad uetusta faciei suggillata,
& liuores tordili partes duas, terræ samiae partem unam cum
melle admoüeto, cura adhibita ne exulceretur.

Aliud deterforium.

Hyssoi, thapsiæ, casiae singulorum drachmas duas, ceræ tan-
tundem, terebinthinæ drachmam inijcito, cauens ne exul-
cerationem excites, eoq; frequenter tolles.

De uaris.

Exigui sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illinito, uel
argēti spumā cū terebinthina, aut olei cādidi momēto tritā
infricādo perūges: uel alumē fissile cū terebinthina, uel amygdā
la amara aceto macerata infricant. In callū uero cōcretos ua-
ros, saponis gallici drach. quatuor, thuris, thimiamatis ammo-
niaci singulis drach. aq̃ dissolutis perūgito, & post horā eluito.

Ad uaros, pilos, & aspredinem faciei.

Ceræ drachmæ decem, terebinthinæ, drachma, uisci drach-
mæ duæ. Liquato una oleum superinfundens atq; hoc me-
dicamento faciem abstergito, tollit enim radicitus. ALIUD. Pa-
pauer detritum, uel pulegium cum sale, acetoq; applicato.

Ceratum thaidis quo facies rubescat.

CRoci, erythrodani radicis, fuci, thuris, myrhæ sing. drachmæ
duæ Adipe uitulino, oleoq; mastichino excipiuntur: deinde
illinuntur. Interposito tēpore, spongia ex calēte aqua facies ab-
stergitur. Cæterū faciei remedia, et reliquo corpori cōueniunt.

*De oris affectibus, & primum de dentium
dolore. Cap. XXVI.*

Dentium dolorem siue gingiuarum inflāmate, interim
in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui ad ipsos
pertinet,

pertinet, oriri contingit. quapropter ualentissimorum in hoc medicaminum usus est Atq; inde plurima ipsorum quam acerrimo aceto præparantur At gingiuis propter inflammationē dolentibus, præsentissimum est remedium, oleum lentiscinū, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens. nam uetus tanto recenti deterius, quanto calidius. Communis autem ratio etiam hic seruetur, ut humor qui in toto corpore superat, prius euacuetur.

Ad dentium inflammationem.

OS colluatur aceto, in quo decocta sit galla, uel haliacabi radix, alterci semen, folia ōue, uel pulegiū, uel solani succus, uel capparis radix, uel myrti folia, uel poliū, uel cucumis syluestris radix, uel rutæ folia cū oxymelite, uel cornu ceruinum, uel acetum scillites, uel pyrethrū, cū hyssopo. At erosionem exerto denti, styracem cū opio imposito: uel sulfur uinum cū lycio: uel alterci seminis uaporem excipiat per infundibulum. Item Philonis antidotum denti circumlitum, dolorem sedat. Quod si defluxione laborēt dentes, myrti, lentisci, & gallæ decocto colluentur, uel rhus syriaci, balauftij, uel malicorij. applicantur aut salis partes duæ, aluminis usti, & aceto extincti triq; pars una: deinde uino perluuntur. porrò gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur, uel aloe cum uino eluuntur: uel rubi radice uino decocta: uel rhu syriaco. cruentis autē & defluxione tentatis gingiuis crudum salsamentum in olla comburito, quoad in carbones redigatur. puluere attingito. At mobiles stabilis aloe inspersa, uel rhus syriacus, uel alumē scissile, uel galla, uel rubi radix per se, aut cum uino incocta.

Aliud ad dentes.

NVcis uiridis corticē terito, eiusq; ius, cū habes, in id conijcito myrrham uerā, & alumen scissile, ubi omnia in unitatem coegeris, in usu infundito, ac in gingiuas qua parte dens indolet, demittito & persanabis. **ALIVD.** Allium, piper, herbam pediculariam quæ staphis agria dicitur, detrita, in linamento in globulos coges quos circa dentes uersans humorem in capite contentum elicies, dentemq; sanabis. **ALIVD.** Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas omniaq; oris ulcera depascencia Chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo, utitor sicco, aut cum aceto, sine dolore dentes tollit, farina

rina cum liquore tithymalli imponitur, & super hederæ foliū accommodatur, ac per horā finitur, sua. n. spōte dens conteretur. Dentiū smegma, quod & parulidibus benefacit. Aluminis latercularij triēs, salis ammoniaci tantundē, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum drachmæ quatuor, piperis grana octoginta.

Ad parulidas.

Sulfuris uiui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflammatio quædam est in aliqua gingiuarum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationē cōuertitur, & cum suppurauerit, scapello incisa, linamentis insertis distenditur. Epulis autē carnis excreſcentia est, quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet: nonnunquam cum febris & dolore. Quoniā igitur reprimi debet, utendū est, æruginē rasa priuatim: uel cum pari galla, uel fori combusto, uel alumine quolibet cremato, uel galla per se uel squama æris cum aceto diebus sat multis leuigata desiccataq;.

Smegma dentium.

Aristolochiæ radix cōbusta, cerui cornu combustum cū mastiches momento, sal candidus melle respersus & fici folijs inuolutus exustusq; donec in carbones mutetur. **ALIUD.** Buccina sale respersa, ustaq;, cochleæ terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ crematæ cum modico sale. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotūdi flos, uel nardi spicæ, uel folium malabatri, uel iuncus odoratus angulosus, uel iris.

Dentium candorem concilians, & oris suauitatem faciens gingiuasque reprimens.

Pvmicis, salis costi, iridis singulorum drachmæ quatuor, iunci odorati angulosi drachmæ quinq;, spicæ nardi drachma, piperis drachmæ sex. Tritis utitor.

Ad stuporem dentium.

Stupori benefacit portulaca commāducata, uel oleum quod immaturæ oliuæ fuderunt infricatum, uel amurca in æreona se cum oleo cocta, donec mellis spissitudinem habeat, atque uetusta si perungatur, magnum affert momentum.

Ad dentes attritos.

Dentibus attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochiæ

chiz sarmentorum quæ clematicis dicitur, singulorum pares portiones iniiciuntur.

Ad gingiuas corrosas.

Rosarum floris drachmis octo, gallarū drachmis quatuor, myrrhæ drachmis duabus, si gingiue erose, & humiditatis uitio staccidæ, colluantur, sanescunt. Idē præstat lac asininum, oliuæ foliorum decoctū, acetum scillites: arida uerò admota, ærugo ferri, cytini. Tumidas excrescentesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria ex colymbadibus oliuis, calidū, calidum, uel lentiscinum, uel melinum amurcæq; discutit: sicca autem, ærugo ferri, uel ær. s. aristolochiæ radix, arnoglossi semen, dyphryges, atramentum sutorium tostum, cytini.

Ad disrupta labra.

Amurca cocta illinantur: uel hoc prodest adeps anserinus cum melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

Aduersus linguæ morbum qui batrachus appellatur.

Batrachus tumor est, ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maximè in pueris: itaq; locus misyos, æruginis rasæ, pari pōdere sicco perfricatur. Mento autē adhiberi debet medicamentū. Anthera, uel spherion, uel ex ouis perigrum. In adultis remedium est uenas sub lingua diuidere.

ALIUD. Valet etiā ad oris ulcera, quas Græci aphthas uocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis singulorū equale pondus cum passo. os etiam his colluitur. ALIUD. Erui farina cū melle prius absterfis, delinitur, galla leuis cum melle, uel rosarum flores similiter. Vel oliuæ foliorum decocto colluant.

Ad tonsillorum inflammationem.

Si in febris tonsillæ, & columella inflammationem senserint, sgargarizare cōuenit decocto fursurū, aut rosarum, aut palmarum, aut myxæ, aut lenticulæ. Cum uerò inflammatio remittit, consistitūe, mel ipsis adiiciendū est, quod per initia facere nō oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionē quandam cōcitent. Vbi in suppurationē conuersa eruperit, gargarizandum est, ex mulsæ uel lenticulæ decocto, uel rosarum: idq; faciendū est, donec in totum soluatur: aut stomatica collutio ad gargarizandum etiam exhibebitur. At si pestifera tonsillis
ulcera

ulcera oboriantur, utendū quidem & præscriptis, sed priuatim exhiberi debet medicamē diamoron, ex aqua calida, uel aqua mulsa, quæ rosarū inspersum florē obtineat, uel costū, uel -hus sicca, uel decocta, uel glauci foliorum aridorum decoctū quod amarum est. optimè autē facit, si succū, ut ad collyria utimur, in mulsa dissoluis. ipsius autē fruticis sicci, si inspiretur, usus est laudatissimus, aut si digito admoueatur cura uero habenda est ne prorsus attingatur, aut certē leniter admodū. Profuit & pastillus Andronius. Post hæc acria irritantia uē gargarizatur ex medicamento, quod ex dulci radícula quæ glycyripe dicitur, constat: aut eo quod croco, uino scybelite, terra chia, & myrra cōponitur. deinde amylo, & tragacanto. Vbi iam cōstitit ulcerum depastio, gargarizandum medicamento ex lacte & samia terra confecto. ALIVD. Ad tonsillas quæ post inflātionem induruerunt, ἀντιόξας græci nominant. Ex malo punico dulci cum cortice tuso succus exprimitur, & eius partes sex, mellis uni mistæ coquuntur, donec eis mellis spissitudo sit & perunguntur. ALIVD. Gallæ omphacitidis uncia duæ, aluminis scissilis uncia, salis ammoniaci tosti tantundem. Pulvere attingito. ALIVD. Gallæ drachmę octo, misyos drachmę duę, salis tosti drachmę quinq; utitor puluere. est autem Antias, tonsillarum tumor, schirrum præferens.

De uua.

VVa si inflammationem experitur, gargarizandum ex iisdem, quæ tonsillæ inflammatae postulant, & mediocriter astringentibus, qualis est mali punici succus per cochlear, uel instrumentum, quod ab uua attollenda staphileparton appellant, subiectus, tum per se, tum cum melle affatim cocto. uel dulcis radix, mali punici succo mista. proficit etiam succus dulcis radice cum melle illitus. iam hæmatites lapis uuam reprimat, & phrygius combustus, & ageratus, item ex lapide phrygio medicamen ad pudenda inscriptum. His adduntur terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, & omphacium, per se & cum horum aliquo. Item spinæ egyptia succus & alumen scissile rosæ uero, & semen, & folia lenius operantur, adhuc lenius gummi, tragacantha, sarcocolla, amylo, quibus utendum dum magis una prematur ab astringentibus constricta. ubi æqualiter crassa fuerit ipsa, quod

uicium

uitium iam uuam Latini, κιδνα Græci propriè dicunt, gargari-
zationibus fidendum etiam ijs quæ ex myrrha, & croco, & iun-
co anguloso fiunt. Contusiones autem cauendæ sunt, ob quod
pinna potius perungere conuenit. compositum uero hoc uti-
le est, rhus syriaci drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, costi
drachmæ octo, rosarum seminis drachmæ quatuor. Præterea
gingiuis benefacit, linum ex purpura marina, quod uiperæ col-
lo circumdatum ipsam strangulauerit. deinde circumadigatur
tonfillis, & colli uitijs, mirabili quodam modo opitulatur, ut
Galenus author est.

Ad sanguinis ex ore profluum.

POrri folia contusa imponuntur, uel sponsia recens in picē
crudam mersa comburitur, in puluerem coacta utitor, ac
ualde utile est remedium, & collutiones oris ex rosis siccis, aut
uiridibus. Ad hæc decoctum frigidum, uel pampinorum uitis,
uel lentisci foliorum, uel rutæ, uel malorum cotoniorum, uel
rosarum, uel uuæ acinorum, uel lenticularum.

*De anguina, eiusque speciebus: ubi etiam de strangulatis:
uel alio modo suffocatis agitur. Cap. XXVII.*

INterioribus faucium, pharynga Græci uocant, musculis in-
flammati angina accidit, quæ synanche Græcis dicitur: ex
terioribus, parasyanche. Eodem modo & in superiore gut-
turis parte, λάρυγξ Græci nominant, habet: cuius si interiores
musculi inflammatione confluentur, cynanchem: si exte-
res, paracynanchem efficiunt. Hæc autem comitantur omnes.
recta ceruice spiratio, dolor cum difficultate spirandi, nonnul-
lis etiam febricula oritur, faciei rubor, ceruicisq; & tumor in
quibusdam os egri apertum habent, & deuorare nequeunt. Cy-
nanchicos uero strangulatus quoque interdum secutus est.
Pueris raro talis affectus oboritur, cum scilicet ceruicis uerte-
bræ affectæ loco suo excidunt. Verum illis ceu curationē non
recipientibus, ac deploratis, manum admoliri non oportet. Re-
liquis autem sanguis protinus è cubito mittendus est, sed non
subito ac semel, uerum pluribus interpositis uicibus enacua-
bitur. quippe cum lata, semelq; facta uacuatione, anima ipsis
deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum materia
in affectam partem collectim prorumpit. Si per hæc non le-
uantur, eas quoque uenas incidere conuenit, quæ sub lingua
sunt,

sunt, uel ipsa quoque lingua scarificanda, si propensior foras cum tumore appareat. Alius acriore clystere subduci debet, pedes aqua calida foueri, extremæ partes ualide deligari, collum lanis succidis, uel etiam oleo imbutis contegi, crudaque farina ordeacea, quæ Græcis ὀμὴ λωσὶς dicitur modo cataplasmatibus obduci. gargarizandum uerò per initia ex eis quæ in tonsillarum inflammatione dicta sunt, uel simplici diamoron, † cum thus decocto. Potius autem est diamoron, quod syluestribus moris conficitur. Deinde & compositio diamoron, uel eo quod diacaryen à nucibus uocetur perungantur. Cum autem morbus uiger, consistitque, & nitri momentum admiscendum est, aut etiam sulfuris uiui, nisi acrimonia quædam prohibeat. item sterqus caninum aridum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum & remedium: idque album maxime, item syluestrium hirundinum cinis similiter efficax est. Si malum longius prorogatur, etiam perunctione diabesasa, utemur, nunc uires ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intendentes. Cucurbitula quoque, uel hirudo sub mento, & circa ceruicem admoueri debet. utendumque gargarismatis ex iride, hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, sicis pinguibus in mulsâ decoctis, uel rutæ succo cum lacte, uel sinapi cum oxymelite. Sin autem ex his quædam acrimonia percipiatur, oleum ipsis quàm optimum calens exhibetur, aut rosaceum per se, aut cum cremore ptisanæ, aut scœnugræci gargarizandum. Cibus sit triduo aqua mulsâ, inde ptisanæ cremor cum dulci quadam potione, deinde & ouorum lutea perliquida, ac sorbitionibus utendū ex chondro, ubi deuorare melius cœperint, & cibus qui ægri uiribus respondeant. Cū morbus cœperit inclinare, ægri deambulationibus & balneo credentur: pars affecta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliquaque uirū recolligendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex strangulatis, quibus spuma iam circa os emanat, manus admoueri non debet: si Hippocratis cōsilio acquiescimus. Alij uerò uitæ restituantur, aceti infusione & piperis, uel urticæ seminis in aceto triti acerrimi. Verum quia ægre magnoque negotio assument, compellere eos ratio est. Discussis autē colli ruboribus, statim sursum respiciunt, & ad se redeunt. similitudo in his qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur. Nam ita horum calor recreatur, refocillaturque.

† In nostro codice est σὺν ἀφελήματι ῥοιᾶς, id est, cum deco-
cto mali punici.

*De grauedine, destillatione, raucitate, &
tussi. Cap. XXVIII.*

Communis est hisce uitijis, excrementitij humoris ex capite in subiectas partes descensus: si in nares decumbit κόρυζα Græcis, grauedo Latinis appellatur: si in fauces, & palatum, simplici uocabulo κατάρρεος, nobis destillatio. si in guttur, & asperam arteriam defluerit, ut etiam membranam internam quæ hanc integit, exasperauerit, rauca uox efficitur, uocaturque malum Græce βρόγχος & ἀσθμαίνικον Latinis raucitas. In quibus non solum ex capite, sed etiam uehementi clamoris conatu, & spiritus inspitatu frigidi asperitas contrahitur inflammatoria. Si morbus perseueret, fluxioque in pectus, pulmonesque defertur, tussis oboritur ipsis maligna, ac contumax. Iam & propter intemperiem subinde tussis accidit, interim ob calidam, ut in febribus: interim ob frigidam, ut aquilonijs diebus, eaque magis sicca est. Iam uero alijs quoque morbis tussis nonnunquam symptoma efficitur: uerbi gratia, pleuriticis, iccorariis, phthisicis, pulmonariis: Galenus itaque in diuturna tussi grandines quasdam ex pectore educi memoriam mandauit. Alexander autem calculum quendam grauem, qualis in meatibus urinariis nascitur, post longam tussim expulsus: ac inde illam quoque cessasse prodidit. Porro nos in sanguinis reiectione calculos excerni uidimus, quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius commemorabimus. Qui igitur ex æstu grauedinem, uel destillationem concipiunt, his calor sensus oboritur circa partes affectas, acris, tenuisque humor destillat, tum per nares, tum per os, faciesque rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput undique & frons distenditur: meatusque ossium quæ à colo ethmoide uocant, clauduntur, ne uox deorsum per nares transmeet: si uero longius malum trahatur, tussis quoque affligit, pituita educitur, nunc cruda & liquida, nunc uiridis. Quibusdam & febris superuenit: quæ ob æstum laborantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctionem efficit.

V *Curatio destillationis, & grauedinis.*
Bi calida præpollet intemperies: iis pugnandum est præ-
sid. is

fidijs, quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt. balneo utendum est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi uero his proderunt ad sorbitionem aptati, oua forbilia, amyllum, liba dulciaria, quæ itria dicuntur, sesama, necnon amygdala item nux pinea, & quæ ex lacte fiunt bellaria: uina dulcia, non uetera. medicamentum diacodion linctu assumptum, & quæ his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus contumax sit, modico utendum cibo est, caput calefacientibus, tenuiq; substantia præditis nardino, rutaceoq; debet perungi. Irinum uero non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur: intus nares thure, & myrrha cum oleo perunguntur, præsertim si perfrictio grauedinem crearit. Alios naribus odoranda adhibita iuuarunt, ut lacineæ panniculorum combustæ, uel melanthium, uel cuminum ustū illigatumq; in panniculo. Iam cyphi sileniacum, id est lunare olfaciant, fronti que illinatur, cui simul unum ex emplastris, quæ inflammationem arcent, agglutinabitur. Exempli gratia Icesium, uel Oxera, uel Barbarus, uel Athens. Ad stillationem uero ex frigore ortam, & cyphi potus utilis est. Thorax autem balsami liquore illinetur idemque per lanas succidas cum styrace, & irino, uel anethino circumfouebitur. Cibus calidioribus, & ad concoctionem promptis uti commodum est, ubi iam materia concoquitur medicamen quod pituita per os educat, idoneum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sapo, atque eius generis consimilia.

Raucitatis curatio.

Raucitau quæ arteriacum & branchum appellauimus, competent quidē superius comprehensa, uerum priuatim ubi arteria, & caput eius quod larinx dicitur inflā matoriam quandam affectionē experiuntur, emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate præditis per initia utemur, donec inflammatio remissior enaserit: talia uero sunt quæ ex passio cretensi, tragacantha, gummi & amylo cōstant. Item pinguium palmularum decoctum. & dulcis radice cum sapa, donec mellis spissitudinem conquirat. Item compositionem quas quod sub lingua reneantur, *ὑπογλωττίδα* appellant usus est. Ante omnia uinū hoc tempore circuncidendum: postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, uinum dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte,

lacte, cū amylo, uel pane filigineo Adhæt sorbitiones ex amygdalis, butyrumq; utile. At si humor in particulas se receperit: transeundum est ad ea quæ ualentius abstergūt, cuiusmodi est ferculum ex faba fresa paratum, & quæ ex melle præparantur. His adde brassicam & porra probe cocta. medicamenta uero calidiora & ad tussim accommodata profunt, quæ constant sapa ex ficis pinguibus confecta, thuræ, iride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, casia & his similibus.

De tussi.

Tussis quoq; eadem ratione curanda. hoc solum inspicitur num aliarum particularum consensu fiat ut gurgulionis distillantis, uel capitis, an alijs morbis coincadat. His ubi quàm fieri potest optime erit prospectum, quemadmodū à me cōprehensum est, diceturq; in posterum, tussis curationem molire. Compositorū uero præsidiorum enumeratio hic subiecta est.

Catapotia ad distillationem in fauces & tussim.

Styracis, myrrhæ, opij, galbani singulorum pares portiones. passo excipiuntur, uel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternæ uel aut quina, noctu dormituro dantur: passumq; superbibitur. Hæc ad acrem tenuemque fluxionem ualent. **ALIVD.** Alterci seminis drachmæ duodecim, nucleorum pineorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ. sapa, uel passo in usu excipiuntur.

Eclegma.

Mellis uncia, butyri semūtia, simul incocta exhibetur: itē ex hyssopo, ficibus, nucleis pineis, & iride decoctū sorbetur.

Catapotia ad ueterem tussim accommodata.

Styracis drachmæ sex, myrrhæ drachmæ duæ semis, terebinthinæ, galbani, opopanax, iridis singulorum drachmæ duæ, piperis albi, nitri, seminis alterci, lachrymæ papaueris, singulorum drachma, sine ullo liquore in pila tusa in catapotia rediguntur: utitur ut prædictum est.

Ad aspredinem gutturis, tussim & sputū cruentum.

Amygdala amara, quibus cortex sit detractus uiginti quinque, seminis lini torrefacti drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum uero passo excipitur:

PAULI ÆGIN. m si uerò

si uerò & sonus uocis fuerit oblæsus, mel miscetur in passi uicē & præsertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

Arteriace quæ quod sub lingua teneatur hypoglossis appellata, facit ad obcisionem uocis, raucitatē. item ad eos qui egre reijciunt, anaphoricos græci nominant.

TRagacanthæ drachmæ sex, gūmi tantundē, myrrhæ drachma, thuris drachma una semis, piperis albi grana uiginti, croci drachma una, dulcis radice succi drachmæ sex, palmularū triū caro, passi cretici, quantū sufficit. Atq; succus tragacanthæ solus ipse sub lingua loco dulcis radice succi retētus. Eiusdem decoctū spissitudinem habeat quadruplum inditur.

Arteriace ad abscissum uocis sonum conuenit, & eos qui uocis exercitio utuntur.

Porra sex coquito, usq; ad iertias, atq; ipsa proijcito, iuri ipso succū alicæ admisceto, mel & ouorū prius decoctorū lutea tria simul incoquito, circumagitās anethi ramusculo.

Compositio ad tussim, græce bechicon appellatur.

PVlegij sextans, nucleorum pineorum, cnici seminis, lini seminis singulorum uncia, piperis cocti triens, melle cocto excipiuntur. **A L I V D.** Hyssopi pulegij, piperis singulorum uncia, petroselini semuncia.

Medicamentum tussim ueterem concoquens.

Mellis drachmæ sedecim, terebinthinæ drachmæ duæ, galbani drachmæ quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabæ magnitudinis, nucis uel auellanæ atq; ex his delingitur. **A L I V D.** Aridam tussim curant tum arteriaca medicamenta, tum aquæ nonnunquam feruentis sorbitio. nam dū propter pituitæ crassitiem non excreant, reijciunt quæ, humectantibus aliquantulum iuuantur, cæterum conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis, & pinei nuclei decoctum.

Pastillus à fumo distus capnistos ad tussim continuam.

STyracis, piperis, mastiches, petroselini, singulorum unciam, sandarachæ scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in carbones proijcito fumumque excitato, ut tussiens hunc per

per infundibilum aspiret . conuenit & qualemunque perfri-
ctionem expertis .

*De orthopnœa , & suspirio , & spirandi difficul-
tate . Cap. XXIX.*

Q Vi febris expertes , crebro ueluti à citatiore cursu re-
spirant, ab accidenti quod superuenit nostris suspirio
si, Græcis ἀσπυρτικοί appellant, ijdemque hinc quod
omnem figuram totius thoracis rectam seruent, strāgulari me-
tuentes, orthopnœici dicuntur. creatur hoc mali cum fistulosæ
pulmonum cartilagines crassis, glutinosisque humoribus fue-
rint infarctæ spirandi autem difficultas commune est sympto-
ma, quod & his, & alijs compluribus affectibus superuenit . In
curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est , ut per exte-
nuantia, abstergentiaq; medicamina, glutinosus humor, & cras-
sus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites & oxy-
melitis ex ipso præparati potio, ipsaq; scilla tosta læuigataque
cum melle . Ex antidotis hiera, & purgatio continua ex uali-
dissimis medicamentis petita, à radícula uomitus, aristolochia
rotunda, pota, cētaurii magni radix, spondylii semē, radixq; ca-
laminthæ semē hyssopus, iris, melanthiū, asellorū qui sub aqua
riis uasis agūt sextarius in uas fictile coniectus, carbonibus sub-
ditis frigitur. Vbi candorē acquisierint, teruntur, & melle co-
cto excepta mystri mensura ante cibū secundumq; ipsum dan-
tur. Quod si necessitas urgeat, etiā uena ante hæc omnia inci-
detur, & quantum uires patiuntur sanguinis detrahetur: aluus
clysteriis sollicitatur, Thorax à foris, sicubus & lolij farina ob-
ducendus est, cui adiecta sit resina, cera & mel. Inspargatur autē
ipsi iris & manna. Nō inutilis est & farina ordeï cruda, cum resi-
na, cera, iride, & manna, unguētis autē utēdū calidioribus, irino,
anethino, rutaceo. Sed quod subscribitur medicamētū, huic ui-
tio proprie dicatum est, pumicis pars una, fæculæ, quæ est ui-
ni fæx, combusta, partes quatuor, auripigmenti pars una, iunci
rotundi floris partes duæ, alcyonii pars una , aphronitri partes
duę. Contusa incernuntur, unguentisq; excepta, thoraci infri-
cantur. Malagmatis utendū est quæ serosas superfluasq; sangui-
nis humiditates, græci ἰχθῆρας nominant, possunt extrahere .

Potio suspiriosis apta .

P O L I I , abrotani, castorei, chamæpyteos , guttæ ammo-
m 2 niaci

niaci, singulorum par modus. Melle subacta exhibentur. **ALITER.** Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum tribus mulsæ cyathis. **ALIVD.** Aphronitri drachmæ nouem, piperis drachma, filphij drachma semis. Cochleariū ex aqua datur. **ALIVD.** Castorei, suffiminis ammoniaci, singulorū drachmæ sex, piperis grana uiginti, passō excipiuntur. Instar fabæ cū mulsæ exhibetur. **ALIVD.** Sinapi drachma, nitri spumæ tres oboli, elaterij semiobolus. Totum in pastillos octo digeritur. Bini duobus diebus offeruntur, nam sine molestia supra purgant. His qui præfocantur, aphronitri drachmæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumētur, ac cum cardamomo nonnunquam, subito auxiliatur. benefacit etiam coxendicibus.

De peripneumonia.

Cap. XXX.

Peripneumonia pulmonis est inflammatio, quæ plurimū ex ualentibus in eam partē distillationis, aut angina, aut suspirio, aut pleuritide alijs uel morbis contrahitur: Aliquando etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hæc subsequitur spiritus difficultas, febris acuta & ardens grauitas distensioque pectoris tumor & magna repletio faciem occupat, materia sursum ignis instar impetum faciente. Malæ itaque in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum nutant, tunica oculi ceratoides, ob cornus imaginem dicta, in pinguedinē languescit. Cum uera signa ad æstum flagrantiorē declinare uidentur, pulmonis inflammatio Erysipelatis naturam resipiens, subesse existimabitur. In ijs igitur qui ex alijs morbis huc decidunt, sanguinis detractio uitanda est, maxime si diu hoc in statu fuerint, uel si per initia sanguinem dimiserint. Verum alius in morbi remissione clystere ducenda est, si ægre respōdet, aut cucurbitulæ, ubi nihil obstat, pectori, & lateribus admouendæ sunt, eæque prægrādes, & multæ, cute incisa. Sin autē peripneumoniæ affectus statim ab initio inuaserit, sanguinem mittere, suffragrātibus qui huc requiruntur, numeris, ex usu est; sin minus, cucurbitulus certē desigere: quibus tantū elicietur sanguinis, quantum uires patiuntur. Quod ad cibū uero attinet, danda est sorbitio ex ptisanæ cremore & chondri cum melle, uel ex amaris amygdalis cum similagine, aut chondro, dulci quadam potione admista, hydromalo, uel apomelite, uel hydrosato. Rectē sumitur & recens butyrum, cochlearibus circa tribus,

bus. Propinatur autem ipsis ficuum cū hyssopo decoctum, uel iridis in mulsā coctā, uel leuigatā instar duū cochleariū mulsæ insperforū. Hoc itidē, ab inferioribus partibus expurgat. At uirtutis tuēdæ gratia, crebrius potui assumetur, mulsā per se & cū nucleis pineis, ac cucurbitulæ uniuerso thoraci laboribusq; agglutinabuntur. Ceratum uerò cyprinum quod contineat iridem inspersam, imponetur, uel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, uel epithema ex cera, resina medulla ceruina, butyro, æsypo medicamento, iride sicca, & nardina unguento.

*De cruentis sputis.**Cap. XXXI.*

CRuentum sputum si disrupta uasorum commercia excitarint, multum sanguinis euacuabitur. Et quidē modo manifesta ex causa, ut alto delapsu, clamore, & cōsimilibus, modo ex occulta, ueluti plenitudine, aut frigore immodico, nam id uenis rumpendis esse habile scribit Hippocr.

Si uerò exesa parte aliqua sputū cruentū æditur, nō conferim, sed paulatim sanguis reicitur, sic ut acres quidam prauiq; cibi, uel inedia, uel acris ex capite destillatio præcesserit. At si ex adaperitione, *ἀναόρωσις* appellant, nullū quidē ex prædictis, præterquam plenitudo interdū præcedit, sed uictus humidior, calidiorq; balnei immoderati usus, calidi nimis loci inhabitatio morbū facere uidebitur, & neq; inflammationes, neq; febres, neq; dolores experientur: sicut in iis euenit qui exeso uasorum corpore, *διάσφωσις* appellāt, sanguinē reiciunt: Imo contra leuius faciliusque agent (ut uerisimile est) euacuati.

Quod si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua nō respōderint, ēt particulis, erūpens sanguis subtrahet. Idē uerò hic pariter iis qui ex uase plenitudinis causā rupto uacuātur, satis ad ualeitudinem proderit, nisi ex ulcere, aut immodica uacuatio-
ne noxam senserint. Quæ uerò exesis uasorū tunicis sanguinis fit euacuatio: nunquam commodē cadit, facitq; ualeitudini.

Quod si per uomitum excreetur, clarum est eū ex stomachi, aut uentriculi regionibus procedere. In quibus & per annum infra descendens nonnunquam uacuatur. Si cū tussi, ab instrumentis respirationi dicatis prodit. Iam uero spumans & subalbidus sit ex īterualloq; reicitur, ut dolor absit, & pressio, ex pulmone ferri notum est. In quibus temporis spatio, febris sequet̃ continēs, præsertim iis quibus ex erosione profluit,

m 3. & non

& non nihil ex pulmonis substantia, aut arteriæ asperæ circuitus qui *βρόχιον* dicitur, aut uena egeratur. Notus certe quidam mihi est ex iis qui sanguinē è pulmone reiciunt tēporis processū maxima cū tussi, & sanguinis copia, calculos quatuor, aut quinque expuisse asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarum trium, aut quatuor, ac deinde dolore leuatus est. paulo post tabe cōsumptus interiit. Porro si pituitosa cum tussi leuiore, uel sreatu quoque; ædatur, eaque spumosa leuiaque, exaspera arteria prodire scito. Si uero ater sanguis & in grumū concretus fuerit doloremque; in loco testetur, ex thorace educi significat, per pulmonē arteriamue translatus. Qui uero sreatu, ex faucibus per palatū educit. Cæterū si quādo à capite destillet, cū irritatione quadā, & tussi æditur, ut qui ad asperæ arteriæ caput defluat: iterumque; sursum feratur, hæc acris plurima ex parte distillatio, uel capitis dolor, uel grauitas præcedit. Accidit autē nōnunquā per palatum sanguinem uacuari, & propter hirudinē deuoratam, & alicui indidem particulæ adhærescentem. Verum de hac in lib. de uenenis pertractabitur.

Curatio ob distillationes humoris aeris.

Quibus destillatio cruentū sputū cōcitant, uena protinus debet incidi, nisi uehementer acris humor destillauerit, ac pro uirium modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoque; ueteri calido, uel sycionio præter caput perfricari. cibis adhiberi. frumētaceus cui succus alicuius austeri adiectus sit, ut mali granati, pirorū, malorū, uel illa eadē simul incoquat dormituro ex pastillo diaelectru dat tertio die mellis cocti momentum delingitur. Quod si morbus longior hæc uicerit, capiti raso medicamentū, quod ex fimo syluestriū colūbarū cōstat, imponis, & post tres horas medicamēto deposito, balneo ægrum cōmittis, sic ut caput nequaquā inungat. Deinde ubi sorbitionibus alueris, somnū capturo. Theriace antidotū datur, iterumque; die insequenti, ubi dederis, similiter totum corpus, præter caput perfricato. huic autē ceratū ex thapsia, aut aliud quoddā iniicitur. & rursus utendū sorbitionibus. Quod si malū in ætatē incidit. cucurbitula occipitio defigenda est. At si acris admodum fuerit distillatio, sanguinis detractio cauere debet: alimentis autem & præidiis iis tū quæ supra, ubi de distillatione egimus cōprehensa sunt, tum quæ mox dicentur, utendū. Qui ob frigoris

goris iniurias sanguinē expuūt, thorax illis fouēdus est remediis, quæ calfaciūt ipsum simul & desiccant, quod præstat medicamentū diadyopeperion, i. quod duplici pipere cōstat, una cū pastillo diaelectru, hoc est ex succino exhibitum. At qui ex respiratoriis sanguinē reiiciūt disruptis ortis uenarū, aut patefactis, uenā iis secare cōuenit, nisi sanguinis copia prorūpat. oēs aut quos hoc uitii premit locis aeri expositis decūbēt, lecto immobili, figura sublimi, cauētes ne uehemēter respirēt loquanturq; imponēda aut extrinsecus supra partes affectas, spongia ex tepente posca. A septimo die lana succida cum rosaceo, uel myrteo, uel lentiscino, cui interim acetū interim uinū austerū sit additū: si copiosè efferēt, farinæ pollinē, & mannā thuris cū aceto superaccōmodamus, uel alumen, uel acaciā, uel malicorium, uel gallā cū aceto, uel palmulas cū polētis, & malis cydoniis in uino austero decoctas. post hæc aut & emplastrū diaiteō hoc est ex salicibus iniiciendū, præsertim ubi moderatior sanguis fertur. Per os autem hæc sumpta proficiunt. portulaca cōmanducata benefacit efficacior autem succus ipsius epotus, balauistiū, rubi fructus & flos, quercus mēbrana cortici subiecta, & quæ glandis putamini subest tunica, maximè uero cocta ipsa utūtur: fagi aut & ilicis mēbranæ præstatiores sunt, terra samia quæ aster dicitur, ad oēm sanguinis reiectionē. Itē lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuissimū pollinē detritus cū succo mali punici, uel polygonii, pondus aut lapidis erit scrupulus unus. Cōposita medicamenta hæc profunt, pastillus diaelectru, diacoralliu, & qui ex spina ægyptia conficitur, itē puluis confectus ex terra samia quæ ἀστυς dicitur, lemnia sphragide, corallio, simphyto, amylo, omnibus pari modo.

Cum signis exesi uase reiscitur.

IN his autem qui corrosis partibus expuunt sanguinem, idque potissimum, ut destillatio præcesserit & opii partē semissem adiicimus. Insuper medicamentum his facit, quod samii asteris, agerati lapidis, lemnia sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochleariis potum ex duobus plantaginis succi cyathis. **ALIVD.** Lemnia sphragidis drachmas sedecim, samia terre, quæ aster dicitur drachmas octodecim, amyli drachmas octo. sarcocollæ drachmas quatuor gummi drachmas duas, pulueris cochleare unum cum decocti palmu-

m 4 larum

larum cyathis duobus. Superbibant autem etiam poscam frigidam, uel palmularum, uel malorum, uel pirorum, uel pampinorum uitis, uel eiusmodi cuiusdam decoctum. nutriuntur uero, si uires quidem requirant, ad secundam tertiamue horam, sin minus circiter quartam. Panis sit lotus ex aqua frigida, uel alica, uel chondrus † cum quodam succo refrigerante, puta mali granati, uel myrti, uel omphacomelitis, uel oua forbilia, uel aliquod ex lacte bellariu, cum quodam astringente. Inter olera, seris, cichorium, plantago, cum oleo immaturo, acetoque incocta. Ex fructibus mala, pira, mespila, malum granatum, corni fructus potus erit si febris careat, uinum aquosum, modicum: si febris adest, ex praedictis quaedam potio, uel hydromalum cibariticum. Porro qui uomunt sanguinem, iisdem sustentandi sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum sumant: quippe ex facili curantur: quandoquidem auxilia etiam quae bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus palam appropinquant. At sanguine in uentriculo grumi instar coactro, coagulum potandum est maxime leporinum, aut lixiuium ex fici cinere, cum aqua, uel thymum, uel satureia cum aceto, uel etiam ex lacte scissili uacuari debent, aut ex aloe. Rursus qui per palatum sreatu sanguinem reiciunt, gargarizabunt ex astringentibus, fronti; & capiti admoenda sunt quae ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur. Haec eorum qui sanguinem expuunt curatio est, quam summa obire cura conuenit propter imminens ex immodica uacuatione periculum: si quidem copiose uacuatus sanguis quemadmodum in his qui iugulantur, mortem infert praesentaneam, si affectus remanet, in tabem transire minatur. postquam igitur omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor substituerit, uires ipsis recolligendae sunt, roborque adhibendum, ac recentium porculorum perunculi, ac cerebella huc faciunt: corpus perfricari debet. uitari autem, balnei frequens usus, & uini potio, ira & uenus.

† Scriptura quae est in ueteri codice est multo uerior, μετὰ τινος τῶν τυφόντων χυλῶν οἷον ῥοισιᾶς ἢ μύστων, &c. id est, cum aliquo succo adstringente.

De purulentis & tabe quae phthisis dicitur. Cap. XXXII.

Puris illuies quod ἐμπύημα graecis dicitur, in uacuis thoracis regionibus, uel membrana quae costas succingit, colligitur.

colligitur. interim propter sanguinis educationem, ulcere ad cicatricem non perducto, quod etiā tabes statim comitatur si ex pulmone fiat reiectio: Interim ex inflammatione suborta: quę deinde in abscessum conuersa, rupta; fuerit, quemadmodū & in laterū doloribus, quam pleuritidē uocant, nonnunquā accidit: uel propter confluxum ex capite manantem. notæ igitur empyematis adhuc cōsistentis erunt, grauitas thoracis, tussis ualida, sicca; cum dolore, aliquando etiam cū humiditate, ob quā releuari quoq; uidentur, febriculæ per initia affligunt, languidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquam uero abscessus ad uomicam inclinauerit, uehemētius cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis proprietate conturbātur, spiritu molestati. Rupto abscessu, pus educitur, nunc purum, nunc fæculentum, & nonnunquam sursum abscessus erumpit: quando etiam periculosior est: nonnunquam infra. Ac ea quę inferius tendunt, partim in uentrem & intestinum transsumuntur, partim in uesicam traductione per uasā quædam administrata. semper autem feбри hectica laborant, quoad sursum omnia fuerint educta. In quibus, nisi summa adhibeatur diligētia, protinus purulēta illa collectio in tabem quam phthisin græci uocant transit, pulmone exulcerationem sustinente. In quā iam phthisi confirmata, genæ liuescunt, desudationes in frōte, ac ceruice fiunt, carnes colliquantur, ungues curuantur, pinguesq; & exalbidi uel pallidi apparent. Malo iam uincente, uenter turbatur, præcordia sursum conuelluntur, sitis ipsos magis conficit, cibi quę fastidium urget, & id quod sursum uergit, uehementer foedi odoris est.

Curatio.

Primum igitur puris collecti concoctio adiuuanda est fomentis per spongas, & cataplasmatibus, ex hordei farinis cū ficis pinguibus incoctis, resina modica, columbarū fimo, nitro, & hibisco. Rupturam uomicæ promouet etiam sani lateris incubitus. mulsæ autem sorbitio interposito tempore, & ptisanæ cremoris cum melle. Valentiores, bibant decoctum quoque hyssopi, & thimi cum melle. opitulatur etiam rupturæ, & fassamentorum esus, & catapotia hieræ diacolorynthidos dormituro data. At ubi pus excerni cœperit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radicis decoctorū in mulsā potio, uel dulcis radi-

cis radicula cum sisamo detrita. Item pollen, mulla & oleo incoctus superaccomodatur. Quod si ulcus aegre possit sursum repugnari, compositis utendum est, puta medicamento dia prassiu, hoc est ex marrubio, simplici & composito. item, dia orobon, id est, eo quod eruis constat, necnon dodecatheo & phyloxeno appellatis. Verum in tabem quae phthisis dicitur prolapsis, porra capitata, quae in chondri & ptisanæ sorbitionibus contabuerint, exhibentur: quae simul per se bis cocta offeruntur. Potus autem aqua coelestis erit, atque mulla inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia quidem remissionum, cataplasma ex semine lini & polline ex decocto foenugraeci, uel maluae, olei mellis & foliorum althaeae. temporis autem processu, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride transitus est. quin & emplastri Mnasei usus conducit. Verum si thorax fluxione infestetur, medicamentum diaiteon, hoc est, ex salicibus confectum recte imponitur. atque superius in purulentis simplicia dicta, nonnullaque composita ipsis propinantur. Tussi uero grauius affligente, thymum, hyssopum cum succo radiculae dulcis melle decocto excepta, formataque, sub lingua tenenda dantur. Ceterum conueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod uiperis constat. Optimum uero auxilium est, & boli armeni portio. item Eldrae Antidotum, nihilo praedictis minus proficit.

De laterali dolore, quae pleuritis dicitur.

Cap. XXXIII.

Pleuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, proprie inflammatio est membranae, quae costas succingit: Huic simul accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor usque ad iugulum & praecordia pertinens. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflammatione, in qua erant omnia modo comprehensa apparent, his notis discernetur, quod pleuriticis dolor punctorius adfit, tussis aliàs sicca, cum & crudus morbus significatur, aliàs cum sputo, quod humoris qui morbum facit index est. Rubrum siquidem & subcruentum aeditur, cum sanguis superat. Flauum uero & subpallidum, cum flaua bilis: quemadmodum rursus album, & leuiter spumofum, cum pituita. Ob melancholicum uero succum: nigrius pulsumque, durum & serrae modo inaequale obtinent. Iocinoris autem inflammationi, neque punctorius dolor, neque pulsus adeo durus superuenit, uerum tussis perpetuo sicca

ficca & quæ nihil emolitur, male habet: facies pallidior apparet. At quibus pleuritides ex musculorum exteriorum inflammatione creantur, quæ propriè pleuritides non sunt, iis cum eò quod sint sine tussi, sine sputo, ac sine pulsus duritie, ad manus tactum locus affectus indolescit: atque si tumor purulentus non fuerit discussus, extrinsecus incidi postulat, cum pleuritis quæ inflammationi membranæ costas integrentis fertur accepta, eo non feratur. Illa namque, nisi uel extra, uel intus, expurgetur, purulenta colluies empyema Græci uocant, multo citius in peripneumoniam degenerat.

Curatio.

ITaq; si dolor ad iugulum usque peruenit, remedium est sanguis dimissus. Sin autem ad præcordia descendat, purgatio. Recentiores autem omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationem, quæ purgatio solet accersire. Quod si uires non patiantur, neutrum facere oportet. Clysteribus acerbis utendum: & si quidem dolor fuerit mediocris, aqua mulsa, & ptisanæ, uel chondri cremor propinari post illos debet. Vbi morbus inclinauerit, porrum cremoribus rectè iniicitur, uel calaminta, uel pulegium, & urticæ semen, cum melle delingitur. Porro uehementes dolores à corporis uacuatione leniendi sunt lana calente, aut sulfurata imposita, aut etiam fomentis ex milio, aut furfure per sacculos adhibitis, aut ex aqua calida, aut oleo in uesicula. Lanæque succidas imponere utile est cum oleo & uino ex marina præparato. Vel sal iniicere, uel cataplasma diaspermon, id est, quod seminibus constat ex decocto chamæmeli, althææ, uel ficorum pinguium, iridis, absynthii, mellis modico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt sorbitiones cum mellis momento à septimo autem linctus ex amygdalis. & urticæ semine, ex melle simul contritis dabitur, uel eclegma quod ex butyro, & melle coctum est, utendumque medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci uocant hypoglottida. Epithemata conuenient cum quod à graui odore dyfodes nuncupant, tum diasampsuchu, id est quod constat amaraco. Item emplastrum peganera dictum, locis dolentibus utiliter accommodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequenter fuerunt abunde. Aluo iniici debet ab inferioribus partibus butyrum & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu piceæ,

piceæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent uigiliæ medicamen diacodyon delingere conueniet. Ex antidotis, & Athanasia, & alijs ad hoc compositis utemur. Post quartumdecimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsis admoueri, tenuiorq; feruari uictus debet. Deinde morbo inclinâte balneo æger credetur, frigus uitabit, solidiore utetur cibo. At si inflammatio membranæ costas integrentis non discussa, in pus transire uideatur, supra commemoratis utendum.

Ad laterum dolores sine feбри.

L Arerum doloribus sine feбри, bdellium medetur, & costus, brassicæ caulium combustarum cineri adipi q; mixta. Nam id medicamenti affatim discutit.

De cordis affectibus. Cap. XXXIIII.

C Ordinis affectus si quidem primario accidit, omni destitutus medicorum auxilio, in præsentaneam mortem præcipitat: nempe cū inflammationem, erysipelata, & intēperies ualidas in acutissimis febribus ipsum experitur, uel sanguinis profluuiū ex sinistri potissimum uentriculi uulnere. At si consortii lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore uentriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumq; & alias plerasq; causas, syncopen appellatam, quæ subitus est uiriū collapsus sustinebit, quæq; indicatur, animæ defectu, pulsuum paruitate, extremorum perfrictionibus, & sudore circumfluo. Quæ inquam syncope, si ualida est, medicinæ locus non est. Si uires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est. Itidē ualentes cordis palpitationes sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem uero cor si incaluerit, magnam crebramq; ædit respirationem. si perfrikerit, paruam & raram, quomodo autem cardiacæ syncopæ possint emēdari, secundo uolumine, inter ea quæ febribus superueniunt, sumus executi. Tantum uero hic adiiciendum est, si symptoma euincit, postquā extrema perfricata fuerint, inunctaq; & post puluerem ex pauimento iniectum aliaq; uiriū recreationi apta, particulis sudore diffatis iniicere emplastri modo conuenit myrtum detritam, uel cimoliam cretam, uel succinum, uel malicorium cum manna, uel terram samiam cum gummi. Extremis autem frigentibus adusque inguina & alas sinapi uel

uel pyrethrum, uel adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua aut uino frigido temperato, suum petūculi, articuli, rostra, alæ, omniaq; frigida. Capiti fronti q; omphacinum, aut astringens aliquod cum gummi, uel rosarum decocto imponetur. Præcordijs & stomacho cataplasma admouebitur ex palmulis, rosis, cœnanthe, acacia, hypocistide & alumine.

De palpitatione cordis.

NOui (Galenus inquit) qui annis singulis uerno tempore, cordis palpitatione affligeretur. Aduersus quam uenæ sectionem trienniū expertus commodā, quarto anno sanguinē prius misit quā symptomate corripere, atque ita securus fuit, eoq; modo multis subsequētib; annis factitauit, & conuenienti uictus ratione usus est attamen & hic ante senectutē, fato functus est, quemadmodum alii quoque omnes, nonnulli in febribus acutis subita syncope oppressi similiter interierūt alii ipsorum etiam citra syncopen, ueluti apoplexia tentati repente diem obierunt. Complures ita affectorum ætatem egerunt, minorē annis quinquaginta, maiorem uerò quadraginta.

De mammillarum affectibus. Cap. XXXV.

LAc à partu sæpe casei modo coactum māmillis inflammationes parit. Utendum igitur per initia est hisce rebus. spongia mollis posca tepente imbuta, expressaq; loco appositē superaccommodatur illigaturq; uel palmulæ cū pane ex posca in leuorē contritæ, uel ouo toto utendū est cum rosaceo, & cerati momēto, uel alumen, psyllumq; cum coriandro, uel portulaca applicato Vel lapis pyrites tritus cū cerato impositus illigetur. At distentione oborta, uel lacte in grumos concreto, panis ex hydrelæo, aut mulso instar cataplasmatismis iniicitur. Aut panis cum perdicii herba uiridi simul cū cerato, bis quotidie, aut lomentū cum hydromelite, uel sapa applicatur. Quod si uero pondus ferre nō poterint, superfusione utendum est ex dulci oleo calēte, per lanas deliciores Fetus autē adhibendi ex uapore calidæ aquæ, uel decocto fœnugræci, uel altheæ, uel apii seminis. Delinere uero māmillas conuenit pol line farinaceo cum seminis lini, aut fœnugræco cum hydromelite, aut sesamo quod cum melle aut butyro sit leuigatum. Cæterum ne lac exugatur cauendum est, nam maior per lactationem materies illuc citabitur. Inclinate autem inflammatione,

cerata

cerata hæc recte induces, betam oleo incoctæ quo ad intabuerit, ipsam quidē proiicito, oleo autem ceræ modicum iungito, ac utitor. **A L I V D.** Quorum crudorum lutea decē, cerato miscētur, qui uncia duæ & semis ceræ, rosacei uncia quatuor sint adiectæ. Postquam radícula agitaueris, muriæ quantum recipe re potest indito, & rursus ubi permoueris, utitor. Porro ad māmillarū durities, facit & medicamentū ex melle: tū omnia medicamēta molliendi facultate donata. Cū uero in abscessū uertitur, iis utendū est, quæ in parotidibus cōprehensa, sunt item illis, quæ, ubi de ascessibus tractandum eris, enumerabimus.

Archigenis de erosione māmillarum cum malignitate.

VInti Adriani boni sextarii uiginti, rhus quo coriarii, utuntur libra, cupressi pilularum tantundem, gallæ omphacinæ nigræ selibra, casia tantundem. Contusa uino diebus decem commadescant, deinde coquuntur agitata cupressi rudicula, donec dimidia ferè pars fuerit absumpta. atq; tunc herbæ proiiciuntur, succus coquitur dum mellis spissitudo fiat, deinde uitreo uase reconditur. In ulceribus depascentibus mero utitor. Sin autem crassius fuerit medicamen, uino liquari debet: ut applicetur māmillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis ex humiditate putridis, intestinorum torminibus. Idem uero dolores etiam lenit, lacte dilutum. Aliæ mammarum exulcerationes communem reliquis ulceribus curationem recipient.

Quomodo māmilla conseruentur.

CVminum cum aqua tritum māmillis obdunducitur, deinde spōgia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura stringito, à tribus diebus cumino deposito, māmillis florem bulborum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus triduum finito, idque ter mense facito. **A L L V D.** Cicuta in pollinem derrita, ad nouem dies imponitur: spongiaque extrinsecus, sicut comprehensum est: pauculis diebus interpositis idem facito: Quin & Naxiæ cotis detrimentum, uirginum māmillas conseruat tueturque.

Ad fædum axillarum odorem, sudationesque.

ALuminis liquidi partes duæ, myrrhæ pars una. Vino dissolutis utitor. **A L I V D.** Plumbaginem combustam, uinoque odorato extinctam, ex uino terito, myrrhæ momentum iniiciens quoad sordium fiat spissitudo, ac utitor. **A L I V D.**
Argenti

Argenti spumæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ duæ, amomi drachma. uino excipiantur. ALIUD. Aluminis liquidi drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. uino leuigatis utitor.

*De stomachi, præcordiorum & uentriculi affe-
ctibus. Cap. XXXVII.*

DE cibi fastidio quod febribus superuenit, grandi fame, quam Græci bulimon uocant, canino appetitu, stomachi imbecillitate, animi defectu, insuper siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore, ubi de febribus tractatū est, abunde disseruimus. quare de eisdē rursus dicere opportunum non est. At inflammationes oris uentriculi & iocinoris, astringentia misceri desiderant. Nā si sola relaxatoria medendi ratione curationem tentes, uitæ periculum intuleris. Ob quam causam, siue oleū fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, recte adiicitur astringēs aliquod, uerbi causa, absynthiū, uel nardinū unguentum, uel melinum, uel & malū cotoneū incoctum. Ceratum uero eius notæ est quo subinde utimur, ceræ cādidae uncia, per æstatem drachmis septē, aloes, mastichæ, singulis drachmis, olei omphacini, uel melini, & nardini quantum ad spissitudinem in usu satis est. Sin maiorem requirat astrictionem, ubi tam fuerit imbecillis, ut ne cibis quidem sit retinendis, admisceatur etiam omphacii drachma, aut absynthii succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, cœnanthæ, & rhus succi. Augendus autem cerati modus, qui aliorum medicaminum numero proportionem respondeat. Quod si inueterascit inflammatio, indurescitque, uaria iam magis applicare oportet. tum ea quæ ex aromatis non nihil, & emollientibus, discutientibusque continent, cuiusmodi est quod ex meliloto præparatur. philagrianum, & quod ab odore grato εὐωδῆς dicitur, & uiridis iaspidis torques à collo suspensus, ut stomachum contingat magno est præsidio. In calida autem stomachi intemperie & ardore cum eius resolutione, uel animæ defectu, uel quodam cibi fastidio, ex quacunque tandem occasione, præterquam febris, aqua frigida cū uuæ acerbæ succo propinatur, uel malorū cotoneorū decoctū, uel pampini uitis, uel semen cucumis leuigatū cum frigida. Verū stomacho uesicam aqua frigida repletā, uel
cucumeris

cucumeris ramenta imposito. Catapotia quę siti restinguendę sunt, danda, ut supra de siti à nobis dictū est. Porro medicamen quod stomachum ex humiditate superflua imbecillem, refrigeret confirmetq; , istud est. Rosarum uiridiū foliorum drachmę sex, dulcis radiculę succi drachmę quinę. uino dulci excipiuntur, & ut sub lingua teneri possint, formantur. Ceterum in quibus crassior pituita calefieri incidiq; desiderat, hoc medicamentum proficit, & fœniculi radicis cortis uncia duę, aceti sextarius unus & dimidius, aloes quadrans, mellis librę quatuor. Radices cum aceto coctę exprimuntur, abiiciunturq; Mel autem inditum ad spissitudinem usq; coquitur, & tunc aloę trita inspergitur. Tria huius cochlearia cum aqua sumuntur. quidam uero sine aloę ipsum preparant. iam uero medicamentū diacalaminthes his idoneum est. Quibus autē cibus acescit, coriandri seminis drachma, polentę modo inspersa cōmode bibitur, uel mastichę cochlear, uel lactucę albę seminis cochlearia duo. Compositum autē hoc est, piperis drachma, anethi drachmę tres, cumini drachmę quatuor. trita cochleari uno noctu sub somnum ex uino temperato præbentur. Porro in quibus atra bile uitiosus est stomachus & inflationē laborat spongię in accessionibus oleo acerrimo imbutę applicentur. Deinde si malum remanserit, alumen cum ære læui, melle exceptum ad mouetur, sereos succus bibitur, uel menta potui inspergitur. Si flatibus turget stomachus, & distenditur, calaminthes decocto mediocris mellis piperisq; , mensura mixta exhibetur. Ad stomachi peruersiones conueniunt mali granati acidi nucleorum succi partes tres, mentę succi pars una. Vbi coxeris quoad in unitatem coierint, ante cibum, mystrum unum dato.

Ad Stomachi saluam.

ACeto scillite, aut sale conditarum oliuarum iure, aut summitatis oleę decocto os colluatur, aut etiam minimum ex ipso deuoratur. Inter omnia præsentissimum est, aloę aqua diluta. Ad eos autem qui cibum non continent, quos ueteres proprie stomachicos nominant, fœnugręci farina melli mixta, & malux semen tritum aridum applicatur. certum uero ex cera, irini olei fæce & castoreo,

De cibi fastidio quod Græci ἀνορεξία uocant.
FASTIDIUM, quod anorexia dicitur est, cum stomachus

ethus aut in temperie uiciosus, aut humorum redundantia pres-
 sus cibos auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, ni-
 dorosi, oletosi que ructus, si cibis quodammodo præter uolun-
 tatem sit assumptus. item si frigidiora potius & elaboratu per-
 uicacia, hac tetenti queant concoquere. Frigidam contraria
 indicant. neque enim in hac ægri sitiunt, neq; frigida sustinent;
 & acida nonnunquam eructant. Qui humorum uitio cibum
 respuunt, partim ob tenuitatem, ac rosionem illorum ita la-
 borantes, uentriculi demorsu torquentur, nauseaque magis &
 siti conficiuntur. Quibus autem humores computruerint, in-
 terdum ij etiam febricitant. At quos crassi uiscosi que succi ma-
 le habent, ij plane nec rosionem uentriculi, nec sitim experiun-
 tur. communiter autem omnibus superuenit nausea. porro si
 in uentriculi sinum humores se receperint, etiam hos ipsos
 euomunt. si uero, infarcti uel etiam imbibiti tunicis adhære-
 scunt, nausea solum, non uomitu præmuntur, præterquam cū
 cibos assumpserit. Qui igitur ex calida intemperie fastidio la-
 borant, refrigerante uictu curantur, præcipue qui ex aceto assu-
 mitur. Panis ergo posca imbutus esui, ipsa que posca potui da-
 tur. Item ozigala, & quam Romani melcam appellant, quod
 ex lacte quoddam est opsonium, intybi & portulaca, interim
 etiam aqua frigida, omniaq; mediocriter secundum eius quæ
 subest intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horū
 usus, non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem mor-
 bum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrarijs medi-
 cari conuenit, uino ueteri & condito, hydrogaro, item anisi, ru-
 tæ & petroselini decocto: iam pipere ex aqua calida communi,
 uel etiā ipso medicamine, quod inscribitur diatrion pipereon,
 uel cui nomen est diacalaminthes. Dabis etiam nonnihil the-
 riacæ ex uiperis confectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum
 copiam laborantibus inidonea est. insuper allia his & alimen-
 ti & medicaminis nomine conueniunt. Sin autem humorum
 abundantia fastidium excitarit, tenues, mordacesq; aut uomi-
 tu, aut per aluum euacuabis. facilem itaque uomitum reddit
 aqua temperata, uel mulsæ dilutissima præbibita. Satiū fue-
 rit, si ante hæc humectantia exhibeas alimenta, ueluti ptisanæ
 cremorem, uel ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili
 uomas, priori libro est expositum. At si difficilius æger uomat,
 præstat materiam ad alium eligere copiosiore temperatoque

PAULI AEGIN.

n

alimento

alimento his prius humectatis. Purgans uero medicamentum esto, uel picra ex aloe, uel ex malis cotonijs præparatum, cui adiectum sit aliquid scammonia, uel quod constet rhodomelite. Si uero citra scammoniam aloes potius copia ipsos euacuare liceat, melius feceris, eò quòd illa stomachum offendat. Quibus crassi humores uiscosiq; fastidij authores sunt medeberis extenuando ipsos incidendoque tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & muria componuntur, ut cappari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intemperie fastidientibus consulimus, maximè post uacuationem, quæ nimirum fiet oxymelite Iuliano. Extrinsecus utendum quæ calfacere stomachum & corroborare queant, inunctionibus & malagmatis, qualia sunt potissimum quod dicitur diazomphacos, & Marciatum aliaque consueta unguina: insuper epithemata, Baiium & Euodes huiusq; notæ reliquæ: his addentur exercitia & frictiones potissimum. Ad eos qui frigidi humidique humoris, uel talis intemperiei uitio difficulter concoquunt, cibumque respuunt, ea quæ ex malis cotonijs consiunt, pertinent. Dico autem quod uocant meloplacuntion, item quod ex malorum cotoneorum succo præparatur, tum quod ex carne eorum constat. præterea dia citriu, idest ex cytrio confectum. Malagmata uero, Marciatum & quod ex acerbæ uuæ succo componitur. item Baiion, Polyarchion, atque his finitima. Sin ulcus fuerit in stomacho, aut uentre, omnibus acribus & cibus & potionibus abstinere oportet, uti uero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tū iis quæ ex amylo, terra samia, lemnia spargide & lacte, uel melle paucissimo conficiuntur, ut etiam purgent citra rosionem. Epithema facies ex palmulis cotoneis, & polenta. Ceratum ex melino, uel rosaceo cum ammoniaco & thure. Ad hæc Nelei epithema conducit, & emplastra ex salicibus, & Icesion. Notæ ulceris sunt uomitus sanguinis, uel puris, uel etiam ramentorum.

Ad solum imbecillumque stomachum, & ob hoc cibum non concoquentem, ualet hoc, Aloes, masuche, mastiches, styracis singuli sextantes, absynthij triens, cenanthe quadrans, gleucini selibra, melini quadrans uini quod satis est. Nonnulli etiā cypheos & rosarū singulos sextantes miscent. Hæc in leuorè redacta, purpura, uel lana, excipiuntur, ac stomacho imponuntur. Quidā ceræ selibrā adiungentes, epithema ipsum faciunt.

Ad

Ad ileosas stomachi affectiones, hoc est uehementes & conuulsorios dolores.

O Prime facit pastillus Amazonum: inuenies autem huius scripturam, tum aliorum ad stomachū compositorū materiam ad calcem libri de medicamētis compositis explicatam.

De flatu uentriculi.

Cap. XXXVIII.

Flatu in uentriculo generantur, humoribus, uel cibis, exigua caliditate in uapores dissolutis. nam frigiditas hoc nomine quod extenuare ac dissoluere nō sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit. minor uero caliditas diffundit quidē & transmutat alimentū, uerū minus quā opus sit: unde flatus excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & apij, & spondylii, & dauci, in oleo decocto. Vbi uerō adfectioni adest frigiditas, ruta, bacca lauri, nigella, & feniculum oleo incoquantur, misceturq; bitumen & oleum laurinum: At si inflammatio dolores comitetur, in uicem calefacientium laxantibus uteris, acetū decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias. iam uero polij fasciculus, uel calaminthæ decoctū cui mellis paulillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaq; dum uehemens dolor inciderit, adhibenda consulo, dum mediocris, etiam fomenta ex milio sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum undique comprehendens toto symptomate frequenter subito liberat, castoreumq; ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo sicyonio appositum, uel si cum tormine intestinorū flatus incidunt, medetur. Itē talus suis cōbustus, potusq; tormina & flatus tollit. Idē facit aristolochia rotunda. Iam uerō aduersus dolores flatuosos ex uētris obstructione, uel crassitie, uel perfrictione obortos, uinum meracius, à cibo sumptum proficit. Vbi somnus accesserit, etiam ex toto leuat affectos,

De cholera.

Cap. XXXIX.

Cholera est immodica uentris pērturbatio suprā iniraq; ex continua ciborū cruditate proueniens quæ inquam cruditas nonnunquam ex magna alimentorum prauitate, interim ex uitiosorum humorum superfluo contrahitur. Si igitur nausea abundus æger est, & turbatur, cibis etiamnum

n 2 crudi

crudis in uentriculo manentibus, aqua tepida propinari debet, deinde uomere oportet, digito, uel pinna ori indita: item alui ductione adiuuandus est. Vbi uerò hæc exinanita est, conquiescere, & præcordia oleo dulci cum uini modico, uel mastichino, uel etiã nardino si hyems fuerit souere conueniet, somnumque permittere. Vbi iã exacta apparuerit concoctio, balneis & probi succi cibo utendum est. At si inanitio fiat immodica, sufficient quidem initio uel ea quæ secundo libro de uentris perturbatione comprehensa sunt. Sin autem perseueret euacuationis imperus, uenter concidat, pulsus minor creberque euadat, cataplasma adhibendum ex palmulis cum œnanthe & acacia, item hypocistidis & malicorij succo. Adhæc offerendus est ad sorbendum aquæ mediocriter frigida cyathus. Præstiterit rosarum, uel œnanthe, uel rhus, uel uitis capreolorum decoctum, uel mali granati acido dulcis succus, cui mentæ paxillum sit inspersum. Porro si excrementa fuerint acriora, uexerque ardor, & sitis, cucurbitæ semen cum aquæ cyathis tribus, tum intybi, & portulacæ in posca coctæ alimenti nomine exhibeantur. Verum si fluxio sisti nequeat, uinum quoddã austerrum, potui dandum est, si febris absit, palmatianum, uel aminæum, uel spathites, uel omphacomelites. Sin absit, rhoetes, uel myrtinum, uel cibyriticum hydromalum & potui, & cum mica, uel halica, uel chondro. At si respuant cibum frumentaceum horarios seu fugaces fructus mandent, mespila scilicet, uel pira, uel mala cydonia, uel punica: quod carnosum est & durum expuant. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, extrinsecus contra uentriculum ipsum, cucurbita leuis quam maxima admouenda est. Dum autem ipsa adhæret cibo aliquo ex prædictis ali debent. Ad conuulsorias autem contractiones calida linimenta, oleo, imbuta, musculis circumponere oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum sit aliquid castorei & sicyonij. Ante hæc artus aqua calida superfundendi. At si uigiliæ torquent, somnus, is quæ aduersus illas prodidimus, conciliabitur. Si uires autem non prohibent, etiam medicamentum diacodion ipsis propinabitur: ubi morbus inclinauerit, ad balneum deducuntur, cibus ad refectiõem, pulli gallinacei erunt, colūbæ, uel suũ petunculi, similiãue. Alui profluuiũ *διάρροια* græcis uocatur: quod ciborũ corruptela est, plerumque sua sponte cessat, ægris non citius alimentum sentientibus quàm absoluta

absoluta facta fuerit concoctio, & corruptorum euacuatio: sin autem remaneat, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur & cœliaco affectu. Cap. XL.

CUm lienteria duplex sit species, una sanè ex superficiali intestinorū exulceratione: secundū quosdam uerò etiam ex cicatrice, quam dysenteria magna ex parte, uel aliæ fluxiones excitant: altera ex facultatis cibum in uentre continentis imbecillitate, secundam opinor differentiam cum cœliaca dicta affectione cōmisceri confundiq; Etenim in hac cū uenter præ imbecillitate nequeat cibos & concoquere & distribuere, læuia, cruda & per liquida redduntur, † aluo in omnibus fluida. Verum in lientericis celeriter, quæ assumptæ sunt, egeruntur, tamq; intensa est cruditas, ut alimenti assumpti genus apertè cognoscatur, atq; hac nota potissimum à cœliacis discernuntur. Itaq; semen lini cū palmulis ipsis obducit. Summè autē facit lentiscus, rubus oxymelite incoctus: cū ad est in statio cum inū miscabitur, anethumq; & iura: augescere uerò profluuium adiungemus mala cotonea, alumen liquidum, acaciam, hypocistidem, gallam, uel quædā, uel omnia. Cerata ex oleo myrteo cum uino quodā astringēte. Epithemata calidiora quidē ex baccis lauri, & quod ex seminibus cōstat. Astringunt autē magis diaenanthes, & diagigarton, i. ex acinis malorum punicorū: Itē quod ad Antyllū auctorē refertur, & Erythrii mirificū: si uerò morbus in uetustatē incidat, etiā uentri rectè applicatur & ceratū ex sinapi, ipsumq; sinapi. Portiones cōueniunt, simplices quidē, plantaginis, uel ronicis, uel mali granati cortices, uel sorba arida, uel immatura, uel omphaciū siccum, ex uua aminæa, tribus obolis potum. Qui febricarent cū uini austeri cyathis sex: febricitantes autē cū aqua pluuiali sumunt. Porro alius arida gallinarū potui inspersa, stomachū minus attingit, tū ea quæ urinā citant, exempli gratia, apium, adianthum, similiaq; epota deriuationē moliuntur. Cōposita uerò sunt polyide sphragis, pastillus ex succino, item ex ipina ægyptia cōfectus, insuper clidū appellatus, & diaspermaton. Item hoc est præstantissimū quod sequitur, ronicis syluestris seminis sescuncia, plantaginis seminis uncia, † hypocistidis succi drachmæ sex, gummi uel acaciæ drachmæ tres. Excipiuntur

cotoneorum ad tertias decoctorum liquore. ALIVD. Cumini, piperis, thus syriaci, balauftij singulorum fescuncia, malicorij uncia, laseris fescuncia: aut eius pulueris drachma potui inspergitur, aut oxymelite macerata dantur mane & uesperis. ALIVD Myrti nigræ cochleate, eiusq; dimidium, anisi, rosatum ficcarum, cœnanthes singulorum cochlearis dimidium, palmulas uiginti, in pastillos cogito, & drachmam unam cum aqua, aut diluta uini portione porrigito. iā Theriace ex piperis optimum his est præsidium. Cibus autem, si acris & biliosa sit deiectio, ex chondro, oriza, halica, & similibus erit: quibus cum astringens aliquod decoquetur. pirum, malum cotonium, mespilum, & id genus alia, item lac decoctum probe his proderit. Potus erit, aut uinum aquosum, tenue, aut dulcis quædam portio. Sin autē pituitosiora excernunt, contrarius ipsis cibus exhibetur, nonnulla stomacho grata admiscuntur, anisum, cuminum, uel apii semen: Adhæc lenticula his cocta plerunq; ipsis profuit, cum aceto modico, uel oxymelite commanducata. Præterea brassicæ & ipsæ bis coctione expertæ: præstat autem secundum ipsorum coctionem in posita fieri. Vinum assumetur uetustius calidusq;.

† Rectior est scriptura ueteris codicis *δευματιζομένης ἐπὶ πᾶν τῆς γαστρὸς*, i. uentre omnino fluxionem abundè accipiēte.

‡ Veteres libri hoc loco hanc scripturam habent. *ἑποκυττῖδος χυλῶ 3.6 κόμμεος ἢ ἀκακίας ἴσον*, id est, hypocystidis succi drachmæ sex, gummi uel acaciæ par modus.

De tenesmo.

Cap. XLI.

Tenesmus interdum dysenteriam præcedit: sæpe uerò & ipse solus paulatim generatus, definit. Est autem affectus hic, implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil præter modica cruenta, uel mucosa, egeritur, quæ totius prope mali causa est: factaq; in loganone inflammatio edematodes hoc est mollis & cedens hærentis illic stercoreis opinionem, & deiiciendi ea desiderium mouet. Galenus memoriæ prodit etiam calculum quendam in tenesmi affectione per anum fuisse excretum. Subinde uerò obstructionem stercoreis in tenui intestino coacti, tenesmus secutus est, qui astringentibus quidem obturantibusq; remediis magis increuerit: clysteribus autē acrioribus, nempe mulsæ cum sale, uel medicamine quod emolliat, per

per os assumpto, ut damasceno, uel pinguibus siccis, rore marino sero lactis stercore excreto, confestim finitus est. Quod si igitur citra talem causam, tenesmus obortus sit, conuenit inflammationem, cruda ordeï farina calida & fotu ex uino, oleo myrteo, uel rosaceo, uel omphacino lumbis & inferiori uētris ab umbilico regioni adhibito lenire ad ea uero quę longanoni mucosa impacta sunt, mulsā indita aluo abstergendo muriaq; sæpe demissa auxilii fuit abundē. Sufficiunt autem salis drachmæ sex in aquæ calentis hemina. Porro dolores intentionesq; leniuntur in sessu fœnugræci, uel maluę, uel seminis lini. Alii autem frequenter hunc quoq; in sessum felicem sunt experti, rutæ, myrti, cytini, lauri, cupressi. æqua singulorum uiridiū portio in aqua coquitur: est autem Marcellium. Vbi altè affligit inflammatio, irritationesq; iniici debent ab inferioribus partibus cremores frumentacei cum quodam astringēte decocto. oleum uero dulce inditum retentumq; dolorem soluit. Cum autem crebra desidendi est cupiditas, etiam Agatidem spissamētis calidis sedi apponent, aut furfures calidas in fascia, aut spongiā, aut aliquid huiusmodi.

De torminibus quæ dysenteria dicitur. Cap. XLII.

CVM intestina intus exulcerantur, latini tormina, græci dysenteriam appellant, quæ nunc ex tenesmi mutatione, uel quadam ex prædictis alui turbatione prouenit, nunc per se incipit, in qua excernuntur primum biliosa, uaria. deinde leuiter subcruēta, postremo saniei similia cuiusmodi à mortuorū cadaueribus solēt pfluere. At quæ à bile nigra oriūt, exitialis est, ut quæ cancrū cū exulceratione testēt. Si igitur ab exulceratione, cruēta stercorei cōmixta deiici cū dolore & torsionibus cernantur, ulcus tenuia intestina obsidere nota est, quæ per os potissimū remedia desideret. Sin aut syncerum stercus descendat. crassa, quod enematibus magis cedit. Porro cum multū sanguinis seorsim excernitur: affectū cruentā dysenteria appellant: quanquā interim sanguis etiā nigrior, quam naturaliter esse debet, & splendescens deiiciatur, cum scilicet iecur alimentum distributum non probe conficit. Iam uero cū retentrix ipsius facultas, uel alteratrix imbecillis est, sæpe eiusmodi descendūt ut recēs in eis caro lota esse uideat. Atq; hanc iecorariā uocāt dysenteriā, de qua in iocinoris affectu agemus.

Itaq; utendum est communiter ijs quæ in coeliacis & alijs præter naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim conueniunt, lemnia sphragia, quæ etiam depascētem modo dysenteriam persanat, & pota & in aluum data, si intestinum malsa prius fuerit abstersum. Deinde muria & lactucæ succus potus conuenit dysentericis: ipsaq; lactuca in posca cocta esui idonea est, item plantago, rubi tum fructus, tum folia, & althææ radicis decoctū, hippuris ex aqua, uel uino bibita, eiusq; succus, pdest. Mori succus immaturus exiccatus, atq; hoc magis batina mora similiter resiccata. siccant etiam uentris fluorem oua ex aceto cocta comestaq; Satius fuerit, si cōmixta quibusdam ex ijs quæ ad dysenteriam faciunt, frixaq; esui exhibeas. Vtilissimum his est omphacium, rhus rubrum, eiusq; succus, malicorium, galla, acini uux, mespila, myrra, corni, cochlearum integro tostorum cinis. Compositum hoc bene facit, cochlearum cineris partes quatuor, gallæ partes duas, piperis partem unā in puluerem redacta obsoniis inspergito, uel ex aqua, uel ex uino albo aquoso potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondum alvus putre occupauerit, & canum ossa uorantium stercus aridum, cum lacte caseato, ex lapillis marinis iniectis potatum. composita uero ex ægyptia spina pastillus, itē Philippi, tum qui ex cornu ceruino constat, adhæc qui ex seminibus conficitur, quiq; ad Trigonem refertur. Iam catapotia ex macere admiranda. maximè autem commendatur & hoc: opij, croci, lycii indicis, acaciæ, rhus, thuris, gallæ hypocistidis, malicorij, myrrhæ, aloes, æquales singulorum portiones, nempe tres obuli ex aqua propinantur. ALIVD. Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorij, singulorum drachmæ quatuor cochleare unum ex uino datur. ALIVD. Rhus drachmæ octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quæ opij drachma. Exhibetur drachma ex uino temperato Hoc autem eclegma ipsis conueniet. Myrtorum nigrorum, rhus syriaci singuli sextarii, palmularum thebaicarum duæ libræ, malorum cotoneorum carniū libra, mala granata acida cum ipsis corticibus decem, uini astringentis sextarij duodecim, ad tertias decoquantur. Percolatis libræ sex mellis iniiciuntur, & ad spissitudinē iam incocta linctu exhibeto. Notum uerò est cataplasmata quoq; ex astringentibus componenda, quorum materiam explicatam habes. Porro aluo indita, dysentericis propter tenellos

tenesmos infestantes, ex usu fuerint, cremor orizæ, uel chondri, uel huiusmodi alterius cum adipe caprillo, uel hircino, tū ea quæ capite de tenesmo diximus. Si autem sanguis profluit, ex inferioribus partibus infundere oportet succum polygoni, uel plantaginis cum acacia, uel hypocistide, uel id genus aliquo. Sin urgeat fluxus, etiam quod sanguinē cohibeat quoddā iniiciendum est, ut cinis lanæ succidæ, uel spongiæ inanis, pice liquida, uel sanguine bulbulo imbutæ uel alumine liquido, combustæ, uel asinini stercoreis succo. Huic & Andronis pastillus præstant est remedium. tum qui Musæ ascribitur, ac persimiles. Insuper subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus potissimum etiam dolores circa deiectionem fiūt. Vbi uero ulcera intestina depascantur quæ tum fædo excrementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis interuallo, agnoscimus, enematibus quæ crastam inducunt utemur. cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, item diachartu, id est ex chartha inscriptus, ac Bitynius, Theoniusq; : Præterea qui ex suberibus constat, ex lenticule decocto, uel cuiusdam astringentis, iniecti. Atq; hoc enema est ex ijs quæ admodum expertus sum, glandis caliculi combusti (Est autem calyculus concavum illud unde querna glans prodijt, quo coriarij utuntur) Auripigmenti consolidæ, rhus syriaci, æquales partes. his cōtusis, duo cochlearia ex cipito cremore orizæ & succo anchusæ quæ folium habet spinale, amplum nigrumque, quod choerospileton appellant. Item ouorū candidi liquoris similiter ad uncias duas ternasue immittito. Epithemata uero in cœliacis enumerata sunt. Item uentris inunctiones quæ astrictoria ac ficcante constant materia, glutinatorio quodam adhibito, gummi, thuræ, taurocolla, polline, in similibus cataplasmatibus locum habeant. † Alimento his erit per initia. pulicula ex ovo & lacte. deinde sorbitiones frumentaceæ per se, & cum lacte, item lac mediocriter coctum maximè commendatur. Holerum usus non est necessarius quidem, attamen gustandas exhibebis serim coctam, intybum, plantaginem, brassicam b s coctam, poma quæ ὀπώγα dicuntur astringentia, carnibus ipsorum reiectis, uel aliis quæ asperare intestina possunt. Verum si multa sit caloris intemperies, etiam intybus cruda esui danda est, & aqua potioni frigida. Alia uero potabilis aqua cœlestis esto: si uero laborauerit

rauerit stomachus, uinum quoq; propinandum est. Postea ex-
aucupio sicciora & concoctioni morigera sumantur: balineis
dulcibus utentur, à quibus si fluxionem experiantur, spongiam
magnam, uel panis filiginei micas uino ascalonire, uel quodā
astringente calido imbutas, toti uentri imponere oportet, cō-
tra quem cum deligaueris, sic lauare iubeto.

† Hoc loco uetus cod. habet, τροφή δὲ ταύτης ὡς τὴν ἀρχὴν
ἔστω, id est, alimentum per initia his sint oua. Sed uulgarē scri-
pturam bonā esse ex Aëtio qui uis intelligere potest, apud quē
uox ὡς ἀλλὰ est, quam interpres oua lacti mixta reddidit.

*De morbo intestini plenioris, quem graeci colicon
appellant. Cap. XLIII.*

Colon, cum pars sit intestini crassi, à dextra ilium regio-
ne procedēs, ad finisteriorem cincturæ modo pertinet.
Huic dolores grauissimi plures ob causas suboriuntur.
uel enim ex crasso pituitosoq; humore intra tunicas ipsius re-
cepto, uel ex spiritu crasso, & flatulento qui non habet exitū,
uel propter inflammationē, intestini, uel ob acres mordacesq;
humores. Qui ergo ex humore crasso, ac pituitoso dolorem cō-
cipiant. hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsēr-
tim sensu, qua parte colon situm est, ceu terebra pertundatur.
Hos torsiones quoq; affligunt, ructus, nausea, uomitio cuiusli-
bet humoris, potissimum pituitæ. Alius grauer impedita ni-
hil reddit, ac ne spirituum quidem transmittit. Stercus autem
quandoq; excreum, bouino simile uidetur, leue & flatus ple-
num, Præcedens horum causa est magna ex parte, continuus
ciborum frigidiorum, crassiq; succi, usus, repletio, cruditas, otium
& his finitima. Qui autem ex spiritu flatulento indolescent,
ijs tensionis magis sensus obuenit: qui autem ex inflammatio-
ne, ij feruorem internum percipiunt, & febris non ignaua, uri-
næ retentio simul & stercoris pulsus in uētre molestat, sitis, ar-
dor, nausea, bilis potius uomitiones quæ nihil leuant malum,
summatim inter colicas affectiones hæc est grauissima, quæ in
Ileum transitionem minatur. at quibus acres rodentesq; succi
dolorē mouent, sicut etiam qui ob inflammationē dolent, hos
ardor sitis & uigilia torquet, † febricitant aut oīno uel minus
quam illi, urina redditur aeris, & biliosa per aluum descendūt.
Sæpe

Sæpealui deiectio maiorē excitat cruciatū, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti: Itaq; doloribus quos frigidi & glutinosi ac crassi humores contraxerūt, medebimur sic ut nō uehementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis quæ nimis excalfaciunt, præfidiis fundantur, ac in spiritalem potius substantiam rediguntur. Quapropter & incidi, & cōcoqui medicamentis debent, quæ non inflent, sed extenuent desiccantq; nec per morbi initia ualde calefaciāt. Prius itaq; aluo stercore leuata, cōgrui clysteres ex oleo iniiciuntur in quo decoctum sit cuminum, uel ruta cū adipe anserino, uel gallinæ, aut cucumis syluestris radicum decocto, & myrrhæ drachma, melle & oleo, aut ex myrrha, melle, & oleo sicyoneo. Iam uero commune oleum iniectum, sæpe uitream simul pituitam expulit, ac dolorem subito finiuit. At si ob doloris uehementiam etiam enema retinuerint, glans aluo demittenda est, ex melle, cumino, nitro, rutæ semine sicco, brassicæ caule probe polito & muria madefacto, uel cinere brassicæ melle consperso, uel cucurbita syluestri trita cum melle, nitro & cumino. Glandes autem digitorum sex erunt, ut strictiorem anī musculum quem σφιγκτηρæ uocant, exuperent, sedemq; ungere oportet, ciclamini succo cum melle, & nitro, uel centaureo cum melle, & nitro. Si dolor non remittitur enema præter commemorata sit. Resinæ terebinthinæ uncia, uel opopanacis drachma, uel galbani drachmæ quatuor, bituminis tantundem, cum nitri drachma, & aquæ uncia, olei rutacei uncia quinque, aut amplius. fetus autem partibus indolentibus superaccommodandi sunt ex cumino, uel anethino, uel sicyonio oleo. Cataplasma admouendum, trisperrum appellatum, cum cumino, baccis lauri, apii semine. Epithemata uero conuenient, diaspermaton, diadaphnidon, adde diameliloton, & Poliarchion. Inseffus autem utilis ex decocto fœnugræci, althææ, chamæmeli, artemisæ, anethi, lauri, & similium. Item in oleum calidum, aut hydrelæum descendere alienum non est, potui offertur absynthium, & cuminum æqua portione, uel panax cum aqua, uel castorei, anisi, piperis, singulæ drachmæ cum oxymelite. Quod si dolor non conquierit, propinatur ipsis medicamentum diatrion pipereon, uel theriaca. Iam sinapismo, & dropace in remissione doloris utēdum est, ac balneis naturalibus: à balneis

neis autem aquae potabilis abstineant, nisi doloris circumstantia compellat. Vbi iam praedictorum aliquo medicamento facta prius fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incalescantque; iacnico intra ignitos parietes inspergendo nitrosa quaedam smegmata. Cum dolor est uehemens, mediocriter lementibus uti conuenit, qualis est pastillus ex castoreo, tum aluo ab inferioribus partibus inditus, tum potus, similiaque; his medicamina. Nam quae ualenter stuporem inducunt, uitare oportet, quippe paulisper quidem leniunt, sed longiorem affectionem reddunt, dum materiam incrassant, meatusque; intestini condensant. Porro ubi iam pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amarescente, uel his catapotijs: Aloes, euphorbij, cocci gnidii, scamoniae aequali singulorum modo, dantur duobus scrupulis. Vi etus utilis erit calidior sicciorque; per initia morbi, a cibo abstinabitur, deinde acria assumetur. Porro igitur ipsis exhiberi cocta cum condyto debent, apium, asparagus palustris, cruda alia, & maxime ijs qui talibus non offenduntur, ipsumque; uero condytum bibant panem uero cum ipso assumant. Insecutis diebus etiam reliqua boni succi alimenta concoctuque; facilia dabuntur, sic ut repletio cruditasque; uitetur. At si flatulentus spiritus doloris author fuerit, secundum clysteres qui flatu discutiant, potionesque; etiam cucurbitae quam maximae cum flamma ac leues toti abdomini defixae, frequenter abunde auxilii praestiterunt. Porro cum inflammatio intestinum exercet, uena in cubito aperienda est sin urinae difficultas distorqueat, et ex talo sanguis detrahi debet, & praedicta admoueri praesidia, * praeterquam quae acria sunt & ualenter purgant: utendunt uero ijs quae magis leniunt, enematis, cataplasmatibus & superfusionibus, in oleumque; descendendum, ac cucurbitulas ipsis defigemus, ceratum abdomini applicabimus quod habeat cerae quincuncem, olei chamamelini uncias duas, rosacei tantundem, lementi semunciam, uitella ouorum quinq;. Haec succo lini seminis soluuntur. Victus tenuis ac febricitantium proprius ipsis conuenit, quousque; inflammatio discutiatur. At, qui si propter acreis rodentesque; succos dolitant, oleum ipsis ab inferioribus partibus iniicietur, in quo foenugraecum decoctum sit, uel althea cum tenera adipe recenti anseris, uel gallinae uel etiam cremore ptisanae cum rosaceo, uel succo quoque; lini seminis. Propinandumque; ipsis Antidotum piera dia aloes, & balneis uten-

utendum ex dulci aqua, cibo sorbili ex chondro, uel ptisana, pifibus saxatilibus. In summa uniuersus uictus humidior erit, & frigidior. Abstinendum acribus omnibus, cum cibis, tum medicamentis, fortuque ex asperginibus, & cataplasmatibus, uini potione & potissimum ueteris. Cum autem dolor præpoller, etiam iis utendum est quæ sensum obstupefaciunt. nam offendunt minus aliis huiusmodi affectiones medicamenta quæ tenues, mordacesque humores incrassant, & mediocriter refrigerant. Puto autem colicam affectionem, quæ etiamnum regnat ex huiusmodi prouenisse humoribus, quæ ab Italiæ quidem regionibus incepit, in aliis autem multis Romanorum Reipublice locis pestiferæ cuiusdam suis modo sit grassata: ex qua plerique in morbum comitiale, alii in artuum resolutionem sensu incolumi, nonnulli in utraque sunt prolapsi: ac eorum qui in comitiale morbum inciderunt: plures interiire. Ex illis uero qui in resolutionem, plures euaserunt, tanquam in crisi, causa aliorum ex loco quem infestauerat, conuersa. Sic igitur laborantes, medicus quidam in Italia curauit uictus, quadam ratione infideli refrigerante & maxime temeraria. lactucas enim non coctas refrigeratasque ipsis porrigebat, intybumque similiter supra satietatem comedendum. Item uuas, mala pisces dura carne præditos, omniaque crustacea quæ uocant Græce *οτράκωδες*, pedes bubulos, bulbs & similia, non solum facultate, sed & tactu frigida. uinum raro præbebat, cum autem dabat frigida miscebat, ipsamque frigidam uel etiam poscam frigidam exhibebat, ab omni alio calido, & medio cibo abstinens. Atque plurimos sic præter omnium opinionem persanauit, imò nonnullos qui iam in morbum comitiale, uel resolutionem prolapsi erant, propemodum sanitati restituit.

† Veteris Cod. hæc est scriptura, *πυρέττει δὲ οὐδὲν ἥλως ἢ ἐκείνων ἤττον*. Sed uulgarem lectionem, uel eam quam habet codex Orosii *πυρέττει δὲ μόλις*, meliorem esse ex Alexan. Tral. intelligere licet, qui scribit, eorum qui colico dolore laborant, *ἐκ ἀνδρῶν πυρέττει διατελεῖν τῆς πλείους* id est plurimos non esse sine febre.

† Totus hic locus sic legitur in antiquis libris. *τῶν δὲ δι' ἰσθατος ποτίμε λέρων ἀπεχιδῶσαν, πλὴν εἰ μὴ διὰ τὴν περίτασιν τῆς οὐδύνης ἀναγκάζονται, ὅνῃκα δὴ πρῶως ἐνιέντας αὐτὲς τινὲς τῶν ἐξημένων φαρμάκων λαβεῖν καὶ πυρίαν αὐτὰ κελεῖν ἐν τοῖς διαπύροις*

πύρρσις τίπρσις, id est, à balneis aquæ potabilis abstineant nisi doloris intensio compellat, ubi iam prædictorum aliquo medicamento facta leuiter fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incalescantque laconico in lotis ignitis.

* Hoc scriptura est in ueteri codice πλὴν τῶν δριμέων καὶ τῶν δερρακινόντων ἰσχυρῶς, id est, præterquàm quæ acria sunt & multum calfaciunt. Quæ scriptura rectior est.

De tenuioris intestini morbo, qui ileos dicitur:

Cap.

XLIIII.

Ileos cum affectus sit maxime acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauior. Qui. n. hoc malo sunt oppressi, miserabili morte perunt, ad uitæ finem, ster-
cus per os reddentes. Contrahitur id uitij cruditatibus, & ob-
structo recrementorum itinere, iis nimirum retentis, quæ iam
corruptionem experta sunt: ex letalibus medicamentis, cunq;
in scrotum prolabuntur intestina, & cum inflammatione sen-
tiunt, colica affectione plerunq; præcedente, causamq; adferen-
te. Pueros itaq; superfusionibus, cataplasmatibus, enematis, glan-
dibus & fomentis, sicut in capite de colicis comprehensum est,
curare oportet. Adolescentibus autem & ætate floridis indu-
bitato sanguinem detrahenda: sin minus, uincit multas ac leues
cucurbitulas toti abdomini admouere: Loco autem dolenti,
etiam cute incisa: item perfricare & deligare artus, & tunc effi-
cacioribus clysteriis & iniectionibus uti. Ad hæc in oleum ca-
lidum descendere, antidota purgationesq; assumere, breuiter
omnia adhibere conuenit, quæ ad colicos scripta sunt, præter
eos qui ex acris, rodentibusque succis indolescunt. Mirifice
autem ipsis facit etiam si uomuerint, anethum coctum, porum-
que, à potu panis in calidam demersi frustula statim esse, dum
incalescunt. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cu-
minum in eadem trita potui dato in senis oxymelitis cyathis.
Qui ex medicamento in ileon inciderunt, ut uomant compel-
lendi aquæ calidæ potui. Noxiorum autem medicamentorum
nota, quinto libro habes expressas. Deinde oleum calens pro-
pinari debet, uel iura pingua ut denuo uomant. Diebus ali-
quot interpositis, theriace potui detur. At si obstructio perse-
ueret, lacte scisso cum scammonia, uel aloes, uel cuiusdam pur-
gantis momento, aluum inanire confert. Si ex intestini prolapsu
in

in scrotū affectus processerit figuratis statim ipsis sublimibus in inguina cōpelletur delapsū intestinum, fasciaq; deligabitur.

De renum & uesicæ affectibus, & primum de calculo. Cap. XLV.

MOrborum cognatio, ordinē disciplinæ transgredi nos compellit. nam cōmunis est Colicis, & lapidem in rene habentibus aluus initio astricta, uehemens dolor, fastidiū, cruditas, & tormina: Propria uero, colici habent omnia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis quidē in dexteriore potius ileū parte dolor excruciat, & usq; ad stomachum, iecur, & lienem peruenit, aluus omnino cohibetur, adeo ut ne spiritus, quidē infra trāsmittatur. Cum uerò necessitas stercus expellit, flatulentū bouili modo est. Interim etiam uitrea pituita excernitur, urina copiosior pituitosaq; redditur. uerū nephritici grauē in ipsis renibus infixum dolorē impacti pali instar sentiunt, eiusdemq; lateris ac ē directo subiectus testiculus indolet, femur eiusdē partis directē obstupefcit, excernitq; etiā sponte quidem raro, omnino autem clysteriis aluus citata, flatu, stercusq; e biliosus egerit. urinæ paucæ, & arenosæ magis prodeum: meatus per quem urina distillat, astringitur. hæc indicia calculos in renibus esse fatentur, quæ adultis potius oboriuntur. in uesica autē pueris magis calculus solet concrecere: notæ harum sunt cruda & subalbida urina cui subsideat arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contractant pudēda, intenduntq; & continue ad urinā reddendam urgeantur, ac stillicidio uexantur. Materiam igitur calculis creandis suppeditat crassius, terreusq; humor. Effectrix ipsorum causa est ignea renum, aut uesicæ caliditas. At in renibus quidem medicamentis poti conuenit, quæ calculos cōfringunt diffecantq; , non autem manifesto calefaciunt. Talia habentur basilicorum asparagorū radices rubiq; , nitrum combustum, graminis radix, adianthū, bdellium, lauri, radice cortex, altheæ semen, cicer nigrum arietinum spongiarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, carpesion, saxifraga. Non uerò, & esu, & potu prodest, cardui, radix, erysimion, & prionitis. balneis autem crebro utantur, & post lauacrum statim quædam ex prædictis bibant. Cæterum superfusiones, cataplasmata, fots, infessūs, relaxantia & quæ leniunt, ex colicis huc transferre conuenit.

Compositæ

Compositæ potiones sunt, rutæ syluestris, maluæ syluestris, apii radices. incoquantur uino, & liquor inde expressus temperatusq; aqua, duobus cochleariis porrigitur. Hoc inspergi potest. Balsami fructus, lapidis spongiarum, pulegii sicci, maluæ syluestris seminis singulorū pares portiones. ubi contusa fuerint, † cochleare inde cum uini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inarefactus, cicadæ siccae sine pennis pedibusque, lapis iudaicus, qui tecolithos dicitur, ex mulso in calido balnei solio offertur. tum medicamenta composita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, Fusca nephritice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatissimum remedium troglodytes: est autem passerulus omnium auium minima, ea sola excepta, quæ Regulus appellatur. Hoc enim solo paulo maior est, ei que similis colore inter cinerium & uiride, tenui rostro, in muris maxime & sepibus degens. Hic inquam totus sale conditus crudusque frequenter commanducatus, calculos iam creatos per urinam expellit, in postetumque generari prohibet. Combusti integri cum pennis cinis uniuersus per se & cum pipere, phyllique momento ex mero & melle potius, idest potest efficare. Ad dolorum uero acumen & uigilias bona sunt remedia Sotira, & Philonis medicamen. iam sanguinis missio adhibita dolorem sæpe leuauit, celeriter calculum emoluit. Tuetur à calculis, ne fiant, primum sane cibus boni succi, & moderatus, dein exercitia, rarusque leguminum omnis generis, frumentaceorumque usus, item casei abstinentia, lactis, & quæ ex ipso præparantur, obsoniorum, uini nigri, carniū copiar, & omnium summam crassi succi, ac nimis calidorum acriumque, hydrogarorum dico, & conditorum & similia. Hæc enim si obseruentur, non solum lapides nondum creatos prohibent concreescere, sed etiam iam factos, confringere, uel excernere idonea sunt, bibant autem oxymeli cum quodam simpliciore urinam citante, ueluti adiantho, apio, graminis decocto. A balneo ieiunus ante uinum aquam temperatam potet. ac in medio prandij frigidam superbibat, si nihil prohibet. † Vbi prauī humoris copiam presentiscunt, sanguine detracto, aut purgatione uacuentur. Omnium uero præsentissimum est ad calculos arcendos secundum balneum, aquam temperatam prius bibere, quam uinum, aut aliud alimentum assumas: ac uesicæ calculos in pueris,

pueris, ualentioribus emolire præfidijs, delectu ex supra comprehensis habito. Quod si impendio excreuerint, aut ceruici uesicæ impeerint, iniectione recti syphonis, catheterismum uocant, per quassatum utendum, aut etiam calculi incisio adhibenda, ut in parte chirurgica dicitur.

De inflammatione.

AT si inflammatio renes, aut uesicam exerceat, quam hæc nota testantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate, febricula, mentis alienatio, uomitio bilis syncera, urinæ reddendæ impotentia, & præsertim ubi uesica inflammationem experitur: sanguis statim detrahendus est, utendūq; superfusionibus, quibus leniendi potestas est, & cataplasmatibus ex ruta, anetho, fœnugræco, althææ radicæ, clysteriisq; mollibus, & iniectionibus ex oleo, papauere, adipe anserino. In uesicæ affectu etiam, opii semiobolum cū myrrha, croco, & oleo, in aluum demitti, mulsaq; potui sumi debet, ab iis abstineri quæ ualde urinam citant, ac multa potio uitanda, nisi acris biliosusq; humor superet, tunc n potui quoq; liberaliori indulgendū est, ac una uice cumulatim, qui ex aliquo citra rosionē, urinā mouente, sumetur. Seminis lini partes duæ, amyli pars una, cochleare ex aqua datur, item cucumeris & peponis semen. Cum ardorem igneū renes sentiūt, linamēta ex uino & oleo rosaceo, uel aqua & oleo rosaceo, uel melino super accōmudantur, aut ceratum ex cera & rosaceo chamæmelinoq; uel melino & luteis ouorū confectum cum aceti paululo, uel polygoni succo imponatur. Postea etiam emplastrum quod à succis diachylon dicitur, cum chamæmelino adhibeatur. calida aut nemiū uitanda, ne puris generationē suscitēt, itē quæ impendio refrigerant. quippe ab his renes facile in scirrū indurescūt. Ad hæc balneis. cū inflāmatio instat, abstinentū: uictus qui in febribus dari solet, & ab inflāmatione arcenda nomen aphlegmanton sortitur utilis est.

† Hic locus sic descriptus est in ueteribus codicib. διδὺς κοχλεάριον μετ' οἷνις κεκραμένις κινάδων. β, id est, cum uini temperati duobus cyathis.

‡ Locus hic integrior est in uetustis codicibus πλήθους δὲ καὶ κακοχυμίας σπναιδανόμενοι διὰ φλεβοτομίας ἢ κατάρσεως κενούδωσαν, id est, si sentiant plethoram & cacochymiam sanguine detracto aut purgatione uacuentur.

PAULI ÆGIN.

o De ab-

*De abscessu & exulceratione partium per quas
urina descendit, græci uocant.*

DOlores circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris inordinata, abscessum in renibus fatentur. In uesica autem præter cōmemorata, loci cruciatus testatur. Cæterum affectus renum, hac nota deprehenditur. si homo in sanum recumbens latus, in opposito percipiat dolorē ceu ē sublimi rene suspenso. In quibus utendum est incessu ex hydrelæo, item cataplasmatibus ex polline, oleo & resina, uel erui farina, cum melle, uel cardamomo, uel columbæ stercore, cū ficis pinguibus. Pus autem per urinas confarctim excretum, abscessum esse ruptū, & ulcus in particula ostendit. Quoniam uerò etiam sine abscessu, instrumenta per quæ urina fertur exulcerationi patent, uase, aut rupto, aut exeso ex materia acri uel lapide per radente, distinguenda est renum exulceratio, ab ea quæ uesicam exercet, uel meatus quos οὐρητῆρας uocant, hoc pacto, Renibus quidē exulceratis in lumbis dolor exercet cum grauitare & sine impedimento urina redditur, cui pus mixtū reperitur, carnosis particulis innatantibus. Vesica autē exulcerationem experta, tortum uehemens in pectine imoq; uentre mouet, urinæ difficultas urget, pus ubi reddita urina est, subsidet, squamulæ fœdi odoris, uel laminis similes in sunt furfuracea autem subsidentia uesicam scabie laborare notāt, si uerò meatus urinarij sint exulcerari, etiam puris mixtura medio quodam modo habet, & pilis similia potius in lotio feruntur, dolorque mediam inter renem & uesicam, regionem occupat. Si autem pus aut sanguis excernatur, idq; citra urinā, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendorum exulceratio significatur. Itaq; cum uasa urinæ dicata exulcerationem sentiunt, aqua mulsa bibitur, aut fœnugræci decoctum cum melle, aut cucumeris semen cum passō. Pus reddentibus per urinam, bolus armenus datur, aut ferularum combustarum cinis, quantum tribus digitis comprehendi potest, ex passō, item lactis potio uehementer his auxiliatur. Composita autem hæc, seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorum drachmæ duæ: pastilli finguntur. **ALIVD.** Nuces pineæ numero uiginti, cucumeris domestici seminis grana quadraginta, amyli drachma. Excipiuntur heminis duabus decocti nardi apij seminis. Archigenes in epistola ad Articum

ticum iubet, cum urinæ difficultas urget, papaueris albi torridi seminis detriti drachmam unam capi, quæ decocto iunci rotundi, aut calami, aut dulcis radicis inspergatur. Dolores autem ex ulceribus contractos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis grana numero triginta, nuces pineæ duodecim. amygdala amara corticibus exuta triginta quinque; croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus quotidie assumet cum lacte, aut passo. Mitius erit si pro nucibus pineis maluæ seminis equalem modum iniicias, Elidere autem potest (inquit) uesicæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confecta. Ego uero in uetustioribus hoc usus, nunquam aliud magis uarium de sideraui: chamædryos, chamæpyteos singulorum drachmæ uiginti quatuor, asari, piperis albi singulorum drachmæ septem, cinnamomi drachma: optime detriti cochlearia duo ex passo cretico, porrigo, si febris adsit, ex aquæ cyathis tribus, ubi uerò mordax est exulceratio, etiam amyli duobus cochlearijs & cucumeris seminis granis quindecim adiectis, uoti compos euas. Hæc quidem ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta, diaphysalidon, id est ex halicacabo, & antidotum ex syluestris maluæ semine, necnon ex tragematis confectum benefacit. Regioni inter scrotum, & anum, nec non inferiori uentri cerata imponuntur ex æsypo lota, butyro adipe anserino, styrace. In uesicam autem infunditur clysterio mulsa aquosissima, uel lac cum paululo mellis, uel cum cucumeris semine, uel candidus oui liquor cum pompholyge, uel dictorum medicaminum aliquo. Si ulcus pascendo serpit, pastillus ex carta iniiciendus est, aut Bithinius: & cataplasma ex palmulis & uuis passis cum galla, acacia, hypocistide, & alumine debet imponi.

De sanguinis renum profluvio.

Renes infirmi lotium subinde retinere nequeunt, sed patentes redditi sanguinis nonnihil ex uena laxant, aliasque crassities remittunt. Sæpe renes etiam iuxta circuitum quem admodum hæmorrhoides, sanguinis profluvio laborant. Inani uerò subleuantur, in quibus nihil subito tentandum est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseveret, uena in cubito aperitur, ac medicamentis quæ ad sanguinis sputum, aliasque sanguinis eruptiones inscribuntur, in renibus ac uesica sanguinem fundenti, utendum est. Maxime uerò dari debet symphyri

o 2 radix,

radix, & tragacanthum uino maceratum. Ad hæc polygoni & plantaginis succus, cum posca, aut amygdala amara cum passo. Vel hoc, aluminis scissi drachma tragacanthi drachmæ duæ, gummi oboli quinque: ex passo assumetur: item cataplasma ex ordeï farina cruda cum posca & rosaceo, aut ex palmulis & pane filigineo cum acacia, uel hypocistide, in uino astringenti, uel posca decoctis obducitur. Cum uesica sanguinem fundit, etiam cucurbitulas in illis & coxendicibus defigemus. Cæterum particula quæ sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quod sanguis urinæ miscetur, aut è contrario, ueluti in pure comprehensum est. Concretus in uesica sanguinis inde adeo deprehenditur, quod post illum urina subito cohibeatur, & fibræ quædam sanguineæ (ut uerisimile est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem potui artemisæ decoctum, heliochrysiq; , uel cunilæ, uel raphani semen, uel liquor laseris, uel cyrenaicus, uel apij succus, singula in aceto temperata: aut leporis coagulum, aut hinnuli, aut hœdi in oxymelice, aut lixiuium cum oleo: spongiaq; à foris ex muria, uel lixiuio calido accommodatur. Quod si uitium his non abigitur, secatur locus inter anum & penem, quemadmodum in calculosis: ablatisque grumis commode curantur.

De renum duritia.

Quæ durities in renibus contrahuntur, nullū sane dolorem mouent, sed uidentur renes ipsi tanquā ab alijs suspendi, coxæ stupent, crura impotentia uacillant, urina modica egeritur: Totus deniq; habitus duricie renū laborantiū ijs potissimū qui aqua subter cutē laborāt, similis est. Hi ergo emollientur ceratis, malagmatis, frictionibus & fomentis. Ad hæc quæ urinam cient, assumuntur, aliusq; subduci clystere debet.

De diabete.

Cum poculēta, statim qualia assumpta sunt per urinā transmittuntur, diabetes uitium appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti cōficiuntur, unde quoq; dipsacon græci affectū nominant: qui ex retentricis sane renū facultatis impotentia contrahitur, attractricis autē maiore robore, ut totū corpus ob immodicum calorem exhauriat exugatque. Itaque aduersus hunc pugnantes, cibum pleniorē, quique difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremur, ueluti alicam cum
rosa

rosato, uel rhodomalo, uel hydromalo, uel uino non uetusto, uel aliàs quodam calido. Ex oleribus autem intybum, serim, lactucas. inter pisces erunt saxatiles, suum petunculi, uulua, pira, mala, punica mala, & frigida potio. Item polygoni succus, heleniumq; rectè ipsis propinatur ex uino nigro, palmularumque & myrti dilutum, præcordiis & renibus obducitur polenta ex aceto & rosaceo, folia uitis cotyledonis, parietariae, portulacae. sudores excitandi, uomitusque à potu frigidus, omnibus quæ urinam mouent, abstinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

De stillicidio urinæ & eius difficultate.

Cum neq; inflammatio, neq; calculus, neq; aliud quippiam ex prædictis infestat, urina aut acris est, totusq; habitus, uel etiã reliqua signa, bilem testantur, ex hac uel urinæ difficultas, uel stillicidium contrahitur. Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant contemperantq; pisanæ cremor, pisces, balnea, uictusq; idoneus: acria uitanda sunt, uinum, exercitia, ita & tarda comestio. Quod si urinæ tenuitas, alborq; & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, cõueniet uinum calidum, cõdita, tum quæ urinam cient & medicamina & cibi, adhuc infessus calidiores. At si præter alborẽ, etiã crassities in urina appareat, pituitosus humor cẽsendus est, qui ceruicem uesicæ obstruxerit ubi utendũ est oxymelite, tum iis quæ constant ex hyssopo, pulegio, uel thymio, uel silphio, aquæ mulsæ incoctis, item superfusionibus calidioribus. siue aut humor crassus, siue calculus, siue grumus, uel eius generis aliquid obstruẽs, urinæ transitum impediat, siphonẽ rectũ catheterẽ appellauim, indere ex usu est, nisi particulæ inflàmatio prohibeat. Porro in febribus urinæ difficultati medemus, superfuso rutaceo, uel anethino, uel ueteri oleo. Si aluus astricta est, iniicietur ab inferiori parte decoctum scœnogræci, uel malua, uincitq; insidere ægrotãtes supra cõprehensos in hydrelæum, uel aliquod dictarũ specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, syluestris malua radices in sicyonio cum aqua modica decoctæ donec inarescant, ipsæ quidem proiciuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorii quantum sufficit.

De uesica resoluta.

Vesicæ resolutionem, nunc urinæ difficultas, nunc spontanea

nea ipsius emissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

De urinæ incontinentia.

MVsculus, qui ceruicem uesicæ ambit, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiam maxima ex parte solet accidere. Communiter itaq; roborantibus potissimum uti conuenit, ut cœnelæo calido & similibus: abstinendum iis quæ ualidè refrigerant: calidis fouendi potius egri, quatenus fieri potest. Etenim frigidas ueluti resolutionem representat, naturaliter autem hæc opitulantur. Galli guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbetur, uel leucanthemi flores similiter, uel leporis testiculus derasus in uinum odoratum, cōtra hæc uitia bibitur. † uel calamintha myrrhaq; ante cœnam propinetur, uel rutæ syluestris semen torrefactum per triduum potui exhibeatur. Cæterum pudenda eius qui hoc detinetur uitio, cimolia cum succo herbæ perdicii perunguntur.

† Huius loci hæc est lectio i ueteri, ἡ καλαμὴν θὺν ἡ σμύρναν ὁδὸς πικρῶν, i. uel calamintha myrrhaq; in uino ante cœnā detur.

De iecinoris affectibus.

Cap. XLVI.

IEcur pluribus uitiis oppottunum est. nam imbecillitate, inflammatione, erysipelate, scirro, abscessu, ulceribus, & obstructionibus corripitur. Primum de imbecillitate ipsius dicendum est, à qua propriè iecinorosos nominare ægro tantes consueuerunt. Si ergo aluus in succum quidem conuersa uerum liquidiora deiciat alimento minus probe, aut neutiquam in iecur distributo, sic tamen ut uenter à noxa sit immunis, attractricem uisceris facultatē infirmari suspicio est. Si uerò in eis recens caro lota esse uideatur, alteratricem, tum eam quæ sanguini creando est dicata. At si ex calida intēperie sit, imbecille, recrementum alui tēporis spatio fœculentius apparet, ualdeq; fœtidum, bilis insigniter colorata crassaq; descendit. Iam uerò etiā quando iecoris substantia cū ea colliquatur, & totū corpus cōsumitur & febris urget, cibiq; fastidiū, & biliosus uomitus. Cū aut frigida affligit intēperies, neq; frequens, neq; copiosa aluus est: quippe affectus longius prorogat, & certis diebus uēter cumulati⁹ deiciet, sed minus fœtida ceu sanguinis crassi

crassi faciem, ut propè atrabilis uideatur. Item plures & uarii deiectionum colores, frigidam notant intemperiem, in quâ febris languida apparet, facies non collabitur, maior ciborum appetentia inest. Harum intemperierum alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt sicciora & pauciora, magisq; ægri fient: si uero humida, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus excruciat. At si inflammatio iecur infestat. omnibus quidē ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est: idemq; ad iugulum supra, ad usque costas spurias infra peruenit. Huic dolori accedit febris acuta, tussis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus difficultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra: bilis euomitur, & alius non respondet. Quum autem similia in pleuritidis signa existant, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide comperhensum est. Si uero Erysipelate iecur conflictetur, flammeus ardor gliscit, urunturq; ægri, & marcor sequitur, qui *μαρμας* µὲν græcis dicitur. Priuatim uero cum caua quidem iecoris inflammationem experiuntur, nausea adest, uomitus, cibi fastidium, & flammeus ardor intenditur, anima deficit, & sæpe membra perfrigescent, ut aqua subter cutem transfundi inde incipiat. Rursus si gibbam ipsius regionem inflammatio exerceat, præter alia superius cōmemorata, tumor quoq; manifestius in superficie oculis & tactui conspicuus est. hæc quidē ualidam grandemq; inflammationem testantur. sin obscura quædam fuerit, iubebimus egro, magnam ædat respirationem. Et si dextra parte præcordia dolere dicat, moderata iecoris inflammatio censebitur. Quod si oblongus inflammationis tumor, qua parte muscoli incumbunt, appareat, sed ita ut nullum ex prædictis adsit, illos ipsos eadem inflammatione occupari noscemus. Grauitas autem cū distentione, & doloris, dextra præcordiorū parte sensus, nullo substante tumore, nulla febris urgente, uenarū signatur obstructio, qua uenæ portas & cōcaua iocinoris perreptantes iis quæ per gybba ipsius excurrūt, committuntur. Itaque si in abscessum degenerat: inflammatio, dolor & distentio ipsis increfcit, rigores sine ratione accedunt, dolentesq; iocinore, in sinistrum magis latus decumbere nequeunt, rupto autem abscessu, uel per urinas, uel per aluū cumulata puris subluuies prorumpit. At si tumor in scirrham affectionem deciderit, dolores quidem remittunt, sed tumor cū duritie est conspicuus, quæ ambiunt partes extenuant

& tempore procedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua inter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Itaq; aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum is quæ uiscus mediocriter confirmet, uiri consilium est. id autem præstat seris & cichoriū, interim crudum, interim coctum cum coriandro assumptum, item decoctum ipsius, epotum, & succus non solum, uerum & puluis ipsius mulsæ insparfus & calidis, & frigidis iocinoris uitiis opitulatur. Adhæc intybum troximum & sonchus eiusdē sunt generis. Benefacit etiam mali medici succi cyathus in aquā mulsam demissus, similiterq; filicis succus. At si cum obstructione mediocris affligat intemperies, ea ex uino quodam tenui, & quod urinæ mouendæ est, porriguntur. Catapotium uero quod recipiet radice cichorii drachmas quatuor, chamæpyte os radice drachmas quatuor trita cum melle cocto dantur ad nucis auellanae magnitudinem, quibus aquam calidam superbibere conuenit, iam ex opio & semine alterci confecta propinātur, ipsumq; Philonis antidotum. In quibus calor intenditur, etiā rosaceum primi meriti ipsis, uel melinum potui datur. Esui, ptisanæ cremor, uel chondri cum hydrorofato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci potione. Et summam cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, non obstruunt: uinum omnino circunciditur, nisi alteram ob causam, nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirant, tum enim ex tenuibus & iis quæ græci *ὀλιγοφόροι* uocant, aquosum aliquod exhibetur: Ac Erysipelas quoq; in eum modum curabitur. Porro in frigida intemperie contrariis pugnandum est. Panis igitur recte cum uino assumitur, item brassica bis tēue incocta, castaneasq; esse confert & uuas passas tum ex gallinis quod satis est: uinumq; bibant: sed prius ipsis eupatorium, uel asarum, uel medicamentum diapedereon propinari debet. Iam ex iis quæ prius ad coeliacos & dysentericos inscripta sunt, idonea deligi debent: cyphoides autem appellatæ compositiones, ad calidas intemperies neutrquam conueniunt. nisi modica quedam caliditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. ad frigidas autem optima sunt remedia, magisq; si cum humiditate, aut iecoris obstructione euenerint. Si uerò obstructio ex crassa glutinosisq; cōtracta humoribus fuerit, corruda & præsertim huius semen datur, item lauri radice cortex eupatoriumq;

riumq; ex oxymelite, uel lupinorum amarorum decocto cum ruta & pipere. Ad hæc farina lupinorum pota, & capparis radicis partes duæ, costi pars una cum uino: & medicamentum diabacanu ad obstructions quas crassi uiscosiq; humores excitant salutariter sumitur: præterea iris & pistaciorum fructus cortexq; marrubium insuper & amygdalæ amaræ, & ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; radix, agaricum, acetum scillites, oxymel, iecur lupi, aridum tritum & cochleario datum, omnibus iecoris affectibus ex uino dulci succurrit, item antidotum Theodoretum efficacissimum est remedium iecori obstructo, scirrho indurato diuq; inflammato. Item colicis & ictericis, similiter etiam picra ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiendi facultatem habent, nepe porra ex oxymelite, syluestris asparagus, & capparis, reliquaq; obsonia ex condimento aliquo calefaciente, quodq; meatus referat, incocta. Vinum tenue ac uetus utile. uitanda sunt alimenta crassi succi, balnea crebra, eaq; potissimum à cibo. Si morbus in uetustatem incidit, etiam uenæ sectio purgatioq; adhibenda, si nihil prohibet. Cum autem iecur inflammationem experitur, sanguis ex cubito dextro intrepidè mittendus est, & copiosus si uires sufficient. Extrinsecus farina hordeacea & fœnugræci, & semine lini cum palmulis, uel malis cotoniis, meliloti flore, absynthio, chamæmelino obducetur. Illud autem in summa præcipiendum est, ut astringentia emollientibus semper admisceantur. Epithemata uero iniici debent, tum quod ad Nileum authorem refertur, tum quod à grato odore euodes dicitur: item Philagrianum & Apollophanis, necnon ex melilotis confectum. deniq; quod coptum appellatur. Porro ad maximas inflammationes hoc ualde experientia comprobatum est, absynthii comæ, nardi gallicæ, asari, croci, singulorum uncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellii, ammoniaci suffiminis quod thymiama appellant, singulorum uncia duæ, medullæ uitulinæ uncia quatuor, cerati lentiscini libræ quatuor. Ad hæc oxymel ipsis dandum est, simpliciaq; auxilia, nempe, asarum, nardus gallica, uel indica, iuncusq; odoratus rotundus, petroselinum. Alius irritanda est, urticæ, uel mercurialis, coctorum esu. In declinatione morbi epithimum & polypodium ex mulsâ porriguntur, aliusq; inaniri postulat per clysterem, initio quidem ex aqua mulsâ cum sale, uel nitro, facta autem

rem inclinatione, miscetur hyssopum uel origanum, uel cnicum, uel centaureū & cucurbita syluestris. Summatim uero caua iecoris pars per aluū: gibba per urinas expurgatur. Alimentum his dabitur, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit. At inflammationis quæ Erysipelatis naturā referat, curationem superius sumus executi. Abscessū aut factō, ruptura adiuuanda cataplasmate trispermo, cū resina, manna pice, radicibus altheæ, columbæ fimo, caprillo stercore, præbitor aut ius decoctorū ad tertias polij & fumarie quæ in ordeo nascitur, item decoctum thlaspi uel cichorij, & chamædryos radice bibant: uomicaq; abscessus facta, mulla conuenit, & quæ in renibus exulceratis cōmemorata sunt. Extrinsecus imponitur medicamentum Mnafei, reliquaq; emollientia Item Icesion, uel quod salicibus constat. Si uero iecur scirrhum induratum fuerit, parum in medicina spei est, affectu in aquam subter cutem transeunte. Attamen emollientibus admiscenda sunt, ammoniacum, bdellium, medullæ, adipēs, & quæ his similē potentiā obtinent. Portiones expediunt, quæ angustias uisceris recludunt absterguntq;. Huiusmodi sunt quæ urinam citant, & calculos cōfringunt. Adhæc quæ nuper ad iecoris obstructionem dicta nobis sunt: alimento nimirum decenter adhibito.

De malo corporis habitu, qui Cachexia dicitur.

Cap. XLVII.

Pincipia hydropicorū affectū uocare nostri malū corporis habitū, Græci καχεξία consuerunt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit, in sanguinis detractio, quæ particulatim ac per uices adhibita ad tertium quartumue diem produci-
tur. Sed uacuandi sunt potissimū, qui hæmorrhoidibus, aut mēstruis nō respōdentibus in morbū inciderunt, quemadmodum iis qui copia uitiosorū humorum laborāt, uacuatio sanguinis per uenā uitāda est: purgādi aut sunt ex hiera, dia colocynthidos uictus erit tenuis, & desiccās. Aquarū naturalium usus adhibebitur, primū aluminosarū, nitrosarūq; magis, mox sulfurosarū: pluribus diebus iterpositis aliud balneū accommodabit, uariōq; exercitationis generi credētur ægrotātes, maximè aut ei quod per medicos alyptas, i. reuēctores administratur. postea ueratrū assument mirificè quoq; iuuat ipsos & absynthij potio, & cotabismi. & dropaces. Si affectus in hydropē deciderit, aquæ subter cu-

ter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

De aqua inter cutem.

Cap. XLVIII.

Cum iecur uehementer perfrixerit, interim sanè primario, aut inflammatione, aut scirrho, aut alio implicitu uitio, interim lege consortij quod cum aliis partibus habet sanguinis elaboratio non succedit, ac uitium aquæ intercutis quod hydrops græcè dicitur, inde contrahitur, in quo nonnunquam spiritus copia cum humidi momento intra membranam, quæ peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomine percussum tympani modo crepitum elidat: qua ratione et tympanias nuncupatur, qui stomachi, alui, & coli inflationibus, febribusque longis superuenit. nonnunquam uero ex duritie peritonæi, aut uulnæ in mulieribus, aut ex scirrho generatur. Aliquando contra humorum abundantia cum paucissimo spiritu, in eisdem regionibus collecta tanquam in utre quodam conseruatur, unde malum, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima uero ex parte, ex duritia & scirrho lienis, & iocinoris longisque; intestinorum profluuiis, in quibus fit ut uenter quidem intumescat, reliquum autem corpus quod alimentum non sentiat, consumatur. Nonnunquam etiam in tota corporis mole frigidior pituitosiorque sanguis continetur, qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis ueluti in aquam resoluta emanat, adeo ut corpus albido, & pituitæ colore emortui instar appareat, uocaturque hydrops leucophlegmatias hypofarcidios, uel anasarca. Quem lentæ febres, malus stomachi habitus, hæmorrhoides diu suppressæ fluxus muliebris, spiritus difficultas, uigiliæ sine ratione oborientes, causæque his consimiles mouerunt. Curatio igitur communis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tympanias appellatus medicamenta requirit, quæ aquam educant. Cui autem anasarca nomen est, sanguinis detractione succurrimus, maximè si affectus origo ex hæmorrhoidibus, aut menstruis suppressis exiit, nisi prius cum malo habitu premebantur sanguinem emiserint. Et hic igitur ut in iis qui malam corporis habitudinem sortiti sunt, per uices tentanda est uacuatio. Deinde stercois bouis gregarii aridum exactè tritum, coctumque in posca, uel oxymelite, sulfurisque; pars quarta superinspersa, toti uentris capacitati iniiciatur, uel stercores caprilla in pueri urina ad for-
dium

dium spissitudinem macerata, applicato, per uentrem summè ipsos purgat. Item cataplasmatibus utendum ex fermento, ficis pinguibus, calce, nitro, iride, cardamomo, sulfure uiuo, ammoniaco, baccis lauri, uua taminia, columbarum ruralium fimo, uel omnibus, uel quibusdam ex his cum oxymelite. Post quæ ephithema spongium appellatum ex caprillo stercore mirificè humiditatem uacuat, tum per latètes meatus, tū per aluū. Insequentibus diebus emplastra perficcantia imponuntur, tū dia iteon, id est, quod ex salicibus est, tum quod icesium dicitur, uel quod Cureo ascribitur, uel diadaphnidon quod ex baccis lauri factum est, uel polyarchium, uel epithema diaspermation ex seminibus præparatum. Atq; hoc indubiè mirificos præstat effectus, quod sequitur. quippe humores ex alto eripit: lapidis pyritis, sulfuris uiui, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ duodecim. cumini drachmæ sedecim, nitri drachmæ duodecim. Excipiuntur cera modica, & terebinthina, pelli que illita, toti uerò ab imponuntur. Ius radicis sambuci decoctæ in uino potui datur, uel cucumer syluestris uino austero maceratus per triduum, cyatho uno propinatur. Accessio autem fit quotidie usq; ad cyathos tres: Hoc quod subiungitur, uaria constat mistura: balsami, nardi, casia, cumini, dulcis radiculæ, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amomi, myrrhæ petroselin, calami aromatici, piperis, seselis, spondilij pares portiones, faciunt autem bene etiam singula per se, & omnia quæ urinæ ciendæ sunt similem facultatem obtinent. Caterum scilla tostata, cū melle trita & linctus modo exhibita, sine grauitate urinam mouet: coqui autem possit etiam in aqua, iis qui bibere uelint. Iam hoc quod sequitur præcipuè bonum est: interioris scillæ libræ duæ, in uini austeri sextariis tribus adusque tertias incocta porrigito ex uino quotidie, orsus à mystro usq; ad unciam. Istud urinam optimè prouocat, quod recipit aluminis liquidi circa fabæ magnitudinem: ubi aqua dissolueris, linteoque percolaueris, ad tres dies propinato, uel uno interposito. Conuenit etiam his pitra ex oxymelite. Adhæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus. Plura uero aquam educūt, sed hæc usus comprobauit, gnidia grana quadraginta, aut quinquaginta, uel lathyrides uiginti, aut triginta, uel euphorbii silique quinque, aut septem, uel squamæ æris drachmæ duæ, aut tres cū micis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ, uel sambuci

buci radice corticis succus epotus cum condito, uel chameleæ foliorum, æris combusti, anisi singulorum par modus datur in aqua, per initia quidem drachma una, diebus aliquot interpositi s etiam duæ, & plures. Atque insequentia, mirifica sunt cataporia: aloes, euphorbij, cocci gnidij, singulorum uncia, rhei semuncia, excipiuntur succo brassicæ, fingunturque cataporia, dantur siliquæ septem, aut nouem. Antidotum ex gariophilo, aquam mirabiliter elicit, iam uinum quod aquæ educendæ est, dare tentabimus. Est autem hoc præstantissimum scillæ uncia tres, seminis apii, capparis radice corticis, piperis, singulorum drachmæ quatuor, cocci gnidij decorticati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo, uini optimi heminæ duodecim, mellis crudi libræ sex. Contusa cibataque uino perfunduntur, scilla simul leuigatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem, etiam theriaca utendum est, & stercoreis bubuli cochlear ex uino porum quotidie strenuè auxiliatur. item clysteres adhibendi acres, nisi uenter sua sponte humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, cardamomi, cumini, nitri, aristolochiæ, fœnugræci, pulegii, ficuum interioris pares portiones susino excepta mulieribus subiiciuntur. Secundum hæc aquis naturalibus, uti continenter expedit: ad hæc in arena contexti desudent: aliis autem lauacris abstinebunt. Quod si uero interim lauent etiam, utentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce, & persimilibus inspersis. Hæc sanè uel citra lauationem utilia sunt, aridaque cum oleo uentri adfricata. At si id uitium est, cui ansarca nomen est, reliquas partes exerceri, quatenus licet, oportet & siccas ad solem perfricari. Reliqua uictus ratio siccior assumetur. Cibus itaque erit salsamentum, sinapi, & allia: ex auibus syluestres, & siccæ magis. Inter olera asparagus, bisacutum, porrum, sinapi, caucalis, reliquaque syluestria. Obsoniis miscebitur sal theriacus, uel iamblicus: uinum uetus, tenue, ad urinam mouendam efficax ebibitur. Sin autem facultas datur, ex marina confectum: omnis potio liberalis uitanda est, aquæ in totum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus, acrioribusque cibis & auxiliis abstinendum, mixtim uero his utendum, ita ut ei quod magis urget, occurramus: si uero id morbi genus est quo uenter sonitum ædit, Tympanias uocatur, purgantia, & quæ

quæ uniuerſum corpus emaciant colliquantq; releganda ſunt item ex ijs quæ urinam mouent efficaciora. Illis autem quæ extenuare & diſcutere ſpiritus poſſunt, tum intrinſecus, tum à foris utendum eſt. aut cucurbitulæ leues crebro toti uentri ſuffiguntur. Sin id uitij male habet, in quo ueluti in utrè aqua contrahitur aſcites uocatur, niſi prædictis ceſſerit remedijs, ad perforationem ueniendum eſt quæ παρακέντησις dicitur, quod nulli alij aquæ ſubter cutem generi conuenit.

De Liene.

Cap. XLIX.

CUm lien melancholicum humorem, qui ueluti limus ſanguinis exiſtat, à iocinore trahere ſoleat, ſi quidem facultas attractrix infirma fuerit, meatus uero obſtrictus per quem prius trahebatur, niger icterus conſtituitur, ſanguine impuro per totum corpus diſperſo. At ſi lienem grauitas, & diſtention, uel etiam dolor exerceat, obſtructio indicatur: ſi nihil horū euenerit, attrahendi potentia imbecillitas. Quin etiam ſi atra bilis uomitus ſine febre aliāue malignitate oboritur, retentricem lienis uim laborare indicium eſt. Expultricis imbecillitas cibum faſtidium, efferet, dum non amplius melancholicum excrementum, ab liene ad uentriculi oſtium deferretur, appetentiamque excitat ſed in ipſo liene obſtruitur, primum ſanè inflammatio huius, cuius notæ ſunt, feruor, dolor, & diſtention, excitatur. quæ paulopòſt in ſchirrum degenerat, ſicut feruor quidem dolorq; finierit, tumor autem & duritia maneat, Hoc preſſis uitio, os foetet, gingiua exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt, ob quæ ſimul affecto iocinore, cutem ſubeuntes aquæ colliguntur, ſicut comprehenſum eſt. Itaque intemperies ipſis eandem cum iocinore curationē poſtulat. ſi adeſt inflammatio, ſanguis à cubito ſiniſteriore, uel ab extrema manu dimittendus eſt, eo quòd reuulſio longioribus interuallis fieri debeat, uel etiam propter naturalem quandam cognationem: deinde cataplaſma inducendum ex quæ citra euidentem calorem extenuant, admixtis quibuſdam etiam nunc aſtringentibus: uidetur autem hanc facultatem habere ſuapte natura, qui uocatur flos ſalis. Porrò eſt & hoc cataplaſma mirificum, ſœnugræci triens, farina hordeaciæ, naſturcij, ſingulorum uncia, ſi cum pinguium libra, uerbenacæ herbæ arida uncia,

da uncia, ficus, aceto quam acerrimo macerantur. Deinde cum alijs prius contulis incoquantur, postea iterum coquantur. Vel stercus caprillum cum cruda ordeï farina coctum ex posca inducitur: adhibeto, si placet, & salis florem, fouendo autem prius cyprino cum aceti momento, malagmatis utitor, primum simplicioribus, quale est hoc. Cerae sesquilibra, centaurij libra, natri triens, terebinthinæ, seminis uiticis, capparis radices corticis, singulorum quincunx. Coctis quæ liquari possunt, arida in sparguntur. iam quod ad Nileum autorem refertur præstantissimum est. Verum ubi inflammatio in scirrum degenerat, ualentioribus uti conuenit, ut etiam cutis summa exulceratur, quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedunt Macherionis, Curei, item ex baccis lauri confectum, & ex salicibus. Quod subsequetur, etiam ipse expertus sum, auri pigmenti uncia duæ, sandarachæ uncia duæ, cerae libra, terebinthinæ libra, picis arida tantundem, galbani uncia, opopanax uncia, capparis radices corticis, glandis unguentariæ, singulorum unciæ quatuor, lachrimæ ammoniaci scrupula sex, nardini, uel cyprini uncia quinque. Ammoniacum etiam cum aceto applicatum, lieni sæpe profuit, item potum scrupulis tribus quaternisue cum uno castorei, si priusquam in lauacrū descendant, ficum siccatum comederint, sputoque eam reddiderint, uel ammoniaci pars una, castorii tantundem; datur drachma. hæc etiam ad induratos scirrhus, proficiunt, quemadmodum capparis quoque cortex ex aceto contritus, applicatusque. Idem bibitus aceto, uel oxymelite, crassos, glutinososque humores uacuat, interim sanguinem. Iam salicis cortex, consimiliter inungitur, & cinis ex officina fabrilis cum cruda ordeï farina ex oxymelite inductus. Item centaurei succus à foris impositus, epotusque, & lupinorum amarorum decoctum cum ruta & pipere potu assumptum, nec non farina ipsorum obducta, & aqua in qua candens ferrum subinde extinctum est, febricitantibus per se data cyathis tribus. febris carentibus autem cum uino & aceti cyatho uno, uel rumicis syluestris radices cum scilla tres oboli, uel chamædryos, uel serpilli acetabulum totum cum oxymelite, uel anagallidis, quæ cœruleum florem obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, uel acetum scillites, uel oxymel. Cōposita autē hæc, panacis radices, gutta ammoniaci, capparis radices corticis, herbae lanariæ, scillæ

scillæ tostæ medullæ æquales portiones exhibentur drachmæ unius pondere. benefaciat etiam suspirosis, & hydropicis.

ALIVD. Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmæ duæ, suffiminis ammoniaci totidem. Teruntur aceto scillino, instar drachmæ unius dantur ex oxymelite.

Ad lienem scirrhum induratum.

Cyclamini drachmæ uiginti, brioniae drachmæ tres, dictamnii drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo, herbæ lanariæ drachmæ sex, capparis radices drachmæ sex. pastillus triobolaris ex oxymelite porrigitur. & qui ex æruca præparatur, non in idoneus est: cibus competit tenuis, acris, siccus: potio paucissima adhibendæ exercitationes frictionesq;, & sinapismi, interim etiam cucurbitulæ cum scarificatu desigende.

De morbo regio, qui iëteros Græce dicitur. Cap. L.

Regius morbus, quem Græci iëteron appellant, bilis est per totum corpus suffusio, modo atræ, de qua in lienosis à me dictum est, modo flauæ. Differentiis constat numerosis: quarum causæ & notæ hæ sunt. Si enim febricitante ægro repente superueniens febrem finierit, crîsim testatur, materia ex alto foras prorumpente, contractum. Medicina nõ indiget, ut quod balneis & moderata frictione subito discutiatur. Si autem cum febris & biliosis deiectionibus inuadat, & præcordiorum dextra parte grauitas adsit, ferues iocinoris inflammatio significatur: cuius uis sanguis in bilem mutatus, per uniuersum corpus defertur. Sin autem feruor citra grauitatem in ipso subest, ex sola iecoris calida intemperie, uitium gignitur. Si absque febris alba deiciantur, uesicæ fellis malum ostenditur, uel ipsius meatuum: si grauitas quidem præcordiorum dextram partem premat, obstructorum, sin autem citra illam, facultate imbecillum, uel attractrice, eius qui humorem ex iocinore eliciat, uel expultrice, illius qui ad intestina eundem protrudat. Quippe sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus diffunditur, quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim uero his etiam urinæ biliosissimæ affatim excernuntur. Cæterum fit etiam arquatus, ex intemperie calida solidarum partium, dum id quod ratione alimenti, ipsis offertur, in bilem transmutant, quemadmodum in aquæ subter cutem genere,

genere, cui nomen anasarca, in pituitosam humiditatem, est mutatio. Verum talis arquatus dignoscitur hac nota, quod non subito, ac una uice, sed paulatim procreetur, sic ut nullum ex commemoratis adsit. Iam uero noxii medicamenti potus, & uirus extrinsecus à uenenato animali illatum, regium morbum parit. Itaque calide iecoris intemperiei, & inflammationis uiriumque imbecillitatis, curationem supra sumus persecuti, ubi de ipso agebatur, quam etiam integram huc transferre oportet ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis utrique sint obstructi, uel alter duntaxat, uenam, in cubito dextro ipsis diuidi consilium est. Nonnulli uero, tum his, tum illis qui ex iecore inflammato, arquatum contraxerunt, uenam propter minimum dextræ manus digitum, incidunt. Cataplasmatibus quæ inflammationem arcent utendum est, & purgatione ex hiera, nec non clysteres idonei sunt, potui rectè datur arquaticis, ius apij, uel adianthi, uel rumicis, uel serpilli decoctorum ad tertias, uel absinthium potioni inspergitur. Præclare faciunt raphani succi cyathi duo, cum uini cyatho uno poti. Et cichorei succi cyathi bini, uel terni per se aut cum uino poti. Sed qui iecoris inflammationi arquatum fuerunt acceptum, mulsum bibent, uel decoctum tenuis aristolochiæ, uel hyperici, uel adianthi, uel herbæ lanariæ, uel erythrodani similiter, uel cornus ceruini scobis drachma, cum uino, uel pastinaci syluestris decoctum in uino, ut tertia pars super sit, uel sulphuris uiui drachma in ouis sorbetur. Hæc etiam propter obstructionem arquato laborantibus ualde auxiliantur, seminis autem attriplicis scrupuli octo, cum chrysattico, aut alio passo in solii ingressu poti, uacuationem magnam præstant. Rectè etiam picra datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amygdalis pastillus datur, & cinamomi quantum tribus digitis comprehendere potest, in mulsi cyatho uno, uel aqua temperata, uel myrrhæ ad fabæ magnitudinem cum piperis granis quinque, tantundemque cinamomi. Qui uero ex calida solidarum partium intemperie in arquatum inciderunt, molli frictione, exercitiis moderatis, unctione & balneis tractandi sunt, cibo humido & mediocriter, refrigerante, cremore prisanæ, intybo, feri, cichoreo, piscibusque, uino tenui aquoso. Qui ex lethali potione, aut ex uirulentorum animalium moribus in hunc affectum sunt prolapsi, de iis quinto uolumine

PAULI AEGIN.

p

tracta-

tractabitur. Porro si bilis in oculos faciemque se receperit, elaterij instar erui cum lacte muliebri naribus in balneo instillato, & statim in solium descendat, cauentes ne caput immergatur. Post balneum uictu, recreatis, rursus medicamentum errhinon in sole, naribus infundito. Bene facit etiam cyclamini succus, porri, & nigellae. Acerum uero accerrimum naribus attrahat in folio desides, contineatque et pressis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

De umbilico prominente. Cap. LI.

Causam umbilici prominentis, & quomodo id uitij manu curetur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam uero nonnulli etiam medicamentis in naturalem statum redeunt, ipsa hoc loco dicemus. Aluminis scissilis drachmae quinque, flocium uini drachmae octo, rosacei decem, gallae immatu-
rae drachmae duae. Vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto inducuntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur. *ALIVD.* Fabae fruscae, corticum gallae, balauitij pares portiones, coquuntur in aqua: ubi dissoluta fuerint, tritaque diligenter, spongia, ut praedictum est, imponuntur. *ALIVD.* Plumbi scobis drachmae sedecim, cicutae, manne, cerussae, hypocistidis succi, singulorum drachma, uino dissolutis in modum praedictum utitor.

Quomodo impuberes imberbesque diu maneant, & particulae naturales testesque conseruentur, ibidem etiam psilothra numerantur. Cap. LII.

Cimoliae cretae, & cerussae aequales partes, alterci succo excipiuntur ut sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac utitor. *ALIVD.* Cicutae succum, solani, alterci, lupini foliorum teneriorum, psillij aequalem modum. ubi contriueris, utitor, sed locum prius abstergito abluitoque. Oportet autem pridie quam usurpare uelis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolendis dicarum, psilotrum appellatum. Asellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulae rotundissimae similem, graeci κατὰ τοὺς δὲ τοὺς uocant, drachmae duae, sandarachae drachmae quatuor, calcis drachmae octo, aceti ueteris cyathus. Lixiuiam est ficu tantum de coquito in fictili, ac in balneo utitor. *ALIVD.* Calcis uinae partibus duabus, auripigmenti totidem, terrae

terræ cimoliæ parte una, in aqua coctis quemadmodum explicitum est utitor. *ALIVD.* Simplex odorisque expers: calcis uiuæ utriusque sextarium, sandarachæ unciam. Coquito ut dictum est, & utitor. Porro quæ pilus adimant, in ocularijs exposita sunt.

De ramicum generibus.

Cap. LIII.

Cum intestina peritonæo rupto deuoluuntur, operosa nimium est curatio, cum uerò ob raritatem illius descendunt, faciliior sanandi ratio est: ac huic malo pueri potius, utpote humidioris naturæ, sunt opportuni, multiq̃ue adeo citra manus operam medicaminibus impositis, & conuenienti deligatura persanati sunt. Utendum uerò est remediis infra comprehensis, ubi hoc solum addiderimus, affectus solo loco differre. Quando nanque intestinum etiam nunc supra in inguinibus iacet, nostri inguinis ramice græci, *βυβονοκλήνη* uocant. Cum in scrotum iam infra delapsum est intestinorū ramex, græce *ἐντεροκλήνη* dicitur. Malicorij igitur drachmæ, decē gallæ immaturæ drachmæ quinque, in uini austeri cyathis tribus incoctæ, & leuigatę imponantur, intestino prius confriato, & aqua frigida superfusa: decimo die soluuntur, sed ita, ut æger in lecto maneat diebus triginta, bibatq̃ue cupressi decoctum cum uino, uel eius globulorum tres obolos, ex diluta uini potione. hoc medicamentum auxiliatur pueris.

Aliud glutinatorium.

Symphyti radice, marrubii succi, amygdalarum amararum, gummi, pares portiones. *ALIVD.* Terebinthinæ sescuncia, ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearum cū suis testis, singulorū uncia, ichthyocolla in aceto diebus tribus ante maceratur. *ALIVD.* Cupressi, galbulorū uncia, gallæ tantundē, melicorii semūcia, taurocollæ uncia tres, mānæ thuris, semuncia, symphyti tantundem, cochlearum cum testis uncia. Galbuli & malicorium uino astringenti diu incoquantur. Et cum reliquis leuigatis excepta, in usum accommodato. *ALIVD.* Aloes, malicorii, thuris, hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulorū sescuncia, uini dulcis qđ sufficit. *ALIVD.* Magis uarium, facit etiā adultis cum morbus uetustatē nondū senserit: chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollę, ichthyocollæ, lapidis Gagatis, lapidis hematitis rhus, syriaci, & coriarii, acaciæ

p 2 singulorum

singulorum fescuncia, lapidis pyritis ignem non experti, magnetis coerulei coloris, aluminis scissi, mannæ thuris, singulorum uncia, picis brutiæ uncia quinque, cochlearum cum testis uncia, argenti recrementi quod helcysma dicitur, uncia quatuor, gallæ, squamæ stomomatis, æris singulorum uncia, bituminis uncia sex, Myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur, Medicamento tam spisso ut digitos non coinquinet, utitor. Quod si iacere non sustineant, triangula ipsos fascia crassiore, quæq; intestina possit constringere, tuto deligabis. A cibis infantibus abstinendū, uino copiosiore, crebris balneis, ualido motu, nempe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.

Ad aquosum ramicem qui hydrocele dicitur, ut humor collectus euacuetur.

Piperis grana centū, lauri bacca octoginta, nitri drachmæ uiginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei hemina dimidio exceptis utitor. **ALIVD.** præstantissimum. Lapidis asii floris drachmæ sex, uuæ passæ acinis uacuæ drachmæ duæ. cumini æthiopici drachmæ octo, nitri rubri tantundem. Trita imposito, fouens uesperis & mane: quidam uero adiiciunt etiam sulfuris drachmas octo. **ALIUD.** Calcem uiua balnei sordibus exceptam cum cerato impones, & paululum nitri calci miscebis. **ALIVD.** Radicis brassicæ crematæ cinis adipe suillo ueteri liquefacto exceptus inducitur: per triduum soluitur. † Ne autem humoris magna fiat colluuius, hoc utere malagmate, Ceræ libris duabus & semisse, picis triente, guttæ ammoniaci triente, aluminis liquidi fescuncia. Proficit etiam medicamentum digiron hoc est ex populo nigra & reliqua extrahentia.

† Antiquus codex, πρὸς δὲ τὸ μὴ πάλιν συλλογὴν ἔχει γενέσθαι, Ne autem rursus humor colligatur.

De inflammatione testiculi scrotique & alijs ipsorum affectibus. *Cap. LIIII.*

Scroti inflammatio hisce agnoscetur notis. locus primo contactu indolescit, feruor, duritiesq; intensa apparent. Testiculo autem inflammationem sentiente non ex leui tactu dolēt affecti, sed innixis ualidius digitis rubor & durities ipsius per summa minor extare uidetur: impressis autem digitis durities in alto occurrit, & febris nonnunquam oritur. Itaque testiculorum inflammationibus propriè cōuenit sanguis ex

ex talo dimissus: cōiter aut oībus cataplasmata & cerata. Imponi igit debet ex lomento diluta uini mixtione cocto cū uuis passis pinguibus acinorū expertibus cumini, uel hastulæ regiæ radix incocta, cōtritaq; miscet tenuissimæ parti polētæ æquali: uice cataplasmatidis adhibet uel lini semē ex diluto uino, uel fēnugræcū ex mulsa, uel lilij radix ex mulsa, aut recentibus uini flocibus cū polētæ polline. Vel senecion. & coriandrū uiride cū uuis passis quibus acini sunt exēpti. Sin multus infestat ardor, folijs alterci cū triticea farina, aut cicerū obducitur, uel arundinis folijs, uel cucurbita cruda. Si uetustior est morbus cū duritie, cucumeris syluestris radix in mulsa cocta, leuigataq; cum lolij farina admouetur. Itē hoc efficax est auxiliū, uuarū passerum quibus acini sint exēpti, uncia quinque, cicerū subferuefactorū fescūcia, cumini uncia, sulfuris uncia nouē, nitri uncia, resinæ uncia tres & semissis cōtrita oīa cū melle in cataplasmatidis formā digerēs, utitor. cerata aut hæc sunt, olei cyathus, colophonix uncia sex plūbaginis, cumini, uuarū passerū, lomentis singulorū triens, ceræ sextans. Plumbago cū oleo adusq; aliquantulam spissitudinem incoquitur. deinde cera resināq; inditur. Sublata ab igne semifrigida, uuis passis cōtritīs, farinisq; superfundito. ALIUD. Olei anethini & rosacei, ceræ, resinæ piceæ, singulorū quincunx, cumini uncia duæ & semissis, stercore asinini fescūcia cuminū teritur cum stercore asinino, ceratumq; refrigeratū miscetur unaq; leuigatur, deinde in panniculum illitū admouetur, lana superaccomodata. olei omphacini, uel butyri, uel resinæ æquali modo utitor. Quod si à sudoribus ulcerata scroto excitetur, gallā detritam, uel alumen inspargito, pingui aut hircino felli & perungito. Porro ad testes aphræ ulcere pressos terram cimoliam cum aqua prius illitam, finito siccescere, calidāq; aqua abstergito, myrtum siccam, & smyrnij paulum in puluerem redactum applicato. Si caro in testiculis excreuerit, cinis sarmentaceus nitro & aqua maceratus curat inductus. Pruritu scrotum irritante, nitrum, pedicularia, Græci staphidagriam appellant, alumen liquidum, aceto contritum, rosaceoque, illinitur in balneo Vbi laueris, candidus oui liquor cum melle parti inungetur.

De seminis profuuii & ueneris insomnijs. Cap. LV.

Seminis profuuium quod græcè γονόρροια appellatur, est inuita, ac præter uoluntatem excretio, quæ continuè naturalibus

turalibus nō intensis, ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate prouenit: in qua ex usu est cōquiescere, lumbos pubemque hapso ex uino & melino uel œnanthino cōtegentes: mox cataplasmatibus obducere ex palmulis, malis cotoneis, œnante, acacia hypocistide, rhu, & similibus. Insidere oportet lentisci, rubi, & id genus aliorū in uino decoctionibus, uel etiam, aquis cibisq; uti siccātibus: post prima morbi tēpora ad exercitatoriam rationē deducere, qua totū corpus, partesq; affectæ confirmantur. Caterū quō seminis paretur fœcunditas, libro primo, ubi de sanitate tuēda agitur, abundē tractauimus. Vbi etiā illorum qui uenerē exercere nequeunt, scripta est curatio, itē quæ ad ueneris insomnia proficiant. porrō iuuabit genituræ profluuio laborātes, & lectus frigidior, & dextri lateris, uel sinistri incubitus, itē medicamēta frigida lumbis substrata, qualia sunt coriadrū, cicuta, cerussa, portulaca: omnia uero ex aceto.

*De satyriasi.**Cap. LV I.*

Satyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidā seminis uasculorum inflammatoriæ affectioni cum intentione superuenit. Hæc palpitatio nisi finiatur, in seminariorū uasorum resolutionē, aut conuulsionē delabi consuevit, ac qui conuulsi fuerint celeriter intereunt. obeuntes autē uentre inflantur, & frigidū sudorem emittunt, ac mulieribus quoq; , sed raro hoc malū accidit. sanguinē igitur protinus dimittere conuenit, uictu uti tenui, & abstemio, eumq; assumere quotidie, ualenter nunquā, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium, beta, malua, & mercurialis momentū, & ius esculentum cochlearū: nil malū fuerit etiam ex simplicibus clysterē ab inferiore parte iniicere. Quæ uerò urinā mouent, medicinæ cauendæ sunt, lumbis refrigerantia quoq; admouere oportet, ut solani succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necesse uero est, colem, & inter anum, scrotumq; locum refrigerantium, quibus leniendi uis inest, aliquo demulcere, nempe argēti spuma cimolia creta, cerussa, aceto dilutis, aut aqua, aut uino dulci, aut sapa sepino cubitu cōquiescere nocuum est. Rursum confert bibere nimphææ radicē, iridē, & adiantum. Rutæ uero succi potus profuerit, & seminis profluuio laboranti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumentaceus modicus, sitis inducitur. At si prorogatur uitium, cucurbitulæ cute ferro incisa defigēdæ sunt. Si plenitudo adsit et hirudinibus uacuare,

cuare, & uentrē cruda ordeī farina ob linere, alienum non est.

De priapismo.

Cap. LVII.

Priapismus est firmū genitalis incrementū, quod in lōgū latumq; intumescit, citra ueneris appetentiā flatulentus nimirū est spiritus qui particulā in tumorē attollit, ex humoribus crassīs, & uiscosis modici caloris opera procreatus. Notū uero est cuilibet, particulas nō esse calfaciēdas, sed leniter refrigerādas cerato rosaceo, cū aqua cōtuso, itē chamæmelino cerato in genitali & lūbis imposito, uictus & medicamēta exhibent, quæ extenuare citra manifestū calorē possunt. Applicabuntur et quæ naturali modo operātur, experimētis ac usu probatā. Nympha igit potui dabit, uiticis semē: rutæq; uiridis obsonijs mixtū. Sed p initia id nō assumi debet, ut quod uehementer calefaciat: uerū post aliorū extenuatiū usum. Si uacuatione uti libeat p uomitū id facies. Nā per aluū factæ, uicinas particulas sæpe fluxioni oportunas efficiūt. Exercitiū fricatioque flatib. discutiēdis rectē adhibētur. Nulli p̄dictorū uenus pdest, nisi quibus ex huius abstinentia semē abūdere conicimus.

De particulis inefficacibus.

Cap. LVIII.

Qui hoc uitio laborant, non ruunt in uenerem eoq; pusillanimes fiunt. Causa horū est, particularū resolutio, uel seminis inopia. Cū igitur ea quæ semini generando sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quæ simplici uirtute ad uenerē incitant, nunc ualentiora adijcere oportet. Cōmuniter igitur medicamētis quæ à lassitudinibus reficiēdis, acopa dicūtur, ad resolutionē inscriptis, hic quoq; utendū est. Priuatim stellio cōcrematus, in pulueremq; redactus cū oleo magno dextri pedis digito, illinitur, & uenus exercetur: ubi cessare uoles, digitus abluatur. Iā medicamentū ex stellionibus uaria constans mistura efficax est. Potui uerō dantur quæ incitant, quale hoc primū est, piperis, baccarum pini, petroselini, ceruini genitalis ramenti, terebinthinæ pares portiones, melle excipiuntur. ALIUD. Cicerum crudorū, baccarum pini, singulorum uncia duæ, seminis erucæ, piperis, singulorum uncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cū uino. Item satyriace dicta ex multis composita congruet, atq; id genus alia. Inspecere præterea oportet reliquas morbi causas, & conuenientem ipsis correctionem accommodare.

Pudendorum & ani remedia. Cap. LIX.

Naturalium aniq; ulcera circa inflammationem oborta, medicamentis indigent, quæ uehementer reficcant. cuiusmodi sunt ex charta cōbusta, anethū ustum aridum, cucurbita cōcremata. At siccis recētibusq; ulceribus, etiā aloë præsens est remedium, si arida in puluerē redacta applicetur. Porro omniū leuissimū est, & nihilominus efficax pōpholyx. At si humidiora euenerint ulcera, piceæ cortex per se lapis hæmatites. an etiā altè descenderint, manna prædictis miscbitur. Si pascendo serpant, lenticula cum malicoriis inducetur, utendumq; est Coraco ex phymelite appellato, & bithyno, adhæc, eo quod ex charta usta cōponitur. Rimas autē naturalium sedisq; Græci uocant rhagadas, iuuat resina fricta, cum rosaceo cōtrita, ut sordiu fiat spissitudo, adiecto etiā luteo oui, opioq; uel hederæ foliorū cōbustorū cinis cū rosaceo in plumbea pila tritus admouetur. Iā pastillus ex œnelæo, & lapis phrygius admodum probata sunt remedia ad rimas, tū sordida circa ani orbē ulcera, præsertim quæ elidi nequeunt. ALIUD simplex quod ēt acrimoniā obtundit. Cadmiæ combustæ, elotæq; uncia duæ, rosarū ungue ex foliis desecto, uncia sex. puluis inspergitur parti uino prius absterse. Ad condylomata uerò faciunt chalcitidis, œsypi, medullæ ceruinæ, rubi foliorū æquales portiones cū cerato, idē præstāt pastilli ex œnelæo. Quod si in cole intra genitalis foramē ulcus delituerit, pus, uel sanguis citra urinā redditus fatebitur. Curatur primū aquosa mullā collutum, mox lacte, postea collyrio Asteri lacti mixto, aut pastillo Leuco, aut is qui uocatur dialotion in plumbea pila subactus demittitur, uel etiam penna tincta perlinitur, inde tenue linamentum tortile unctum imponitur. Præstantissimum uero est etiam quod capit gallæ, pompholygis, amyli, & aloes pares modos, rosaceo, & plantaginis succo leuigatos.

Ad naturalium dolores.

BVtyri, resinæ, paribus portionibus pulchrè liquatis obducto, uel ex seminis linis succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pondus leuigatum imposito.

Ad intumescencia pudenda.

Vitis foliorum tenerorum triginta numero, cerussæ drachmæ quatuor trita applicantur. Cæterum fotu ex aqua marina

rina frigida coles utitor & quiete, penemq; deligato. Carnosas naturalium excrescentias, quas Græci thymos uocant, compefcit, nec finit rursus augescere cinis palmitum cum aceto cataplasmatismodo illitus, item salicis corticis combusti cinis. In uniuersum & thymus, & myrmecia, & uerruca pensilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta ualenter exulcerantia eliduntur: ijs autem quæ exedunt, emoriuntur. Propriè contra hæc uitia proficit, elaterium cum sale impositum, grossi cū aceto, nitro & farina. Liquor fici illitus, smaridis caput salsum crematum in cinerem, ærugo cum sulfure uino combusta, tithymalli liquor illitus, ocymi folia cum atramento sutorio, uel heliotropii maioris semen cum uino cataplasmatismodo applicatum.

Ad ani inflammationem.

Cerussæ uncia quatuor, pompolygis uncia, uel cadmiæ tene-
ræ, thuris, singulorum uncia: sereos succi hemina diluun-
tur, succus autem paulatim affunditur, donec absumatur. De-
inde ceratum ex uncijs duabus ceræ, & rosacei libra confectū:
ubi deraferis miscetur, ualideq; emollitur. Demittitur autem
instrumento quod à pure trahendo πυλκον Græci nomināt,
& superdeligatur, facit autem & ad ani fissa cum inflamma-
tionem sentiunt, item aduersus sedis exulcerationes, cum ar-
dore, aut rosione infestantes.

Ad sedis erysipelata.

Medicamenti, quod ab herbarum succis diachylon appella-
tur, libra, rosacei quantum satis est, panis puri libra, croci
uncia, opij uncia. crocus & opiū passio macerantur, panis aqua.
Deinde leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceum ad-
miscetur, emolliturq;: Vtile est etiam ad podagras calidissimas
ALIVD. Arcet etiam ani inflammationem cerussa cum uino ro-
saceoq; in pila plumbea, & cochleari plumbeo trita inunctaq;
uel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leui-
gata, dum sordium spissitudinem habeant, perungito.

Hedricum ad ani dolores.

Alterci folia tenera, portulacæ folia tenera, micas panis in
uino tinctas. ouorum tollorum lutea pari pondere, rosacel
quod satis est, ubi locum rosarum & meliloti decocto foveris,
cataplasma imposito.

Hedricum

*Hedricum optimum ad ani inflammationes,
eiusdemque excrescentias.*

CErussæ, spumæ argenti, suffiminis ammoniaci, bdellij, singulorum scrupula sex, terebinthinæ uncia, cetræ semuncia. Arida succo solani, alterci, uel portulacæ conteruntur. Quæ liquatur, ubi illis adiuncta fuerint, excipito. Et emolitis rosaceo, utitor. Iam medicamē phicoryche. & dia molibdenes ad hæc diatolarion. Præterea pastillus dia halicabu & dia rodon ad ani inflammationes genitaliumq; laudata sunt remedia.

Ad excrescentias ani.

EXcrescentijs si inflammatio adest, ut edum generatim iam commemoratas, & propriè hoc pastillo, cerussæ quadrans, pompholygis uncia, argenti spumæ sextans, mastichæ scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si careant inflammatione, cupressi galbulorum combustorum cinis loco dolenti, uino prius absterfo inspargitur, uel cucurbitæ aridæ corticis combustæ, uel palmularum nucleorum cinis similiter, uel testarū ouorum, & fœniculi cinis, uel succi mali punici foliorum, æqualis modus. Vino albo deterfa pars diebus septem eluitur. callosa aurem tubercula calce & auripigmento cum aceto acri trito rectè etiam in sole perungis.

De hæmorrhoidibus.

ORis uenarum, quæ quod sanguinem fundere solita sint grecis *αιμορροειδεις* appellant, iustò largius inanitis, habitum in aquam subter cutem resolui contingit, & affectos, infeliciter contabescere: periculum uero est, etiam ne largum sanguinis profluvium accadat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur: unde laboriosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, unā purgationis gratia relinquere oportet. Quædam uero superius existunt, non apparentes, eoq; difficilem curationem recipiunt. Cæce autem nihil quidem excernunt, sed dolorem mouent acriorem, hæ itaq; succo cyclamini illito adaperiuntur. Contra eas uero quæ immodicè fundunt sanguinem, spinæ ægyptiæ, foliorum sambuci, artemisiæ, singulorum uncia quinque, sideritidis uncia quatuor, coquuntur in aquæ heminis octo ad dimidias, inde herbæ proiciuntur. aquæ uero miscetur pulvis hic cretæ sutoriæ, aluminis rotundi, singulorum

lorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, sereos tantundem. ubi puluerem decocto solueris, septies quotidie irrorato. in secundo die pari modo aliâ confectionem mensura æqualem superfundito: sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die ac compunges: si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit, pulueris uero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, puluere attingito, ut exactè adurantur panis ob inflammationem instar cataplasmati inducetur. ALIVD. Panis purus in garum primæ notæ tinctus, ustusq; in nouo fictili, & pertritum applicatur, ano prius uino abluta. Facit etiam ad excrescētias. ALIVD. Sereos drachmæ duæ, chalcitidis drachma, misyos tantundem, atramenti sutorij quod chalcantum dicitur drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ nouem, æris combusti drachma, cretæ sutoriæ drachma sicco utitor. Cibi erunt ijs qui supramodum inaniuntur, pauci sanguinis efficaces, & minimè recrementitij, quiq; siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca lotus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt intybus, cichoreū, portulaca: inter uina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem obcæcatis, his contrarius uictus proderit: potissimum uero loliginum, sepiarum, multipedarum, torpedinis, selachiorumq; esus probè conueniet. hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

Ad procidentem anum.

ERucæ fructus, gallarum cerussæ, acaciæ, hypocistidis succi, piceæ corticis, thuris, myrrhæ mineæ, paria pondera. Sicca admoueto, ano uino prius austero deterfa. ALIVD. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum drachmæ octo, rosarū floris drachmæ quatuor, myrrhæ mineæ drachmæ duæ. Utitor sicut priore. ALIVD. Piceæ corticis, mannæ, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ, utitor quemadmodum præceptum est. itē urina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

De uteri affectibus & primum de mensium purgatione.

Cap. LX:

Mulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis uero ante tertiumdecimū, aut duodecimum,

decimum, plerisq; autem post quartumdecimum erumpunt. Tēpus cuiq; purgationi præsinitum nō est, ordinatumq; , multis ad duos trēsue dies , haud paucis usq; ad quintum profluit, aliis etiam ad usq; septimū : raro ad duodecimū purgatæ sunt. Porro desinunt menstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem usq; ad sexagesimum durant. Nonnullis à triginta quinque annis, præsertim obesis, menses cessare incipiunt morata igitur purgatione, lauandum est circa statum menstruale tempus, ac præsumetur potui, aut sesamū, aut capitatum porrum cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autem ex passo cretico erit, cuius hemina mensura pota ambulationibus menstrua dimoueantur, Cibus sit, lolligines, sepia, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis: quippe sanguinem propriè commouent.

De mensium suppressione.

SVpprimitur menstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunquam uero locis peculiari uitio confiantibus ex frigidityte insita, aut ictu, aut intemperie ab origine, seu acquisita malignitate magna uero parte ex abortu: uel principaliore quadam parte primario affecta, nempe iocinore, aut uentriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, longo morbo uitiata. At suppressio complures affectus, & longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorum affectum primarium purgatio circunciditur, aut moratur, ex usu maximè fuerit, id quod primario afficitur curare, inde uteri habere rationem. Notæ uero quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ. Cum uerò nihil illorum adfuerit, constat palam primario affectu uterum occupari. Itaq; si ætas non prohibet, aut habitus, aut aliud quippiam, uenā oportet incidere, idq; non ante statum mensium tempus: sed ubi iam præterierit, decem dies superadijciantur. Detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus libris & dimidia, neq; minus una, si quidem uenam diuiserimus. Sin autem non, hiera diacolocynthidos purgari debent, duarum drachmarum pondere, in sex mulsæ cyathis. Si febris adsit, hiera quidem uti non expedit, uerum sanguinem mittere in primis febriculæ diebus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt mulieres diebus pauculis: in sequentibus autē, exercendæ obambulationibus, inferiorum frictioibus, & balneo. Cibi congruunt distribui

diſtribui faciles, & liquidi, olera, dulcia omnia, piſces ſaxatiles, ex auibus teneriores, lactis potio, ex melle confectiones, μελιτρώματα uocant, uinum tenue, album, non adeo uetuſtum. carnes inidoneæ his ſunt, & legumina, præter ptisanam. Vbi ſtatum menſium tempus propinquum eſt, dantur ex marinis ſelachia, & malachia, ut dictum eſt, item oſtracoderma, hoc eſt teſtaceam cutem ſortita, capitata porra, cum ruta & pipere cocta, eorumque ius potui datur: infernæ partes uinculis, tribus quatuorue diebus conſtringuntur. Cum inſtat tempus purgationis, tollitur deligatura, myrrhæ obolus bibitur, aut fabæ inſtar, uel caſtorium ex paſſo, aut muſa, uel decoctum artemiſiæ, aut ſaluia poſt balneum ex paſſo, & abſynthii. Aſynthites autem uinum per totius curationis decurſum potatur. Vbi acceſſerit iam menſtruale tempus, ſi nihil, aut nulla mentione digitum fuerit excretum, ex talo ſanguis detrahendus eſt. Poſt ſeptimum, aut octauum diem, purgatione ex hiera utendum eſt, ſecundum quartum diem, dropax inferiori uentris regioni lumbis & feminibus applicetur, atque aquæ potu triduum uſa ſinapi cuni æqua panis macerati portione aduſque æquinoctium admoueat, deinde lauet, in ſecundo menſe ficus ſiccata in uicem panis miſceantur decocto ſœnugræci, maluæ, pulegij, rutæ, & artemiſiæ. In ſinum uero demitteretur, ſuſinum, aut amaracinum, peſſusque inſeratur ennepharmacus, aut libaninus. Eſt autem peſſus lana concerpta, & in rotundam, digiti humani formam redacta qua medicamenta cõtineantur. Hæc igitur curatio plerisque ad purgationem abunde fuit. ſin autem uehementioribus indiguerit medicamentis, hæc ſunt, iris illyrica cum uino pota, iunci anguloſi, ariq; radix, caſſia, iunci rotundi flos, & nardus, helenii radice decoctum, myrrhæ ad fabæ Græce magnitudinem cum paſſo ex dimidio muſæ cyathopotæ, atque dictamni decocti cyathi duo, item ammoniacum, & ſagapenum. Quæ minus ſtomachi uitiis ſunt opportuna, etiam opopanacis paululum in globulos redactum percocto melli intinctum, aſſument. Iam uerò conſueta nobis ſemina menſes mouere poſſunt, ſed minus: ſœniculum, cuminum, apium, daucum creticum, ſeſeli, amiſiſon, cicer, fructus cedri, ac omnia quæ urinam prouocant. Commode etiam ſinui muliebrium imponuntur myrrha, abſynthii, aut lupinorum decocto trita, aut rutæ ſucco leuigata, bdelliumque ſimiliter, ſtyrax, ſylueſtris

syluestris oleæ gummi, aut rutæ succi itidem, aut longa aristolochia, in collyrii formam concinnata. Per similitur etiam magni centaurei radix, aut ueratri, aut liquor scammoniae, & cucurbitæ syluestris medulla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & galbanum suffumigatum. Eadem uero & foetus solent educere.

De immoderata purgatione uteri & sanguinis profluvio. Cap. LXII.

Immodicę purgationes mulieribus oboriuntur, interim mensibus adactis confarctimq; ac concitatus erumpentibus, interim ob legitimum partum quę plerunq; etiam sponte sua cessant: Crebro autem abortus causa, uehementi laborant profluvio, ut subinde periculum accedat. Imprimis igitur extremi artus ab alis & inguinibus, uinculis excipiuntur. Posca non frigida potui datur, muliebria ex eadem fouentur, & iniiciuntur locis multæ lanæ, ex uino, oleo, uel rosaceo, uel melino, uel myrteo expressæ. Cibus dabitur chondrus lotus ex posca, uel oryza, uel alica: uino autem abstinebitur, & hydromalum austerum, aut omphacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhiberi debet. Balaustrum in posca propinari, uel hypocistidis, uel acaciæ succus, uel lycium, uel samius asper, uel succus immaturæ uuę siccus, uel rheon, uel lenticulæ ex Italico fictili combustæ cinis: aut sesamum editur in posca maceratū, quoad molle delicatumq; euaserit: insinuati uero pelli per naturalia, sanguinis fluorem sistunt, hypocistidis succus, aut acacię cum manna in aceto contritæ. Mirificę auxiliatur spongia in uino, aut liquida pice demersa, pessarii modo adhibita, uel combustę ipsius cinis cum aceto, uel posca eodem modo insinuatus. Similiter etiam suberis in Italico fictili concremati cinis. A foris autem imposita iuuant astringentia epithemata, & cataplasmata ex palmulis, & cotoneis: quę malicoria receperint, aut sageam glandem, aut rubi surculos, aut lentis folia, balaustrum, acaciam, hypocistidem, gallæ modicum, alumen. Maxime uero hoc, raurocolla madescit posca, quousque soluatur de inde in linteolum ualidum illinitur, lumbisque agglatiatur. Efficacia ad hoc sunt, & glutinantia emplastra, ueluti Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, & similia. Pessulis quoque ad sanguinis profluvium uti oportet. Gallæ interius leuigatū, & thuris

& thuris lachryma aqua diluta naturalibus inseritur, uel cytini, uel mala punica dulcia similiter, uel polygonū tritum. Composito autem, aluminis scissi, gallarum interioris, acaciæ succi, mannæ, singulorum uncia quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida leuigantur succo plantaginis, miscenturq; . Cū usus exigit, excipiuntur in pessum ex lana, & in rosaceum intinguntur, insinuantq; naturalibus. Iam cucurbitulæ leues magnæ frequenter subrer māmillas affixæ abundè retrahunt. Infessus autem profluuiο sanguinis laborantibus cōuenit, ex marino iunco, Græci uocant oxyechœnum, capitibus myrti, rosis, rhamni folijs, rutæ surculis, æquali pondere in aqua coctis insidere iubeto. **ALIVD.** Mali punici dulcis radicis corticis, myrti, cupressi corticis singulorū tres partes, gallæ pars una, aquæ quod satis est. Infundito autem per uterinum clysterem succū plantaginis, aut sereos, aut polygoni, aut solani, aut perdicij herbæ, aut psyllij, aut hypocistidis, aut acaciæ, eaq; lana aut digito, aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificium imponatur. Insuper pastillus Andronis per uterinū clysterem infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut uino alstringente efficax est remedium.

*De fluore muliebri.**Cap. LXIII.*

Vlūæ fluor, totius corporis quod expurgatur est distillatio: Talē uerò speciem id quod euacuatur, repræsentat, qualem etiam humor in corpore superans obtinet. aliud rubrū, ueluti sanguinis sanies, aliud candidum, pituitæ soboles est, pallidum aliud, quod bilem testatur, aliud uero aquosum, at si sanguis purus, sicut in uenarum sectione, efferatur, at tendendū est accuratè, ne quædam in uulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci continuè madent humoribus, colore uariātibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumq; fastidit, in obambulatione difficulter, spirat, oculos habet prætumidos, nunc cū dolore, nūc citra illū, aut cū exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Toti igitur corpori auxiliātur quæ citra manifestū calorē exiccant, cū affectus sit humidus, frictio totius corporis, & unctio ex melle abunde cocto, medicamina dantur urinam cientia, utpote aqua, cui asarum & apium sit incoctum: uacuatur etiā totum corpus per aluum: præterea portulaca commanducata, succusque

cusque ipsius potus praesidio est. Item balaustium, rubi fructus & flos, quercus liber qui cortici ligni subiacet, & tunica glandis putamini subiecta. Equisetum maxime sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut uino. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus, cum uino sumptus, samius aster, lemnia sphragis, coagulum leporis, aut haedi, aut ouis, aut uituli, aut cerui, uinacea trita, myrti, uua immatura sicca, piceae correx. & quae ad uuluum sanguinis profluuio laborantem dicta sunt, non admodum efficacia. Vbi uero cum labore fertur, per siphonem uteri, clysteremve alicui succum, aut tragi, aut oryzae demittes cum aliquo medicamentorum quae dolorem sopiunt, αὐόδυνα Graeci uocant: & in accessionibus quidem lenire oportet: cum autem remittit, circuitum enim nonnunquam habet, habitum corporis mutare noxium humorem euocando expedit uariis gestationibus, obambulationibus, uociferatu, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes superpositas uinculorum iniectionibus, frictionibus, psilothris, smegmatis, sinapismis, uomitibus à radícula uictus ratione uiribus recolligendis dicata, balneis, uino, uario ciborum genere.

De inflammatione uteri, & declinatione. Cap. LXIIII.

Inflammatiō uuluae, pluribus ex causis oboritur nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione: adeoque ex abortu, & ob sinistram partus additionem. Comes inflammationis uuluae est febris acuta, dolor capitis, tēdinis basis oculorū, brachialis, digitorū, & colli deorsum retractio, declinatio ad opposita stomachi ex consortio dolor, oris uulue conniuentia, pulsus exigui, crebriq;. Et si languida fuerit inflammatio, haud ualido ipsius uteri dolore torquentur. Sin uehemens, & ipse torus pulsatile cruciatum percipit, undiquaq; inflammatione obsessus. si pars ipsius illā sentit, in ea magis dolor intenditur. nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus longanone cōpresso, retinetur. si priora dolor inferiorem ab umbelico uentris regionem occupat, & stillicidiū, aut urinæ difficultas uesica pressa excitatur, lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur. & crura grauantur. Extrema ad fundum uteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum uero os uuluae inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoque

toque immisso os occurrit durum rigidumque. Itaque in curatione primum usui uenit fons ex uino & oleo, uel uino & oleo rosaceo super infernam uentris regionem & lumbos per hapsum ex lana puriore eitra deligaturam adhibitus. Cibo astinetur triduum, secundum quod sanguis ex cubito mittendus est, si nihil prohibet. alendæ sunt chondro ex aqua, mulsæ, uel panes, uel ouo scorbili, uno die interposito. Post quintum, cataplasma superaccommodatur, polline farinaceo, semine lini, fœnugræco, ex mulsæ, in qua papauerum capita decocta, reiciantur, & oleo. at si inflammatio erysipelatis naturam sortita excandescat, meliloto in passo cocto tritoque; ouorum tostorum lutea adiecito cum rosaceo, uel melino, uel crocino, & cataplasmatibus modo adhibeto aut palmulas uino temperato feruefactas, cum polentarum polline, & quoddam ex enumeratis unguentis leuigato, applicatoque; in morbi declaratione ceratum nardinum, aut cyprinum iniiciendum est. Per totum uero morbi decursum, etiam in fessis utiles sunt ex decocto fœnugræci uel seminis lini, maluæ, artemisæ, & oleo. In iis autem quæ non sustinent calorem, ex aqua calida rosaceo super fuso, pessos autem in usionesque; adhibere conuenit ex œsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino unguento susino, & cera chyrrenica. in quibus autem calorem ferunt, etiam pessus qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsis conueniet, item enneapharmacus, rursus in quibus non tolerat, ex ouo rosaceo, adipe anserino, uel gallinaceo adaptabitur. Porro ad inflammationes magis furibundas emplastro dia chylon quod est ex herbarum succis in uase fictili cum rosaceo liquefacto. miscetur succus plantaginis, uel fereos, uel cichorii, uel intybi. Aut hoc utere, adipis anserini, uel suilli recentis drach. quatuor cerati rosacei, uel susini sextantes, ouorum tostorum luteorum unc. croci drach. myrrhæ tribus obolis, opii obolis duobus, uel loco opii, papauerum capitum decocto, si dolor multus ex cruciat, lachrymæ papaueris instar lenticulæ cum lacte muliebri, & succo fœnugræci in pello subiciendum exhibeto. At si inflammatio cum duritia infestat, tetrapharmacum rosaceo solutum, applicatur, uel iufunditur. Si a naturali sede uulua declinauerit, per accessiones simile inflammationibus curationem recipiet. ubi uero remittitur dolor, & declinat, leuioribus utendum. Quod si malum inuerateuerit, noxia ex alto euocantibus utendum, quæ metascritica dicunt. Exrrinsecus autem duritiæ oborta, malagmatis pugnandum,

PAULI AEGIN.

q nempe

nempe dia melilotu, hoc est ex sertula campana confecto, item Mnafæi, cefi, melinæ Serapionis, aut pyrinæ, uictus aut per initia tenuis adhibetur. Vbi paulū declinauerit malū, ægrotantes ad balneū ducentur, uarioq; magis cibo & pleniore nurriendi.

De uulue abscessu.

Cap. LXV.

I Nflammatione in abscessum transeunte, dictæ quidem notæ intēsiōres erunt. Præterea uero inordinatæ febriū cum horrore accessiones obueniunt primis quidem temporibus intensæ, cum doloribus ad ultimum, ubi suppurauerit, aliquantulum remittūt. Postquā uero erumpit uomica, dolores aciores subinde uisi sunt ceu lancinantes & punctus modo incidere, febriculæ uehementius infestant. Atq; urina nonnunquā retinetur, nonnunquā stercus, impedimento ab affecta uteri parte facto. Alias tumor in pube eminet, & ueluti exundationis sensus cum abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiam instrumeto ad perspiciendum iniecto, aut digitorū tactu deprehenditur præterquā quod dolores ob neruosam oris uulue membranam aciores urgeant, sicut infundo sinuq; minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor non occurrit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio itaq; celerius ad iuuāda est cataplasmatibus ex fœnugræco, semine lini farina hordeacea, ut frumentacea, cui ficus coctæ adiiciantur interim & stercus columbinum. In fœssibus etiam ad inflammationem aptis frequentius utendum. Item pessulis ex terebinthina, myrrha, œsype, butyro conuenit. Abscessus autē rupto, si ad uescicam pus euaserit, lactis & cucumeris seminis potu utendum est, si ad longanem ruptus sit, lenticulæ & malicorii decoctum indetur aluo. At si in sinum pudēdi eruperit, mundum quidē a pure, rosaceum infundetur, aut cādidum oleum, aut tetrapharmacum regale, aut butyrum recens. Si autem offeratur sanies tenuis, fœtida, ceu ab ulceribus depascētibus, magis astringēs erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si uero humoribus etiam excretis, inflammatio diuexet, persistere iu cataplasmatibus, & in fœssibus, ratio est. Cæterum si in uulue ostiolo abscessus sit obortus, neque rumpatur, partibus, quæ puri incumbunt, extenuatis, ad puris excretionem, quæ manu administratur

tur, diuertere consiliū est, ut in chirurgica pertractabimus.

De uteri exulceratione.

Cap. LXVI.

EXulceratur subinde unlua ex infelici partu, aut foetus extractione, aut eius corruptela, uel ex medicamentis acribus uel fluore, uel abscessibus diruptis, si igitur prompta in conspectum uenerit exulceratio, instrumento locis inspiciendis idoneo deprehenditur. sin alte defederit, ex iis quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur, ex inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut fœculentus cū magno dolore, ex sordido autem copiosior, & sanes cum minore cruciatu, depascente, fœtidus niger cum doloribus uehementioribus, aliisq; inflammationis signis, iam quæ laxant medicamina irritant, contraria leuant. Cum purum ulcus est, humor paucus, equalis, odoris expers, crassus candidus, cum sentiendi facilitate habetur. Si inflammationem experitur ulcus, iis quæ ad illam scripta sunt, utendum est. Sordidum, ptisanæ cremore cum melle illuendum est, aut terra pharmacum iniiciendum cum susino, uel mulsā, in qua fœnugræcum sit decoctum, aut malua, aut furfures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quo magis expurgetur, etiam marrubium, aut eruum, uel melli adiuncta erui farina uel iris, uel alumen rotundum, uel aliquid simile inspergatur. Hæc ipsa etiam extrinsecus, ex mulsā macerata, instar cataplasmatibus illinuntur. Peculiariter prodest hoc medicamentum. Crocus primæ notæ leuigatur cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino inungitur linteolo, uerum quod infra ponitur, isto quoque efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde incoquatur, donec intrabescant, postea feruntur una cum rosæ foliorum drachmis quinque, croci drachmis tribus, iure capitū papaueris admisto, inde ceræ cum rosaceo liquatæ drachmæ duæ ipsis superfunduntur, ac in pessulo subiiciuntur rosaceo perunctis. Salutare est etiam medicamen ex ouis, croco, rosaceo, apipe anserino, cerui medulla præparatum. Item Aegyptia citra æruginem mirifice ad exulcerationes conducit † ubi autem pascendo serpunt ulcera cum inflammatione quidem obducitur panis tepida maceratus, ex hydromelite, oleo, althæa fœ-

q 2 nigræco,

nugræco, palmulis pinguibus. Iniicitur autem plantaginis succus, solani, polygoni, & sereos primum per se, mox cum uino austero aut aceto. At citra inflammationem, si urgeat depassio ualentiora iniicientur, ueluti decoctum malicorii, rosarum, summitatis oleæ, cupressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentisci, rhammi, rhus, coriarii ex uino astringente, postea uero aluminis, acaciæ, lycii, hypocistidis, ex eisdem uero decoctis parabitur etiam infusus. Si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen ex charta cum posca primum demittere, deinde cum aceto, aut Antheram, aut chalcitidem, aut atramentum sutorium, ex eisdem liquoribus, & quæ dysentericis congruunt, cibus dandus boni succi, modicus. Purgato ulcere, ægrotans balneorum ciborumque uarietate sollicitari, uinoque refici debet, quo caro statim procreetur. Pelli loco subiicitur medicamentum diamoron, hoc est ex moris, remissum cadmia, uel ladano uel plumbagine. A foris autem emplastrum, quod cicatrici ducendæ est, abdomini coxisque imponitur. Quæ admodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducetur.

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. νομῆς δὲ οὐσῆς συν φλεμονῇ μὲν κατὰ πλάττον ἄρτω καθαρῶ πεφυραμένω δὲ ὑδρομέγιστος, ubi autem est nomē cum inflammatione inducere cataplasma oportet ex pane puro subacto ex hydromelite.

De cancro

Cap. LXVII.

Cancrorum uulvæ alii cum exulceratione, alii citra ulcus inuadunt. ubi igitur exulceratio non est, tumor in uulvæ ostiolo reperitur durus, inequalis, prætumidus, colore fæculentus, subruber, interim subliuidus, ac uehemens dolor exercet inguina, abdomen, imum uentrem, & lumbos ad manus contactum, uariamque medicinam excandescunt. Eyuicerato autem cancro, præter dolores, durities, tumoremque, ulcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, sordida, labris prætumidis, albicantia, turpem humorum colluuiem concretam habentia. Quæ uero puta dicentur, fæculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparent, sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut ruffa, grauiter olens. Interdum uero sanguis defertur, aliaque notæ in uulua inflammata expolitæ. Itaque affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum

modum etiam Hippocrates pronuntiauit, lenire tamen est in fessibus ex foenugræco, malua, ac cataplasmatibus similibus. Insigniter autem leniunt, solanturque in accessionibus malua, aut althæa in mulsâ intabescens, & rosacei paululo leuigata, & applicata. Ad hæc cataplasma ex ficis siccatis melilotis, ruta, thure, buniade herba diligenter cum oleo contusa. Item quod constat palmulis in passo coctis, cui adiecta sint ouorum lutea, polentaque, uel ex papauere cum coriandro, aut polygonio, aut feri. Hæc in doloribus usui sunt, Postea ceratum iniiciatur ex rosaceo, aut mirteo, aut œnanthino, aut melino, cum palmulis in passo coctis, proprie uero conuenit præparatum ex amurca in uase æneo collecta, quæ torrefacta leuigatur, & rosaceo, cerato, adusque emplastri spissitudinem excipitur, hæc quidem extrinsecus conferunt, intus autem oleum quoque lenit, ubi fuerint exulcerati, item lac muliebre infusum. Pars modo succus plantaginis tepidus. Sin cruentum sit, succus polygoni cum thuris modico dolorem sopit. Ad hæc pessuli ex croco, muliebri lacte, lachryma papaueris, & œsypo. Omnibus autem efficacius est etiam ad sedis affectus medicamentum quod recipit, Argenti spumæ Italicæ lotæ selibram, thuris masculi, œsypi, adipis suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrrenicæ, singulorum sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex fereos succo trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui facile in corporis membra queat distribui, bonique succi, pinum paucissimum, aquosum, acrium esus, & alimenti copia uitanda est, ut quibus cibi prompte corrumpantur.

*De scirrho & duritie.**Cap. LXVIII.*

Scirrhum contrahit uulua, alias repente, ut nulla causa euidens præcefferit. plerunque uero eundem inflammatio mouet, quæ nec soluta nec in abscessum mutata fuerit. At scirrhorum, genere comprehenditur etiam durities, quam

Græci uocant, circa uulvæ ceruicem potissimum obueniens, tumorem quidem pari modo repræsentans, sed minus actui renitentem & cum mediocri dolore. Comitatur autem hos quoque uteri in opposita declinatio † & tumor qui ratione depressionis ut uehementer remittitur, cum grauitate, motuque difficili, non crurum modo, sed totius etiam corporis, atque obeundis actionibus pigritia. sequitur non probe curatas,

malus corporis habitus, aquam inter cutem representans. Per initia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis, assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis, œsypo, nitro, absinthio, & cucurbitulas cute ferramento incisa admouere consilium est. Malagmata uero hæc, Polyarchion, & diaspermation hoc est ex seminibus confectum, & quod baccis lauri constat. Inseffus ex caricarum decocto, artemisiæ, pulegij, althææ, pessulos ex terebinthina, galbano, myrrha, iride, œsypo, dropace, aquas naturales sulfureas, bituminosasq; usurpare commodum fuerit, si uires constant, etiam helleborismus conuenit.

†Vetus liber. ὁ γὰρ πρὸς λόγον τοῦ πλῆσεως ἰσχυρῶς ἀντίτυπος, idest, tumor ratione plenitudinis uehementer resistens.

Pessulus emolliens.

Ceræ ponticæ nardini unguenti, singulorum quadrans, irini, gleucini, cyprini singulorū uncia duæ, adipis ursini asferiniq; botyri, œsypi, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum uncia. A L I V D. Polii drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor cum uino Mendefio tritum irinoque imbutum subiicitur. A L I V D. Ceræ thyrrenicæ, adipis uitulini, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei ueteris pares modos. Medicamentū noxia euocans quod Græci dicunt meta syncreticon, & ad inflationes, uux passæ candidæ sine asinis, uncia tres, rutæ uiridis foliorum uncia duæ, aquæ marinæ fescuncia, cymini drachmæ quatuor, mellis quod sufficit. Inunctum uero pessulū cyprino oleo immergito, & suabiicito. Præterea Chrysis ab auro sic dictus pessulus Libaniusq; , & Enneapharmacus affectui sunt utiles uerum Titianus his magis accommodatur.

De mola.

Cap. LXIX.

Mola quoque induratus est tumor, interim in uulua ostiolo, interim etiam per totam ipsam prominet, tactu lapidis duriciem refert, ita ut ea & quæ superiacent deorsum trahantur, corpus emacietur, color prauus appareat cibi fastidium urgeat, menses supprimantur Mamillæ inturgescant, ut in quibusdam per initia, de foetu concepto sit suspicio. Insecuto autem tempore discernuntur, nonnullæ uero aquæ inter cutem præbent opinionē, sed hoc intercedit discriminis

minis, quod tumor durus sit, nec sonus fiat cum digiti iniiciuntur, quemadmodum in morbo hydropico. Cum autem intenditur, in aquam subter cutem reuerta degenerat. Nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte affectus redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modice frigida cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant clariores quietosque. Nam motum quamlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiasque iis remediis quæ in scirrhis & duritiis, uulvæ dicta sunt, persanabimus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt sanguinisque eruptionem, ut etiam fluorem muliebrem curabimus. Ceterum sunt qui molam carnem asserant informem, ipsis uulvæ tunicis adhærescentem, foetus modo in lucem educti. Atque hæc morbi species uictus ratione laxante tractabitur, quo citius excutiat.

*De inflatione uulvæ.**Cap. LXX.*

INflatur uulva ex frigore, uel corruptione foetus, uel ex ægro partu ostiolo conniiente, uel sanguine in grumum intus coacto. Alias spiritibus in concauo ipsius spatio conceptis, alias in raritatibus uulvæ corporis, quas tumor pubis & imi uentris comitatur cum duricie & dolore punctorio, qui ad septum transversum usque & stomachum inguinaque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus inedia, fomentaque ex oleo rutaceo adhibentur, infusus ex rutæ pulegii, artemisiæ, cassiæ decocto, similibusque, cataplasmata ex semine apii, cumini, anisi, ameos, farina lolii. Ad hæc cucurbitulæ, tum leues, tum cute incisa affixæ. At si diutius uitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est, dropaces sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem si contingat, auferet, leniter ipsum dissipans, rursusque admouebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absynthio. At epithemata molentia erunt, Polyarchion, dia spermaton quod est ex seminibus, & diadaphnidon, ex baccis lauri præparatum. Præterea pelli ex ruta, melle, & nitro. Maxime uero hic conducet,

q 4 ficuum

ficuum pinguium contusarū drachma, cumini drachmæ duæ, aphronitri drachma ac acrimoniæ causa, in lac prius immergatur. Iam emollientes pessuli sunt huic uitio accommodati.

De uulvæ strangulatu

Cap. LX XI.

STrangulatus uulvæ ad superiora recursus est, quæ principalissimas partes in doloris consortium perducit, utpote arterias quas uocant carotidas, cor, cerebrique membranas. Comitatur affectus, cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia, crutum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Cum iam instat strangulatus, grauis sopos premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprehenduntur, impediunturque, uox obmutescit, crura contrahuntur. deinde maxilla rubere incipiunt, faciesque repletur. Cum remittet, humiditas quædam ad tactum ex locis mulieribus præcedit, uentrisque strepitus, ac aliquod ex interaneis progreditur, ipsaque uulua paulatim laxatur, atque sic mens ipsa, & sensus redit. Cæterum morbus iuxta circuitum mouetur, sicuti comitialis, idque nimirum uulua repleta, aut seminali, aut alia materia, qua intus cõputruerit, ac multæ rursus a morbo sese recolligunt, nonnullæ uero in ipsis accessionibus perierunt subito, quibus pulsus quidem crebriores, & inordinate intercidunt, deinde etiam in totum abolentur. Modicus uero humor superficiem irrorat, respiratio primum languida est, mox in totum abscinditur. Porro uitium hoc hyeme & per autumnum magis infestat iuuenulas ad uenerem procliuēs, steriles & potissimum si ex medicina sumpta fuerint infœcundæ, item alias perfrictiones expertas. In accessionibus igitur summa de ligare, conuenit, crura tota, corpusque totum perfricare, ut animo destitutæ sese recipiant, item quæ foedioris sunt odoris, naribus oportet ad mouere. Exempli gratia linamentum ex lucerna extinctam, castorium, picem liquidam, cedriam, lanas & lacinia combustas. Quidam uero & matulam naribus admo-uerunt cum urina ueteri, uel deiectione cucurbitulas adglutinare uincit inguinibus & imo uentri cum multa flamma, & leues & cute incisa. Quod si longius accessio se produxerit, etiã quæ flatibus educendis sunt, proficiunt, ut quæ colica dicuntur, ano subiecta nempe cuminum, nitrum tum melle. Item
stercus

stercus clystere subducere profuerit, ne illorum appositu sedes prematur. In uulnam uero unguenta odoratissima infusa, ipsam solent detrahere, sicut amaracinum, malabathrinum, ac sinapi, partim naribus offeratur, partim applicetur pedibus. Deinde in clamabit aliquis ipsas uoce asperiuscula, excitabitque, & ea admouebit, quæ per sternutamenta euocant, ex castorio, stuthio, & pipere. ubi accessio conquirit, uomitum cogere, cibum nullum aut paucum præbere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthidos dabitur, post triduum cucurbitulæ defiguntur lumbis & illis. Mox castorei potione utemur, nunc artemisiæ decocto, nunc ex mulsæ, in quibusdam enim hoc uel solum ad integram morbi curationem abunde fuit. In sessus porro & pessus molientes his adiunguntur. Atque hæc ad accessiones proficiunt, uerum ut totum corpus reficias, a sanguinis dimissione auspicatus, ad purgationem ex hiera transgrederis. Inde picram ex aloe factam exhibes drachmæ pondere cum tribus aquæ mulsæ cyathis, diebus continuatis, uel interpositis mensura duarum drachmarum, cum senis aquæ mulsæ cyathis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & sinapismos utiliter applicas, nec non acopa ex euphorbio. Postea exercitiis uti, frictione & uocis exercitio prodest, denique & aquis naturalibus.

*De uulnæ procidentia.**Cap. LXXII.*

Vulua procidit raro quidem, sed multis occasionibus, uel enim ab alto delapsa, & in coxas firmata, membranis, quæ interaneum id continent, ruptis, aut extractione secundarum simul ipsam extrahentium, ut quæ eidem adhærescant quemadmodum in partu difficili, uel indiligentius imperitusque extracto foetu, uel ex uulnere, uel aliqua animi perturbatione, scilicet nunciato filiorum interitu, aut hostium insultu, aut periculosa nauigatione, aut eiusmodi quædam causa. Ut cum tota corporis mole soluta, uulua simul sit deuoluta uel ob resolutionem, imbecillitatemque particularum, ut in declinantibus ætate potissimum accidit. Procidit autem iuxta os ipsius. Quidam uero & totam uulnam prolabi memoriæ produnt, quod a uero longe abest. Qua enim ratione sursum redacta queat affirmari? Conuenit igitur foecibus clystere prius euacuatis, urinæque excreta, quo uulua urdi-
quaque

quaque sit libera, laborantem figurare supinam, ut coxas habeat sublimiores, poplitesque flexos cruribus diuaticatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinu muliebri proportionem, tenuique linteo circū dare, & in succum acaciae, uel hypocistidis uino dilutum demergere, tum uuluae inferre, & citra uiolentiam totum quod procidit sursum agere, quoad tota moles in sinu factus subsederit. inferna ab umbilico regio spongia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisque inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulae agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico & utrisque aliis, naribus odorata admovebuntur olfactanda. Tercio die lana sinui iniecta, mulier infideat in uino nigro austero modice tepido, uel in decocto myrti lentisci & malicorii. His probe peractis, lana ingesta tollitur. Altera inuicem prioris eodem humecta medicamento inseritur. Cataplasmata a foris imo uentri superiniunguntur ex palmulis, polenta, uel lenticula & malicorio cum oxymelite, ac tribus diebus interpositis rursus haec fient, quoad perfecte curationem absolueris. At si processu temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius metu pericula. Etenim uulua uniuersum ablata ubi computruerit, mulierem superuixisse commemorant.

De muliebrium locorum clausura, quam phimon appellant. Cap. LXXIII.

LOci muliebres circa ipsorum os clauduntur, uel ex praecedente exulceratione, uel in schirrum durata inflammatione. Curabuntur infessibus qui emolliant, ex hydreleo & fenugraeci decocto, consimilibusque cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis uaporibusque iis qui ex aromatibus confiunt utendum erit. Iam uero soluit etiam hoc uitii cum nihil aliud sit quam uuluae ostioli strictio, pessulus ex aescylo, nitro, resina, & terebinthina.

Vt sterilis mulier concipiat. Cap. LXXIII.

Communiter itaque ambobus congruit, & uiro & mulieri uniuersum corpus conseruare probe temperatum laboris, cibi, balnei & reliquorum omnium mediocritate,

tate, & quod inter ea maximum est, curare ne habitu sint obefiore. Neque enim pingues liberis procreandis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuosē contingere haud possint commode, tum quod momentū seminis emittant. Neq; tamen nimis extenuati, liberis operā dare feliciter queunt, lauabunt autem ipsos omnia calefacientia & leniter infantia, uinum itaque calidum modice sumptū. Et ex oleribus, eruca, hominū, erysimum & cōsimilia, ruta uero & calamintha omnino uitanda sunt. At si humorum quodam uitio foemina non concipiat, hos expurgare, aut proba uictus ratione emēdare expedit. Proprie uero mulieribus conueniet, curam locorū genitaliū quā fieri potest maximam habere, & menses sine ullo impedimento emanare. Cum igitur propinqua est purgatio, cibi potusq; quam maxime licet, mediocritatem, curæ habebunt, & ex iis quæ purgationi irritandæ sunt, aliquid assument, cuiusmodi sunt odorata olera & acria, utpote scandix, erithmon, fœniculum, apiū, smyrniū. Porro uulue intemperiem corrigere oportet, frigidiores itaq; notat menstruorum retentio, uictus frigidior, & crassi succi, stupidum quid in uentris parte infera lumbris, & cruribus oboriens. Quæ uero penitus refrixerunt, ne uerem quidē appetunt. Quare conuenit cū aliis remediis, tum fomentis omnibus & iis quæ constat sufficere, calorē reuocare. Nec abs re fuerit, castoreum bibere, & ex seminibus odoratis, cuminum, anisum pulegij comam iuniperi fructum, pipere singulis adiectio, at fomenta ipsarum uuluarū, partim uapores erunt qui inferius per sellam assumentur, partim a qua calida ad collutionē iniecta, in qua decocta sit saluia, artemisia, ruta, iuncus odoratus angulosus, pulegiū, acorum, seminaq; odorifera, hæc singulatim etiā inferiori uentris regioni ab umbilico applicantur. Præsidio est, & polyarchi epithema. Item inferioris uentris coxarumq; fricationes nihilominus conducunt. Insuper in pessis subiiciuntur ex myrrha, ruta, galbano & castoreo, ubi prius aqua mulsa, aut marina uulua foueris. proficit et ad hæc pessulus gone appellatus. Calidiores locos fateor corpus totū calidi⁹, menses pauci & laboriosi, genitaliaq; mulieris exulcerantes, corrigunt modice humectis & frigidis, cuiusmodi sunt olera quæ lactuca, maluē, blitū, cucurbita, cucumis, pepō, triplex, portulaca, aliiq; cibi cōsimiles, uesicæ abdomini & lūbis frigida applicantur cataplasmata, succiq; illinuntur. At humiditatis uitio fecunditatem

foecunditatē frustrari indicat in coitu, uulua humescēs, tenuius & copiosum menstruum. His uictus utilis est siccior, labores, superiorū perfricationes, uomitus, cibi sicci & mediocres. Pro fuerit & uuluam acerbis medicaminibus cōtinere, quale est lentisci decoctū, myrtorū rosarū, rhus, item mali granati floris, rubi ramusculorū teneriorū, & gallæ. Sicciorē uero uterū contrariis curare oportet, balineis dico, inunctione, & alimēto humido, olerosoq; mediocri uino & nō nimis ueteri. Quod si a cras floribus succi cōcipere impediatur, siquidē rodens aliqui fuerit mulierē probe purgare cōuenit medicamēto quod cūlibet humori propriū est, maxime autem picra ex aloe, mox sero lactis aluum ducere, & uictū probiorē deligere. Pituitosos autem humores laboribus uacuare, sudoribus, & uomitu, uel per inferiora. Cæterū ex medicamētis epithymū quoq; euphorbiū, piper, dauci semen, petroselinī semen, omnia cōtrita drachmarū duarum pondere potui recte dantur. Hoc & uentrē probe ducit, ac uuluā calefacit, quemadmodū sæpe iam menses eruperunt etiā iis quæ purgationē nō sunt expertæ, Postquā uero uterū emendatum esse cōstiterit, mensuris bene respondentibus, tunc uenus est inennda, purgatione desinente. Iam uero qm̄ spiritus similiter in uulua inclusi cōceptionē impediūt, notas ipsorum ex capite de uulua inflatione sumemus. Medemur aut parciore primū uictus, mox cumīnū, anethū, apii semen, rutæ, anisi & pleraq; aromata præstamus, partim potāda subiiciēda. Conniuentes locos aperiemus iniectis clysteriis odoriferis, fomentisq; ex malua, semine lini, & fœnugræco, & oleo. Nonnunquā etiam melle, ualidioribusq; artemisia, cunila, calamintha, pullegio, & anthemide. Præter hæc cōuenit uti terebinthina, nitro, cucumere agresti, elaterio, casia, picis sero. quibus autē os hiat, uictus, fomenta, medicamina sicciora astringentiaq; grana mali pouici, leotiscus, rubi radices, myrta, & quæ humidiori uulue congrua sunt adaptantur. Peruersiones autem fomentis instaurare ac dirigere oportet, item iis quæ molliunt, inferis. uenus aut a tergo exercita, ad concipiendū uidetur cōducere.

De uulua scissuris, condylomatis, & hæmorrhoidibus. Cap. LXXV.

IN uulua ostio rimæ, quas Græci rhagadas uocāt, ex enixu uiolento fiunt. Primum sane latent cū recentes adhuc ex partu

partu sunt dolores, postea uero paulatim percipiuntur, alias manus tactu alias in coitu. quoniam & propter affricationem cruorem reddunt, deprehenduntur autem sinu ad aperto. etenim dirruptiones scissuræque in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manuum operationem rodentiaque medicamina uitantes, simplicioribus infestibus, pessulisque utemur, prodest etiam tetrapharmacum dilutum. At si callum contaxerit, medicamento quod charta constat, ex rosaceo utendum. Sin autem ipsius uim non tulerint, iridem illic terebinthina exceptam imposito. ulceribus iam cicatrice obductis, conueniet ex cadmia præparatum, aut aliquod ex iis quæ sedi consecrata sunt, ueluti quod dia lythargyru, hoc est argenti spuma inscribitur. Cum uero scissuras ueteres in condylomata degenerare contigerit, similibus excindi, atque cicatricem duci debent. Cæterum hæmorrhoides uuluarum, & ceruicem infestant, quæ in partibus instrumento ad perspicendam uulua accommodato exploratis, deprehenduntur, inde quod excrescentia in accessionibus appareat dolorifica, cruenta & subrubra. At ubi remiserint, fluxio citatur citra dolorem subliuida & feculenta. In his igitur cum morbus remittit, uolsella modo fieri queat, præhensas amputare oportet, sin minus, certe medicamentis ipsas desringere, partim attingentes sicco malicorio cum galla aut huiusmodi aliquo, partim iis quæ in uulua sanguinem fundente exposita sunt utentes, † quæ etiam profluuiis, & hæmorrhoidibus conducent, eo potissimum distinctis, quod uulua continuo cruore manet per remissionem non solum in menstrualis purgationis tempore.

† In antiquo lib. hæc est scriptum, ἀκαὶ τὰς δι' ἀρρωστίας ἀπορροήσας, idest quæ ob imbecillitatem sanguinem fundentibus, &c.

De partu difficili.

Cap. LXXVI.

Difficilis partus accidit, aut uitio parietis, aut fœtus, aut secundarum aut foris aduenientium. parturientis quidem, si crassa obesaque sit, aut uulua tota exigua, aut dolorum imperita, aut timidiuscula, aut inflammationem in locis genitalibus aliave particula experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura imbecillis ut fœtum nequeat propellere, aut si ante tempus pariat. At fœtus uitio, si uel inuicitudine magnitudinis existat, uel exiguus & modice grauitatis, nel magni

gni capitis, uel monstrosus, ut, biceps, uel mortuus, uel uiuus quidem sed imbecillis, ut foras non possit procedere, uel si plures foetus, sint. Nam Herophilus, quinque adidisse mulierem, memoriae prodidit. Vel si figuram naturae contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura est foetui, prima quidem, qua manus femoribus porrectae sunt, & caput nusquam inclinans ad os uulvae recta dirigitur. Proxima huic, ubi in pedes conuersus est. Aliae omnes praeter has a natura abhorrent. Ob secundas, quod uelamentum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam ouus est propter subtilitatem abrumpatur, humore siquidem euacuato, infans praeter siccitatem egre deuoluitur. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod uulvam densauerit, aut calore immodico, qui vires dissoluerit, aut ex quodam fortuito accidente. Si igitur ex astrictione, aut ueluti foetu adfirmata pariendi oriatur difficultas, laxatione prius opitulandum, infundendo largiter oleum dulce, & calidum, cum decocto, foenugraeci, aut maluae, aut seminis lini, aut etiam oua quod leniendi facultate praedita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis cataplasmate obducere, quod semine lini constat, aut aqua mulsae, aut hydrelaeo, in febribusque similibus prodest. Insuper laxationes balineis moliri, nisi febris, aut alia quaedam occasio impedierit, mouereque parientem sella in aere calido mediocriter, Nonnulli etiam coquassationes ualidas, sternutamentisque ciendis idonea adhibuerunt. Timidae, mentis robur admouendum, imperita dolorum docebitur, ut ualidissime spiritum comprimat, & ad inguina depellat. Animo deficiens iis quae deliquio abigendo sunt, naribus ad motum recreabitur. Alleuiata mediocriter, cibo modico refocillabitur. Obesam mulierem in lectulo resupinam figurare oportet, ut ad femina genua succlinet, inflectatque, quo uulua ad abdomen tendens, e directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pinguitudine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atque si morbus aliquis particulas male habeat, etiam huic prospicere. Ad haec stercus detentum molli clystere emoliri, & secundas clausas diuidere, aut digitis, aut feramento quod πολυκόπαν uocant, in ipsis occultato sinistra manu praecedere, ac humorem quandam oleosum in uuluae spatium interius clysterio indere. Verum ubi foetus praeter naturam figuratus fuerit, naturalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim

tim in rectum agendo Et si quidem manum pedemve præmi-
fer it, non attrahere membro prehensum oportet magis enim
affirmatur, uel luxatur, uel etiam abrumpitur, uerū digitis hu-
mero infantis, uel coxæ affixis rursus in conuenientem locum
id quod præmissum est, diducere. Porro si cū firma adhæsiōe,
rotius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab
utero sublimē detrudere cōsiliū est. deinde præhēsū rur-
sus ad os dirigere. Postremo si plures uno infantes deferantur
iterum a superiore, infernaq; parte referes. sic ut omnia sensim
& citra contusionem fiant, oleo locis perunctis. Tempus quo
in sellam collocabitur parturiens est, cum uulvæ os dehiscens
digito occurrit, & quod præruptum est, procumbit. Verū si non
procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extra-
ctionē quā Græci ἐμβρυοεκθίσις appellant ueniendum est.

*De coxarum morbis**Cap. LXVII.*

COxarum dolor ab articulari morbo nihil differt nisi
quod ipsius causa, nempe crassus pituitosusque humor
in sola coxarum compage, articuloque concretus in-
sидeat. Dolor ipsis gibba in natibus regione inguinibusque ad
genua usque, in plurimis autem ad summum usque pedem
pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, facibus clystere
uacuatis, uena in cubito secanda, cum sanguinis detractione,
si autem uetustas uitium occupauerit, ex talo partis affectæ im-
minutionem sanguinis moliemur. In accessionibus fotu hoc
utendum, Cyprini cyathis octo, aceti cyathis quatuor, nitri
cyathis duobus, cachryos cyatho uno. Succidis lanis calida ad-
mouentur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum ama-
rorum cum oxymelite, aut farina lolii cum resina, cucumeris
syluestris radice, nitro, calamintha, cachry, baccis lauri. Iam
calamintha sola utiliter ex oxymelite, aut aqua mulsa admo-
uetur. Emplastro uero hoc quod leniendi facultatem obti-
net, utendum est. Cere drachmæ cētum, terebinthinæ drach-
mæ uiginti quinque, eruginis drachmæ sex, myrrhæ, galba-
ni, iridis, singulorum drachmæ sex, cedriæ drachmæ quin-
que. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum eruus im-
plet, aut castorij drachma cum opopanacis tribus obolis.
Porro radicis capparis cortex potui datus, & cataplasmatibus
admixtus est remedio. Cum autem dolor multus excruciat,
etiam

etiam medicamenta a dolore leniendo & ῥόδονα dicta locū habent, utpote quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat. Hoc autē enema inferetur, mellis cyathus unus & semis, olei tantundē, aquae cyathi dno, nitri drachma octo, terebinthinæ drachma quatuor. His calidis iniectis, anus debet foueri, ut longiori tempore ea retineantur, mucosa uacuat, nō nunquam & sanguinem, quando etiam magis opitulatur. At si malū perseueret, quod ratū est, iterū frequentius eo utendum est, in uicē aquae, centaurii decoctū admiscendo. Sanguinē uero trahit & thlipsis semen per inferiora inditū, succus elaterii, & medicamentū ex ipso factū, uel quod ipsius radicibus cōstat. Item oleum sicyoniū, salorū pisciū muria, & oliuarū colymba dum probe per anum ingeretur. Cucurbitulae coxendici multa cū flāma, cute prius incisa defigendae, interim quoq; hirundines. Quod si his malū non finitur, ad purgationē eundū est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis internae, pbe cōtrite drachma offertur in aquae mulsae cyathis duobus, aut paulo amplius aut minus, pro laborantis uirtute, & alui facilitate dabitur. In aqua uero mulsā ruta decoquatur. Puls etiam ex cucurbita syluestri confecta recte hos expurgat: In quibusdā uero & uomitus a radiculis citatus per initia profuit. Cū morbus se remiserit, dropaces ipsis applicantur, acopaq; ex euphorbio sunt utilia praesertim quod a uarietate uocatur poecilon, item balineae naturales his accommodae. Si desiderant, in aliis lauabūt balneis cōmemoratisq; ut edū est acopis, & cōpositis nitris, medicamento Asclepio, & eo qđ ex euphorbio, adarce, nigro ueratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quā staphda agriā uocā, simili pōdere confit. Scđm balineas inspergētur picis aride unc. tres, sulfuris ignē nō experti unc. duae, cuti adhuc calidae, quae charta etiā conteget. At si ne hāc quidē pfecerint, uel reliquis morbi remanētibus, cōgruū erit & sinapi cū caricis, uel ēt per se illitū. In totū uero hos restituit sanitati, iberidis herbę usūs quā lepidon quoq; alii agrio cardamō hoc est, syluestre nasturciū appellāt. Quae uerō apud nos fruticosa nascit similibus laurii foliis & multo amplioribus, respōdere, multa experimēta testāt, nō solū in coxatū, sed in aliis quoq; diuturnis affectibus, p̄ estatē uero lōge sūt efficaciora. Atq; si folia tūc nō pduxerit, corex ipsius radice contūdi cū adipe suillo, ut emplastri spēm repraesentet inde linteolo defiori illitū locis maxime dolētibus imponit, nepe toti

pe toti in natibus gibbo & femoribus, finesq; tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto liueat. Postea ipsum auferes, lotoq; ægrotanti ceratū impones, opopanacis drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duobus dissoluuntur, excipiunturque cerato cyprino: Quod si taliū adurentium usus abominetur, emplastris uti resectorijs oportet, è quorum numero hoc quoq; est, ceræ, resinæ pityine singulorum drachmæ duodecim, terebinthinæ, columbarum syluestrium stercoris, sæculæ uini combustæ recētis, singulorū drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atq; ex reficientibus est quod læna appellatur. utilia uerò sunt quæ ex lixiuio & nitro præparantur. Iam nonnulli ijs usi sunt potionibus quæ ad annum continuantur, in quorū grege habetur medicamentum diateffaron uocatū: chamædryos pondo, gentianę deunx, aristolochiæ rotundę deunx, rutæ seminis sicci sextarius. hæc tusa creataque dantur quotidie cochlearij mensura ieiuno & probè concoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annū, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hepta, id est ex septē confectum, & quod ad Proclum authorē refertur. Exercitia absoluuntur, in ambulatione, cōtinuis, flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis, conuenit. porrò si malum nulli ex commemoratis cedit, aliàs in suppurationem conuertitur, aliàs neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum luxatur. Quare cū uitiū longius se prorogat, articum tribus quatuorve locis urere oportet, ut in chirurgica dicetur, ac complusculi diebus ulcera adaperita, sine cicatrice seruare.

De podagra & articularijs morbis. Cap. LXXVIII.

Non sola particularum corporis imbecillitas, podagricos articulariosq; cruciatus excitat, quoniam accessiones, sine ullo temporis interuallo urgerent, quatenus infirmitas imbecillibus articulis semper incumbit. item ne humor quidē solus hos dolores creat, quandoquidē non solis uitium articulis insidet: sed utrunq; , & humor à natura alienus, & particularū imbecillitas morbū adfert articulare. quoties enim altrix particularū facultas, imbecillior, ciborum grauaturs copia, ex qua cruditates enascuntur, humor superans, in quodcunq; articulamentum, quod antea imbecillius euaserit, se confert, & artubus sese insinuans, colligantes neruos disten-

PAULI ÆGIN.

r dit,

dit, dolorem excitat: neq; enim nervos, per quos motus dispensatur arbitrarius, affectu primario inflammatio infestat, quoniam oporteret etiam medios internodiorum locos ipsam occupare, utpote tibiae medias aut fœmora aut cubitos, aut brachia. attamen afficiuntur iidem nervi lege consortij, quod cū articulis ineunt. Quousque igitur & solus humor pedum articulamenta molestat, podagra vitium nuncupatur. Vbi uerò causa in omnes corporis articulos compulsa fuerit, ἀρθρίτις Græci, nos articulares morbos appellare consuevimus. Quo vitij nomine, uertebras, humeros & maxillas cōprehendimus, omnemque articulum, quicumque morbo implicatur. Nonnulli uerò aures, dentes, guttur, & nonnunquam iecur, lienemque articularijs doloribus conflictari pronuntiant. A quibus nisi de subito vitium in artus sese recipiat eructetque, periculum breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superans qui iuncturis sese inserit, nunc biliosus est, nunc sanguineus, alias atra bile uitiosus, plerumque etiam pituitosus, crudusque, copia alimenti, aut cruditate, aut otio congestus, uerum uetustate in articulis crassescit, & glutinosior euadit: sic ut in duritiem contumacissimam, quam Latini tophum, Græci poron appellant, occallescat. Interim uerò diuersa humorum colluie, vitium contrahitur, ob quod agrè dignosci, & difficulter medicamentis elidi potest, uel etiam penè nullo remedio sanescit. Cæterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, uehemens ambulatio, equitatus creber, usus ueneris intempestiuus, insueta frigida potio, frigidorumque, uel multorum noxiarum uel ciborum esus, multus uini usus. Iam aliqui prolapsu, uel deturbatione, uel propulsu, uel distorsione, uel id genus alijs, prima morbi fundamenta iecerunt, materia quidem præcedente in corpore, quæ antea conquiescebat, nunc autem à causa primaria est commota. Mœrores autem, curæ, peruiigilia, & reliqui animi affectus, non modò mouent, sed ipsi quoque noxios succos, siue primario, siue ex accidenti procrearunt. Variæ igitur, ut à me dictum est, affectus causæ habentur. Sed deprehendi tamen facile humorum noxam inferentium discrimina possunt, tum suis coloribus, tum ijs quæ superueniunt de notata. Siquidem biliosa defluxio præter colorem pallidum & rubidum, caloris sensum doloremque acriorem efficit & protinus in cutem sine magno tumore erumpit, incandescitque calidis

calidis impositis, sicut è contrario ijs quæ refrigerant remittitur. Hoc sanè cum aliis omnibus magna ex parte, tum maximè ijs qui à bilioso humore originem habent euenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionum statu accedit, quando & sitis conficit. Pari modo in melancholicis, color partis nigrior reddetur in pituitosis, ex albidus & aquæ subter cutem similis apparebit, ubi dolor altius delitescit, & tardius in tumorem sese attollit, quemadmodum si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verùm ut singula exactius dinoscas, superior uictus ratio reliquaq; consulenda tibi ueniunt.

† Rectior est hæc scriptura ueteris codicis προσκινυμένης μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ τέως ἡρεμένης τῆς ὕλης, id est, materia antè coaceruata in corpore, &c.

Curatio biliosæ defluxionis articulis conceptæ.

INitium curationis si flauabilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, uacuatione noxi humoris tentabitur per medicamenta purgantia. quale est maximè quod ex rhodomelite temperatur, tum quod malis cotoniis constat, item antidotū ex hiera picra, & aloe cataporia. Per accessiones uerò à foris utendum rosaceo cū oui luteo, & uini momento, particulā sensim infricando, herbæ autem admoventur quæ refrigerant, ut solanū, portulaca, altercū, semperuiuum, palustris lenticula, feris, papauer, polygonium, rosarum folia, & consimilia: Et nunc per se illinuntur, nunc cum micis panis posca imbutis adhibentur, uel hordeacea farina cum rosaceo instar cataplasinatis superaccommodatur. At in Erysipelacea inflammatione articulorū manifestò lenietur cucurbitæ recentis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & per se, & cū pane. Item perdicii foliis & hederæ cum pane uel tenuiore parte polentæ. Ad hæc psylliū farinæ hordiaceæ incoctū, ardētes inflammationes mirandū in modū solatur simili modo & rosaceū ceratū cū quibusdā refrigerantibus succis illitū, & quod ex fabarū lomēto cōponitur. habet aut hoc pacto: ceræ uncia quinque, chamemælini, rosacei, singulorū uncia duæ & S. fabacei lomēti semuncia, ouorū lutea quinque. **A L I V D.** cataplasma uirentes maluæ coctæ teruntur, psyll ū priuatim in uiscū redactū, admisceat: † deinde ouorū luteis admixtis, oleoq; chamemælini applicant. Si uerò tantus urgeat dolor, ut laborās par esse ferendo nequeat, medica-

x 2 mento

mêto ex croco, glaucio & opio uti conueniet, quæ in posca trita sublinentur, uel cū micis forma cataplasmatibus obducuntur. Galenus autem, huius meminit, lachrymæ papaueris drachmas quatuor, croci drachmam cum bulo lacte, uel caprillo trita, uel panis micam inijcito, & emolliens rosaceo excipito, ac utitor cataplasmate, aut opium crocumque pariter trita in lacte, cerato rosaceo excipito: Contulerit etiam eadem parte in accessionibus ceratum ex turpene pisce confectum, item oleum ex eodem expressum. Persimilis est hoc efficaciam, micarum panis aqua, uel posca maceratarum & semperuiui, uel portulacæ, uel solani uel palmularum carnis & papaueris capitum seminis, pari portione, ouorum tostorum luteorum & rosacei quod sufficit, accommodato in cataplasmate. Verum his quæ membris torporem inducunt narcotica Græci uocant, diutius non erit insistendum, quàm ut doloris uehementiam solum lenierint, siquidem largior ipsorum usus, sic insertum constringit humorem, ut in tophaceam duritiem quos Græci πώρους appellant occalescat, ac diurnas motus difficultates pariat. Ab eorum igitur usu quæ dolorem arcent uel medicamento è succis herbarum factis, diachylon uocant, ex chamæmelino resolutum utendum erit, uel eo quod dialtheas appellant, uel huius generis alio. Posteaquàm uerò partem affectam quæ refrigerit recalfeceat, roboranda erit palmulato medicamine quod diaphanice dicunt, cum oxyrhodino, uel uino & rosaceo soluto. At si emplastra detrectent grauenturque, acaciæ succum ex posca, uel lycium adiecto croco & glaucio, & succo perditii ex posca, delinere conuenit. Victus autem ratio refrigerans humidaque erit, ut hordei cremor, ex chondro sorbitiones: ex oleribus, malua, lactuca, intybus: auium cohortalium maximè pulli, piscium saxatiles, erinacius pectines & eius notæ reliqui. Vitanda omnia calfacientia, & quæ pallidam, aut flauam bilem generant, uinum uetus, fuluum, & nigellum, & cibi repletio. balineis utendum aqua potulenta factis, si nihil prohibet, etiam cum defluxiones ipsæ infestant, & cum absunt quantum ad causam pertinet. Temperandum ab iracundia, inedia, acrimonia esu, temulentia, immodico labore, & ueneris usu.

† Vetus codex, ἔτα προσημασμένων τὰ λουκά, id est, deinde albo ouorum admixto, quæ lectio huic loco magis conuenit.

Curatio

Curatio si sanguis artus infestet.

IN quibus sanguineus humor redūdat, protinus sanguis mit-
 ti debet: ac non in his solum, sed etiam in pituitosioribus,
 aut melancholicis. Siquidem in his quoq; succus uenis pluri-
 ma parte continetur, qui copia sua potius quā qualitate of-
 fendit, statim igitur cum quis morbum experiri primum cepe-
 rit, sanguinis missio erit tentanda: nam quos iam fluxio fre-
 quenter infestaret, ij plus inde noxæ, quā auxilii sentiunt. præ-
 fertim quibus corpus est natura frigidius, aut etiā imbecillius.
 Post sanguinem detractum, nisi solus ille superauerit, momen-
 to temporis interposito, etiam purgationem ex hiera antido-
 to moliemur, aut Iuliani oxymelite, quippe hæc magna com-
 moditate purgant: qui uerò ab huiusmodi medicamentis ua-
 cuantibus abhorrent, catapotia quæ sequuntur deuorabunt:
 aloes, colocynthidis, id est, cucurbitæ syluestris, ueratri nigri,
 scammonia, singulorum unciam, euphorbii, nitri, singulorum
 semunciam, succi brassicæ, quod ad ea capienda satis sit: Datur
 singulis pro uirium ratione: melius proficiet, si cotoniorum
 succo excipiantur. Aliud catapotium quod & in accessionibus, &
 remissionibus exhibetur podagricis, qualiscunq; etiam humor
 articulos affligat. Recipit aloes se libram, agarici, croci, singulorum
 semunciam, costi, spicæ nardi, iunci odorati rotundi, floris, opo-
 balsami, casia, singulorum unciam, scammonia sextantē, epi-
 thymi quadrantē cum semisse. Modus mediocris instar duorum
 scrupulorum, summus quaterni scrupuli. Iam uerò ex armenia-
 co lapide catapotia, mirificè purgant, ac propriè articulariis do-
 loribus cōgruunt, tū inter fluxionū principia, tum in decemē-
 to, tum in remissionibus, sed quoniā nōnulli scammoniam ceu
 stomacho noxiam fugiunt, dabūtur ipsis præsertim cū pitui-
 tosa subluies torquet, hæc catapotia, colocynthidis medullæ,
 ueratri nigri, bdelli, gummi, aloes, singulorum uncia, nitri ale-
 xandrini, euphorbii, singulorum semuncia, dantur quaternis scru-
 pulis. Ego in uicem gummi epithymum adiiciebam. Sunt qui
 in omnibus articulariorum uiciorū accessionibus, purgatione
 ex hermodactylis ipsis aluum sollicitauerint, sed attendendū
 est, quoniam hermodactylus stomacho feceffit negotium: an-
 xietatem & cibi fastidium mouet. Quapropter in his uti cōsi-
 lium est, qui obeundarum actionum necessitatē habet. etenim

breui post duos plurimum dies defluxionem ex toto finiunt, sic ut consuetis munijs obeundis sint idonei. Notus mihi est qui non hermodactyli substantiam, neq; aliquod ex ea compositum medicamentum, sed herbæ ipsius decoctum cum aliquo consueto medicamine, utpote aniso, uel apio decoquens ipsum, potui exhibuerit, ac mirum est quàm resoluta saepe aluo defluxionem sedaret: uerùm quia, ut nuper retuli, stomacho inimicum est, ijs postea quæ stomachum confirmant uiresque eius recolligunt, mediocri calfactione os uentriculi corrigere oportet, ijs autem quæ ex hermodactylis fiunt, multo laudatius esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio temperaretur, quod & eandem uacuationem præstet, & dolores sopiat præterquàm quòd stomacho noxam non inferat. Cæterum loco inducentur cataplasmatibus modo in pituitosis, si mediocris dolor afficiat, uiridis brassica, apium, cunyla, uerbenaca recta, sin acris dolor affligat, farinæ fœnugræci parteis treis, pollinis loliacei, farinæ cicerum, singulorum partem unam. ex aqua mulsâ, aut uino tenui cum modico cypri-
no, uel nardino conuenit applicare, maximè per hyemem, item cinis crematæ radicis brassicæ, eiusq; caulicorum cum axungia inductus, multis fuit præsidio. Sed sopiendis doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo autem humori uetus salsa auxiliatur: bubulum etiam stercus cum hordeacea farina in aqua mulsâ coctam prodest: uel per se recens & liquidum, uel cum foliis brassicæ. Similiter caprillus finus per se, uel cum hordeacea farina coctus in posca. Quoniam uerò nonnulli ex ijs quæ contraria esse uidetur remedium senserunt (etenim diuersorum humorum mistura dignotionem postulat) commemoranda iam harum materia est promiscua, Itaque iuuat syluestris atriplex & satiuâ cum pane applicata, aut uerbasci folia cum bulbis & pane trita, uel cum polenta, uel cataplasma ex hordeacea farina cruda. At in quibus obscura morbi est origo, hæc semel experiri abundè fuerit, modò ad consimilia transgrediendum est: modò contrariis pugnandum. Neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis solatium perceperint. Hæc quotidie in artis operibus fieri uidemus, ut idem medicamentum uni articulo profuerit, alteri in eodem ægrotante similiter inflammato non modò non opituletur eodem tempore,

pore, sed aliquando (quod maximè est mirum) offenderit. Quippe unus idemq; sæpe articulus, ex eodem remedio nunc iuuabitur, paulo post eiusdem appositu, inflammationem concipiet. Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusq; humor superat, calidioribus leuabitur auxiliis. Verùm cum acris aut feruida humoris qualitas præcellit, tum refrigerantibus solatium inflammationis paratur. Nec miraculum est si materies natura frigidior inflammationis tempore, & feruore æstuet & incandescat, ut bilis, si ita contingat, admistionem omittam. Porro tophos in artubus impedit coalescere lupinorum farina cum oxymelite, uel posca, uel laserpitio, aut brionia radice cum pane. Iam hoc quod sequitur citra noxam mitigat, & mediocriter discutit, lycii, ammoniaci, thymiamatis, singulæ uncia cum uino ueterrimo & oleo omphacino, trita coquuntur, & è lomento fabarum, quod sufficit, adiicitur, cocta mediocriter modo cataplasmatibus applicatur. Post inflammationis statum, tumore relicto applicandi bulbi per se, uel cum polline polenta, ad ruborem usque, hoc enim modo efficacem usum exhibent. Quod si nihil hisce cataplasmatibus leniuntur, fotibus & superfusionibus erit certandum, maximè si tumor extrema occupet, chamæmeli & meliloti, aut centaurei decoctis. Nonnullis etiam cappari decoctum abundè fuit auxilii, hoc tamen quod infra scribitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origanum, satureia, & calamintha, in aceto quàm acerrimo cocta: eiusdem aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterum, sed frequenter in die fouentur cum fiducia. Hoc præsidio permulti pristinam ualitudinem recuperarunt, quibus non pituita solum, sed flaua etiam bilis fuit intesta. Non desunt qui & subsequens medicamentum salutare sint experti, illicis glandes in farinam redigunt ac diu coquunt, hoc decocto extremos artus per fluxionū initia longo tempore aspergunt. At quæ interius partes habentur, spongiis fouent & per hæc materiæ impetum repellunt. Idem & bile uitiosis artubus conuenit, quemadmodum ex calida aqua sine aliquo decocto superfusio. Porro doloribus qui intenso frigore, aut humoribus inter articulorum ossa impactis contrahuntur, ualens hoc est remedium Olei ueteris sesquilibra, nitri alexandrini, resinæ terebinthinæ singulorū libra, euphorbiæ uncia, iris sextas, scœnogræci farinæ sextarius unus & dimidius.

his autem ea quoq; quæ aduersos coxendicum cruciatus scripta sunt, pulchrè nimirum opitulantur. multi siquidem aduersus huiusmodi perfrictiones cum morbus declinauerit, sinapi cum siccatis ficis usi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborè excitant. Alii uerò medicamentum ex cintharidibus admouët, uerum hæc in posterum efficiunt, nisi aliquo etiam moliente utantur, ut, dialstrutheon & pyxide, & basilio, aut diaclates, aut dia ægiru, aut bromio, aut lyliponio, aut ualentioribus acopis, in quibus etiam nerui consensus, potissimum & infarctus humorum eue niüt. At ex mulæ lotio, in morbo statu præsertim, & in frigidis defluxionibus fouere commodum est. Pariter cõuenit etiam ex utroq; ueratro pastillus cum mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale torrido, aut etiam aliter è marina calida per spongas artus perfudissè uincit. item emplastra ex sale præparata, uel ex lixiuia, & nitro, hisq; consimilia cataplasmata, post uigorè morbi auxilio sunt, uictus ratio siccior minimeq; excrementitia competit, item inedia, uel parciores cibi. frequentibus balneis abstinentum. At si lauent, nitro aliisq; pulueribus utentur deterforiis. Vbi dolor declinauerit, exercitiis se credent: & frictionibus maxime articulorum, in naturales balineas descendët, aut èt arena cõtecti incale scët. Vomitus à radícula cibisq; assumptis mouebitur. Qui ad hoc se cõmodè habent, etiã ueratro nigro uacuëtur per uomitum, uel etiam per aluum inferiorem purgëtur.

Quomodo sanguine infestati artus curentur.

Qui ex sanguine dolorem articulare conceperunt, post sanguinis initio morbi detractionem, remedia cõmemorata loco dolenti sunt inducenda, si biliosior quidem acriorq; sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, certandum, si frigidior, pituitosiorq; aut melancholicus humor coaluerit, t̄ iis quæ post illa subdidimus præter nimis acria, curationem tentabimus. at si uicium in uetustatem incidit, his quoq; locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, & rhus cū polenta ex uino detrita obducuntur. ALIUD. Brassicæ folia cocta accuratè conteruntur, aceti floces cum duobus coctorum ouorum luteis, & rosacei momento, adiciuntur, leuigataq; simul loco iniiciuntur subinde ea mutâdo. Cibi assumentur

assumentur qui extenuant & parum nutriunt : carne igitur & leguminibus & uino copiosiore nigro abstinendum, si autem fieri possit, etiam ex toto uinum circuncidendum. Plurimos siquidem noui, qui prorsus abstemii omnes sanitatem consecuti sint. Alii siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alii in posterum rarius & minori dolore accessiones perceperunt. Quapropter nisi contrarium hinc accadat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuò uitam agent abstemiam. † At qui per imbecillitatem, aut perfrictionem aliquid subsequitur opinentur, ad biennium usq; abstemii, inde ad pristinam cōsuetudinem reuersi, modicum dilutumq; continēter bibēt. Oportet autem abstemios in uicem uini decocto anisi, aut alicuius consimilis seminis uti : fructibus pomaceis reliquisq; refrigeratoriis abstinere, tum ueneris usu. Qui uerò per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere uoluerunt, multis sanè quibus pituitosus & excrementitius humor articularis incubuerit, opitulati sunt. uerùm qui calidioribus siccioribusq; constarent naturis, hos in subitam mortem precipitarunt, quòd materia ad intestinum, aut renes, aut costas, aut pulmonem, aut principem quandam partem se contulerit. Satiùs itaq; est biliosiore præditi habitu, aut copioso sanguine refertis, uini usu interdicare : quod nullus ex eius abstinentia, in commemorata uitæ pericula inciderit : frigidiores autem & recrementis pleni, ex uiperis theriaca uti debent, hyeme frequentius, cōcoctione bene obita, per æstatem rarius, uel enim morbo liberabit, uel certè leuiorem reddet, nulli ex prædictis particulis officiens : quoniam uerò nonnulli nos etiam commemoratis uti antidotis cogunt, non te lateat id quod ex damafonio constat & quod ad Agapetum, refertur, item quod atacton & octoidon dicitur, & quod Proclo inscribitur, item quod ex scordio, aut corallio componi solitum est, alia pleraque non mediocriter proficere, omnium uerò securissimum est longoq; usu probatissimum, diacorallii, siquidem concretas iam in tophum duritias discutit. horum omnium uires & modum usus, & quid in his caueri debeat uolumine, quod compositis medicaminibus dicatum est, reperiēs similiter aduersus articulares dolores, medicaminum quæ psilothra uocant misturam usumq; in eodem habitu, nēpe pituitosiore. Alii uerò qui à toto se morbo uindicare uolunt, integras uulpes oleo incoquant,

incoquunt, quo articulariis morbis medentur. Nō defūnt qui uiuas lebetibus magnis iniiciunt, alii tantum emortuas. Pari modo etiam hyenas percoquunt, oleum hinc conficientes, quod discutiendi uim habeat. deinde eo balnei solia complēt: in quæ postquam descenderunt, immorari ibidem diutius præcipiunt, unde sæpe factum, ut non modò artuum tumores, sed etiam uniuersum corpus euacuaretur.

† Vetus liber, τοῖς ἐπ' ἐκείναις, i. iis quæ in illis dicta sunt.

‡ Veteres libri habent hoc loco ὅσοι δὲ δι' αὐτὴν ἐνεύειν ἢ κατὰ-
 Ἰουεῖν ὑποπτύσσοντες τι φάροντο, ac qui per imbecillitatem,
 aut perfrictionem expuere aliquid uidentur.

De tophis, quos græci poros uocant.

Quoniam & tophi subinde in articulis creantur modo ob humoris qui ad eos decubuit crassitiem, terrestrē-
 que duritiam, modo propter immoderatos discutientium re-
 ficcantiumq; medicinarum usus, siue earum mistura quæ emol-
 liendi uirtute pollent, sciendum uenit ea esse conuenientio-
 ra, quæ mollientem simul & discutientem naturam sortiūtur.
 itaq; emolliunt adipēs uetustī, medullæ, ammoniacum, bdel-
 lium, oleum bene uetustum & styrax. Discutiunt autem & re-
 ficcant, nitrum, sal, lixiuium, adarce, euphorbium, & consimi-
 lia uerūm ad concretos in articulis tophos propriè facit uetu-
 stissimus accerrimusq; caseus cum suillæ carnis præpinguis ac
 ueteris decocto contritus & superimpositus siquidem sua spō-
 te topho dehiscēte quotidie humor qui intus coierat, eructa-
 tur. Valet etiam medicamentum diapernes, usu probatum,
 quod duplici modo præparatur. item quæ dia stactes dicuntur.
 iam hoc peculiariter facit quod recipit spumæ nitri, resinæ te-
 rebinthinæ, lixiuii quod calcem adiectam habet, propolis, sin-
 gulorū triens, ceræ bes, colophonix libra, olei fescuncia: mix-
 tis utitur, tum in tophis, tum in abscessibus: iam quod ex cy-
 nabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tumores, alia-
 que complura: sed ægrè paratur. Quod uerò dia leptocaryon
 dicitur, præterquam quod probatum, etiam facilè cōquiritur,
 non solum ualentioribus, sed teneris quoq; corporibus accō-
 modatum, si assumat medicamentū ex melle, uel ex anemone
 confecti

confecti partes duas ad illius partem unam: quæ si desiderentur, et eius quod cerusa constat, subinde æqualis modus ipsi mīscetur. ALIVD. Ad tophos, sandaracham contritam querneouisco excipito, & utitor. ALIVD. Proficit etiam ad fistulas, & ægilopas, olei sextarius, spumæ argenti uncia octo & semis, auripigmenti uncia. Argenti spuma, oleumq; tantisper incoquitur dum manus non inquinet, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquam unctionem senserit medicamentum ab igne tollito, ac utitor. Ex asii lapidis flore confecta, ubi morbus intermiserit imponuntur, quæ ad omnium articulorum nodos concretos accommodata toto morbo liberare, nonnulli ueterum testatum nobis reliquerunt. Et ex salis flore præparatum medicamē si in morbi declinatione similiter imponatur, tumorum reliquias discutere experimenta fidem fecerunt.

Quomodo quis à podagra se tueatur asseratque.

Podagram quæ iam constiterit, articulumue dolorem, sine prædicta medendi ratione aboleri longè difficillimum est. At eam quæ nondum creata est præcauere, facilius, si quis cibis demat, & eis utatur quæ promptè in membra digeruntur, excrementisq; uacant, item uino moderatiore & exercitationibus satis se committant. Quod ad præsidii partem attinet, sal minutim in oleo tritus & articulis affricus, omnes qui se ab hoc uitio uindicare uolunt, magnificè iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi, eoq; illitu, & mane, & uesperis per totum uitæ curriculum, & ubi inflammationes inclinauerint, utendum est.

Ad portiones qui tum pedum plantas tum calces infestant. Cap. LXXIX.

Perniones ulcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manuum pedumq; contrahuntur, Græci chimethla nūcupāt. Itaq; tepidā aquā marinā superfundere oportet, uel betæ decoctū, uel lenticulæ, uel erui, uel hastulæ regiæ radicis. A superfusione, lenticulæ coctæ uinoq; detritæ admouetur, uel ficus ex oleo leuigata imponitur, uel alumē & farina pari modo, in uino pertrita applicantur, aut floces uini subaridæ, aut bulbus recēs uino tritus adglutinat, aut allia in oleo fricta, proiectaq; & cera oleo mediocri liquefacta imponit, aut malicoriū incoctū uino, & in tenuē redactū puluerē, cerato rosaceo exceptū inducito

inducito, prius locum decocto lupinorū irrorans, aut mannā, sulphurq; ignem non expertum, cum melle cocto imponitur, at alterci succus continenter illitus, ab inflammatione & doloribus uindicat.

Marcellium ad perniones.

RApæ satiux radice excauata, conijcitur in capacitatem ipsius ceræ sextans, olei lentiscini quantum sufficit: cocta in duplici uase ex marina aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, hoc quidem superfundito, ceratum uero in rapa liquefactū frigidum imposito. At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis scissi, minii, resinæ terebinthinæ singulorum par modus: adipe suillo diluta inducuntur. Verum si inflammatio exulceratos perniones malè habeat, medicamento utendum hexapharmaco quod recipit olei uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulorum libram, argenti spumæ uncias sex, colophonix, uncias quatuor, mellis uncias sex.

Ad digitorum rimas totorumq; pedum quæ rhagades dicuntur.

PIce liquida delinuntur, aut cancro fluuiatili, aut marino super carbones cremato, testa abraditur, & cum oleo trita u mellis spissitudo sit, absterfis prius scissuris instillatur. Proficiet etiā scillæ medulla oleo feruefacta, item cū terebinthina leuigata, necnō cornu caprillum ustum, exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare oportet, & sic medicamenti uti.

Ad scissuras calcaneorum & plani pedum, anthera.

CAlcis uiuidæ drachmæ decem, cerusæ drachmæ uiginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recentis uncia septem, colophonix uncia nouē, succi lini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta: teneram plantam efficit ut aliud nullum. **ALIVD.** Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pari mensura utitor. **ALIVD.** Malicorium aceto incoctum diebus quinque applicatur, deinde loco undiquaq; purgato calx una cum oleo, aut sordibus imponitur. **ALIVD.** Scilla cocta oleo, ipsa quidem fricta proijcitur, oleo uerò in quo tamen terebinthina liquefacta sit utitor.

Ad attritus calcanei ex longo decubitu.

CEræ, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt in omni

in omni exulceratione, plantæ pedū, calcanei, supernæ patris, & internæ digitorum, magisq; si ulcus ungui sit propinquum.

*Ad sordida plantæ ulcera emmoton, facit
etiam genitali exlucrato.*

A Murcæ cyathus, aceti cyathus, cocta uase æreo donec mel leam spissitudinem habeant, & trita separatim, profunt. Item squamæ æris drachmas duas, mannæ tantundem, lanarū succidarum mollium, quantum manu comprehendi potest, in uolutarum tedæ, ustarumq; cinerem totum excipito, & utitor, in uulneribus quidem uino diluens. in naturalibus autem & pedum plantis passō. **ALIVD.** Amurcæ, mellis dispumati, paria pondera, hoc etiam cicatrices tollit.

Ad intertrigines, ex calceamentis.

Pvlmo agninus, suillus & caprillus benefacit, uerum coriæ ex ueteribus calceamentis combusta, si inflāmatio urget, nihil quidem adferunt præsidii, sed illa finita, multum: uel cepa cum gallinæ adipe copiosior adiicitur, uel galla combusta inspergitur, uel acacia aceto diluta illinitur.

Ad clauos callosq;.

Cap. LXXX.

Clavis prius undiquaq; purgatis, inducitur medicamentum quoddam ex edentibus, quæ septica Græci uocāt, aut ærugo rasilis, aut sandaracha, aut syringiacus puluis aut collyrium syringiacū loco gummi, ammoniaco exceptū. Est autem clauus teres figura callus, candidus, clauorum capiti similis, qui in omnibus corporis partibus, sed pedum plantis, digitisq; præcipuè nascitur. Tollitur autem longiori tempore, etiam si quis excedentem clauī partem continuè abradat scalpello, aut pumice affricet, similiter etiam callos. Proficat lupinorum crudorum concrematorum cinis cum melle, aut misy, liquida pice exceptum, melanthion cum urina pueri uenerem non experti, uel oui luteum, fabarum lomento cum aceto incoctum. At hoc subinde expertum est, cantharidum, atramenti sutorii, castorei, par modus singulorum, excipitur te rebinrhina, ut emplastri fiat spissitudo, clauoq; prius circumciso, imponitur. **ALIVD.** Feculæ, calcis uiuæ, uisci, singulorum pares portiones, cum stillaticia lixiua, uel urina pueri uenerem non experti.

Ad

Ad unguinū uitia, et primū de reduuijs. Cap. LXXXI.

R Eduuiæ, Græci paronychiam appellāt, abscessū est quī ad radices unguium coit, cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle eā reprimat, & confirmari prohibet, uel Musæ pastillus, uel Heræ, ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodentia medicamenta absūmatur, rumpaturq; , ualet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lycium suppuras autem reduuias, acu adacta humorem emittere, spongiāque aqua imbutā imponere oportet, uel lenticulam applicare ex aqua tritam, aut palmulatū cum uino, uel rosas uirides, uel ficas, aqua maceratas tritasq; , uel polentā cum aqua: efficax est reduuis etiā lupinorum farina melle, uel mulso macerata. Exulceratis reduuijs opitulatur hoc medicamentum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex uino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem undiquaque ab ungue diducere.

De pterygijs.

Pterygion carnis incrementum est, aliquam unguis partem operiens, ex reduuia, aut alia huiusmodi causa proueniens, aduersus quam auripigmentum & manna pari pondere inspargitur, super autē, linamentum ex uino & spongia imponitur. **ALIVD.** Chalcitidis squamæ, malicorij æquales partes. Excipiuntur fico tosta & melle, parte affecta, lupinorum decocto prius aspersa. Quod autem siccum est in ungue circuncidito.

Ad digitorum pterygia putrida, item ad pudendorum ulcera.

Lachrimæ thuris drachma, squamę drachma, æruginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole donec subflauescant. Et loco uino prius irrorato per splenium inducuntur.

Medicamentū quod subito pterygia desiccat persanatq; .

Soryos combusti drachmæ duæ, thuris tantundem, æruginis rasæ drachma cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum ulcera, & nigritias & putredines. **ALIVD.** Squama æris, palmularum carne excepta, aut ficorum utitor. **ALIVD.** Columbæ sterco polentæ polline ex passo coctum pertritumq; calens imponitur,

tur, item squama per se inspersa, pterygia desiccat. Oportet autem crebro, angulum unguis pterygion pungentem, ne incre scat, scalpello superimmissio, adimere.

Ad unguēs contusos.

MYrti, & mali punici folijs teneris unguēs obducito.

Ad cruentos unguēs.

Farina pice mista imponitur.

Vt unguēs qui laborauerunt abscedant.

Sulfur tritum adipe suillo exceptum iniicitur.


Vt scabri unguēs abscedant.

Visci quercini, sandarachæ, foenugreci singulorum pond sextans, cantharidum, thapsiæ singulorū uncia, aceti quod satis est. **A L I V D.** Propolis atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris ignem non experti drachma, oleo non inquinet, in usu calefactū unguibus applicatur. **A L I V D.** Picis liquidæ, ceræ, colophonix, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris uiui, aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. **A L I V D.** quod separat scabros unguēs sine exulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulfuris uiui singulorum drachmas quatuor, resina excipito, & utitor, dissoluēs per dies septenos. **A L I V D.** Erui farina, felle ouillo, uel urina ouilla imbuta utitor, uel calce uiua cum oleo, uel chia cum opobalsamo, uel uisco, atramentum sutorium, sulfurq; uinum quod satis est, exceptum, pelli illitum superinducito, uel herba pedicularia, cum aceto trita utitor, uel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata portio simul radici unguis imponitur, diligentiq; fascia illigatur. Cum autem unguis exciderit, ceratum myrteum cui medicamenti ex resina paululum adiectum sit, superaccommodatur.

FINIS LIBRI TERTII IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDI-

CO INTERPRETE.






PAULI AEGINETAE LIBER QVARTVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.



De elephantia.

Cap. I.



ECCE mea sententia † Cappadox Aetius memoriae prodidit, auxiliorum uim morbis fortiolem esse oportere, eoq; elephantiam nunquam curari, ut qua nulla potentior medicina reperitur. Si enim cancer ueluti elephantia sis quaedam uni obortus particulæ inter morbos insanabiles uel ab ipso Hippocrate relatus est, quanto magis

elephantia, seu totius corporis cancer aliquis, ab omni abhorrebit remedio. Cum. n. atra bilis, ex qua huic affectui origo est, duplici modo generetur, (uel. n. ex melancholico sanguine, faculentiolemq;, & ueluti eius limo: uel bile flaua, utrisq; nimium uis, nascitur) subrubicundam quidem elephantiasim mitiorem quodammodo, ut autem uerius dixeris, minus malignam, prima ipsius differentia procreat, reliquam uero, & maligniorem in qua totum corpus foedatur ulceribus, & extrema decidunt, altera flauæ bilis supra naturæ modum adustæ soboles, producit. Quapropter morbo iam uictis manus aduouenda non est. At si recens adhuc malum est, ut nihil ex summis deciderit, nulla autem infestaret exulceratio, neq; tamen eminentiæ tuberosæ plurimum exurgant, sola autem facies aspectu ingratior, deformiorq; sit quodammodo, eaq; non admodum indecora appareat, curationem experiemur. Nonnulli siquidem haud pauci, sola capitis adustione

adustione multos qui hoc inceperāt uitio corripī, ne uincerentur, inhibuerūt. Protinus ergo inter initia sanguis mitti debet, & magis uere, in quo potissimum hæc lues, & nascitur, & intenditur paucis diebus interpositis, nouem decemue, pulte diacolocynthidos ipsos purgabimus, non semel, uerū subinde, ex ratione uirium quantitatem medicaminis adaucturi. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interpositis circiter decem diebus, lactis fissilis serum dabitur, neq; minus tribus heminis, neq; amplius quinq; Insequenti tempore nō fīssio, aut recens multo lacte nutriuntur. Ob quæ si morbus remittat, eodem uti cibo debent: si remanet, lacte abstinebunt: acribus autem assumptis uomitus cietur, à radícula, aut cibis. Proficit & ex albo ueratro post hæc purgatio: bis quidē, si fieri potest, uere, semel per autumnum adhibita. Malo uictis neq; sanguis mitti, neq; ueratrum exhiberi debet, cum materia neq; ex cute in altum deriuari, neq; hinc etiamnum minui possit sed ea quidē ad uentrem, & intestina deducenda est. Medicamenti autē noxia euocantibus utendū, metasyncritica dicunt, & summam cutē desiccare, & astringere oportet. Leues igitur cucurbitule uentriculi ori & præcordijs agglutinabuntur, eadem membra etiā dropace delinentur. Modico temporis processu rursus ad superiora reuertendum est, à purgatione quam præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis detractione, ut quæ plus noxæ, quàm præsidij esset allatura. Atq; hoc circuitu ad ternas uices quaternas uel per annum uti expedit, uere potissimū & autumnō. potare his prodest aceti cyathum, cū cedrini liquoris cyatho, & brassicæ crudæ succi cyathis duobus. mista dantur manè & uesperī. Vel syderitidis herbæ folia torrida denarij pondere in uini cyatho, uel cornu ceruini drachma, & scillicici aceti quantum cyathus implet, quotidie post matutinā obambulationē potui exhibetur. reliqua uerò pro ratione tēporis his offeruntur, uel scillæ lotæ drachmæ quinq; in mullâ, uel melle eclegmatis modo: uel liquoris cyrenaici ad erui magnitudinem, melle & butyro subacti, uel eboris ramenti drachma semissis cum uini cyathis duobus, uel cumini æthiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His amplius iuuat theriacorum pastillorum drachma in uini primæ notæ cyatho leuigata epotaque. Similiter etiam scillicicorum pastillorum drachma bibitur. Et calaminthæ succum ceum efficacissimū potu auxilium

PAULI AEGIN.

I. commen-

commendāt. incipiendū dicunt à cyathis ternis adusq; senos. Cæterū omnibus his efficacior est theriace ex uiperis, tum potui data, tum extrinsecus illita. Cū autem uiperarū copia datur, nihil æque proficit, ac uiperarū carnes comestæ, albo iure ex copiosiore aqua, sale, porro, & anetho decoctæ, usq; dum spinæ dissoluantur, sed capitibus ipsorū caudisq; digitos quatuor prius amputatis, interaneisq; ipsorum ablatis & cute. Item theriaci sales eadem per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Tali enim ipsorū usu accidit, nonnunquam squamas, † uel ceu uulpis pellem quandam ex cute elephantiorum decidere.

† Aldinum exemplar habet καππαδοκην ἀρετᾶν, Cappadocem Aretæum. quæ lectio rector mihi uidetur.

‡ Vetus codex, συμβάλει ποτὲ λεπιδὸς ἢ οἶόν τινα λοπὴν, quo loco legendum arbitror, ἢ οἶόν τινα λοπὸν: est autem λοπὸς τῆ κεκομμένης ἐλεφαντίνης, id est, cepæ tunica, ut sit sensus, ueluti cepæ tunicam & tenuem illam pellem.

Vetus ratio talis erit.

A Somno manu molliter permulceatur, aluoque deiecta gestetur, uocem exerceat: deinde perfricetur & uario exercitationum genere utatur, nunc saltu, nunc magis, alteribus, & folle. Postea sudore, quæ illinc contrahit, abterso delinetur adipe ursina, aut uulpina, aut hircina, aut auis alicuius, aut butyro recenti pauxillo temporis interposito in lauacro perungetur succo fœnugræci, aut prisanæ cremore, aut ammoniaci momēto, quod aceto subegeris. A balneo deterfus perungetur oleo lentiscino aut cœnanthino, aut myrteo. Vinoq; modico cum alumine, uel ammoniaco, ut sordium sit spissitudo. Rursus teneris panuiculis abterfus dimidia hora conquiescat. Inde potu aquæ ad uomitū sollicitetur, digitis in os, aut pinnis demissis, post uomitū detur potui uinum absinthites, aut organites. Cibus erit panis hordeaceus, uel maza ex polentis. Inter olea, beta, lactuca, raphanus, porra, brassica aquis binis edulcata, & capparis. Ex marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacei, pectines, tellinæ simul cum betis incoctæ: salsamentum uetus ceu in medicamento uicem adhibetur. Vino autem per totum morbi curriculum & uenere similiter abstinendum. At cū uires ex purgationibus lacescitæ recreantur, pauxillum duntaxat uini

uini tenuis & aquosi assumitur, quando & acria circuncidi debent, exceptis condimentis. Recteque ipsis datur ptisana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum pane, malua, rumex & hysarum: piscis molli præditus carne: Ex ijs quæ uolatu fidunt, probis donata succis: Inter fructus, ficus, uua, & uuæ passæ: ex dulciarijs mellitis conferunt, quæ pini nucleis, aut amygdalis frictis, & cnico, constant, ijs qui bis quotidie cibum capere solent: graue autem his est molestumque, semel duntaxat eum assumere. Interiorum cura habita, smegmatis in balneo utendum ex decocto betæ, aut fœnugreci cum aphronitra, aut sapone, aut myrobolano: inrerim & psilothris. Abstergit itidem portulaca cum aceto detrita, tenue semperuiuum, rumicis radices aceto incoctæ, alumen cum sale. Item sandarachæ par modus ex uino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentum, ad utiliginis speciem quæ alphos dicitur, accommodum, ex alcyonio, nitro, myrto, sulfure, fici agrestis folijs siccis, cum aceto tritum, illitumque: idem præstat quod ex sepia testa concremata fit pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gummi, galla omphacitide pari pondere siccum inspersum, aut ex aceto infricatum. Hoc autem mirabiles habet effectus: rumicis radicum fasciculus qui manu comprehendi possit, nitri drachmæ quadraginta, thuris uiginti quinque, sulfuris tantundem, ex aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc efficax est, quod recipit auripigmenti drachmas decem, sulfuris ignem non experti drachmas octo, costi drachmas duodecim, calcis uiuæ drachmas quatuor, ceræ totidem, baccarum lauri aridarum drachmas duodecim. Hæc macerantur populi albæ foliorum succo, aut crasso decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illinuntur, A L I V D. Radicum rumicis fasciculi duo, aceto incoquuntur, & in pilam coniecti conteruntur læuiganturque. Deinde alcyonii libra, aphronitri uncia octo, sulfuris ignem non experti libra, cochleæ testarum combustarum triens, & chamæleontis cum radice triens. Omnia simul læuigantur, donec sordium fiat crassitudo. Deinde illinuntur per æstatem in sole frequenter, hyeme in balneo usque ad desudationem. Item Aesculapij aridum smegma pulchrè his conueniet, ac omnia quæ communiter dicuntur smegmata, imo etiam ea quæ alphos dicata sunt propriè huc pertinent quæadmodum & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At tumidas eminentias si inflammatione tenentur, aut exulcerata sint, delinuntur lycio indico, uel glaucio,

uel aloe, uel Andronij pastillo, aut polyidæ sphragide. Cata-
plasma ipsis aptabitur ex chondro cum succo polygonij, uel
plantaginis, uel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ uiridis
folia cum axungia tinsa, applicataque mirabiliter proficiunt.
Etenim rubor in partibus excitatur, sed ex facili remittitur pa-
ne applicato, aut cerato ex amygdalino atque color naturalis
redit. Exulceratis rectè accommodantur emplastra, tum ex di-
phryge præparatum, tum ex uino melinum. Adde Coracion,
quodq; constat ex oxymelite, & pastillum Andronij, pompho-
ligem, & cadmiam. indicium uerò est totum morbum mitesce-
re. si prima ulcera cicatricem recipiant. Ad spirandi uerò diffi-
cultatem eorum qui elephantia laborant, aselli sub aquarijs de-
gentes, quinque, aut sex, ex aquæ mulsæ cyathis tribus potan-
tur. Iam uerò quædam ex ijs quæ ad ægrè spirantes inscribun-
tur, ipsis quoque communiter competunt. Aquarum natura-
lium usus adhiberi debet, ceu maximè necessarius, præsertim
aluminosarum, ferrumque respicientium. & si fieri potest, fri-
gidarum. Conferunt ipsis si etiam bibantur, nec non mari-
næ arenæ usus. Eandem habent efficaciam omnia quæ de su-
dationes mouent. Quoniam uerò affectus hic, non minus ac
pestilentia contagiosus est, quàm longissimè ab urbibus remo-
ti ægri, in locis mediterraneis, frigidis & ubi sit hominum si fie-
ri possit, infrequentia habitabunt, inde uerò ad confinia migra-
bunt, † tum ipsorum causa, tum illorum potius qui, ut uerò si-
mile est, ipsis incident. Quippe & aere fruuntur commodiore,
& alios hac lue non inficient.

† Vetus liber habet, χαμαλέοντος μέλανος τῆς ῥίζης, id est,
chamæleontis nigri radicis uncia tres.

‡ Hic locus sic legitur in ueteribus libris. διὰ τε αὐτὸς καὶ
τὸς ὡς οἶκος ἐν τοῖς οἰκιστοῖς συχνοτέρον, id est, tum ipsorum cau-
sa, tum illorū potius qui (ut uero simile est) frequētius incidēt.

De lepra, & scabie, quæ psora dicitur. Cap. II.

VTerque affectus, cutis aspritudo est cum pruritu, in qua
corpus absumitur colliquaturque; originem ex melan-
cholico humore trahens: sed lepra altam cutem orbi-
culatim depascitur & pisciū modo squamulas ex se remittit.
Scabies uerò summa infestat potius uariè figurata, furfuracea-
que remittit: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si cor-
pus

pus magis plethoricum uideatur. sin minus, purgatio certè ex
ijs quæ atræ bili uacuandæ sunt. Extrinsicus autem utere com-
muniter utroq; ueratro, calcemq; habe eloram & siccam: in
ipso autem usu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito.
ALIVD. Saluiæ, oleæ æthiopicæ lachrymæ, singulorum drach-
mæ octo, capparis radicis corticis, gummi, singulorum drach-
mæ quindecim. Inunguntur ex aceto ad solem, propriè uerò
lepras disijciunt anemone applicatæ, item uitis albæ radix. Cō-
posita uerò hæc, lolij farinæ choenix, cardamomi albi drachmæ
quatuor, nitri spumæ drachma, atramēti sutorii drachmæ octo
hastulæ regiæ radicis mediæ drachmæ quatuor. Aceto pertri-
ta, & in cerati spissitudinem coacta illinuntur, parti prius nitro
detergæ: ubi solueris (solues autem tertia die) & frigida aqua
elueris, rursus inungentur. ALIVD. Hastulæ regiæ radicis succi
unciae sex, sulfuris ignem non experti, mannæ, singulorum dra-
chmæ decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur. Ad
scabiē peculiariter facit, ex simplicibus herba pedicularia, sta-
phis agria dicitur, lupini amari, cardamomum cum aceto, lilii
radix cum melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillū ster-
cus Inter composita, misy & chalcitis pari modo ex uino humi-
diores scabies delinuntur. ALIVD. Rhododaphnæ tenera folia
in olei sextario simul incoquito, donec arefiant. Ac ubi proie-
ceris, oleo adiunge ceræ dealbatæ uncias tres, postquam solu-
ta refrigeratæq; fuerint, sulfuris uiui unciam inspergito. ad so-
lem, uel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaph-
næ etiam scillam coquunt. ALIVD. Medicamenti *διάχυλων*,
hoc est ex succis herbarum confecti unciae duæ, ceræ tantundē
rosacei uncia argenti spumæ unciae tres, cerusæ totidem, liqui-
dæ picis unciae sex, stercoris argenti unciae duæ, sirici tantundē,
aceri quod siccis læuigandis sufficit. ALIVD. Cerusæ semuncia,
amyli tantundem, plumbi uncia, lotariorum rubrorum uel an-
chusæ, unciae duæ, ceræ unciae sex, rosacei unciae nouem. An-
chusa probè cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adiciuntur.
ALIVD. Oua decem, uel quot ad usum opus est, aceto quam-
acerrimo macerantur, quousq; putamen ipsorum tenerescat,
lutea n eodem aceto coquuntur, læuiganturq; rosaceo, & re-
liquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spiss-
itudinē coactum illitur. ALIVD. Quorum quæ in aceto com-
maduerint, lutea tria, rosacei unciae sex, sulfuris uiui unciae

f 3 tres,

tres, leuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratū adijcito. Argenti spuma uerò oxyrodino detrita, ut emplastrī crassitudo fiat, acriores scabies exterit. Iam uerò ex lapatho smegmata, & ex iis quæ elephantiscis faciūt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras conueniunt.

De impetiginibus.

Cap. III.

Impetigines ex serosis tenuibus, acribusq; humoribus, crassioribus aliis mistis contrahuntur, celerrimè in scabiem, & lepram transeuntes, quapropter remedia ualidè siccātia requirunt. Corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, simplicia quidem ipsis cōferent, cicer, ueratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato, resinæq; mista, crocodili terrestres stercus, atq; sturnorum, cum oryzam solam ederint. Pleriq; hoc solo impetigines mentum infestantes, aliāque particulam, aboleuerunt. Tritici multum capitur, incudiq; ignitæ cuiuspiam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis saliuā continuè defricantur. His opitulantur pruni gummi illitum. In uetustatem incidentibus uiticis folia cū aceto detrita applicantur, uel capparis folia similiter. Composita uerò hæc sulfur cū thuris lachryma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

Pastillus ad impetigines.

Glutinis fabrilis drachmæ quatuor, thuris drachmæ tres, aceti cyathi dimidium, aceto soluta illinuntur. **ALIVD.** Chalcitidis, gummi, singulorum drachmæ octo, sulfuris ignem non experti, misyos, singulorū drachmæ sex, squamæ æris, acaciæ, singulorum drachmæ duæ, aceto delinuntur. **ALIVD.** Sulfuris uiui, nitri spumæ, singulorū drachmæ quatuor, cachryos grana sexaginta, læuigantur ex aceto. Sola uerò pars uitiatā inungitur, sed ita, ut quæ integra est, non coinquinetur: exarsæcta, aqua frigida eluitur. **ALIVD.** Veratri albi drachmæ octo, farinae lupini, buccinorum cōbustorum, nitri, singulorum chēnix. Arido medicamine defricent. Porro impetigines, quas *αγγες*, id est, feras appellant, mediocriter siccantibus remedijs nō discutuntur, acrioribus autem irritantur. Adhibere igitur oportet medicamenta abundè quidem efficacia, sed quæ nō ualenter erodunt, quæ est istud, Glaucii, thuris, alcyonii, bituminis, sulfuris,

sulfuris, gummi, singulorum uncia, aceto inungitur. ALIVD. Picem aphricanam cū aceto coctā liquatamq; illinito. ALIVD ad impetigines & pruritus. Atramenti sutorii, sulfuris uiui, nitri, thuris pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto, in pruritu autem, uino utitor. ALIVD. Leichenicon, ab impetiginibus curandis nuncupatum. Guttæ amoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æquales portiones aceto illinuntur.

*De Pruritu.**Cap. IIII.*

P Ruritus qui senibus accidit, ex toto nunquam confanescit, uerum lenitur infra positis remediis. in reliquis ætatibus, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus putris uel etiam falsus est, per ipsius uacuationem tollitur. Porro cognoscitur ab ætate, temperamento, uictus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in uenis simul cum sanguine redundare uideatur, à sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis peccet, congruis eo medicamentis uacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandum: quippe uitium uix inhumescit, derergitur autem fœnugræci decocto, aut betarum, aut furfurum, aut maluæ agrestis, & satiuæ, aut ptisanæ. Præter hæc, farinæ etiam fabaceæ, uel lupini, uel myrobalani, uel smegmatis ex pepone præparati, quod *πεπόνωντον* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidem cōuenit, forus autem ex saluæ decocto, myricæ, mercurialis, origani, pulegii, baccarum lauri, cucumis syluestris radicis, capparis, lixiuio, & oxalme. Deinde respergunt arido nitro, uel cū fœcula aceti, uel quod recipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulfuris uiui singulorū librā, cimoliæ libram semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris uiui, alcyonii combusti, pari modo. siccis utitor, uel cū quodam ex suprā dictis decocto. Si antē placet, etiam ueratrum siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelæo herba pedicularia contrita, uel sulfur, uel sandaracha, uel omnia, uel sinapi cum myrobalani expresso, & oxelæo, uel utere cochleis combustis leuigatisq; mellē, uel rumicis radicibus, uel smegmatis inde cōfectis, ut in capite de elephantia comprehensum est, aut quibusdā ad scabiē efficacibus. Si autē exulceratio partes excreuerit, parygro, uel

diapompholygos appellato medicamine utendum, uel ceræ uncia liquefacta in cyprini cyatho, cui sulfuris adiecta sit uncia. *ALIVD* ad pruritus. Nucum agnarum raucidarum uncia, sulfuris tantundem, apij succo leuigatis utitor in balneo, membra affatim defricans. Hoc solum multis tum scabiosis, tum alio pruritu retentis, abundè fuit. Item apium per se uiride tusum infricatumq; in balneo uehementer auxiliatur. Similis effectus est perdicion, & acerna resina cum rosaceo soluta, illitaq;. *ALIVD*. Oryzæ puræ & nimius candidæ, uncia tres, tusæ cretæq; aceto quàm acerrimo læuigantur, donec sordium fiat spissitudo, adijciaturq; priuatim sulfuris uiui detriti uncia. mixtis perbellè in balneo utitor, diutius defricās. At in iis qui superfluitatibus magis redundant, pari portione illorum temperata, præstantius remedium reddetur.

*De Leuca.**Cap. V.*

Leuca, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ uiscosa, glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam uerò non quælibet leuce curationem recipit, notas ipsius tales habeto. Acuper summa leucem pungito, sed cute non penitus: & siquidè sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior euaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet, non consanescit. Et quæ plura corporis loca obsidet, leuce, difficilius tollitur, quàm quæ pauca deturparit, item uetustior, quàm recens minus in medicina spei habere cēsenda est. Nonnulli igitur adustionem quæ ferramento candente administratur, in leuca probarunt, sed ita, ut hæc uel sola ualitudini sufficeret. Alii uerò dolorem inde cicatricemq; secuturam ueriti, ut quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem aiunt concolorem efficere, uşi sunt. Alii, & horum inefficiam repudiantes, tincturis uti maluerunt, imposturæ potius quàm auxiliirationē habentes, quæ sanè omnium maximè uitari debent, q̃ affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis uti medicinis consiliū est, ad arcæ seminis roris marini, sulfuris uiui, singulorum paria pōdera, tusa & in cerniculo priuatim creta, deinde simul cum aceto in puluerem sat multis diebus detrita, in sole illinuntur, nō cumulatè, ne cutis exulceretur. Procedente autem tempore
Tueratri

tuera tri & gallæ similiter momentum adiicitur. *ALIVD.* Fici nigrae furculis, aceto maceratis, contritisq; misceto, aphronitri, sulfuris ignem non experti, myricæ fructus, parem singulorum modum, ubi nitro cutem defricaueris, perungito: solique exponito, animum attendens ne exulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis uiuæ eo quod satis est mixto, similiter usus est, uel infricatas (inquit) leucas, albo ueratro, donec sudore diffuentes reliquo corpori concolores fiant, illinito synopide, uel mediade, uel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cum aceto, uel prius absterfis, ut est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem affatim infricato

† In ueteri lib. hæc est scriptura, λευκὴ ἄλλεβόρα, uera tri albi.

De alphi albo, & nigro.

Cap. VI.

Alphi cognato leucis modo generantur, sed illæ quidem altius cutē mutant ut pilos quoq; sibi similes procreent. Alphi aut summam cutem infestant, quanquam & ipsi cum uerustatem sentiunt, penitius recedunt: ut etiam albos pilos producant, idq; humoris qui subest ratione. Etenim ex pituitoso humore albi ducunt originem, nigri autem ex melancholico, utrisq; igitur commune prodest auxilium, elota calx aqua soluta, aut dracūculi radix, cū aceto applicata, simili modo utrunq; ueratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio superfusa, eorumq; farina, ex aceto, uel oxymelite inducta, iam capparis radicis cortex cum aceto, liliq; radix cū melle, cæpa ex aceto in sole illita, crododili terrestres simus idem præstat, pari efficacia & sturni excrementū, cum oryzam duntaxat ederit, sepiaq; testa cōcremata. Compositum uerò hoc præstans est, Alcyonii, nitri, singulorum sextans, uera tri albi, sulfuris uiui, singulorum uncia. Nonnulli uero & stoces uini combustas adiiciunt. *ALIVD.* Sulfuris ignē non experti, nitri spumæ, singulorum drachmæ quatuor, seminis toris marini grana septem, teruntur cum aceto. solum uerò alphi perungito, sed ita ut integram partem nō attingas, siccatum medicamen aqua frigida eluitur. *ALIVD.* Farinæ lupini, buccinorum, & nitri singulorum choenix, uera tri albi, drachmæ octo. Arido pars defricatur. *ALIVD.* Erui farinæ libræ duæ, erucæ seminis, anygdalarum amararum, cucumis syluestris

uestris radicis, singulorum libra: mulso simul leuigata delinuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, uaros, & cutis sordes.

Ad Alphos albos experta.

Sulfuris ignem non experti, sextarii duo, calcis uiuae candidae, Suncię quatuor, albumina ouorum quinque, olei nardini, & aceti momentū. sulfur primū in puluerē cogitur, mox oleū nardinū ei superinfunditur, rursusque leuigatur, deinde acetū instillatur, & iterū teritur, calcē uero priuatim lotā semel, bis, tēue, sulfur adijcimus, una cū ouorum aquato, & denuō cōterimus. collectus humor effunditur. pauxillū uerō relinquētes, ut unguentū queat illini, in hūc modū utimur. **ALIVD** probatū. Sulfure uiuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex aceto utitor. **ALIVD** Archigenis. Fici foliorum quae in umbra exaruetur, sulfuris, aluminis singulorum aqua portio cum aceto inungitur, aut foliorum fici drachmae quatuor, nitri drachmae duae, alcyonii combusti tantundem, aceto in balneis illinuntur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perungitur. albos uerō tollit atramenti sutorii, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus, sine pingui infricatur, illiniturque, uel cachryos, sulfuris uiui adarcæ aquae portiones, ex aceto pertrite infricatur, illinunturque, cum inaruerint abluito, locum perfri-cans. Idem facit & leucis.

Ad Stigmata, ex commentarijs Archigenis. Cap. VII.

Stigmata curabis, si quod matulae adhærescit, cū aceto quā acerrimo illinas, uel calcis uiuae partem uuam, nitri tosti fului dimidiam, cum aqua in sole illinit. At ubi exulcerationem fuerint experta, cicatricē tanquā ulceri inducito. Crito uerō iubet confricatae nitro prius cuti terebinthinam illini resinā, linamentisq; ligatā sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, & sanguinē qui flueret spōgia detergi, interiectoq; breui tēporis spatio, tenui sale confricare locum. Tū imponi, ad dies quinque, medicamentum quod recipit, thuris, nitri, calcis uiuae, cæræ singulorum drachmas quatuor, mellis octo. Quum. n. à parte medicamentū deposueris, nigrū in eo offendes **ALIVD** unguētū Piperis drach. duae, rutæ drachma qua-

mæ quatuor, sandarachæ drach. quatuor, auripigmenti drachma mellis quod satis est, cuti prius nitro infricata illinitur, itē aliis priori cōsimiliter peractis, per triduum soluitur, & nigræ absterfa, rursus inungit. Exerit. n. (inquit) diebus uiginti, tam integrè, ut nec exulcerationē, nec cicatricē relinquat. ALIVD. quod Criticon dicitur. Thuris drachmæ quatuor, nitri drachmæ duæ, atramenti sutorii drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, piperis drachmæ tres, calcis drachmæ tres, thapsiæ totidē, auripigmēti drachma una & semis, sandarachæ drachmæ tres, mellis quod sufficit, utere quemadmodū superiore Oribasius tradit ranunculū applicatum, uel capparis folia stigmata extere. At si altius fixa non discutiantur, modicam uero cutem attingant, crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

*De exanthematis.**Cap. VIII.*

EXanthemata generantur, ex crassis in cute impactis humoribus, magisq; adhuc in superiore pellicula cū densa est. In quibus igitur, si ēt in alto humorū copia subfiterit, primū purgatio tentāda est. Nā si hoc neglecto, prius discutere aggrediari, obstrues ipsos potius q̄ per cutē euacuabis. Sin aut nullæ in alto deliteāt humorū colluuiēs, p̄ cutē uacuare oportet, nec procul attrahere, si aluo, aut uomitu uacuationem moliri uelis, sed humorum qui curi impacti sunt, curationē medicamētis experire, quæ exiūt, calfaciūtq; maximè quū lata sunt exanthemata, siquidē ex frigido admodū, crassoq; humore, talia sunt procreata. Lauri igitur tenerorū foliorum, rutæ & mannæ, æqualē singulorū portionē detritā, & lachrymā thuris oleo subactā delinito, uel betā tenerā incoctā, tritāque inducito, aut ceræ drachmas octo, sulfuris tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinē coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, oīa simul incoquito, factoque emplastro utitor. Sed coctioni sedulo assistendū est, uehementer bonū remediū existit.

*Ad epinyctidas.**Cap. IX.*

EPinyctides ulcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra, quibus diruptis, cruenta sanies defluit, per diemq; non magno pere excruciant: per noctem uero, graui magis quā pro ratione ulceris, dolore torquent. Itaq; liquor laseris aqua solutus imponitur. nam citra rofionem desiccatur, aut cicuta in leuorem detrita inducitur, aut brassica

brassica cruda cum aqua, aut apium cum polenta trita applicatur, aut alteri folia, cum melle pertrita admouentur, aut solanum per se, & cum coriandro uiridi, aut oliuæ foliis utitur cum aqua coctis: aut uuas acinis exemptis, leues, splenio illitas imposito, uel adianthū ex melle tritū. Vitari debet acriū, acidorum, & salforum esus, fomenta, balneum & insolarus.

De pustulis, quæ Græcè phlyctænæ dicuntur. Cap. X.

Pustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, ut humoris colluies habeat emissarinm. Deinde humore leuiter expressio cutis præposita finitur, donec impleatur. At si uulnus cōtineat, denuo pustula perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis astricta, seruanda quandiu id quod sub ea exulceratum est, ad cicatricem peruenerit. Priusquā igitur pustulæ aperiantur, cocta lenticula cum aqua leuigata inducitur, uel mali granati uirgulta, cinere calido reperfata imponuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & ulcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spumæ detritæ mistus, in linteum quæ illitus admouetur, uel lilij radix in aqua cocta tritaq; cum cerato imponitur.

Ad epinyctidas, & phlyctænas.

Argenti spuma & sulfur ignem non expertū pari portione cum aceto applicantur, item myrtus in læuorem redacta, sordium illitione cum oleo & uino, benefacit, tum his, tum calidis eruptionibus, & papulis feruentibus, gliscentibus capitis ulceribus, furunculis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdena, & quod ouis præparatur.

Ad ambusta. Cap. XI.

Ambusta medicamentis indigent quæ modicè abstergāt, non euidenter calefaciant, aut refrigerent: Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisq; leuis terra illita cum aceto nō admodū acri, uel aqua, præclare facit, prohibetq; pustulas excitari. itē oui albumen crudū statim impositū, lana molli exceptū. etenim refrigerat leuiter & citra rosionē deficcatur. idē efficit aramentū scriptoriū illitum, uel lachryma thuris aqua diluta, uel lenticula cocta tritaq; uel eruus applicatur. At ex aqua calēte ustiones priusquā pustulæ oriātur, oliuarū salfarū aqua

aqua cōtinuē superfunduntur, ipsæque oliuæ salsæ cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissile, pertritum cū aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixiuium superfunditur, garo, aut muria fauetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinē coacti delinuntur. Marcellus autē hoc compositū tradit. Panniculi melle imbuti & hordei farina inuoluti, cōbusti; cineris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, butyri drachmæ octo, ceræ, seui caprilli, rosacei, singulorum drachmæ sedecim. At pustulis iam excitatis, rhus cum polenta tritum aceto applicatur, aut calcem uiuam cerato mixtam, illitam; linteolo imponitur, iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis utile est, partes exulceratæ porris cōtritis obducuntur, aut portulaca contrita cum polentis, aut columbæ fimi linteolo inuoluti combusti; & oleo diluti cinere utitor: Mirificè proficit pini aut piceæ cortex, aut adianthum aridum, læuigatum; aut myrti, folia combusta, pertrita; insparguntur. efficax autem unumquodq; horū est, & si cum cerato componitur, item quod rubræ anchusæ radicis siccæ, & in læuorem contusæ trientem recipit, ceræ albæ drantem, rosacei uncias duodeuiginti, iam quod cerusa constat cum modica cerui medulla, laudatum est remedium.

Ad eos qui flagris cæsi sunt. Cap. XII.

Cerusæ argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum susino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim susino solo utitor, uel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum integrum, sine putamine, unita cælis imponuntur, item pellis ouis recens excoriata calens adhuc circūdata, quolibet efficacius die uno, & nocte per sanat.

Quo modo pili adustis renascantur. Cap. XIII.

Pili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut caricæ drachmis octo, sampuci drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, utitor, uel detrimenti lapidis drachmas centū, eris squamæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in usu partem unam cerati partibus octo diluito.

Ad

Ad abrasa, quæ aposyrmata Græci dicunt. Ca. XIII.

Abrasæ & superficiē infestantia ulcera, primū aut uino, aut aceto, aut muria aceto mixta quæ oxalmæ dicitur astringes. Deinde medicamētis, ad cicatricē ducēdam utere, tum liparis, tū ex albis emplastris trypheris. Sūmē autē facit qđ cerusæ partē unā recipit, ammoniaci dimidiā, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in læuorem trito cerusā miscetur, myrteumque superfunditur: utitor lapata. Vel lapidis detrimento, squamam æris admisceto, & myrteo in læuorem coactis utitor, aut cimolia, & argenti spuma, ex uino, ricininoque & myrteo tritis utitor.

Ad abrasa, intertrigines, inueterata ulcera, senilem teneramque cutem.

Argenti spumæ chrysidis drachmę quinquaginta, ceræ drachmæ uiginti, resinæ sicæ ex picea drachmæ duodecim olei sesquicyathus. Argenti spumæ oleo incoctæ reliqua adii-
ciuntur: rudicula agitatis, uel etiam in pila emollitis utitor, sed cutem abrasam ab ulceribus non oportet amputare, sed medicamentum ei inducere: sic enim glutinabitur, uel nigrescens, At ulceri, quod eroditur, sordidumq; est, si carne nudum hiat, uix cicatrix obducitur. Cæterum abrasa tuetur ab inflammatione, rhu rubrum, si illinatur læuigatum, cum melle, aut lentisci coma cremata, & cum melle imposita.

Ad abrasa, flagris cæsa, & articulorum contusiones medicamētum, quod dolorem leuet anodynnon appellatū.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū uncia decem, ceræ uncia sex, olei puri, aut rosacei sesquilibra, amyli uncia duæ. Ad eadem ualet Pelarion quoq; ex helcysmate, id est, recremento argenti paratur, item medicamentum quod ouis constet.

*De formica & uerruca.**Cap. XV.*

VTrunque uitium, cutis excrementia est exigua, callosa, & plerunq; figura teres: sed formica, quæ Græcè myrmecion dicitur, latiore basi, † similem si quis non trectet mordētis formicę sensum inducit. Verruca autem, quæ Græcis uocatur acrochordon, angustiore, ut chordæ summo assimilata, pēdere uideatur. Hos igitur tumores, elateriū cum sale infri-
catum tollit, thuris lachryma cū aceto, grossi cū aceto, farina,
& nitro,

& nitro, liquor fici illitus similiter facit: tithymalli, smaridis ca-
put salsum concrematū, ærugo cū sulfure ignem non experto
combusta, ocymi foliacū atramēto sutorio, sarmentorū adhuc
uiridium ustorum quod distillat, simus ouillus cum aceto, hirci
num fel illitum, heliotropii magni semen, cum uino applica-
tum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum urina pueri uene-
rem non experti, stercus bouis gregarii in aceto.

† Huius loci duplex est scriptura, una in uulgatis codicibus,
καὶ πρὸς τὰς ἀποφύξεις ὁ μόλις αἰσθάνειν, id est, si quis deradat sen-
sum mordentis formice similem inducit: altera est, πρὸς τὰς
ἀποφύξεις, id est, si quis constringat.

De Ganglio.

Cap. XVI.

Ganglium neruorum concretio est, ex ictu, aut lassitudine
oboriens, in pluribus quidē corporis partibus, præcipuē
uero motui dicatis, nēpe manu summa, & pedibus. Quo
in uitio Archigenes calcē uuā unā cum adipe anserino, & tere-
binthina, imponendā censet. Doles uero medicamento, quod
lapidē achatē recipit, utitur. At Oribasius, eo quod subsequi-
tur, cerusæ, resinæ, è pinu, olei ueteris, singulorum uncia, am-
moniaci suffiminis, galbani, singulorum tantundē, ceræ uncia
quatuor, aut pilā plumbeam (inquit) crassiorē uertebræ modo
ganglio ampliorem imposito, deligatoq; pondere siquidē lon-
giori temporis spatio ipsum dissoluit, atq; hoc nos utimur.

De inflammatione.

Cap. XVII.

Omnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, feruor-
que adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas
appellare cōsueuerunt. Verū pro diuersa quæ ipsos fa-
cit, materia, hi quoq; euariant. Cū enim sanguis probus, & cras-
sitie mediocris, in particulam aliquam subito confluxerit, ac
propter copiam impactus inhæserit, inflammatio propriē ap-
pellata nascitur. Cū uero flaua bilis in parte aliqua substiterit,
herpetēs: ubi & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipe-
las excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impense, &
crassus fuerit, carbunculos mouere solet. Itaq; ab inflammatio-
ne quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper ac-
cidit, incipiendum esse iudico. Tumor rubens, dolorificus tan-
genti renitens, & calidus ex sanguine, ut à me dictum, est pro-
bo originem trahit: qui, sanguinem dico, nunc ex toto fer-
tur

Nota

tur corpore, nunc in aliquam particulam copiosius incumbit, sic ut à uasis nequeat contineri, exciditque aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Sæpe uero uirium hoc uulneribus, fracturis, ulceribus, alijsque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio repente euestigio particulam quampiam sine manifesta causa præcedente obsiderit, totum uerò corpus, parti contagium transmittat, uniuersum quidem id, sanguinis dimissione, uacuari oportet. quod autem inflammationem experitur, superfundere ac obducere medicamentis, quæ non calefaciant, humectentque, sed illuuiem humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectam partem se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semper uiuo, mali punici corticibus, uino incoctis, rhu & polenta. hoc & similibus cum dolor uehemens non urget utendum est. Vbi uero particula fluxionem cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua oleum uel adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, ut quæ fluxionum uitiiis omnia sint inimica, doloris tamen uehementia leniri eo quod constat passo, rosaceo, ceraque modica, & lanis sordidis quæ œsypi multum contineant. Per æstatem quidem frigida, hyeme tepida excipiuntur, applicanturque, sed ita ut superiores quoque affectis partibus loci, spongia uino austero imbuta, aut posca frigida comprehendantur. cæterum miscentur cum cataplasmatibus utiliter etiam herbarum. Parietaria igitur ad omnem inflammationem accommodata est, tum per initia, tum in augmento, consimiliter glaucium, atriplex, malua, lactuca, cucurbita, calidis illitæ, benefaciunt & tribuli utriusque inflammationibus ex influxu concitatis. brassica uero durefcentibus ualet. At ubi immutatio his oboritur, nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili fluxionibus dicato, lanam uerò putam uino austero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac ratione inflammationibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas autem quæ occasione cuidam feruntur acceptæ, si calefacias, humectesque, non offenderis, ac si usus quandoque postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia, malum quoddam haud mediocre ægro-
tanti accerfes.

De

De exterioribus corporis abscessibus. Cap. XVIII.

Quod si fieri non posse tibi uideatur, ut suppurationem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam hordeaceam consimili præparatam modo. particulâ iure radicis althææ incoctæ fouebis. At si tumor ad suppurationem contumax est, aut egrè discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis utere: oportet autem ficus dulces pinguesque incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarû in tenuis mellis speciem cogi, farinamque hordeaceam adijci, & si quidem tumor discutitur minus autem ac conuenit, cû ficis siccatis incoques hyssopum, oryganumue: si uoles magis intendere, salê decocto inijcies, diligenter animum aduertens, ne siccando nimium pars in scirrhum occalescat. Tale si quando uideris, cucumis syluestris radicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques, ualentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumque medicamentum, quod dracunculo constat, ualidè huiusmodi uitia disijcit. Nonnunquam igitur solum hunc, decoques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinamque simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores, incoctosque tumores, & concoquit, & discutit. Item pix duros ac crudos tumores uniuersos cataplasmatibus indita concoquit, magisque liquida. **MEDICAMENTVM** compositum quod abscessus iam coctos expellit. ut subinde pus in splenio reperiatur. nondum uerò coctos in totum discutit. Lapidis pyritidis drachmæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti drachmæ sex, exceptum pice, liquida, pellicque illitum imponitur. Splenium uerò non prius aufertur quam sua sponte deciderit sed medicamentum non multo antè præparari debet, ut quod confestim siccescat. In his autem si tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, id ipsum uacuabitur, cura deinceps adhibita ne oleum, aut aqua ad moueatur, uerum si uulnus abluere interim oportet, aqua mulsa, posca, uino & mulso utendum est. Si uerò inflammatione conflictetur, ex lenticula cataplasma inducitur. ubi inflammatio abest, alio quodam emplastro medicamento in huiusmodi sectionibus utemur. quinetiam eo quod constat chalcitide. Cæterum super ipsis iniicitur spongia lanaue uino austero imbuta, uulneri autem nullum pingue medicamentum accom-

PAULI ÆGIN.

modatur,

modatur, quale est tetrapharmacum. nam uehementer postulat successore.

† Hic locus est expressus in ueteribus lib. τὰ μὲν ἡδὴ πεπεμαμένα τῶν ἀποδομημάτων ἀπόνως ἐξήτης δύνατον, id est, quod abscessus iam coctos nullo negotio expellit.

Quæ abscessus rumpant.

Quoniam nonnulli abscessus ferramento diuidi non sustinent, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extrahendo dicta sunt epispastica: narcisci radix in pollinē detrita, ex mulla cū irino cocta applicatur, uel tenera arundinis radix, minutim detrita cum melle. quod si dura fuerit, mulsæ prius incoquetur: uel aristolochiam cū melle applicato, rumpit autem picis aridæ & propolis creticæ par modus, cicatricemq; inducit.

Dyonisia ad abscessus mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quæ per latētes meatus discutit.

Olei ueteris, aquæ singulorum libra, hydrelæum incoquitur paulatim mox, aphronitri uncia sex adijciuntur, misyos uncia una uel duæ, incoquantur donec manus non inquinent. Deinde miscentur mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum uncia sex.

Ad neruicos abscessus.

Ceræ, colophonix, butyri singulorum libra, picis arieæ, mellis, singulorum libræ duæ, uncia sex, eruginis uncia tres, uisci quod satis est. A L I V D. epispasticum. Suffiminis ammoniaci selibra, ceræ, terebinthinæ, singulorum triens, sulphuris uiui quadrans: nitri quadrans. Similion autem medicamen appellatum, & quod porris constat, ualidè tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succum recipit, per cōmodè discutit, mutat, rumpitq; At mitioribus abscessibus medicamenta congruent etiā ad parotidas inscripta. Atq; hæc de abscessu, qui ab inflammatione emanat. Galenus autē memoriæ tradidit abscessum nulla præcedente inflammatione consistui, quæ ex probò sanguine habet originem. Statim siquidem ab initio (inquit) humor aliquis aliàs specie alius, in parte quadā collectus, uicina illi corpora excoriat tēpore, & à subiectis dirimit. Sanè inueniuntur in huiusmodi abscessibus cū scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tum humorū, tum solidorum quorundā corporum

porum species. Etenim stercore, urinæ, grumo, humori mel referenti, mucosq; : ad hæc ossibus, unguibus & pilis, consimilia corpora reperiuntur, imò & animalcula subinde inuenta omnibus propè quæ ex putredine subnascuntur simillima. Præterea in abscessibus potissimum inueteratis, qui humorum ex loco in locum decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides, arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sordes, amurcam & fæcem repræsentent. Quare absolutior exteriorum maximè corporis abscessum significatio compendiosè tradenda est, tum eorū qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaq; est carniū seu partium carnosorum, nempe musculorum, uenarū, arteriarum corruptio, mutatioq;. In genere abscessuum nonnulli tunica comprehenduntur, ut atheromata, stratomata, melicerides. Alij sine tunica constituuntur, quæ generis uocabulum usurpant, unde sermo hic noster procedit. Porro abscessuum generationem plurima parte inflammatio præcedit, de qua disceptatum est. Interim protinus ab initio, quemadmodum nuper dicebamus enascuntur. Comites abscessuum sunt, igneus loci feruor, tumor eminens, ruberq; magis ac antea, durusq; cum dolore punctorio, pulsu & grauitate, ut aliquid ex particula suspensum esse uideatur. Quod si uerò locus in signis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissimum dolor fatigat, & febricula. Est cū inguinis inflammatio, proximis in glandulis excitetur. Vbi uerò abscessus in totū fuerit absolutus magna parte decrescit, punctus obueniunt pruriginosi, & leuiter stupidi, tumor in mucronem acutū magis fastigiatur, tactu lenis, cedensq;, superficies in uertice auellitur. Dico autē hæc de his qui foras rūpuntur. Si igitur uel medicamentis, uel sua spēte rupti fuerint emmoto medicamine, curationem tētabis, parte iam purè uacuata: sin aliter accidat, aperire ipsum in eū modū oportet, quē in chirurgica explicabimus.

De Gangræna, & Sphacello. Cap. XIX.

CVM inflammatio, neq; discutitur, neq; in pus mutatur, sæpæ in gangrænam, & siderationem, quæ Græcis dicitur sphacelios, incidit, de quibus iam sermonem instituiamus. Gangrænas, enim appellant, cū membrū aliquod ob inflammationis, qua cōflictatur, magnitudinē emoritur: neq; iam confirmatas sic dicunt, sed quæ etiam nū fiunt. Eius mali-

t z usi

uis est, ut nisi celerrimè succurras, facilè affecta pars, quatenus uicina comprehendit, mortis habitum repræsentet, & hominè iugulet. Vbi uerò membra sic uitiata in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænâ, sed iam sphacelum nuncupant. Quin & ossibus hoc mali accidit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sanie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpsêrit. Cum itaq; membrum ex toto, uita, sensu motuq; priuatum est, confestim præcidi oportet quàm proximè sanæ parti. Gangrænâ uerò curamus, sanguine ex parte uitiata affatim emissio, uel enim uena incisa sanguis corruptus, cum uena amplior in ipso membro appareat, detrahendus, uel cute totius corporis diuisa, multis altisq; plagis. ubi uerò sanguinem emanare permiserimus, medicamentum aliquod putridis consecratum induci debet, quale est, farina erui, aut lolij aut lomentum, ex oxymelite. Quod si ualentius imponere cogites, salè adijcito, aut pastillū Andronis, aut eius generis aliquem. Faciunt ad gangrænas, & uetustæ nuces: cortex autem ipsas expurgat: item liquor tithymalli tempestiuè & mediocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorū amarorum decocti jus superfusum. Nonnulli uerò ubi putridam partem præciderint, quo securius mali radicē euellant, candens ferramentum adigunt. in quibus sale cū porro utendū est. Vt autē crustæ citius decidant, cataplasma deinde accommodatur ex pane, uel hordeacea farina, uel triticea ex hydrelæo incocta. Itē medicamenti cephalici puluis ex melle, tetrastemon, & Macedonī cum ut appellāt, utiliter imponitur. Iam panis cū apio tritus, aut ocymo, sic iris uel panax, uel aristolochia, uel acorū cum melle, uel thus, crustas probè separat. Idē præstat Macherionis medicamentum, & Ihs linamento illicita ex melle. In tenebris autem corporibus abundè est etiam erui farina ex melle.

Ex Oribasii commentarijs ad Gangrænas.

AEruginis rase, minij, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangrænis illinitur, scalpello undique exasperatis. Item lolij farina cum raphano & sale, nonnunquam etiam aceto. uua passa acinis uacuata, cum corticē ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iuglandium medulla, myrti folia uino incocta, tritaque ex melle: raphanus cum aceto, crustas etiam ad ossa usque rumpit.

De

De Herpete.

Cap. XX.

CUm bilis flaua nullo mista humori excreta in particulam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur. Si quidem substantia crassior sit, acriorq; totam cutem adusq; carnem subiectam exulcerat, uocaturq; herpes exedēs. Si uerò tenuior & minus acris calidaque, pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinē, herpes miliaris dicitur. At Oribasio authore, pituita cum flaua bile mista, miliarē herpetem creat. Corpore igitur toto medicamine quod ducendæ bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaq; inducuntur, principio capreoli uitis, rubi, & plantaginis applicantur. postea uerò, lēticula his miscetur, interim & mel & polenta. Item cataplasma, quod ad inflammationes ex confluxu inscriptū est exempto semper uiuo. Verū exulcerata pastillis inunguntur, passio, aut uino tenui & austero non ueteri, aut posca aquosa solutis inducitur & glaucium, eiq; con similia ex aqua. Cum autem nihil proficit acetum admiscetur. T succo autē plantaginis, aut solani, aut uino diluta magnificē auxiliantur: aut lini semen torridū oleo uinoq; incoctum, inq; læuorem redactum imponitur: aut terra cimolia, solani subacta succo perungitur, & argēti spumæ uncia quatuor, porri succi cyathi dimidiū, betæ succi tantundē, læuigata illinuntur: at inueteratis iam hmōi ulceribus, Musæ pastillus & Andronius effi cax est. **ALIUD** ad herpetem pustulosum. Recrementū plumbi ex uino austero læuigatū illinitur, superiniiciuntur betæ folia uino incocta, uel ceræ triens, myrtei uncia sex, stercoreis plū bi triens, uino diluta illinūtur: at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremēto utitor, aut lente cocta cum melle partem obducito. Ad herpetem uerò qui sub cute affligit, retri mentum plumbi, rutæ læuigatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in uicem rutæ. **ALIUD** Lanæ ueteris illotæ, circa tedam combustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ drachmæ uiginti quinque, recrementi plumbi uncia una. S. seui caprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ uiginti quinque, myrtei uncie quin que. **ALIUD** ad herpetas acutē depascentes, corii mali punci dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanæ illotæ circa tedam combustæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerusæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, uino aut myrteo excipiuntur.

†Hic locus sic legitur in ueteribus καὶ χυλῶ δ' ἐ ἀρογλώσσῃ
ἢ ἀρβύχῃ διείς, καὶ ἐ φήσας δίνω μέγας δύνεις, id est, & succo
plantaginis aut solani, & ubi ex uino coxeris multum iuuabis.

De erysipellate.

Cap. XXI.

Galenus tumorē ex feruente & tenui sanguine conflātū priuatim quidē & propriē erysipelas, appellauit: cū uerò ex ambobus, sanguine & bile constat. utiq; ab eo qđ in mistura superat nomen uitio indidit. Etenim ubi sanguis excelebat, inflāmationē erysipelaceā, ubi bilis flaua præpolleret, erysipelas inflammatoriū dixit. Verūm cōmunius tumorē ex sanguine & bile calidioribus factis conflātū. Erysipelas appellauit. Vtro autem modo dicas, nihil adeò ad præsidiōrum usum interest. id uerò scire oportet erysipelata quæ capiti potissimū oboriūtur, plus facessere negotii, adeoq; esse periculosa, ut nisi efficax cōsequantur auxilium, interim quoq; affectos strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab initio uena in cubito præsertim humeraria debet incidi. sin autem hæc non appareat, eā quæ se conspectui obijcit. At si quid sanguinis dimissionē impediat, purgatione utendū ex medicamento quod bili ducēdæ est. Hac sanè & in aliarū partiū erysipelatis uti, uel clysterijs efficacioribus oportet, tū ipsis illinere quæ influentē materiā refrigerātium uirtute repellunt, collectam uerò, calefacientiū mediocriter & humectantiū discutiāt priusquā particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura ut perliquida inungantur, ita ut frequētius immutētur, primis per spongas molles ablotis, siquidē multus particulæ feruor celeriter in uaporē erūpens, hæc desiccat. Cæterum requirūt erysipelata per initia, ut dixi, quæ refrigerent cū humiditate, nō astringant: quale est semper uiuum, portulaca, psyllion, lentacula palustris, seris, cucurbita, solauum, altercū, lactuca, glaucium, item apiū, & rhamni folia per se uel cū pane inducta, itē ceratum ex aqua admodū frigida. His miscetur ēt opii aliquid, lachrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ. Iam cōposita medicamenta inducūtur, fietq; ceratū, cera dealbata rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino sine sale confecto: his in pila emollitis, aquæ frigidæ superfunditur, quantū potest recipi. Si uerò aceti tenuis & pellucidi momentū temperes, præstātius

stantius medicamentū habiturus es. Item polenta cum herba quadam frigidior ex iis quas enumerauimus affatim membrum refrigerat. Idē efficiūt palmulæ pingues cū horū aliquo mixtæ. Ad hæc pars ēt delinetur cerusa, uel terra cimolia, aut figulari cū solano, aut argenti spuma cū rosaceo, aut chalcitide cū oleo passoq; aut cerusa cū aceto & lycio, uel acacia cum aceto. Cū feruor remittit utendū simplicibus quidem, sulfure uiuo & menta cū oxyrhodino, aut ruta cū absinthio, aceto & oleo, aut argēti spuma cū porri & betæ succo, cōpositis aut, priuatim in capite hoc pastillo. Argēti spuma, cerusa, croco, sulfure ignē nō experto, opioq; cū passo. Cōiter aut omnibus, minio sinopico, chalcitide, misy tosto, erugine rasa, atramēto suto rio, alumine scissili pari pondere ex aceto utitor. ALIUD. Sulfuris uiui, cerusæ, opii, acaciæ paribus singulorū portionibus ex aceto. Cataplasma ad erysipelata, herpetas, abscessus, parotidas & ambusta. Altheæ nouellæ soliorū tenerorū libra. cocta in hydrelæo perbellē teruntur. adiectoq; rosacei triēte, argenti spumæ, cerusæ singulorū uncijis duabus & semisse, iterū læuigātur cū succo coriandri, aut semperuiui, aut solani deinde micis panis adiunctis ut emplastri formā induat, illinitur. Hoc aut emplastro utitor quod recipit recinini pondo, myrtei pondo, unguēti quincuncē, argenti spumæ trientē, æruginis rasæ sextantē. Aerugo & argenti spuma aceto læuigātur. Ceratū ad erysipelata & ambusta. Ceræ albæ triens, rosacei quadrans, oua sex, perdicij herbæ triens. Vbi uero inflammatio mēbri conquieuerit, aut uetustatē experiatur, cataplasma illi, priusquā liueat, ex cruda farina ordeï est imponendū. Quod si liuor iam occuparit, cute scarificatu incisa, cataplasma induci, locusq; perfundi ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim conducet, quinetiā ipsi cataplasmati talis aqua, uel acetum, uel muria cum aceto misceatur. Deinde cōmemoratis medicamētis cōpositis cura adhibita uti licet. Nam si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem conuertitur.

De phymate, bubone & phygethlo.

Cap.

XXII.

AVtore Galeno, bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio, phyma

4

autem

autem glandulae inflammatio ad suppurationem spectat. Aliorum uero quorundam sententia cōter omnes, qui à natura abhorrent, ceu abscessorii tumores quacumque corporis partē obfideant, phymata appellantur. Siquidem Hippocrates in hunc modum scribit. Quibus phymata urinarium meatum exercēt, hi abscessu in uomicā erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis ulceribus, aut doloribus cōtrahuntur, periculo uacant: febribus aut superuenientes, qui plurima parte ex pestilētiā lue solent incidere, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint. Verū priores initio, quēadmodū inflammatio, quaelibet, auxiliis repelluntur, quae refrigerant astringuntque, uel spongiis ex posca impositis, uel lanis oleo crudo uinoque imbutis, uel rosaceo, uel melino, uel lentiscino, uel myrtheo, deinde iis quae digerunt utendum. At si corpus uniuersum succis æquabiliter redundet, prius ipsum uacuari conuenit. ubi iam inanitum est, ulceris in quo id prouenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de ulceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tentetur, lanis oleo quodā laxante, irriguis, rectē lenitur, totumque ipsis membrū inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non promptē diuidere, sed medicamentis quae cerati specie referunt, discutere nitentur, cuiusmodi potissimū est ex perano confectū. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per hanc non discutitur rumpere adgrediemur, aliorū abscessuum modo, similiterque illis mederi. In iis autem qui ob febres aut omnino humorum abundantiam procreantur, cauere debent repellētia, ne materies penitus detrusa cursum repetat, sed ab iis quae discutiunt, statim curationem incipere consilium est. Si autem nihil prohibet, nempe aut ætas aut uirtus, sanguis prius è cubito dimittetur. deinde loco fomenta inducentur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maximè ex iis quae tertio uolumine ad parotidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis quae nuper contra inflammationes prodidimus, quemadmodum etiam phygethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati accommodatis petetur. After atticus herba quam & bubonion, quasi dicas inguinariam, ea ipsa de causa uocant, non solum illitus, sed etiam contactus, bubonibus auxiliari creditur. Phymata autem priuatim discutit adianthum si illinatur, atriplex, parietaria, altheæ radix uino incocta, ammoniacū cum

cum melle emollitum inductumq; uiscus cum resina, cerato-
que. Rumpit autem abscessum propolis, lupini amari ex aceto
illici, cucumis syluestris radix, terebinthina excepta, cappar-
is radix similiter, nitrum cum fermento, aut ficis.

† In antiq. codicibus quædam leguntur quæ in uulgatis exē-
plaribus desunt. Phygethlon enim ita describitur, φέγεθλον δὲ
τὸ φλεγμονῶδες ἐρύσιπελας, ἢ ἐρύσιπελατώδης φλεγμονὴ τῆς
ἀδείας i. Phygethlon autem est erysipelas phlegmonodes, uel
erysipelatodes phlegmone glandulæ.

De furunculo, qui dothien appellatur.

Cap. XXIII.

Furunculus, tumor est abscessum præ se ferens, qui ex
crassis humoribus in carnosissimis partibus concipi-
tur, mitis quidem, cum in sola cute coijt: perniciosa au-
tem, malignusq; ubi subter actis radicibus in superficiem erū-
pit. Dissipat autem furunculū, triticum mansum & imposi-
tum: mastichæ ægyptia, uux passæ quibus acini sint exempti
cum sale tritæ, ac admotæ hunc aut dissoluiunt aut rumpunt, uel
siccæ fici hydromelite incoctæ imponuntur, uel resina ficis mi-
sta inducitur, uel ipsæ ficus siccatæ cum fuerint pingues disse-
ctæ, uel fermentum cum nitro, uel lini semen cum melle, uel
alterci folia, trita cum butyro. Composita uero hæc proficiūt,
quod ex fermento, quod polline farinaceo constat, & quod pri-
uatim à furunculo græcè dicitur dothienicon, fomenta autem
adhibentur ex spongiis mollibus continuè calenti aquæ intin-
ctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur.

De terebintho.

Cap. XXIIII.

Oribasius terebinthum sanè phymatis speciem esse af-
firmat, in cuius extima parte pustula nigra incumbit:
hac rupta id quod subiacet abrafo simile apparet. ubi
scalpello diuiseris, pus inuenitur. Dioscorides autem Alexan-
dræus literis mandauit terebinthos cutis esse excrescentias, ro-
tundas, nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atque has
aliis phymatum tumoribus similiter curari censet: auxilia ex
supra comprehensis huc transferenda.

De carbunculo.

Cap. XXV.

Cum sanguis magis melancholicus effectus inferuescēt-
que aliqua se parte receperit, carbunculus fieri solet,
quod

quod ulcus est crustaceum plerumque à pustula ambustis confimili, interim uero & sine hac incipiens. Cæterum inter initia, quibus hoc malum instat, in particula omnino pruritus sentitur, deinde pustula, nunc una, nunc plures tenues exoritur, miliorum quorundam instar: quibus perruptis, similiter crustaceum ulcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant, modo crusta ipsa cinereum colorem, modo nigrum præferente, sic ut inferiori carni continua adhærescat, & quodam modo affixa sit depascaturque. Reliqua autem caro circumposita, feruidam refert inflammationem, quam Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splendetque bituminis & picis modotalis autem est bilis exacte atra. Verum carbunculi, qui carnem inuaserint, confestim circūscribuntur: qui membranas, nervosque occupant, diutius remanent, luumque subiectis corporibus impartiunt, ut etiam inflammationes quæ erysipelatis naturam resipiant, in ipsis excitentur, plerisque iridem in suppurationem conuersi sunt. multis febres simul accedunt. Iam uero carbunculi ex causis populatum grassantibus excitantur. Curatio ipsorum, nisi admodum fuerint exigui, à uacuatione sanguinis è uena ad animæ defectionem usque dimissi, tentanda est: mox scarificatus recte accommodatur, plagis ob succi crassitiem altioribus: particulae laboranti inducuntur, quæ modicè reprimunt dissipantque; tale est cataplasma, quod ex plantagine & cocta lente constat, quod recipit panis furnacei micam. Est autem panis, nec omnino à fursure purus, nec nimium eius habens, super ipsum uero ulcus ualens aliquod medicamentum imponitur, cuiusmodi est Andronis, Pasionis, & Polyidæ, diluique id uino aliquo dulci, ad sordium spissitudinem debeat. Item massalioticum aridum, uel & ipsum similiter dilutum. Item radix dracunculi, uel aristolochiæ, uel liquor silphij, uel cirenaici, singula ex aceto probe delinentur. At quæ erysipelatis naturam referunt, super præ comprehensis ad id uitii remediis perunguntur. Quæ uero partes consortii lege affici putantur, succidis lanis ex cœnæo madefaciendæ sunt. Vbi iam ardor acquieuerit, carbunculis iniiciuntur cerata cephalica, diluta, illitaque in linteolis. generosissimum est quod herbis, tum illud quod nitro constat, item arida ulceribus depascentibus dicata, per se, & cum rosaceo. Cum autem durities remanet, utemur melino Serapionis, operam adhibentes, ut quam celerrime carbunculi suppurent.

Quod

Quod quidem fiet, si die bis noctu semel tum cataplasmata tū
medicamenta mutes. At quò radicitus carbunculos diuellas,
dirimasq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidū,
minutatim concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in læ-
uorem deteres, linteoq; illitum induces: cum successit, aceto
humectabis Item nucis auellanae ueteris uel etiam non uete-
ris medulla carbunculos maturat rumpitq;. Hoc præstant &
cupressi folia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum po-
lenta, uua acinis uacua, ficus siccatae uino incoctæ, papaueris
ceratidis flores, liquor silphij, cum ruta & mellis momento,
pix liquida cum uuis passis, & suilio adipe.

Ad carbunculos uehementer efficax.

Argenti spumæ libra, olei ueteris libra & semissis, auripig-
menti uncia. Oleo cum argenti spumadum manus nō in-
quinet incocto, sublatoque ab igne, auripigmentum adiicitur,
rursusq; medicamentū coquitur donec nigrescat, tritis in pila
utitor in linamenta filatim carpta illitis.

*Ad gangrænas, ulcera uetera, chironia, strumas, po-
dagram: priuatim uerò ad carbunculos,
præsertim eos qui palpebras
infestant.*

OPij, acaciæ, misyos tosti, squamæ æris, singulorū drachmæ
duæ, atramenti sutorij drachma, alterci seminis drachma,
tritis ex aqua utitor, probè facit & tetrapharmacū quod quin-
tam thuris partem contineat. Aduersus naturalium carbuncu-
los, chalcitidis, atramenti sutorij, singulorum drachmis octo,
aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis utitor. Valet stercus
quoq; ouillum, torridum cum melle. In Alexandria Serapiade
quæ orchis & triorchis dicitur uiridi, cum micis panis, cataplas-
matis modo utuntur ad carbunculos, omniaq; crustosa. Vbi ue-
rò crusta exciderit, communis ulceris modo curabis.

De cancro.

Cap. XXVI.

Cancer in qualibet corporis parte oriri consuevit, liqui-
dem in oculis, & uulua, quemadmodum in ipsorum ca-
pitibus expositū est, aliisq; pluribus particulis, sed præ-
cipuè in feminarū mammis accidit, quoniā natura fungosæ &
inanes. crassissimam atræ bilis, unde hoc uitiū cōtrahit, materiā
promptè

promptè possunt excipere, ex eo. n. humore cū referbuit, cācri proueniūt, atq; si acrior illa fuerit, cū exulceratione. Quapropter colore magis q̄ inflāmatione nigricāt, sed ita ut tantam caliditatē nō experiātur. Venæ aut̄ quæ circa sunt intumescūt, intēdunturq; , cancri animātis pedū modo, unde & appellationem hanc uitiū est sortitum. Nonnulli uerò inde sic nuncuparunt, q̄ difficillimè ab his partibus quas obsederit, euellatur, quemadmodū cancer aquaticus animās. Hoc malū planè propter succi crassitiē nō consanescit, utpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, uel quod etiam mitiora negligat remedia, uehementioribus autē irritetur, excandescatq; . Prima sanè cancri initia prohibere, ne augeant, licet si melācholicus humor prius uacuetur, quā in affecta particula radices subter egerit, impactusq; sit. uacuatio quidem primum tentāda est, sanguinis dimissione, si nihil prohibet, mox purgatione, per initia quidē ex simplicioribus petita, quale est epithymon, quatuor drachmis, & S. in sero lactis, aut mulsā exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigrum ueratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis: solani succus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus autem lana molliuscula, & ipsa succo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc siccescant secco, cōtinentius superfuso. Iam uti diutius poteris in cancris exulceratis medicamento quod pōpholyge cōstat. Nec inepta sūt, q̄ tertio uolumine de uulux cācris p̄didimus.

Ad carcinode, malignaq; tum ad sedis tuberosa ulcera, item ad naturalium uel testiculorum, uel mammarum inflammationes.

IN plumbea pila pistillo plumbeo lemniam sphragidem exposita, & mulsā, uel lacte conterito, ut nigrescat: uel rosaceo, uel immaturo oleo, succōue semper uiui, uel cotyledonis, uel lactucæ, uel psyllii, uel uuæ acerbæ tritam similiter inungito. Crebrior uictus agro dabitur, ptisanæ cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex, bletum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues præterquam palustres.

Archigenis ad carcinode, & maligna ulcera.

Cancrorum fluuiatilium crematorum, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis unā cum

unā cum cerato inducitur, item erysimi semen detritum cum melle accommodatur.

De molli & laxo tumore, qui œdema Græcis dicitur. Cap. XXXVII.

CVM de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, disputatū sit, iterū de cōtrarijs agemus, ab eo quod Græcis œdema dicitur, exorfi. Quemadmodum. n. ex biliosa fluxione, erysipelas, ita ex pituitosa, œdema latus quidam atq; indolens tumor excitatur. Equidē scimus aliter quoque œdemata prouenire, nempe in pedibus, in aquæ subter cutem affectibus, habitu corporis contabescēte, qui phthoe Græcè dicitur, & malo, qui cachexia. Atq; in illis quidē tumor hic affectus qui hominem premit accidens est, nullā seorsum, curationem propriā postulans. Satis. n. est, si quidem curatione egebit ipsa tum crura perfricare oleo cum sale, aut etiam oxYRODI no sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam influente œdema constitit, abundē quandoq; est spongia posca imbuta, cum ligamento leuiter stringente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens, suprā finiat. Esto autem spongia, modò conductura sit, recens, si huius copia non est, eam, cuius erit facultas, detergebis, expurgabisq; nitro, magisq; aphronitro, & lixiuio. Quod si per hæc tumor non subsideat, paululū aluminis iniicies, commodum autē est tenerrimū ellychnion, posca madens impositum: bonū est, & glaucium. Quod si in uetustatē œdema inciderit, parti oleo prius inunctæ spongia ex lixiuio imponitur, eiusq; uiolentiore cōstrictione curatur. discutit autem, ac comprimit tumores laxos cedentesq; quælibet terra illita, magisq; Aegyptia, tum isatis domestica.

De inflatione.

Cap. XXXVIII.

INflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis, quæ ossibus circundantur, & musculis, collecto, nascitur. Porro is colligitur aliquando in uentre & intestinis, itemque in medio horum spatii & membranæ, quæ peritonæos dicitur, ut in aquæ subter cutem genere, cui nomen est tympanias. Differt quoque hæc ab œdemate, quod pressa digitis, fossulam nō repræsentet, & sonitum tympani modo ædat, Membrorum autem densitas, tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non dissipetur. Vnde curandi ratio huic dirigenda

rigenda est, ut membra rarefacias, crassioresq; spiritum extenuas, quod medicamenta tenuissima & potestate calida praestant: atq; in uentre quidem & uisceribus oleum tenuis quod rutam habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt, cumini, apij. Interim uero & cucurbita iustae magnitudinis citra cutis incisionem umbilico bis, ter uel defixa, inflatio nem discussit. Masculis autem ex contusione, quemadmodum propulsu inflatis particulas calidis nimium, & acerbis excandescere contingit. Quare per initia medicamenta quae magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quae discutiant. Utendum igitur sapa, cum olei momento, ac ex lanis succidis calida excipiantur, uel etiam ceratum ex aescylo admiscetur, cura adhibita ut caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam aeger lenitus, sopitusque est, acetum admiscetur, & nitrum, aut aphronitrum, deinde & lixium. Postremo emplastris utendum quae discutiendi uim habet, quo inflatio sublidat, quale est quod sequitur. Sordes balnearum subferuefactae percolantur primum, ut purae euadant, & rursus lebeti iniiciuntur, tritaq; calx restincta farinae modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac utitor. Hoc efficacius est medicamentum ex sycomoro compositum.

De intortis & contusis.

Cap. XXIX.

Articulis intortis, contusisque faciunt lanæ succidæ, aut spongia oxelæo imbuta impositaq; ite bulborum elixorum pars tenerior cum melle, uiticisq; folia, sal nitrū tostū, læuigata cū cerato inducuntur. Iam superfusio aque dulcis, aut marinæ calentis utiliter adhibetur. Vbi uero inflammatio, & dolores cōquiescant, intortæ partes etiā recte perfricantur.

De carne contusa, & sanguinis subter cutem coitu quod

Græce ecchymoma dicitur.

Cap. XXX.

Carne à graui quodam corpore, quod extrinsecus super inciderit contusa, uenisq; exiguis indidem diuortium expertis. sanguis profunditur per subsultum, quod Græci κατὰ διαπύθινον appellant, unde sub cute collectus, chymoma dictum efficit. Cute inquam, non diuisa, tanquam tumor tactu mollis & cedens, comitatur, liuidus, & magna ex parte indolens. Eò igitur animum tendimus ut sanguinem qui continetur dissipemus, idque confestim priusquam nigrescit.

rit. Per initia sanè nonnihil ex astringentibus, iis quæ discutiant, admiscere oportet, eò quòd tunicæ uenularum contusæ densationem requirant: inde etiã solis discutientibus sine astringitione utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subsequenter curationem accommodabimus. Ad inueterata autẽ ecchymomata, raphanus applicatus prodest. Quippe discutit ea ubi erodere inceperit, aut raphani succus, cum micis panis inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, suggillata, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur. Item sanguinis inter ungues concursus ex percussu proueniens, de quibus prius eim tertio uolumine dictum est. Verum de unguium uitiis, in parte chirurgica disseremus.

*De ruptis & auulsis.**Cap. XXXI.*

Ruptio cum ecchymomate prorsus accidit: curatur autẽ medicamentis mediocriter calefaciẽtibus, quale est ex nigris populis acopon, aliaq; huic cõsimilia. At altioribus rupturis magis acria, magisq; incidẽtia accõmodantur. Talibus sanè & cucurbitulæ usus proficit. Ergo si euocatũ celeriter per halitũ ecchymoma totum est, facilẽ dehiscens ipsa caro coalescat. Sin longiore spatio sordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coire nõ potest, sed tantũ propè ipsius labra admoventur. quo fit ut leui momento ea facilẽ separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq; aliud, quàm assiduẽ nouũ quodãmodo ecchymoma creetur, primo persimile, nisi quod citius quàm illud dissipetur, utpote ex tenui magis sanie nunc cõstans, cũ per initia è sanguine ecchymoma esset. Conuulsum autẽ fibris quibusdã laceffitis distractisq; leniri tantũ desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe congregutinari nequeunt. Itaq; Aristolochia rotunda ruptis conuulsiq; si quid aliud, idonea est: similiter centaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, costus, bdelliũ cum oxymelite pota.

*De scirrhus.**Cap. XXXII.*

Exactus quidem scirrhus, tumor est præter naturam sensus expers, & durus: non exactus autem uix sensibilis est. ac qui sensu uacat sanari non potest. qui ægrè sentitur, uix sanescit, si quidem humor unde huiusmodi uitium contrahitur glutinosus crassusq; est, qui particulis quæ scirrho obducuntur impactus solui contumaciter repugnat. Est cum statim

statim ab initio constituitur, augeturq; , plerunq; uero à medi-
cis qui erysipelata & inflammationes uehementer refrigeraue-
rint, astrinxerintq;, originem fortitur. Quòd si quis ea quæ ua-
lenter discutiunt medicamenta, partibus scirrhus obductis ad-
moueat, huic paucis primis diebus, manifestò scirrhus decreuif-
se uidebitur. Cæterum quod de affectu restat, id reddit insana-
bile. siquidem toto quod in eo subtilissimum erat dissipato,
quod reliquum est desiccatum, ceu lapidosa concretio relin-
quetur. Quapropter conuenit discussorium aliquod medica-
mentum, & emolliens habere, quod non ualide calefaciat at-
que desiccet. Huius autem generis sunt medullæ omnes, ma-
gisq; ceruina, & uitulina. Ex adipibus commendatur, leoni-
na, pardalis, ursina, deinde taurina. Inter aues anserina, & galli-
nacea & phasianica, sicciórq; caprilla, & hircina. Ad hæc ammo-
niacum suffimen, bdellium maximè scythicum, styrax qui hu-
mentior est & pinguis: ac Aegyptiaca mastiche. In aliis sanè
particulis scirrhum expertis his seorsum utendum est, tum iis
quæ inde componuntur. uerum in tendonibus & ligamentis,
lapis ignis candens, aceto acerrimo extinguitur, & siquidem
haberi potest, pyrites: sin eius copia non est, molaris, in quo
pars affecta commoueri debet, ut uaporem ascendentem reci-
piat, atq; inde rursus medicamen quod emolliat imponitur,
oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio per totum mor-
bi curriculum pars affecta perfunditur: interim oleo in quo al-
thææ radix ac syluestris cucumeris sit incocta. A balneo autem
in totum ægri abstinebunt, uel certe frequēti, sed posteaquàm
scirrhus emollitus fuerit, ammoniacum pinguißimum aceto
quàm acerrimo maceratum, particulæ sat multis diebus inun-
gitur. Deinde rursus emollienti medicamine utendum, quod
receperit galbanum, & opopanacem, eaque pinguißima eius-
modi uero sunt potissimum, ex petasone confectum, & quod
ad Amythaonem refertur, & strumus dicata medicamenta.

De strumis.

Cap. XXXIII.

Strumæ glandulæ sunt scirrhus induratae, quæ in ceruice,
alis & inguinibus maximè nascuntur. Curatio earum,
cum illa quam in scirrhis tradidimus cõmunis est. Priua-
tim uero lupinorū amarorū farina ex oxymelite cocta appli-
catur, ea quoque phymatis p. õficat: uel bouillū stercus aceto
inco-

incoctum inducito, id etiam tumores scirrosos omnes dissipat probè autem discutit strumax calx uiua melle, uel gymnastiorū sordibus excepta, uel oleo, uel adipe suillo: aut calcis nitrique par modus, nasturtij, & scœnugræci quadruplum cū melle, malagmatis modo imposita duritias dissipant, in pus conuersas rumpit loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini uino incocta, grossi syluestres, & satiui, aut nasturtium album detritum cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris syluestris radicis siccæ, lauri foliorum siccorum cōcremata torum cinis cum terebinthina inducitur, aut pediculariæ herbæ, & nitri æquale pondus, erucæ duplum cum resina iniicitur, aut sterus caprillum bouillumve aceto incoctum, aut erui farina in urina pueri uenerem non experti macerata exceptaq; pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniectum gypsoq; oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali scœnugræci pondere misceto, melle excepto utitor, item quod aspidibus constat medicamentum, mirificæ uirtutis est, tum quod ex struthio conficitur, tum quod cucumeri syluestri, tum quod cedrio liquore confit: strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decē, ammoniaci thymiamatis drachmæ septē, uisci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Ad strumas mammaram duritiasque proficit subscriptum medicamentum, uisci elaborati, resinæ siccæ, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

Ad strumas exulceratas, & sine ulcere.

Ceræ, resinæ pityinæ, adipis suilli insulsi, marrubij, æruginis rasæ, singulorum selibra.

Medicamentum ad strumas, quod dicitur cheradicum.

Olei ueteris pondo dua, ceræ pondo, colophonix triens, nitri, tantundē, alia duodecim membranis detractis in oleo per triduum macerantur. deinde cocta cum fricta fuerit, proijciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: rumpit etiam abscessus. **ALIVD.** Cineris è ficu uncia duæ, aluminis scissi uncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ uncia septem.

Exedens cheradicum.

Aluminis scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ quatuor

PAULI AEGIN.

u tuor

tuor, squamæ eris drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si cancri naturam induerint, rosaceo maceratis bis de utitor.

De stratomate, atheromate, & meliceride.

Cap.

XXXIII.

CVM hæc quoq; inter abscessus, quemadmodū in illis dicebamus, habeantur, singula propriam appellationem à similitudine rerū quæ in tumoribus continentur, sortita sunt. Alij siquidē ipsoꝝ ueluti pingue quiddā seu adeps subest, alij melli simile quippiā, alij quasi tenuis pulicula. Consilium igitur curationis est cōmune, ut quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamentis totū exedatur, aut sectione auferatur. Quidā. n. ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, ij nimirū qui liquidiorē humorē continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione aufertur, & medicamentis exeditur, stratoma uerō nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autem unumquodq; horū agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminū, quæ dissipādū uim habet, materiā, ubi actū est de strumis, reperiēs. Priuatim uerō meliceridas hoc dissipat uix pallæ acinis exemptis octo, squamæ drachmæ tres, parte fomentis prius lenita imponitur. *ALIVD.* Ladani, bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contonditur: facit etiā strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. Ad Archigenes contra meliceridas cōmendat aphronitrū & ueratri partē duplam, cū cerato duriorē impositā, exedentibus autem in cute circūdata, uti non licet. Hac igitur prius meliceridas, atheromata, uel etiam strumas medicamentis adurentibus detegere oportet, simplicius illorū est quod recipit calcē uiuam, saponem & lixiuiū, Varium autē magis, quodq; reconditū seruari potest, capit calcis uiuæ drachmas quatuor, faculæ quæ est fex uini combusta, niri liquidi tosti singulorum drachmas duas, minij drachma, lixiuiō teruntur: ubi mellis liquidioris crassitudo facta est, ter uesfacito, ut mediocrem spissitudinem habeat, pixide plumbea reposito, lixiuiā super distillans ne subito exarescat. ualet quoque ad uerrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercrescentes, facula bimelstri non ueustiore cutem delinito: ubi

ubi arefcere inceperit, ſpongia elotā rurfum perungito : ubi nigruerit denuò ablues medicamentis cruſtam inducentibus : poſtquam autem cruſta deciderit, exedentia adhibentur. Medi-
camentum exedens ualidè citrà roſionem, ſquamæ æris drach-
mæ quatuor, ſandarachæ drachmæ duæ, ueratri nigri tantun-
dem, cum roſaceo utitor. *ALIVD.* Squamæ, ſandarachæ, ur-
ricæ ſeminis torrefacti pari menſura cū roſaceo utitor. *ALIVD.*
Erynaſceorum combuſtorum, ſepiæ teſtæ, auripigmenti equale
pondus ex roſaceo : quæ ambiunt partes orbiculatim omnes
prius delinito ceruſa cum oleo. Item efficax eſt compoſitio
ex calcis uiuæ partibus duabus, chalcitis parte una, auripig-
menti parte una.

De fauis.

Cap. XXXV.

FAuis qui Græcis cerion dicitur, tumor eſt, qui in cute fo-
ramina habet, per quæ humor craſſitudinem mellis refe-
rens excernitur: rectè igitur ipſi imponūtur uuæ paſſæ cū
ruta, aut fici folia molliſſima cū melle, aut naſturtium cū lini
ſemine ex melle, aut cucumis domeſtici radix cum melle, aut
ſulphur uinū cū cerato, uel terebinthina. Cæterū uariam magis
fauium curationē molire, ſi quæ tertio uolumine de manan-
tibus capitis ulceribus dicta ſunt, in hunc locum transferas.

De ſimplici ulcere.

Cap. XXXVI.

QUoniam ſimplex ulceris cōtinui ſolū eſt diuiſio, ſi quis
partes diductas fascia orbiculatim circundata cōmit-
tat, utiq; citrà aliquam aliam molitionem coaleſcēt.
Cum uerò alterum ulceris os in obliquū ſpectauerit, inde de-
ligaturam tentare & in contrariū ducere oportet: cum utraq;
illius labra eò uergant, à duobus principijs incipiendum eſt, &
ora ſic adducenda. Nam cū nihil intra oras inciderit, nempe
pilus aut arena, aut oleum, aut ſordes, aut id genus aliud, omni-
no ulceris concreſcet. quod ſi magnum ſit, adeò ut diductæ par-
tes in totum prædicta deligatura committi nequeant, futuris
ipſæ prius adducentur, deinde ſic deligatæ, glutinatoriis, ut uo-
cant, præſidiis utemur, quæ collectam humorum ſubluuiem de-
ſiccare & conſumere queant: aliam, ne influat, prohibere.

Quæ ulcera glutinare poſſint. Cap. XXXVII.

QUæ ſolia applicata ulceribus glutinādīs ſunt. Itē
ſaliciſ, braſſicæ, oleaginis fruticis quæ chamælaea di-

u 2 citur

citur & fructus & folia & cortex, succusq; austerioris plantagi-
nis papyrus, posca aut uino imbuta & in orbē circundata. Re-
centia ulcera glutinant pini & piceæ folia, cortexq; recens liga-
menti modo circundatus cū aqua aut posca, aut uino caseus re-
cens læuigatus: extrinsecus imponuntur, folia rumicis aut uitis,
aut betæ, aut lactucæ. At ex acido lacte caseus qui oxygalacti-
nus dicitur, uulnera quoq; ampliora committit pira syluestria
quæ achrades dicuntur, fluxionem reprimunt equisetum si ap-
plicetur, etiam si nerui fuerint præcisi, isatis satiuæ in duris cor-
poribus ulcera etiam si musculorum capita affligant, idem præ-
stat, cupressi folia, germinaq; & nouelli galbuli mollesq; etiã
duris corporibus proficiunt, sed miscēdus est pollen farinæ, qui
à pariete propinquo molæ assumitur, myrrha cū aqua illita,
uel lachryma thuris, terræq; lumbrici etiam neruorū præcisio-
nes glutinant, pentaphylli folia cū melle, alia cōbusta applica-
ta. In ueteratis ulceribus anagallis prodest cū cerato. hordeū
combustū, & cerusa cū myrtei cerati triplicato pondere. Ad ca-
pitis ulcera ualet, myrrham aridā inspergere non madefactā,
quippe celeriter contrahit, uel aloen aridā, uel aristolochiam
tritā & melli ex uino incoctam dum mediocris fuerit spissi-
tudo, in linteam illinens applicato. Composita autē ad gluti-
nandum sunt Barbara, Chrysē, Nicolai. item dia iteon quod sa-
licibus, diadictamni quod dictamno constat, atq; alia his confi-
milis quæ magnis potissimum uulneribus glutinandis sunt.

Si dolor & inflammatio ulcera exerceat.

Cap.

XXXVIII.

SI dolor & inflammatio uulnera obsideat, usus est medica-
mentorum quæ desiccant, atque inflammationem arcēt.
Ex liquidis igitur laudatissimum est uinum, deinde posca.
Si uerò etiam cum sordibus inflammatio infestet, mulsæ aquo-
sæ conuenit. Ex ijs autem medicamentis quæ siccandi pote-
state prædita sunt, communiter quidem conferent, inflamma-
tionibus dicata, si oleosa acriæque excipias: priuatim hoc pro-
ficat, malum punicum dulce uino incoctum tritumque appli-
catur, mirabile nimirum & multiplici usu commendatum est
remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium ulcera,
tum ea quæ toto corpore excruciant, oculorumque inflamma-
tiones. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam ulcers accesserit,

rit,

tit, ijs utendum præfidiis, quæ aduersus illa inscripta sunt.

*Si maturari, & ad suppurationem perducine-
queant. Cap. XXXIX.*

Recentia quidem ulcera, & q̄ inflāmatio ne adhuc oc-
cupentur, nō suppurantia, cōcoquit maturatq̄; ex sim-
plicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, uel
chondrus, uel panis, uel glutinū librariū, cū terebinthina obdu-
cta, item cera, crocus, lachryma thuris, uix, rosaceū, adeps suil-
lus, uitulinusq̄; Inter cōposita uerò tetrapharmacū quod lin-
teolis illinitur, rosaceo subactum. Vetera aut̄ & callosa matu-
rant, simplicia quidem uua passa domestica, styrax, galbanum,
myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche, ægyptiaca, &
œlypum. Composita uerò ex recinino, dictum aceron, i. absq̄;
cera, quod ad Galenum authorē refertur, si linteolis illinitur,
oleo ueteri aut recinino solutum. item quod à duplici colore
dichromon dicitur, pari modo & basilicum, similiaq̄;.

De canis ulceribus. Cap. XL.

Cauum ulcus carnē quæ perijt restitui postulat. cuius ge-
neradæ materies sanguis moderatus est, & probus. Hu-
ius igitur mediocritatē ex alimēto sufficienti cōciliabi-
mus, tēperie uerò probam ex bonis ciborū succis, & proba par-
ticulæ in quo ulcus est tēperatura. At in recremento quod eua-
cuatur, tenuē quidē, humidū ulcus reddit: crassum uerò, sordes,
circum ipsum coalescentes, eoq̄; medica mētis æger quæ mo-
dicē ficcāt purgantq̄; Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordea-
cea farina, eruorumq̄; fabarū lomentum, iris, aristolochia, cad-
mia, panax, & pompholyx. Quod si nihil medicamentum ad
creandā carnē inductū proficit, ad aliud sic digredendū est. At
si plusculū sordis sit, humidiusq̄; ulcus, sciendū uenit medicamē-
tum intra modum deficasse, intendendumq̄; esse ipsum mellis
mixture: sin purū & absq̄; humore cernitur, ultra, ac conuenit
deficauit, ac oleo pleniore dilutū ceratum inducere oportet.
Accidit nōnunquā carnē à medicamento ualētiore colliquari,
ut sordidū humidumq̄; ulcus appareat, quemadmodum ab ijs
quæ minus ac par est, deficcant Verū hoc ulcus dum consumi-
tur, canū magis euadet, labris prætumidum, rubens præterea &
inflammationis particeps sæpe uerò æger manifestā erosionē
percipit. Alterū illud quod à parū siccantibus remediis hume-

u 3 scit, nihil

scit, nihil horū succidaneum habet. Putrilago igitur lignorum & potissimum eorum quæ moderata astringendi abstergendi-
que uirtute donata sunt, quemadmodum & ulmus, purgāt ul-
cera, puraq; iam facta carne replent, uel anemonæ appositæ,
item piceæ cortex derasus, tritusq; cū cerato & linteolis illi-
tus cauis ulceribus auxiliatur, & præsertim recentibus, ut quæ
carne destituta reficiat, repleatq;. Cōposita uerò, ubi pura qui-
dem sunt ulcera, accommodantur, quod ostreis constat, quod
Manathoni adscribitur ex uini fæcula, & quod ex aloë confici-
tur, quod Melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannæ,
thuris, alicæ, erui, pares portiones recipit. similiter quod è thu-
re confit, & aphroditarium. Sin autem sordibus magis scateāt,
cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinūtur,
ut Trophos dictum, I sis Athene, ex atractilide præparatum,
Italicumq;, & quæ experientia comprobauit.

Quæ sordida ulcera purgent. Cap. XLI.

Sordida ulcera siue caua, siue plana fuerint, probè purgat
aristolochia cum melle, terebinthina cum pari rosaceo &
melle, uel loco rosacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuæ
colymbades applicatæ. Ad ea uerò quæ neruosis obueniunt, te-
rebinthina cū butyro liquefacta: sordidis nimium & depascēti-
bus benefacit marrubiū cum melle. hoc etiā crustas deiecit. Cō-
posita aut remedia hæc sunt, amurcæ coctæ, mellis despumati,
aluminis phorimi, hoc est liquidi, paria pondera ALIVD. Sera-
piadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, sicca, iridis illyricæ, mar-
rubij sicci, aristolochiæ, singulorum drachmæ octo, erui farinæ
drachmæ decē, arido utitor & cū melle. Insuper ad sordida ul-
cera facit tum Aegyptia, tum ex sale cerata liquefacta, tū In-
dice, tum Athene, tum uiridia diluta. Ad hæc, quod pumice
constet, & ex eruo, sicca, pastillusq; melanchlorus, hoc est, ni-
gro uiridis, similiter etiam Criogenes appellatus.

Ad ulcerum uermes. Cap. XLII.

AD uermes qui in ulceribus procreantur arcendos, pri-
mum quidem est, ut humiditatem putredinemq; eorū
opificem tollas. Cæterum necant uermes communi-
ter quidem omnia quæ ad aurium uermes inscripta sunt. Ad
eos autem qui ulcera infestant, Archigenes commendat ceru-
sam, pollumque, pari modo cum pice liquida illitum.

Quomodo

Quomodo caro ulceribus supercrescens exedatur. Cap. XLIII.

SVpercrescens ulceribus caro medicamentis quæ ualenter exiccât tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum squama æris, omniaq; testacea cōbusta, & erinacei cōcremati utriq; cū toto corpore. Verū hæc modicè purgant, & supercrescentia cōtinent. Asiæ uero petræ flos, ualidior est, hoc magis fori, chrysocolla, chalcitis, misy: cōbusta minus rodunt: item æris flos: similiter ærugo oībus est ualentior, sales aut cōcremati, humentes, & flaccidas carnes cōsumunt, sic ēt linamenta carpta ē panniculo, muria acriori imbuta & resicata, quæ si imponātur, mediocres carniū supercrescentias exedunt. Aerugo, cum æris squama interea refertur quæ ualidè excresecētia supprimunt. Cōposita Rhoda (ut dicitur) arida, psaron, ad hæc, xanthon, sine morſu retinēt. At maximas carniū excresecēcias, adusq; penitiora crustis obducūt, pastilli Faustiani, triti inspersiq;, & medicamētū, quod à solis æstu heliocaes dicitur, aridū. Adde his quod recipit calcis uiuæ, squamæ æris, & mannæ thuris, pares modos. Idem ea quæ nimium excreuerunt, fungisq; respondent, cum melle, purgat: cum cerato, carne replet.

Arida compositio ad carnem compescendam.

ARgenti spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorum æqualis portio. ALIUD uehementer reprimens citra roſionem, ualet quoq; ad pascētia ulcera, & præsertim gingiuarum uitia, quas epulidas uocant, necnon ad dentium candorem. Calcis uiuæ pondo, auripigmenti selibra, hoc auripigmentum ficcū, inquā, ex aqua detritū calci uiuæ, cadmiæ modo lotæ adiicitur: in puluerē radactis ficcis utitor, ex pastillis autē, tum qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypū inscripti sunt, pulchrè coercent, sic emplastra uiridia & præcipuè id quod ex sale Cappadocico præparatur, similiter, & isis summè carnem supercrescentem in ulceribus continet.

De ulceribus serpentibus, & putridis, & phagedæna. Cap. XLIIII.

SVperfusiones utiles sunt ulceribus depaſtis, putridisq;, ex aceto, posca, aut uino astringente, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lenticulæ, malicorij, balauſtij, lentisçi,

u 4 myrti,

myrti, spinæ ægyptiæ, aut aliquo ex ijs quæ astringunt, & sic cant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine liquido, panis filiginei mica, gobio ueteri, aut alio salsamento ueteri carnis illotæ, terebinthina liquida pari pondere detritū, uel aristolochia, uel reciniorū foliorū succus æqualis, æruginis pars dimidia, ex aqua ut mellis sit spissitudo illinitur: si crusta nō deciderit, elaterii parē modū ærugini admisceto putridis efficax est fori si tritū inspergat. Et sup linamēta carpta arida, uel aristolochia rotūda, uel gallæ, æquo pōdere cū oleo illinuntur, uel cucumis syluestris radix, uel brassicæ, uel betæ, uel cucumeris folia, illigata calidis cineribus recōdūtur. Vbi uerō emollita fuerint, cū sale trita imponūtur, ualēterq; repurgant: uel oleæ summitates in uino decoctæ cū melle inducūtur: uel chalcitis applicat, uel apii semē cōtritū, uel lini semē læuigatum, cū atramēto sutorio inducit, uel thymū, uua passa, & ficus incoctæ applicātur, aut fici folia in læuorē trita cū melle, aut nitrū, cuminū & farina ex melle, aut cucumeris syluestris radix aut scilla cocta ex melle, aut foreos drachmæ duodecim, chalcitidis drachmæ decē, misyos drachmæ quatuor, cum dimidia aceti acerrimi hemina, læuigātur donec arescant: exceptis uteris, specillū intingens, ac ulceri circūadigens, superq; duplex linteolum ex œnelæo imponis: sin inflammatione sint occupata, altercum cum polenta. aut brassicam cum melle obducito.

*Ad putredines quamlibet partem occupantes,
& ulcera quæ depascunt.*

Calcis uiuæ, chalcitidis, singulorū drach. duæ, auripigmenti drachma: hoc quoq; ad digitorū pterygia & phagedænas efficax est. Itē naturalīū carbūculis cū melle utiliter adhibet. In reliquis uitiis arido utitor, sup spleniū ex resina inducito.

*Ad omnia quæ depascunt ulcera, quæque os infestant,
item ad sanguinis profluum, & carnem excrecentem, aridum, compescens, longē utilissimum.*

Chalcitidis, misyos, utriusq; crudi, drachmæ uiginti, squamæ ferri drachmæ sex, gallæ omphacitidis drachmæ octo:

Ad serpentina ulcera & putredines.

Salis drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; combusti drachma, squammæ, pumicis combusti, singulorum par modus:

dus: ualet & ærugo rasa cum misy combusto, pice liquida excepta, squamaq; ferri cum oleo.

Ad ulcera pudendorum depascentia.

HAec & meleterion dictum nomis proficiet. Item dia oxymyrſines, hoc est ex acuta myrto, item ex charta medicamen aridum omnibus nomis efficax est. Accedit huc coracion ex oxymelite, pastillus Andronis, & qui huic respondent. Eadē uero hæc medicamenta phagedænis quoq; congruunt, nam & ipsa ulcera sunt quæ depascunt. exeduntq;.

Ad flaccida humiditate ulcera fætidaq;.

LEmnia sphragis ex aceto, uel oxymelite, uel posca, uel uino subacta, ad luti spissitudinē illita benefacit, aut cupressi folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ aridæ concremata cinis, aut platani corticis cōbusti, aut anethi cremati similiter, aut lanarum sordidarum uistarum, aut plantago, aut isatis per se, uel cum polenta, uel peucedani radix arida.

Quomodo cicatrix ulceri inducenda sit. Cap. XLV.

SI carnē ulcerum quæ cicatrice indigēt, siccemus, astringamusq; adeo, ut nō modo id qđ præter naturæ modū superfinitum est, discutiamus, sed et illud qđ naturale est, attingamus, superficiē ulceris cuti similē reddemus. Ad hoc autē sunt idonea, galla acerba, & mali punici cortices modicē siccantes. Quæ uero præter astrictionē sine morſu exicāt, ea quoq; cicatricē inducūt, ueluti myrrha, argēti spuma, ostreaq; cōcremata. Nā hæc quoq; si inspergātur, arida, sæpe cicatricē inducūt: pinī cortex cū cerato myrteo, hederæ flos cū cerato, lilij radix cum rosaceo, resina ex pinu arida, pumex tostus, squama æris pari portione, siccis utitor, idem et reprimat, uel pumici trito, manæ thuris & diphrygis singulorū miscens paululū, utitor, uel argenti spumæ partē unā, diphrygis dimidiā cū cerato instar splenij impones. Vetera autē ad cicatricē ducit uiscus, cū lachryma thuris, ærugo cū diphryge æquali, ceratoq; myrteo: uel cētau-reū minus recēs applicatū. At humidiora cyperi radice obducito: sedis aut naturaliumq; ulcera, præsertim si inflātionem experiātur, aloe persanat læuigata, arida, uel ex aqua aut squama æris, aut chryfocolla in sole cū cera emollita inducitur.

Aridum ad cicatricem inducendam.

OStreorum drachmæ duodecim, pollinis thuris drachmæ sex,

sex, cadmiæ drachmæ quatuor: facit & Nomis. ALIVD. Aristo-
lochia, drachmæ sex, pini corticis drachmæ sex, pollinis thuris
tantundem, pumicis, colophonæ, iridis, singulorum drachmæ
quatuor. ALIVD. Cornus ceruini combusti drachmæ qua-
tuor, pini corticis uncia sex, cerusæ uncia quatuor, æruginis ra-
sæ uncia nouem, cadmiæ drachmæ octodecim. ALIVD. Cyti-
norum, atramenti sutorii, singulorum drachmæ sedecim, squa-
mæ æris, aluminis scissi singulorū drach. octo, gallæ drachma.
ALIVD. Cerusæ, argenti spumæ, singulorū drachmæ octo, recre-
menti plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ singulorū, drach. quatuor.

Ad cicatricem inducendam.

A Luminis scissilis uncia, trita in aquæ sextario maceratur:
ubi solueris, aqua linamenta ambuis, & siccatis uteris.

Emplastrum ad cicatricem inducendam

ex simplicioribus.

C Eræ drachmæ quadraginta, argēti spumæ drachmæ trigin-
ta quinque, diphrygis drachmæ octo, myrtei hemina dimi-
dium: efficax est his quoque; Palmulatu, quod phœnicine dicitur,
item ex cadmia, tum myrsinatū, & consimilia. Ad ea uero quæ
cicatricem uix recipiunt, ceræ myrtei singulorū drachmæ sex,
cadmiæ drachmæ sex, plumbi, thuris, singulorū drachmæ duæ,
aluminis scissilis, æris combusti singulorum drachma, æruginis
rasæ drachmæ duæ: die interposito soluitur.

Diu inueteratis & ægrè ad cicatricem uenientibus.

C Admiæ, chrysocollæ, aluminis scissilis, singulorū drachmæ
octo, æruginis, squamæ æris, singulorū drachma, resinæ pi-
tyinæ drachmæ quadraginta, ceræ drachmæ centum, myrtei
quod satis est. ALIVD. Ceræ resinæ pityinæ, singulorum uncia
sex, cadmiæ tantundem, chalcitidis crudæ uncia tres, myrtei
quantū satis est: uino læuigatur cadmia cū chalcitide, quando
caniculæ sidus oritur: latiore utere splenio, quod platysma di-
citur: super id linamentū carptū & spongiā ex uino inducito.
ALIVD. Aeris combusti, aluminis scissilis, singulorū uncia duæ,
salis ammoniaci drachmæ duæ, ceræ uncia sex, colophonæ tan-
tundem, myrtei uncia duæ, arida in sole diebus uiginti ex aceto
læuigantur, ubi mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata re-
frigerataque; emolliendo miscetur. Valet etiam ad hæc medica-
mentum ex pumice, item Isis, & id genus alia.

De

*De maleficis ulceribus dolosisq; cacoethe Græci uocant,
aliàs chironia & telephia. Cap. XLVI.*

INueterata & quæ uix cicatricē recipiunt ulcera, alii chironia appellarunt, ceu Chironiæ medicinæ peritissimo indigentia: alij telephia, q̄ in tali ulcere Telephus consenuerit. Inspiciendum igitur uenit, num & totum corpus uitioso redundans succo huiusmodi fluorem ulceri transmittat, ac qui superat humor, cōuenientibus uacuari debet remediis. Si uerò uarix cruribus ulcere infestatis illum impertiat, etiam hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabitur: aut uenæ sectione ipsos uacuabimus, abundè sanguinis detrahentes. deinde loco inducemus auxilia quæ sine morfu reficiendi uim habent, simplicia igitur ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calce mediocriter lota: alumen scissile tritum inspergitur: hyssopi drachmæ quatuor, quæ passæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: squamæ gris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

Composita hæc sunt, emplastrum ad chironia.

CErusæ uncie octo, aluminis scissilis uncie duæ, squamæ gris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorii, singulorum uncie duæ, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrtei lidra una & semis, arida uino teruntur. hoc medicamenti protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in usu emollitum myrteo, cicatricem inducit.

ALIVD. Argenti spumæ libra, olei libræ duæ, chamæleontis nigri, radice aristolochiæ, gallæ omphacitidis, singulorum uncia, galbani, guttæ ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum uncie duæ, præparato radicibus uiridium arundinum agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica ulcera quæ tibias mammasq; obsident, item strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, pollinis thuris septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores utuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coniectis unitisq; utitor. ALIVD. Archigenis, ceræ triens, olei omphacini, pollinis thuris, uel eius lachrymæ, diphrygis, squamæ singulorum drachmæ quatuor, arida cū aceto læuigas, ubi mellis spissitudo facta, cerato misces, & uteris diluto quod linteolis possit illini. ALIVD ad mulierum dolosa ulcera,

ulcera, & aliorum qui tenera carne præditi sunt, Cera tyrrenica drachmæ octo, adipis taurini, terebinthinae, plumbi combusti, loriq; singulorum drachma: utitor per linamenta ex rosaceo uel myrteo diluens.

Ad cicatrices nigricantes. Cap. XLVII.

Cicatrices nigras tollit oleū in quo bryoniae radix candida & nigra incocta sit, dum succum reddat, impositum: calamintha ex uino cocta, argenti spuma cū rosaceo albo lota: ex imperiginibus cicatrices, tū alias, & cōcolores efficit asini adeps illitus: ærucæ semē ex felle caprillo, bubulo, & ouillo, perunctū cū argenti spuma, ouillus talus combustus, ex uino austero tritus, gutta ammoniaci cū suillo felle illita. Cōposita uero, argēti spumæ, mētæ, lachrymæ thuris, pares portiones cū melle. *ALIVD.* Nitri, suffiminis ammoniaci, sulfuris uiui, myrrhæ, paria pondera, ex aceto albo, aut uino, aut aqua, minutim detrita modicè illinūtur, ne exulcerationē excitent. *ALIVD.* Cimoliæ cretæ, columbarum fimi, saponis, thuris, æquales modi ex aceto. *SMEGMA* ad cicatrices nigras, Cimoliæ cretæ drachmæ octo, aphronitri drachmæ quinque, ueratri albi drachmæ quinque, glandis unguentariæ expressi drachmæ quatuor: in balneo cicatrices abstergito.

De sinibus. Cap. XLVIII.

Cum adiacens ulceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit glutinaturq; nostri sinū, Græci colpon nomināt. Si igitur ad superiorē partē porrectus sit, facile sanies per os emanat, atq; ideo prōptē cōglutinator. Si inferius ipse spectet, sanies uicinā aliquā partē intus erodit, ac nisi emissarium quoddā collectionis scalpello prius feceris, nihil promouebis, neq; carne ipsum replendo, neq; conglutinando. Quod si artus aliquos nēpe cubitū, aut femur sinus occupet, poterit utiq; decliuis figuratus citra diuisionē ex aduerso factā coalescere. Etenim in cubito cum ore flexuræ ipsius uicinæ sunt, summam manum elatius protendens, sinum ad effluxum conuertis. At in femore si propter genu sinus designat, decliui figura posito, iuxta poplitem mollem puluinem subiicis, quod inguina genu humilia sint. Si igitur sinus carne impleri non desideret, statim fistula quadam recto peruia foramine cui uesica illigata sit, ad saniem quidem quæ sinui inhæret

inhæret abstergendam aquosa mulsa potabili, elui debet: uerum ut coalescat, uino aut mulso: deinde ad glutinans medicamentum transeundum. Sin cauus sinus carnem requirat, primum medicamenti, quod charta constat, aridi paululum cum multo rosaceo inferi cōuenit. deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum Isis aut Machæronis, aut simile quoddam unà cum rosaceo cerato liquidiore solutum inijcitur. Vbi uero carne mediocriter sinus fuerit repletus, conglutinans quoddam medicamentum impones, quemadmodum & recens cruentum uulnus curabas. Huius autem generis sunt, Barbara, Dichroma, & scirrha, id est, fulua appellata. Maximè uerò omnium quod ex recinino, & metallicis sine cera præparatur fuluum Galeni emplastrum conueniet. Post medicamentum, sponsia recens ex mulso, aut uino circumponitur, & quàm fieri potest mollissimè, deligatura à sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, linteolum uerò circumductus fundum sinus sine dolore constringat, paulatim uero soluatur usque ad sinus oras, emplastro extrinsecus sinui circumdato, sed ita iuxta oras descisso, ut sanies queat excerni: quod fiet paruo quodam alio emplastro superimposito ex eodem medicamento ob effluxum laxo: fines id adusque solutionem, qua tertio quoque die facta id ipsum auferes mutabisque: quod toti sinui circumdatum est relinquens. Nota uerò erit an sinus ima coaluerint, si sanies probè emanet pauca, & concocta, aut si nequaquam effluat: insuper eodem in sinu si neque dolor aliquis sensibilis, neque tumor, sed tota ratio contracta, sicca, & doloris expers appareat. At si pus etiam maturum in ore modicum conspicias, multo magis de sinu conglutinando sperandum est. At si primo altero uel die sanies quædam tenuis è sinu excernatur, nihil adeò de glutinatione despera, quippe medicamenti uirtus humorem tenuem † ex subiectis partibus frequenter extundit, unde partes siccae mediocriter factæ coeunt, & glutinantur. Tertio uerò die, aut quarto ab initio si cruda per os sanies euaserit, scito sinum non coiisse, eodemque medicamento non insistere, nam cum propter humiditatem quampiam, ut ueri simile est, à parte decidat, non alienum fuerit etiam mutare.

† Antiquus codex habet, ἐκ τῶν ὑπερχειμένων, id est, ex superpositis partibus.

De

De sinibus laceris detritisque.

Vbi abscessus tardè sectus fuerit, uel medici imperitia, uel eius qui curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis, diruptaque, quod Græci ab attritis uestium laciniis rhacodes dicunt: nec fieri potest, ut prædictis collutionibus adimatur, glutinante utendum medicamine, temperatura liquido, uiribus autem sicco. tale est palmulatum dictum ex chalcitide, ueteri dilutum oleo, ut neque admodum sit durū, neque manus intinctas inquinare desierit, deinde uino mediocriter uetusto maceratum, postea orbiculatim cum decenti deligatura impositum. Conuenit autem laceræ ut comprehensum est, cuti, potissimum mel, quoad emplastris spissitudinem habet coctum impositumque: Præstiterit autem post illitionem lacero in sinu factam, myrrham in pollinem coactam, cribro suspenso ei inspergere, uel aloen, uel thus, uel simul omnia. Expertus autem sum, tenue centaurium in hunc usum mirabile esse medicamentum. succedit huic symphytum, deinde iridis illyricæ radix, postremo erui farina. Nonnunquam uero inter coquendum ea melli insperguntur, cum cacabus ab igne tolletur. Melius autem fuerit, si lebetes iam à flamma amoto hæc fiant, deinde diligenter agitemus: ubi medicamentum tepidum euaserit, sinui imponatur, illigeturque; sicut expositum est.

*De fistula.**Cap. XLIX.*

Fistula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus nascens, ab arundinearum fistularum tralatione appellatur. Si itaque in os desinat, curari sine manu haud potest, nisi temporis spatio, squama ultro uel os deciderit. Si uero in os non finiat, medicamentis quæ callos elidunt & conglutinant persanabitur. Itaque callos excidunt hæc quæ subiungam: Spondylii radix circumrasa impositaque; fistularum callos eximit, item ueratrum nigrum duobus tribus uel diebus insertum idem præstat. Ad hæc amurca cocta & in collutione adhibita. Iam sory crudum uel concrematum cum uini diluti momento ad collutionem iniectum: item sory & drocomagma cum hydromelite, uel elaterium terebinthina exceptum in penicilla cogito, imponitoque; uel laserpitii radice succum infundito. Id quod sequitur callos consumit: æruginis drachma duodecim, ammoniaci drachmæ dux, excepte aceto in longum inducuntur.

Collyrium

Collyrium quo fistulis exterendis utor.

GUtræ ammoniaci, atramenti futorii, æruginis, misyos, chalcitidis, gūmi pari modo excipiuntur aceto. **ALIUD.** ex his quæ Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmię, misyos, atramenti futorii, eris combusti, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri ueneris non experti urina & finguntur collyria, ex quibus uno fistulę imposito, panis mica aqua madens ext rinsecus superaccommodatur, mutaturque sæpius donec inflammatio conquierit & crusta exciderit. **ALIUD** quod in Alexandria accepi, Anchusæ radicem, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis scissi, atramenti futorii, aloes, singulæ uncia, cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. **ALIUD.** Atramenti futorii drachmæ duæ, chalcitidis, æruginis, singulæ drachmæ, excipito ammoniaco & utor. Cum autem callus fuerit extricatus, ærugine cocta cū mulsâ purissima octupla in collyrii formam redacta, repurgatur. Vbi uero callum eliseris, iis quæ carnem procreant uti opportunum est.

Collyrium ad carnem generandam.

ALoes, myrrhæ, ammoniaci, ouorū putaminū combustorum cineris, æquale pōdus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturq; . **ALIUD.** Myrrhæ, aloes, & thuris, malicorii, æqualis modus aqua excipitur, quidā uerò taurino felle, carnes etiā oleo quod in maturis uuis expressum est eluuntur. Notus mihi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirū quanta res felicitate successerit. Postquā uero carnes produxeris, glutinatorio utendū medicamine, quomodo in aliis finibus præcipitur. At cū fistula arctior, longaq; fuerit, Galenus ait, neq; callū adhuc, sed sordiciē tantūmodo contraxerit, primum lixiuiā demisi, deinde eandem tantisper inibi permittēs dū sordes excidisse sperassem, medicamentū applicaui. Est autem id quod recinino oleo constet superius cōmemoratum.

*De ulceribus diruptis.**Cap. L.*

Nonnulla ulcerū cicatrice obducta, frequēter haud magno temporis interuallo, iterū inflāmatione tētantur rūpunturq; siquidē esse quodā affecto, interdū caro circundata ex facili cicatricē recipit, ac sana ex toto esse uidetur: uerum cursu humoris ualido paulatim ex ossē in alto contabescente

sciente, tum inflammatio, tū pus oboritur, quod cicatricē deradit. Curatio igitur eiusmodi ulcerum tantam requirit siccitatem, ut os affectum decidat. Huius autem sinus concauos promptē replebunt papaueris syluestris ficiq; folia cū polentæ subtiliore parte læuigata, atq; ex uino applicabis, uel alterci semen & atramentum sutorium pari pondere contrita imponentur, uel peucedani radix de subito squamas ossium separat.

De articulorum ulceribus. Cap. L I.

CUm articuli carnosus partibus sicciores existant, exulcerati sicciora medicamenta requirunt. Probe igitur facit pastillus Polyidæ ex uino subactus donec sordium fiat spissitudo. Item quæ similiter huic desiccant medicamina. Item marina, muriaque frequenter irroratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis ijs utendum est quæ maiori etiam siccandi uirtute pollent.

Quæ spicula, aculeos, spinas, & consimilia educunt.

Cap. L I I.

ACuleos, arundines, insuper spicula & spinas extrahit utrumque anagallidis genus, aristolochia rotunda, ammoniacum cum melle, alterci semen læuigatū inspergitur, arundinis radix contusa melliq; mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito educit.

Si ex uena, arteria ue, & naribus sanguis profluat. Cap. L I I I.

PArticulis sanguinē fundentibus, figura ei quā in sinibus exposui contraria, rectē adhibebitur, nempe quæ sursum uergat, neq; id tamen immodicē, nā periculum est, ne dolore oborto, uas rursus sanguinē profundat: cū nihil æquē sanguinis profuuiū excitet, inflammationesq; augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis erumpit, statim digitum ori ulceris uasculi iniicito, innitens leniter premensq; citra dolorem, nam simul & sanguinē continebis, & grumū uulneri induces. Quinetiam si altius deliteas uas quod sanguinem emittit, diligentius perdisces, & situm ipsius, & magnitudinē, item uena sit, an arteria: deinde si exiguū uas existat, aliquo ex his quæ sanguinem reprimunt utendum est. Optima uero eius generis sunt, quæ obstruendi uim obtinent, unde Græcis emplastica dicuntur, ex resina fricta, farinæ triticeæ polline, gypso composita, similiaq;

oui

oui candido macerata, & cū leporinis pilis imposita: at si amplum uas existat, hamo ipsum attollere conaberis, & mediocriter circumages, sanguine represso: siquidem uena extiterit sine funiculo sanguinē his ipsis medicaminibus sistere tentabis: si arteria, alterum ē duobus facies, aut funiculo circumposito, aut toto uase præciso sanguinem coercebis. Est, cū magnis quoque uenis funiculos circumdare cogimur, quemadmodū nonnunquam easdem totas transuersim nimirum amputare, in cuius rei necessitatem uenitur, in uenis quæ à penitioribus rectè sursum feruntur, præsertim per actū quoddā spatiū, aut principes particulas, sic n. utraq; pars utrobique & reflectitur: & uulnus à uicinis corporibus premitur contegiturque: tutius autem fuerit utrumque facere, funem quidē radici uasis circumdare, quod autē inde procedit abscindere. his sic peractis, uulneri celerrimè carnem inducere, priusquam funiculus à uase decidat, si. n. subito carnē contraxerit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod græcè uocatur aneurysma sequitur. Dignosces autē num uena an arteria sanguinem profundat inde, quod huius flauior tenuiorque sanguis existat, & cū pulsu uacuetur, † illius autē nigrior, & sine pulsu. Subsequens igitur est omnium optimū quæ nouimus ad carnem inducendā medicamentorum, quo etiā ad cerebri membranarū hæmorrhagias uti securissimū est, itē ad collī uulnera, ipsarūque uenarum iugulariū quas sphagitidas Græci uocant, etenim & harū sanguinē citra uinculū cohibet, Recipit autē thuris lachrymæ pinguiſsimæ partem unam, aloes in mollioribus quidem corporibus partē dimidiatā, in durioribus æqualem, ac in uicē lachrymæ thuris, tenuissimæ eiusdē partis tantundem, cū oui albo subigitur, dū mellis fiat spissitudo. deinde leporis pilo mollissimo excipitur, mox uasi ipsi, tum ulceri uniuerso copiosissimè imponitur. Deligandum uerò extrinsecus est fascia ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor aut quinque amplexus super ipsum uas quod profluit, iniiciuntur. hinc ad radicē ipsius distribuuntur, postea ubi tertio solueris die si tutò adhuc medicamentum ulceri adhæreat, aliud rursus orbiculatim circumdabis ac ueluti contegens iterum, deligabis quemadmodū prius. at si sponte sua primū reiecerit linamentum, uasis radicē digito leniter comprimens, ne uidelicet quippiam confluat, hoc quidē sensim auferes, alterum uero impones, atque hoc modo quoad carne obducatur uas, curabis, ita ut

PAULI ÆGIN

x

semper

semper acclius particulæ figura sine dolore seruetur. At quæ crustas generant, quoties illæ decidunt, nudam magis partem quam naturaliter esse debet, efficiunt, multiq; iā ex iis quibus crusta decit, sanguinis profluiū quod ægrè suppressi queat superuenit, quinquā & his utendū est cū magna urget necessitas. Maximā uerò necessitatē uel crustā inducentibus medicaminibus, uel ignitis ferramentis utendi puto, ubi ex erosione putrefcētis alicuius profluiū sanguinis concitatur. Quinetiā cum in huiusmodi affectibus totū quod putredinē experitū est exciderimus, tutius est uel ipsius quasi radicē adurere uel medicamentis quæ crustā faciunt uti: hoc autē maximè tum in pudendis, tum in sede fieri consuevit. At scopus crustā generantiū medicamentorum erit calor cum astrictione, quemadmodū in chalcitide, misy & atramento sutorio habetur. Quæ autem ex calce uiua conficiuntur, uehementiora quidē his sunt, cæterū quia calx non astringit, crustæ citius ab ipsis decidunt, hæere autem ipsas longè est utilius, quippe ad basim earum caro supernascentur, efficiturq; uasis profluentibus ueluti operculum, at huiusmodi sanguinis profluiū isatis satia si inspergitur probè coercer, uel gallæ combustæ. Porro ipsa feramenta ignita ex aceto aut uino restringere oportet. In uniuersum sanguinis profluuium sistunt, simplicia quidem, aloë, thus, eiusque pars subtilior, terra samia, ærugo ferri, lanarū crematarū cinis tenuissimus similiter, sterus asini & equi, bitumen modicum, malicorium, diphryges, galla, myrtus arida, alumen omne, tum crudum tum combustū, resina fricta, uitis cortex, aut folia arida, platanorum galbulorum pollen tenuissimus, maximè cum humorem concretū deposuerit: priuatim autē ex naribus profluuium imposita reprimunt iunci acuti semen, urticæ foliorū succus, chalcitis, anthyllis concremata, pili leporis, ferulæ medium ustum cū aceto, † sterus asinum siccum uel humidū, succus porri cum sulphure, ellychnio exceptus: composita uerò ad quodlibet sanguinis profluuium hæc quoq; faciunt, sponsia recens in liquida pice mersa & bitumine circumlita, olla recenti concrematur, cineris partibus duabus, miscentur plumbi & stammeos, singulorum pars una. **ALIVD.** Thuris lachrymæ eiusq; partis tenuioris, sulfuris ignem non experti, æqualem modum inspergito. **ALIVD.** Chalcitidis drachmæ uiginti, lachrymæ thuris uel tenuioris eius partis drachmæ sedecim, resina

resinæ frictæ, gypsi, combusti, singulorū drachmæ octo. ALIVD.
crustas inducens sanguinemque reprimens. Chalcitidis, æris
combusti, atramenti sutorii, misyos tosti paria pondera, item
Rhodia dicta, & Xanthe probè sanguinem cohibent.

† Hic locus sic rectius legitur in vet. τῇ δὲ φλεβὸς μελάντε
ρον τε καὶ παχύτερον, &c. uenæ autem nigrior & crassior sine
pulsu.

† Rectior est scriptura in ueteribus lib. ὄνωις ξηρὰ ἢ ὑγρὰ.
id est, Ononis sicca uel humida. Quid autem sit Ononis, Dio
scorides & Galenus docent.

De nervis conuulseratis.

Cap. LIIII.

Neruis uulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obti-
nent, acumine, inflammatio & dolor immodicus acci-
dit. Quare & febres & conuulsiones his oboriuntur,
quibusdam & delirium ob commercium quod nerui cum ce-
rebro obtinent. Interim uerò in aliis quoque ambientibus par-
ticulam uulneratam locis inflammationes, & abscessus ex ip-
so neruo uulnerato ob cohærentiam solet accidere. Ratio igi-
tur est, cutis uulnus apertum inglutinatumque; relinquere, quò
per id sanies effluat. At si punctus in conspectum non ueniant,
etiam duabus lineis sibi continuis incidere præterea oportet.
Remedio autem est, si corpus plethoricum sit & magna urit in-
flammatiō, primum à sanguinis demissione auspicari: si uerò ui-
tiosis repletum sit humoribus, etiam purgatione utendum est.
Medicamenta uerò uulneri applicentur quæ dolorem leniāt,
& effluxum saniei patefaciant, non facta præsertim diuisione.
Itaque aqua calida, quanquam reliquis inflammationibus sit
accommodatissima, uulneratis tamen neruis est inimica, ac
præstiterit eos oleo subtili, quod astrictionis sit expers, ad sen-
sum calido irrorare, neque enim frigida neque tepida admo-
dum tutò adhibetur. Verum ex medicamentis idonea est te-
rebinthina resina, per se quidem, in pueris & mulieribus &
ijs qui molli sunt carne, cum euphorbio autem emollita,
in duris corporibus: & si nonnunquam duriora contige-
rint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasmata uerò in
neruis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhi-
bebis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruinam,

in lixiuio, cum oxymelite coctum. Si putredine careant puncturae neruorum, recte cerato uteris, quod recipit ceræ quadrantem, euphorbij unciam, aut columbini fimi in duriusculis corporibus, olei sextantem, interdum etiam terebinthinæ unciam: ut autem emplastri figuram induat medicamentum, uncia uni euphorbij, sex uncias singulorum sequentium, ceræ, resinæ frictæ, olei, picis liquidæ injicies. At si in uicem resinæ propolim pinguisimam indideris, multo id reddes præstantius: atque hoc ad nervos punctos laudatum est remedium: idem & à rabioso cane morsus efficax est. Aceti sextarius, picis pinguis libra, opopanax quadrans: opopanax aceto solutus magis læuigatur, pix liquefacta mixtaque coquitur: medicamentum compunctis nervis idoneum est, ut quod os puncturae non sinat conuiuere, quemadmodum nec in his qui à rabido cane morfi sunt, ulcus in cicatricem coalescere: sed efficax solis duris corporibus sinat autem in pueris, aut molli carne præditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex digerente quodam amaracino, aut obo balsamo, aut oleo ueteri liquefacere. Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem uiuam, aut euphorbium, aut sulfur uiuum, aut syluestris columbæ fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut liquorem cytenaicum, aut castoreum, ac in medicamento libram, dictorum alicuius uncia debet injci. Facit autem bene neruorum uulneribus & præsertim puncturis: quin & in agro ubi nullius copia datur propolim recentem pinguemque uulneri poteris inducere, aut fermentum maximè uetustum, per se aut cum propoli minutum, uel cum liquore tithymalli: cataplasmatibus utendum ex oxymelite factis, aut lixiuio cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut hordeacea, aut subtiliore polenta. idque non solum dum inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio protinus. Cæterum quæ relaxant cataplasma in neruorum uulneribus semper uitare oportet. At si nervus non punctim, sed planè cesim uulneratus fuerit, cute etiam quæ interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectus, non transuersim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acribus nullis utere, quippe nudus cum sit nervus, uehementem ipsorum uim ferre nequit. Quare calcem quæ sæpius æstiuo tempore lota sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quæ
ex

ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosa
 ceo largiore liquefactum. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex
 ijs uulnus contingat, quandoquidem neruus ipse & sensibilis ma-
 ximè est, & temperamento suo frigidus, & principum corpora
 partium primati continuus, imò ne oleo quidem eiusmodi ul-
 cus irrorare conuenit, hinc enim sordidum redditur. Abluenda
 igitur à uulnere sanies est molli lana specillo subunctorio cir-
 cumuoluta. Quòd si omnia ex animi sententia processerint, èt
 uino dulci madefacere citra periculum licebit, sed in robustio-
 ribus Polyidæ pastillo in linamentum illito cum sapa calida
 uti postquam neruum denudatum contexeris, linamenta ex-
 trinsecus circunducere oportet ex medicamento quod angu-
 gis uulneribus faciat, nempe eo quod euphorbio præparatur,
 aut fimo columbarum: sed ita ut etiam sanas partes ampliter
 comprehendat. Quum uerò transuersum nerui uulnus est, ma-
 ior conuulsionis metus impendet, ac quæ ad curationem uul-
 neris spectant. hic quoq; sunt eadem, quanquam nonnulli in
 uulnere adhuc recenti futuris usi sunt, ac medicamento aliquo
 conglutinatorio: uerum suturas non summæ nimium cuti, sed
 altius moliri conuenit, ne quæ in imo sunt inconglutinata de-
 hiscant: rursus cura adhibenda est, ne ab acu neruus compun-
 gatur. Cæterum in summa sciendum erit, in neruorum uulne-
 ribus medicamentum natura calidius quod puncturis mede-
 tur, diuisionem nerui non posse curare, ut qui rosionem ipsorū
 feruoremq; sustinere nequeat: neq; quod diuisionibus mede-
 tur, puncturis conuenire: non enim uirtus ipsius altè quā an-
 gusta est cutis diuisio, penetrat. Victus itaq; adhibebit tenuior,
 lectus mollis, oleumq; calidum alis, capiti & ceruici superfun-
 ditur, at si in crure neruus uulneratus sit, inguinibus, inferiori-
 bus uentris partibus, & locis uicinis: balneo in totum donec
 inflammatio inclinauerit, abstinendum est, quum aquæ conta-
 ctus nequaquam, ut dixi, ipsis conueniat. Quoniam uerò non-
 nulli citra id manere consuetudinis gratia non sustinent, siqui-
 dem læsa particula in manu fuerit, conādum est quatenus fieri
 potest, ipsam aqua seu calida, seu multo magis frigida nō made-
 facere. Si pes uulnus acceperit, quoniam fieri nequit ut nō ma-
 descat, ubi lauacrum ingressuri sunt, emplasticum aliquod me-
 dicamentum uulneratę parti superaccommodabis, iterum ex-
 trinsecus linteolos multiplicatos plures oleo imbutos iniicies,

iterum fasciam ex linteo à foris deligabis, deinde rursus in ipso balneo fasciam oleo prius superfundes, cum æger in solium descendet: ubi lauerit, omnia quæ imposita sunt abicies, ac prædicta totius curationis ratione uteris. Contusi uerò nerui ubi simul cum his cutis contusa exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarum lomento & oxymelite postulant, nonnunquã adicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picem liquidam admisce: sin autem citra cutis contusionem euenerit, magis discutient adhibebitur, nempe oleum calens, anethinum dico, superfusum continuè, aut rutaceum, aut irinum, aut amaracinum. Quòd si totus nervus præcisus sit, periculũ quidem nullum sequetur, uerum particula debilis manebit. Curationis autem eius communis est cum ea quæ aliis ulceribus accommodatur, hæc quidem ex simplicioribus remediis in neruis conuulseratis curatio abundè est. quidam uerò compositis uti consueuerunt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione præparatum, melan chloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorum & compositiorem, & utendi modum septimo libro reperiēs. Sed quia nonnulli præpotentium etiam sumptuosius ad neruorum uulnera remediis uti uolunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas neruorum, hæc, cinamomi, dictamni, sceniculi, singulorum uncia, amaraci sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terebinthinæ uncia. ALIUD. Liqueoris cyrenaici uncia, ceræ quadrans, opobalsami libra. Ad denudatos neruos hoc ualet. Ceræ unguentariæ quadrans, unguenti spicati, aut foliati, aut nardini libra, rompholygis, spicæ nardi, amomi, phylli, singulorum uncia, atq; hæc supra spem respondere Galenus pronuntiauit.

De articulorum contractione seu ligatione, quæ ancylosis dicitur. Cap. LV.

Articulos ex humidioribus infarctis, ac neruea quadam tensione contractos, detentosq; ancylos, & ancyloses appellare cōsueuerunt. In quibus remedio opus erit quod emolliat relaxetq;. Communiora igitur his remedia conueniunt, quæ in particulis scirrhis induratis, ac adeò quæ in resolutis commemorata sunt, propria uerò magis, irroratio ex hydrelæo, in quo decoctum sit lini semen, scœnugræcum, althea, auris, cucumeris agrestis radix, ipsumq; oleum hieyonium. Vbi
his

his artus irrorati fuerint, accommodatur primum acopa simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete, Bromiū, quod ad Basileum refertur, Pyxis, deinde Aristophaneū, & quod Asanirō attribuitur. Validissima, Lisoponium appellatū, & Pœcilū: emplastra, quod Amythaoni adscribitur & Anicetum. Laudatissimum uerò quod recipit bdellij, adipis uitulini, suffiminis ammoniaci, iris illyricæ singulorū drachmas sedecim, opopanax, galbani cachryos, styracis, thuris singulorum drachmas octo, piperis grana centum sexaginta, ceræ libram semissem, resinæ terebinthinæ tantundem irini sedimenti quod satis est, & uini quantum sufficit: tunditur hoc medicamentū. Est & acopon non inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter acopa uero & emplastra, medicamentū medium est diapternes. uariis confectum misturis. Verūm acoporū usus molli adhibebitur & continua frictione, ita ut simul affectum articulum experiare, an flecti possit, & extendi.

*De articulis relaxatis.**Cap. LV I.*

LAxantur subinde articuli ob longos februm morbos, colicos & resolutorios, præsertim ubi calidior ipsos humidiorq; intēperies occupauerit: atq; motus inde impeditur. Succurrit his acaciæ succus aqua dilutus & parti superfusus: aut rubi, aut myrti, aut lētisci, uel ulmi radicū corticis decoctū cōgruet, aut malicoriū applicatū, aut myrti folia, cū cerato myrteo imposita. Nā colligātes nerui firmari desiderant facultate quæ astringat deficcetq; huiusmodi igit medicamenta articulis imponi debēt, cuiusmodi ex salicibus est & oxyra, & palmulatū quod uinum astringens, aut acetum assumpserit. Multi uero eiusmodi impotentia m à frigore fieri putātes, deinde calidioribus usi præsiidiis, maiorem noxam intulerunt.

*De lumbricis.**Cap. LV II.*

TRes sunt uniuersæ lumbricorum differentię: prima teretum secundum crassitiem, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nuncupant. Origo omnium generum est ex cruda, crassa, pituitosaque materia & putredini accommoda, qualis in pueris aliisq; uoracibus colligitur: non autem ex calida, acri, aut melancholica substantia. Hæ siquidem alimenti naturam egressæ, lumbricis procreandis ineptæ redduntur. e contrario autem, biliosa potissimum recrementa

etiam hos perimunt. At si quando flaua bilis una cum lumbricis infra, aut etiam uomitu eruperit, ipsos quod de intestina obfistere, humorem uero biliosum uentriculi os aut aliam quampiam particulam occupare scito. Cuiusque igitur ipsorum differentiae speciem, generationem, locum, notas, curationemque exequemur, à rotundis exorssi.

De rotundo lumbricis.

Teretes igitur lumbrici speciem habent omnibus perspicuam, quod sane aliis frequentiores sint in gracilibus plerumque intestinis consistunt, & superiorem uentriculum subeunt, ideoque frequenter per os reiciuntur. quibusdam & è naribus redditi sunt: atque hoc genus infantibus peculiare & plurima parte cum febricula: sed per febrium initia orti, substantiam ex subiecta corruptione retinent: in statu, ex malitia morbi: in declinatione, toto ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriae mandauit bonum esse indicium teretes lumbricos prodire cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito etiam intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorum & uentris, tussis exigua cum siccitate irritantes: nonnullos comitatur singultus quoque, & somnus cum palpitatione, iique sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore expergescunt, & iterum sopiuntur pulsus inaequales & febres augescunt inordinatè, quae cum extremorum perfrictione, tertiam, interim quartam, die uel nocte accessionem sine ratione habent. Infantes autem etiam mandent lingua inaniter exerta, & dentibus strident, oculis conuiuent, uoluntque conuiescere, excitantibus ipsos indignantur, tociuli apparent, genaeque rubescunt, ac rursus liuent: atque haec paulatim & ex interuallo. Quibusdam nauseae & rosionis causae stonacho peculiare creantur, atque aegri cibum respuunt, compulsi aurem ad cibum nauseabundi uix quod assumitur deglutiunt, uel etiam assumptum reuomunt, plerisque uero alius descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neque esurie, neque euacuatione modica suborta, At qui non in omnibus omnia quae iam commemorauimus signa inquirere oportet. sed nonnulla ex eo quod praepollet interim & plurima. Haec autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt toduntque, febris autem calor uapores sursum, cerebro

cerebro transmittit prauos, ex putrida in uentriculo collecta humiditate exhalantes, in quibus amborum partim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere cōitemur. Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alii produnt se lumbricos uidisse, qui ex inguinibus ægri eruperint. Cæterū occisos hos omnes prius educes: occides autem, amaris potissimū usus remediis. Cum igitur febris & lumbricorum communis sit curatio, conuenient auxilia simpliciora: potui igitur dabitur chamæmelorum decoctum uel myxariorum, ut appellant, uel ipsa myxaria decocta esui dantur: item sereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida uel cum posca, uel myosotidis herbæ decoctum, uel cornus ceruini ramentum, uel minium synopicum tenuissimum, ac olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeant, qua enim amarum est, lumbricos occidit: quā lubricum, detrahens ipsos cum stercore reddit. At si inflammationem distentionemq; uiscera experiantur, cataplamate urendum est, quod lini semine, farina lœacea, absinthio & bryoniæ radice constat, ex hydromelite uel etiam humido fotu ex oleo chamæmelino, uino, absinthii semine, & aloe, præcordiis accommodato. Vbi uero non uehementer febres molestant, miscenda est myxariis mentha & exhibenda est. Cum ad integritatem uentū est, efficaciora quoq; usurpantur, quale est decoctum seriphii uel calaminthæ, uel filicis, uel cardamomi semen, uel mali punici acidi radicis ius ad tertias redactū, uel fricti cumini, uel nitri fului, singulorū scrupula tria, uel sandonicum uel abrotanum, uel etiam ambo simul, cum melle in catapocia coacta, uel lupinorum amarorum scrupuli terni uel brassicæ, uel erucæ semen læuigatum, uel absinthinum, quod etiam solum frequenter abundè fuit. Dantur autem & ter-na lotæ aloes scrupulæ quod remedium est laudatissimum: in ualidioribus illota quoq; aloe utimur. quia uerò ifantes aloën cochleari non admittūt, supinis fasciola ipsis detentis, ore aperto per clysterium quoddam ualido munitum canali, inuitis aloes quā penitissimè transmissam iniicimus. Atque hæc mirifica medendi ratio in pueris est, qui difficulter possunt tractari: quibus etiam cibos subinde sorbiles, quemadmodum iis qui cibum auersantur, infundimus. Cæterū & cyphi & masua-phium

phium rectè dabitur, item cornu ceruinum combustum cū pipere & melle uel oxymelite, reliquaq; ex oxymelite ipsis dare conabimur: præstiterit autem si acetum scillinum fuerit, præfertim ætate prouectioribus, aut sinapicū oleo & aceto ad cochlearis magnitudinem. At qui lumbricis, cum alui profluuiis infestantur, præbent plantaginis succum, ipsamq; plantaginem aridam assument, ex quo enim utriq; & fluori & lumbricis efficax est. Cataplasma his accommodabitur ex farina ordeï cruda, filici, absinthio, farina lupini, sandonico & abrotano. Iam uero & malicorium acacia, galla, uel balauustum admiscetur. Quoniam uero nonnulli subinde amaras potiones ceu ingratas respuunt, ex iis quæ modò comprehensa sunt, dabuntur non manifestò amara. His accedent insuper chamæditys, marrabium, helenium, baccæ lauri, acacia, thymus, pulegium, carpesium, iuncus odoratus angulosus, polypodium, iris, ênicon, erythrodanon, spina ægyptia cum pipere, singula sex scrupulorum instar: item decoctum menthæ, mori radice succus decoctum uie, petroselinum reliquaq; odorata semina, extrinsecus autem inducitur aloë cum melino & uino. hoc & appetentiam excitat: quæ uix maguo negotio recipitur: miscetur autem sæpius aloë absinthium: aut felle taurino, cum amaris quibusdam prædictis umbilicum impleto: aut oleum ex rhododaphnæ factum sæpe delinetur, aut liquor cedrinus & solus cum cerato, toti uentri imponitur, aut pix arida trita inspergitur, uel mentha, uel melanthium cum rosaceo, uel etiam seriphij decoctum ipsis admiscebitur, uel fraxini perficæ folia in pollinē detrita applicamus. Utendū uerò est & medulla cerui, unguinis modo, in umbilico, inferiore uentre & lumbi: ceratūque adiūgetur, si res postulet, hoc, Aloes, absinthij, farinæ lupini, seriphij, melanthij, singulorū scrupula sex, ceræ uncia & semissis, chamæmelini quod satis est, felle taurino arida læuigantur. Porro ab inferioribus partibus mulsam iniicere sæpius expedit, quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant: si autem putrefacti in alto corporis non excernantur, sed potius uapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloes, aut medicamenti amari ex ea confecti portione, quandoquidem etiam in aliis mediocri alui uacuatio, non expers est præsidij.

† Integra huius loci scriptura est in antiq. codice ὁ φθάλμος καὶ οἱ φακοὶ ται, oculi caui apparent.

De latis

De latis lumbricis.

Latus lumbricus mutatio est (ut ita dicam) adnatæ in interiori intestino membranæ in materiâ animalis modo mobiliem, quæ sæpe tota redditur longitudine incredibili, uel pars ipsius excernitur: dissolutus uero, non coalescit: & nunc in iis etiam qui febre carent, abundat: nunc febricitantibus accidit, ex longo morbo continuas stomachi rofiones inferens, ac impotentem ciborum appetentiam. Nam quod animatum euasit, in intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur, His occupatos comitatur corporis gracilitas & pulsus inæqualitas, cum inæqualitate: at quod certissimum est indicium, cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernuntur. Curatio concordat, potio enim ex acris petita, & alliorum esus, tum filicis, uel centaurei decoctum, & potum & ab inferioribus partibus inditum, uel calaminthæ uel dictamni, uel pulegii: dabitur autem in aluum & muria. Præbire uero hoc medicamentum quod sequitur, neq; ijs qui aliis lumbricis infestantur, inutile est, si febre potissimum uacuerint. Nitri rubri, piperis, cardamomi pares portiones: dantur terni scrupuli cum uino aut aqua calente. *ALIVD* eclegma. Piperis, baccarum lauri purarum, cumini Aethiopici, mastiches, pares modi, mellis quod satis est: datur cochleare unum mane, & dormituro. At si efficacius id fieri desideres, nitri quoq; rubri parē portionē adicies. *ALIVD*. helenij, suffiminis ammoniaci, piperis in alio filicis, singulorū drachmæ quinq; cum oxymelite calido: tempore interposito dabit euphorbii drachma, uel duæ prouectoribus potui. *ALIVD* Filicis acerabulum, nitri drachmæ duæ, datur uinum cochleare aquæ euacuatione prius facta: satius aut erit si etiam scammoni momentum assumat. *ALIVD*. Mali punici acidi radicū corticis in summo decorticati drachmæ quatuor, piperis tantundem, cardamomi drachmæ sex, marrubii drachmæ duæ, melle dantur, porro prius assumpto. Verū ut ex toto affectus discutitur, theriacem quoq; exhibebis, si ualida febris non prohibet.

*De ascaridibus.**Cap. LVIII.*

Ascarides, ut modò etiam diximus, specie lumbricorum cōtinent, uermibus similes quæ in extremo lōganone & mu-

& musculi anum stringentis σφιγγης Græcis dicitur, initio reperiuntur, uehementem locorum horum pruritum excitâtes: generant speciem hanc praua alimenta, perfrictio, & ciborum corruptio. Vacuari igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momêto, uel nitri: in prouectioribus, acri muria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucurbitæ syluestris, aut absinthij, aut chamæleontis, aut anchusæ, aut cnici, aut hyssopi, aut pulegij, aut calaminthæ, aut lupinorum: secundum clysteres sublinetur longanon, simplicibus quidem, acacia, aut hypocystide cū nitro, aut rhu syriaco cum alumine liquido: at quibus aluus astricta est, lemmia sphragide, cum uino: compositis autem Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem multis peruiū foraminibus, quales ab utero metrenchytæ appellantur: aut carnem salsam commodè impositam deligamus, quamdiu sustineri possit, eamq; frequenter mutare oportet. Cæterum cōmuniter omnes quos lumbrici male habent, pellichneumonis iuuant, suffiri. Cibi præscribentur ipsis probi succi, & qui faciliè in membra digeruntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugent, nec uires superari permittunt, propter quas & uinū aquosum exhibebimus: frequentius autē nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones pariāt. dabitur autem cibus, tum præcipuè quum potissimum nutriti magis fuerint. At si alui profluuium fuerit, sciendum est lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam sorbiles ægris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, uerbi gratia, pyris, aut malo cotonio, aut malis punicis, præcipuè acidis, à foris autem uentri remedia continentia inducuntur, de quibus supra dictum est.

De dracunculis.


Cap. LIX.

IN India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitâtia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam latera sub cute perreptant & palam mouentur, deinde cum diu extremum aliquod dracunculi remanserit locus suppurat, & cute ipsius adapertha, initium ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, præcipuè abrutus. Quapropter nonnulli dicunt plumbeam molam ex dracunculo suspendendam ne uersum,

uersim, sed particulatim molis pondere decidat. Alij uerò hos damnant quòd nihilo magis pondere molis plumbeæ dracunculus abrompatur, & dolores uarios concitet. iubent partem in aquam dimitti calidam, quò dracunculus tepefactus foras prorepat, deinde digitis ipsum membratim extrahere. At Soranus neque animal prorsus, sed neruosi cuiusdam substantiam esse putat, quòd opinionem motus solum præbeat, siue autem hoc sit, siue quod prius dictum est, Sorano & Leonidæ, alijsq; uisum est, calida superfusione & cataplasmatibus concoquentibus in his uti ex mulsâ, farina triticea, aut hordeacea. Est cum emplastri usum eiusdem potentia probant. Conuenit autem & quod ex baccis lauri & quod ex melle constat: emortui siquidem horum usû dracunculi, nimirum quod continetur corpusculum excidit. Suppuratione autem facta, nisi exiderit, cutis diuidenda est: ubi denudaueris, quod continetur auferes, & cutem linamento penetrabis, ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quæ puri sit maturando.

FINIS LIBRI QVARTI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDICO
CO INTERPRETE.



PAVLI AEGINETAE
LIBER QVINTVS,
IOANNE GVINTERIO
Andernaco Medico Interprete.

Quomodo quis ab omnibus communiter
uirulentis bestijs se tueatur. Cap. I.



DE VIRULENTIS bestijs præcipien-
tes, ab ijs quæ in omnibus huiusmodi
cōmuniter proficiūt, ex ordiemur, ita,
ut quomodo quis ab illarū iniuria se
tueatur, prius expediamus. Si igitur
aliquis necessitate quapiā coactus, lo-
co feris frequenti obdormiat, ubi po-
tissimū salamandræ aut phalangia, aut
serpētes aliqui abundēt, horū cauas la-
tebras allio in aqua detricto, aut aliqua ex herbis quas expone-
mus, obturare conuenit. Suffitus autē rectē excitantur ex cor-
nu ceruino, caprarum ungulis pilisve, lapide gagate, bitumine,
bdellio, galbano, cupressi aut cedri rasura, melanthio, peucedaa-
no, uiticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachryos radice, cu-
nila, aut ex reliquis grauitè olentibus aliquo. Culces autem
proprie persequitur suffitus ex atramenti sutorij, melanthij syl-
uestris, seminis cumini, paribus modis, item finus bubulus eos
dem fugat. Ad hæc etiam ignes incendere crebriores uincit, fu-
giunt enim magna parte feræ eorū splendorē. Cæterum totū
substernere ex hastula regia, nepita, uitice, pulegio, polio, cu-
nila bubula, abrotano, expedit. At si toto huiusmodi toto uti
non

incocta: aut acetum & aquam marinā aut acetum cum muria. Cæterum locis effectis gallinæ, & magis galli gallinacei, aliave animantia per medium dissecta, calida imponi debent. Nam uirus transsumunt euocantq; & dolores mitigant. Emplastra quoque utiliter applicantur, tum hoc quod sale, tum illud quod cachry & adarce constant: in totum, quæ acrioris sunt potentia. Omnes uero communiter & morfi, & icti à quocunq; tandem uirulento animali, præterquam si interiora omnino offensa non sint, porabunt serin, aut ericen, aut astragalon herbā cum aceto, aut bitumen, aut paliurū similiter, aut ueteris rhu decoctum, aut mustelę inueteratę drachmę duę ex uino sumptę, præsentī sunt remedio, uel marinę testudinis sanguis, aut castorei drachma cum diluta uini potione, aut roris marini tantundem, aut sicyonię radicis aut porri succus, aut chamæpitys, aut smyrnium, aut cinamomum, aut aristolochia, aut uiticis semen, aut cupressi pilulę, aut seseli, aut piper, aut trifolij semen, aut baccę lauri, aut cancer fluuiatilis tostus aut elixus: item composita hæc Theriace utilis est.

*Theriace aduersus uirulenta & lethalia uenena,
uiperę morsus, & scorpionis ictus.*

BRyonię, opopanacis, iridis illyricę, roris marini radicis, zingiberis, singulorū drachmę quatuor, aristolochię drachmę quinque, lachrymę thuris, rutę syluestris, singulorū drachmę tres, farinę erui drachmę duo: singuntur pastilli uino, danturq; singuli qui treis obolos pendeant, ex eodem uino. Cæterum purgatio omnibus conueniet, desudationes, & theriace ea uiperis assumpta.

De rabiosi canis morsu, & metu aquę, quę hydrophobia dicitur. Cap. III.

EXordium sermonis à rabiosi canis morsu capere, quā ab alijs muluimus, quod animal & fœcundū prouentu, & contubernale homini existat, rabieq; sæpius corripitur, & agrè caueri possit, ac periculū ab eo sit ineuitabile, nisi multis aliquis & conuenientibus usus fuerit præsidijs. Rabiunt canes plerunq; in æstu uehementiore: autem Lycus memorię mandat, interim etiam per frigora maxima: rabidi autem & potum & cibum auersantur, siti premuntur, neq; tamen bibunt: anhelant præterea non parum, aures inclinant, saliuam & copiosam

pioſam & ſpumantem ædunt, & muti in rotū ſunt, & ueluti inſani, ut ne domeſticos quidem agnoſcant: inſiliunt itaq; ſine latru omnibus pariter & beſtijs, & hominibus, mordentq; . ubi momorderint, ſtatim quidem nihil moleſtię adferunt, præterquàm ex uulnere dolorē: poſtea uerò aquæ metum, hydrophobiam Græci appellant, faciunt, qui cū conuulſione, totius corporis rubore, præſertim faciei ſudore, & anxietate accidit, aquā fugiunt, & dum uident, & dum admouentur: nonnulli etiā omnem humorē: alij canum ritu delatrant, & obuiū quemq; dentibus appetunt, morſuq; ſuo in alios eandē affectionē tranſferunt. Porro accidentiū, aliorū quidem cauſa manifeſta eſt, occupatis. ſ. ueneno partibus uniuerſis: metum uerò aquæ nonnulli ex immodica fieri ſiccitate dixerunt, quaſi humida ipſorum ſubſtātia in contrarium penitus habitū mutata. uerum Ruſus talem melancholię ſpeciē ipſis oboriri pronuntiauit, ueneno humorem illum imitato: quemadmodū alios melancholicos nouimus alia timere, quæ cauſa ſuperuenit etiā ijs qui dicunt canis qui momorderit imaginē in aquis opinari ſe uidere. At ex ijs qui hoc uitio ſunt occupati, nullum, præterquàm unum aut alterū, ſuperuixiſſe, ex hiſtoria didicimus, eoſq; non à rabioſo cane morſos, ſed ab homine quodā morſo uitii adeptos. At ante affectus huius occupationē multi etiā quos canis momordit, ſeruati ſunt. hinc igitur curatio auſpicanda eſt. Quoniam uerò ſubinde, eo quod tunc aquæ metus non inuadat, (magna. n. ex parte circa quadrageſimū ferè à morſu diē ſolet ingruere, quibuſdā & poſt ſex menſeis, proditū eſt nonnullis poſt ſeptem quoq; obueniſſe) nonnulli canem qui momorderat non rabire arbitrati ſunt, properarunt uulneri cicatricē inducere: unde ipſi cauſam huic affectioni dederunt, hac autē probatione uſus deprehendes, morſu rabioſi ne canis fuerit, an non. Iuglandibus nucibus conciſis uulnus diligenter obſtruitur, ſequenti die ablata, gallinaceo, aut gallinæ in cibo apponuntur: ac primum ſanè non attingent, fame autem urgente ſi edant, rem conſiderato. Nā canis qui momordit ſi nō fuerit rabioſus, uiuent: ſi rabidus, ſequēti die peribunt, atq; tunc ad uulneris dilatationē properandū eſt, iterumq; poſt paucos dies eadē probationē tendū, & ſi non perierint gallinacei, tunc uulcus ad cicatricē perduces, nullū ueritus periculum. Hanc itaq; probationem Oribafius tradit. Quod ſi ex cōmemoratis indi-

PAULI AEGIN.

y ciis.

cijs accuratè canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quæ aperiendi uim habent, utemur. Primum igitur ex aperiuntibus est, quod pice, aceto quod acerrimo, & opopanace compositum fiat, in capite de neruorum uulneribus explicatum: at si qui mortuum accepit, delicatiorē cutem habeat dilui ipsum irino debet aut balsamo, aut eiusmodi aliquo: uel ulcera prius fomētis adiura, allio obduces. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

Aridum ad crustam in canis rabiosi morsu excitandum.

Salis fossitij drachmæ octo, chalcitidis drachmæ sedecim, scilicet tantundem, rutæ uiridis drachmæ quatuor, æruginis rasæ totidem, marrubij seminis drachma: utitor primū arido ut crustam inducat, deinde cum rosaceo, ut crustæ excident. Cæterum partes affectæ ad dies quadraginta duos, ut minimum, sine cicatrice seruentur.

Cataplasmata quod oras uulneris latas in rabidi canis morsu seruat.

Cepæ cum sale & ruta inducuntur, aut la serpitiū cum sale, aut salsamentū uetus, aut cinis sarmentaceus cum oleo, aut alia, aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrū, singulatim, aut cum sale: aut iuglandes nuces, cum allio, sale & melle, aut cinis ficicerato exceptus, uulnus autem aqua, abluetur, in qua decocto sit chamæmelum, & syluestris lapathi radix. Nonnulli & ferro candenti ulcus adurunt. Cæterū potui assument comorfi, simplicia quidē, lycium, absinthiū, liquorē silphij, chamædrin, scordiū & poliū: composita autē hæc, cancrorū fluuiatiliū, sarmētorum uitis albæ, in cyprio uasē, aut æreo cōbustorū, cochlearia duo, gentianæ radice læuigatæ cochlear unū, cum uini meri ueteris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato, aliqui uerò & perdicis sanguinis duo cochlearia addunt. Capiēs autem cancrorū dū lina increseit, priusquā sol exoriat. iis autē qui eodem die non biberunt, duplicē portionē exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca ex uiperis rectè datur. Purgare expedit medicamēto ex cucurbita syluestri, ita ut quotidie, id exhibeas, cum decocto elelisphaci, aut sideritidis heraclia, quam & dialyson appellant: nonnulli uerò & iecur canis qui momordit edendum dederūt. Cæterū uictus ratio talis adhibenda est, quæ simul ueneni uireis haberet extinguatque, simul & descensum ad interiora prohibeat: quæ duo præstare potest, uini dulcioris uetusti

uetuli & meraci, lactisq; potio. idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedimentum aliquod non præsumpta quæ retulimus remedia fuerint, carnis præscissio uel cucurbitulæ uel ustio non adhibenda est, ut quum iam uenenum penitus secesserit: medicamentis autem quæ euocent, Græci metasyncretica uocant, uti consilium est, aquæ metu uidelicet non oborto. purgatio ex hiera & scissili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per ueratrum.

Ad morsus canis non rabiosi. Cap. IIII.

Canis non rabiosi morsus, quum & ipsi uirulentæ cuiusdam substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, laeta manu morsum ferito. insuper nitrum cum aceto tritum ex alto in patrem fundito, deinde spongiâ recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidam imposito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim consanescet: uel erui farinam oleo maceratam imposito: aut spongiam recentem, aut lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi folia cū aceto tinsa inducito, aut cepam tritam cum melle, ut organi comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle: uel marubium nigrum, quod & balloten dicunt, cum sale ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim his efficax est: inflammatione conflictantes, argenti spuma trita ex aqua oblinito.

De uestis & apibus. Cap. V.

Apium ictu dolor sentitur. locus rubescit, propinquæ partes tument increscuntq; aculeus, in uulnere relinquitur. In uestis autem similia quidē, sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus utraq; lutum, & hubulus finis, illita: & lac ficulneum, aut læuigata mori arboris folia, aut maluæ: aut farina ordeacea ex aceto imponitur. quinetiā muria aut marina aqua fouere cōducit.

De phalangijs. Cap. VI.

Phalangiorū morsu, locus ipse quidem rubescit, & ueluti punctus per ambitū apparet, non autem tumet neq; incalcescit, sed leniter rubidus frigore & pruritu uexatur.

Comites notæ percussorum sunt perfrictio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, dolor ualidus, pallor, cōtinua urinæ ex cernendæ incitatio: quibusdā & urinæ difficultas, colis intensio, oculi hument: inguina & poplites intenduntur rigentq; cō uulso modo, ualida stomachi rosio urget, lingua sermonem manifestò non explicat, uomitus aquæ uel aranearum textis si milium erumpit. sunt etiā quibus per urinas, & aluum eadē descendūt demissi igitur in aquā calidā dolore liberantur, ac rursus ualidè indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerē ficulneū cum sale læui ex uino maceratum, imponas: aut radicem syluestris punicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea aceto madefactam. Iam & ulcera funere marina aqua calidiorē, aut apiastrī decocto, conducit, eiusdemq; folia imponere, ad hæc balneum frequentius utile est, atq; his potionibus medicis uti: uti abrotani semine, anetho, aristolochia, agresti cicere, cumino æthiopico, cedri baccis læuigatis, platani cortice, trifolii herbæ seminæ, myrticæ semine, singulorum drachmis duabus cum uini cyatho & uiridium cupressi foliorum aut pilularum decocto, uino temperato. Ferunt nonnulli & cancrorum fluuiatilium succum cum lacte & apij semine datum, periculo subtrahere.

De araneæ ictu.

Cap. VII.

Est quoddā etiam aranearum genus quod percussu ualidos dolores circa media præcordia excitet, item ruborem, & urinæ difficultatem, nonnunquā & suffocationē. Leuantur autē ictu hisce remediis: cumini syluestris thebaici, aut uiticis seminis, aut albæ populi foliorum poto, uel alijs solis assumptis & uino meraciore superbibito iuuantur.

De scorpionis ictu.

Cap. VIII.

A Scorpione ictis locus quā primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nūc feruor, nunc frigus uicissim inuadit, acceditque dolor qui itidem modo decrescit, modo intenditur, comitatur ipsos furor, horroris sensus, tremor, extremorum perfrictio, inguina his attolluntur, particula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus. His auxiliantur protinus, lac ficulneum instillatum uulneribus,

neribus, ipsæq; scorpio qui percussit minutim contritus, uul-
neriq; impositus, sibi remedium est. post hæc est sal tritus cū li-
ni semine salutariter imponitur, itē altheæ herbæ semen: suc-
currit & sulfur uiuū resina terebinthina exceptū: similiter ēt
galbanum splenii modo. dilatatū impositumq; nepitæq; læui-
gata & applicata, & ordeacea farina in uino parata & in rutæ
decocto exhibita. auxiliatur his ēt trifolii herbæ semen læuiga-
tum iniectumq;. Ad hæc, portiones hæc cōueniunt: aristolochiæ
drachmæ duæ, præsertim corticis cum uino, gentiana tusa, pu-
legiumq; abundē decoctū, item bacca lauri numero decem le-
uigatæ, nepita cū posca largiter incocta, cyperis cū uino, ruta
similiter, lac ficulneum & laserpitii, si adsit, si desideretur, par-
thico liquore utendū erit. benefacit ēt trifolij ocimiq; semen
ēporū. Idem præstat argenti spuma subito ictui præter opinio-
nem imposita omniū aut horum uicem præstat balnei conti-
nuus cum multo sudore usus, uini potio plenius diluta. Porro
composita hæc potari debent: sulfuris uiui fabæ Aegyptiæ in-
star cum piperis granis octo, in dimidia uini hemina: uel liquor
laserpitii cum cancro detricto in uino: aut melanthii, cumini
æthiopici, uiticis seminis, pares portiones cum uino.

*Ad scorpionum periculorum & pha-
langiorum ictus.*

FECIS drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, rutæ syl-
uestris seminis drachmæ tres, castorii, erucæ seminis, singu-
lorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine hirudinis marinæ.
dantur quaterni oboli cum uini meraci uel aceti cyathis tri-
bus. **ALIVD.** Pyrethri, aristolochiæ, singuli trientes, piperis
drachmæ duæ, liquoris laserpitii drachma: exhibetur ad fabæ
Aegyptiæ magnitudinem.

De scolopendra terrestri & marina. Cap. IX.

AT si scolopendra momordit, communiter quidem locus
affectus in orbem liuescit attolliturq;, aliquando feci si-
milis, rarius autem ruber apparet, exulceraturq; statim
ab ipso morsu adeo ut uix magno labore curari queat. præter
hæc etiam toto corpore pruriginis sensus percipitur peculia-
liter autem iis qui à marina scolopendra imperiti sunt, aquo-
sus pellucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Pla-
gæ igitur imponi debet sal bene tritus uel ruta leuigata, aut cinis

aceto maceratus, aut scilla. Fouendus locus est muria cū aceto. Arigenes aut oleo calido liberaliore fieri id iubet & praedicta sic imponi. Potui dabitur aristolochia cum uino, aut serpillum, aut calamintha, aut syluestris ruta, aut trifolium aut succus radicis hastulae regiae dimidia heminae mensura cum uino.

S Ad stellionis transmarini morsum. Cap. X.
Esamo trito cataplasmatibus modò obducito.

De fele. Cap. XI.

Q Vi à fele mordentur, ualidè quidem dolent, & locum affectum liuidum habent, sed statim cepae & allia ictui applicata, auxiliantur. insuper eorundem esus, uino meraco superassumpto, remedio est.

De mure araneo. Cap. XII.

V Bi uerò mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsatiles, & in singulis detiū eius animalis ictibus, rubores: pustula insurgit sanioso humore plena, propinquae partes oēs liuent: cute pustulae dirupta, albū ulcus apparet. nā ad mēbranas neruosas deraditur. ad haec, excidunt ēt partes exese depastione oborta, his quae serpunt simili: praeter ea ēt intestinorū tormina comitātur, urinae difficultas, & frigidi madoris undiq; eruptio. Auxiliatur ipsis galbani spleniū per se impostum, uel tritū cū aceto, uel ordeacea farina, cū oxymelite applicata, ipseq; mus araneus qui momordit dissectus admotusque sibi est remedio. aduersatur ēt pyrethrū illitum, uel mali punici dulcis corium incoctū, uel malua syluestris, uel allia contrita, uel sinapi laeuigatū cū aceto: itē ex calida muria forus conducit, deinde ordeū ustū ex aceto applicatū. Potui propinabitur abrotanū ex uino coctū. aut sisymbriū, aut serpillum, aut erica, aut galbanum, aut elelisphacum, aut tenerae cupressi pilulae cū oxymelite, aut pyrethrū cum uino, aut chamæleonis radix, aut hœdi agniue coagulū, aut gentianae radix, aut uerbenaca, quae etiam imponitur cataplasmatibus modo: ipsumq; murem qui momorderit, exactè detritum cum uino bibunt. Efficax hoc etiā quod sequitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiae corticis drachmæ quatuor. porrò ad muris aranei & scolopendrae morsum. sal cum liquida pice rectè applicatur, aut cera cum melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut calaminthae folia, uel ordeum etiam cum aceto.

De

De uiperatum mare tum fœmina. Cap. XIII.

IN uiperæ tū maris tū fœminæ morſu ſimiliumūe animalium uirus iaculantium, dolor loci ſtatim ab initio ſequit̃, mox totius corporis: apparent ēt in morſu duo foramina paruo inuicē ſpatio diſcreta, fluitq; ex his ſanguis humorq; ſanioſus, deinde oleoſus, poſtremò ēt æruginōſus, quē nonnulli uirtus uiperarū eſſe dicunt, præter hæc tumores iuxta morſum ſubrubi liuidiq; aſurgūt, corporis color perit: uerrigines oculorum, ſtomachi reſolutio, & animę defectus oboritur, quibusdam ēt uomitiones bilioſæ, urinæ anguſtia: inſuper puſtulæ in cōmorſa parte erūpunt, ueluti in ambuſtis: itē depaſtio ipſam inuadit, ad uicinā procedens, gingiuæ his cruentantur, accedit etiam tremor, ſopor, & frigidi ſudores. minori aut̃ cum periculo liberari, quos uipera mas, quàm quos fœmina momordit, uidentur: ex his ipſis minus periclitantur qui cibum præſumpſerunt. In curatione autem præſtantiffimum remedium eſt, alii eſus, & uini meraci potio, adeò, ut ſi aliquis uti ſuſtineat, nullum præterea remedium deſideret. edūtur etiam utiliter & porra & cepæ & ſallamētum quàm acerrimum. Sunt qui & ranas in cibo elixas dederunt, benefaciunt & hæc quæ ſequuntur cum uino ſingulatim pota: teſtudinis marinæ ſanguis reſiccatus cum cumino ſylueſtri, coagulū leporis, aut hinuli tribus obolis, ceruini genitalis ſicci, anchuſa tenui folia tota, hæc autē nonnulli ēt colloſuspendunt, porri ſuccus dimidiæ heminae meſura ex mulſa, apiaſtri foliorum ſuccus, ſylueſtris ruta, gallinarum cerebrum, panacis radix cum uino incocta, agarici drachma, iuniperi bacca, haſtulæ regiæ radix, piſtacia trita, uitiſis ſemen, muſtelæ inueteratæ ſiccataq; drachmæ duæ: echini radix ſuccusq; cancri fluuiatiles aut per ſe, cumq; herba pedicularia, ſale & polio: ariſtolochiæ radix cum myrrha, gentiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta, atq; hoc quod ſubjungam mirificè efficax eſt.

Oribasii ad uiperarum morſus.

ANiſi acetabulum, piperis, drachmæ quatuor, ariſtolochiæ corticis, opij, caſtorij, myrrhæ, ſingulorum drachma: paſſo læuigata in paſtillos inſtar fabæ Græcæ cogiro, & pro uiribus cuiuſque exhibeto, cum ternis diluti uini cyathis.

ALIVD; ex Lyci commentariis medicamentū uiperæ morſibus

y 4 præſen-

praesentaneum, Myrrhae castorij, piperis, sandarachae, singulorum drachma, anethi seminis acetabulum : laeuigata ex passio dantur. **ALIUD.** Ex Archigenis commentarijs. Cancros uiginti cum farinae triticeae quod satis est, in pila diligenter contundito, admixtaque nepita & salis momento, pastillos fingito & siccato: in usu, cum lacte applicato, unumque cum mulla potato. At si fluuiatiles cancros desideres, marinis utitor. extrinsecus autem plagae inductus caprarum finus ex uino strenue auxiliatur: aut lauri folia cum oleo incocta, aut baccae lauri, aut nepita, ericae, ruta, apium, abrotanum, galbanum in splenio adhibitum, origanum uiride laeuigatum, gallinacei pulli dissecti, † & protinus calidi impositi: farina erui cum uino macerata crebro emplastri forma illita, raphani cortex laeuigatus, scilla cocta, farina hordeacea ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cum tenuissimo farinae ordeaceae polline, sex uini similiter cum farinae polline, ruta cum sale & melle, surfures in aceto coctae, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cum sale. Foueri debent trifolij decocto aut pulegii, aut muria aceto adiecto. Quum autem subcruentae pustulae euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam coctam cum melle obducito, dum consanescant. At ex uiperis antidotum proprie his & potum & plagae impositum efficax est.

† Melior est uetus cod. ἐπιτιθέμενοι δεσμοὶ καὶ συχνῶς ἐπαλλάττονται, id est, calidi impositi & frequenter permutati.

De amphibæna & scytale. Cap. XIII.

Consimilia ex horum moribus eueniunt, eademque ipsi auxiliatur, quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non sunt.

De dryino. Galeni hæc præfatio. Cap. XV.

Dryinus in quercuum radicibus uitam agens, tam malefica parataque ad nocendum ui est, ut calcatus solum, pedes hominis cute nudos relinquat: totisque cruribus tumorem laxum quem oedema uocant, copiosum excitet. Ad hæc quod multo magis est mirabile, forunt omnes eorum pariter manus excoriari qui curationem uitii administrauerint, & si quis ulciscendi studio interemerit, dicunt hunc prauè admodum olere, illoque suo foetore omnium aliorum odorum sensum auferre. Ictis ab hoc animali tumor circa locum uitiatum cum

cum rubore excitatur, pustulæ in circuitu assurgunt. aliquando aquosa sanies emanat, stomachi erosio uexat, & torsiones. Cōgruit ipsis aristolochia uino pota. item trifolium herba, radix-que hastulæ regiæ consimiliter assumpta. prodest cuiuscunque quercus fructus lænigatus, & epotus. Itidem ilicis radices tusæ, & loco admotæ auxiliantur.

De hæmorrhoo, & prestere seu dipsade. Cap. XVI.

Qui hæmorrhoi ictum sensere, ualidos experiuntur cruciatus, admodum exigua angustaq; redduntur corpora ex dolore continuo, multus ex plaga sanguis erūpit: & si cicatrix toto corpore inducta fuerit, rūpitur, funditq; sanguinē, cruēta excernuntur recrementa, sanguis qui defluit in grumum concretus est: tussi ex pulmone sanguinem reiciūt, quæ euomentes ēt sine remedio intereunt. A dipsade percussos ardor intolerabilis urget, sitis tanta excruciat, ut nec extingui, nec intermitteri possit, copiesē potū ægri hauriūt, eadē tamē siti cōficiunt, tanquā nihil planē haussissent, similesq; toto habitu sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. unde propter cōtinuā potus assumptionē præstet ab urendo, dipsas à sitiendo serpens appellatur. Multi aut ueterum ab hæmorrhoo & dipsade commorsos ceu desperatæ salutis & conclamatos esse putauerunt. Porro si specialia aduersus feram præsidia desideremus, communia tētare oportet, ac protinus scarificationem uisionemq; adhibere: & si liceat partem uitiatam præcidere. deinceps aut acria cataplasma imponi debent. utilia sunt omnium ciborum acrium esus, præsertim quæ ex falsamētis petuntur, uini meraci potio, & lauacrum hæc autem continuē, & exiguis temporum interuallis subinde adhibenda, priusquam morbi corripuerint. nam ubi illi semel emerferint, nulla medicorum ope iuuantur. Cæterum remedia, quæ loco inducuntur. contra morsus inscripta reperimus, dipsadis quidem, portulacæ folia contrita ex aceto, polentam, rubi folia cum melle lænigata, plantaginem, hyssopum, allium album, porrum, rutam, urticam, hæmorrhoi præter iam dicta etiam hæc benefaciunt, uitis folia cocta cum melle lænigata per os autem hæmorrhoi ipsius crematum potui datur, aut allium cum irino oleo: esui dantur etiam uuæ passæ.

De

De natrice quam Græci hydron dicunt.

Cap. XVII.

Natricis morfu ulcus factū dilatatur, & liuescens auge-
tur, sanies ex eo nigra copiosa, & foedi odoris, qualis
ex depascēte ulcere, excernitur. Curatio mali, tēporis
processu, & uix procedit. impone ī itaq; moribus origanū læ-
ue, ex aqua maceratū. confert & cinis quercus, oleo tēperatus:
uel ordeacea farina cū melle deliquato bibiē, itē aristolochia
drachmis duabus diluta uini portione, uel in poscæ duobus cya-
this: deinde marrubij succus aut decoctū cū uino, aut nastur-
tium syluestre, aut semen hastulæ regiæ seu flos, aut fœniculi
semen cum uino: item recens fauus cum aceto comeditur:

De Cenchro. Cap. XVIII.

Quod si cenchrus nocuit, morsus eius uiperæ similis
est, putredo comitatur & carnes intumefactæ prius,
ut in aqua inter cutē, defluunt, lethargo ueternoq;
premuntur. Testatus Herasistratus est, iecur ipsis, uescam, & co-
lon affici: resectis siquidē ipsis, partes quodammodo corruptæ
inueniuntur. His igitur lactucæ semen cum lini semine appli-
catum auxiliatur. succurrit & satureia trita, ruta syluestris, ser-
pillum cū hastula regia læuigatum. potui uero daræ protinus,
centaurij radices drachmæ duæ cum ternis uini cyathis: aut
aristolochiæ radix similiter, nasturtium itidem & gentiana,
potu conducunt.

De Ceraſte & Aspide. Cap. XIX.

Tria aspidis genera Galenus prodit, primum eius quam
cherſæam quasi terreſtrē uocant, mox eam quæ chelido-
nia dicta est, tertiā pyada appellarunt, quæ omniū est
perniciōſiſſima. siquidē erecto collo, extenſoq; pro diſtantiā lo-
ci, ad quē dirigit, uenenū in hominē iaculatur. hanc memoriæ
tradiť, reginā Cleopatram, quā Antonio deuictō Auguſtus eā
capere uellet, ſiniſtræ mamme admouiſſe, morſamq; ab ea in-
teriſſe, ut quæ longē celerrimam mortē inferat. Porro cera-
ſtis, morſu locus cum duritie & puſtulis intumeſcit, emanat ex
uulnere ſanies, modō nigra, modō ſubpallida & porraceo colo-
re: totū corpus uaricum modo attollitur, genitale arrigitur,
mens alienatur, oculi obſcureſcunt: poſtremo, conuulſione ut
in tetano pereunt. Verūm aspidis morſus acus puncturæ ſimi-
lis, om-

lis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis non copiosus, sed exiguus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis multiplex admodum, sed mitis, nec sine uoluptate comitatur. Quapropter rectè Nicander cecinit.

Et uir perit absque dolore.

MUtatur color & uirescit, stomachi rosio exigua infestat, frons continuè reuelli, palpebræ sine sensu ueluti in somno commouentur, atque inter hæc morsprehendit, ne tertia quidem diei parte dilata. His itaque utrisque membri affecti mutilatio mox à morfu facta, succurrit: eoque sine mora, si fieri potest, præcidendum est, & in his & propinquis partibus omnem carnem circum secare statim, & radicitus usque ad os excindere oportet. deinde reliquæ ferro candenti exiccandæ sunt. etenim horum uirus, sicut & basilisci, taurino sanguine similiter, celerrimè sanguine siccatur, celerrimè sanguinem in arteris & spiritum coagulat.

De basilisco.

Cap. XX.

HAec bestia rarò quidem hominum oculis occurrit. Erastriatus autem hæc inquit quum basiliscus momordet, plaga sub aureo colore tingitur. conducunt ipsi, inquit, castorij drachmæ tres potæ. similiter etiam papaueris liquor. Nos autem hæc experti non sumus.

De pastinaca marina, & muræna. Cap. XXI.

IN marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio manifesta est, pisces enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliatur ipsorum moribus lactis ficulnei guttæ quatuor aut paulò plures, cum ramusculis, serpilli tribus aut quatuor, & quæ ad uiperas commemorata sunt.

De dracone marino.

Cap. XXII.

MArini draconis ictum plumbo infricato, aut serpillio trito obducito, aut lente elixa, aut sulfure cum aceto, aut dracone ipso euiscerato. foueri locus urina humana debet, absinthium cum diluta uini potione bibi: aut eleliphacus, aut furculi ficulnei, in dulci uino dilutum, aut piscis ipsius cerebrum.

De scorpione marino.

Cap. XXIII.

SCorpij marini ictum sanat nullus piscis dissectus impositusque, sulfur uiuum cum aceto infricatum, baccæ lauri tres tritæ potæque.

Quomodo

Quomodo testudinis marinae sanguis præparetur. Cap. XXIII.

Testudinis marinae sanguis in hunc modum præparatus, reponitur. In ligneo aut fictili uase resupinata testudine, caput ipsius celeriter amputato. cōcretum autem sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq; operculi instar uasi cribro: siccatum excipiens utitor aduersus uiperarum morsus, ut prædictum est, drachmis duabus cum uno aceti cyatho. sequenti drachmis quatuor, cum duobus cyathis: tertio die, drachmis octo cum tribus aceti cyathis.

De crocodili morso. Cap. XXV.

Ad crocodili morsus nitrum cum melle tritum usque dum ulcus repurgetur, imposito: deinde repleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tradit se cognouisse qui à crocodilis commorssi, adipe ipsorum imposita uulneribus, exactè fuerint adiuti.

De hominis morso. Cap. XXVI.

Non extra institutum fuerit, cum uirulētis bestiis, et hominis morsus conscribere. siquidē maligniores multo aliis ulceribus apparent, præsertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus usus, & præsertim lenticula. Cōmuniter itaq; quæ in aliis uirulētis cōmemorata sunt, et in his extrinsecus per initia moribus applicare cōueniet, præter ea quæ nimium acria, adurētiaq; sunt. peculiariter autem oleo morsum prius illitum, fœniculi radice cum melle obducito, aut lomento cum posca & oxyrhodino, frequenter immutans. Emplastro aut hoc utere, quod recipit squamæ æris, galbani, æruginis singulorum unciam, ceræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium: plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem, & squamam: ubi coierint, quæ liquari possunt adduntur. Finita autē inflammatione, communis ulceris modo etiam hæc curabis.

De uenenis. Cap. XXVII.

Quum de uirulētis bestiis succinctè tradiderimus, proximum fuerit, ut de uenenis sermonem aggrediamur, simplicia quidē referētes eorumq; notas & remedia, tum cōia, tum specialia: cōposita aut ex studio omitemus, etenim nonnulli uariorū medicamentorū lethaliū cōpositiones exposuerunt, quæ nocere magis, quā iuuare legētes possunt, neq; n exacta horum

Et horum indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, ut etiā congruum ipsis remedium queas adaptare. Quum igitur hæc uaria ex superante in ipsis ui appareant, id etiam aliquis rectè quod exhibetur, uarium adaptans, nonnunquam ex æquo, non nunquam ut excellat, medebitur. Incipiemus itaq; & hic rursus à præcautione.

De uenenorum præcautione.

Cap. XXVIII.

DE uenenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere illa, & declinare præcipit, longè difficillima est. propterea quòd ij qui huiusmodi insidias homini clàm machinantur, tanto id astu faciunt, ut uel peritissimus quisque decipi possit. siquidem amaritudines uenenorum dulci aliquo admixto, obtundunt, grauemq; odorè odoramētis additis operiunt. interim ceu ad sanitatē, salutisq; gratia in morbis hæc propinare crediti, quod genus est absinthium, abrotanum, opopanax, castorium, uenena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta solidioribus, uel obsoniorum uarietate adumbrantes, ipsa offerunt, unde cui in suspitione huius doli uita fuerit, uitare eum oportet condita elaborataq; cibaria, omneisq; in gustu qualitates intensiores, exempli gratia, dulcis, acidas, & salas, potissimum uero aquæ quod satis est præsumere oportet, restincto enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho non apprehenduntur ueruntamen alia quædam ratio asserendi hominem ab iniuriis uenenorum est, est efficacior. Couenit. n. quum suspicio mali medicamēti accepta fuerit, præcomedisse aliquid quod obtundere uenena possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt caricæ cū nucibus iuglandibus, ruta, salis grumo, & quæ mala medica dicuntur: item naporum semen drachmæ pondere cum uino, aut nepitæ folia, aut terram quam lemniam sphragidem uocant, aut tutæ folia uiginti: nullamq; nocebit uenenum. Iam uerò antidota cum uino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tutò admodū præseruant, quale est quod terrestri crocodilo constat, dia scincu dicitur, & quod à uariorum animalium sanguine dia hæmaton uocatur, & Mithridatium, hoc aliquando etiā ipse rex Mithridates usus est, quotidie præsumens, ut à lethali medicamento se uinuicaret, præseruaretq;. Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamento epoto, mori non posset, gladio sibi ipsi uitam ademit.

Quoniam

Quoniam uerò etiā citra infidias propter necessitatē aliquando locis desertis nociuis uersantes, fortē sub arboribus, ut picea aut pinu cibum assument, diligenter attendendū est, ne ex his aut superioribus locis mortifera labantur animalia, & uasa, tū quibus hauritur uinum, tum quibus aqua, tum quibus obsonia incoquantur, exactē operculentur, quemadmodum in uirulentorum animalium præcautione expositum est.

Communis uenenorum quomodocunque assumptorum curatio. Cap. XXIX.

AT si nonnulli lethale uenenū sponte sua, ut mortem sibi consciscant, assumpserint, qualia multa in hominū uita solent accidere, aut etiam aliquorū insidiis, siquidem nobis constet quod ueneni genus potatū sit, protinus ad conueniēs ei remediū descendemus, ut in horū enumeratione dicetur: at si medicamen exhibitū tunc nobis fuerit incertum incognitumq; conuenit statim ad ea quæ cōmuniter ad quæcunq; uenena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil planē in medicina spei est, egris propter moram iam deploratis, desperatisq;. Actutum igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cū aqua exhibito, uomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrū cū aqua calida ingeri debet: aut maluæ, lini ve seminis, aut tragi frugis, aut fœnugræci, aut urticæ seminis decoctū. Non enim solum uomitionibus euacuabunt, sed aluum quoq; subducent, & uenenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum habetantia, præsertimq; oleum, quod manifesto inde licet cognoscere. Si nanq; cutis exulcerandæ studio, cantharide aut calce uiua, aut eiusmodi quodā acri utaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur. imo neq; corpus astringere potueris oleo præunctum. Præterea uomitus non modò quod nociuū euacuat, utilis est, sed interim haustum uenenū odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore, cerussam, uel gypsum: concretria grumis, lac aut recentē sanguinē: halitus grauitate: uirus qualitate & odore, leporem marinum, & rubetam ranam ostendit, ut per hæc ad accommodata singulis remedia uia non sit difficilis. Admifcebitur autem oleo maluæ, decoctū, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguibus, uel gallinarum: aut ex lignorum cinere

nere facta lixiuia. Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum, uinum copiosum & uetus: & quæ adipe aut butyro constant. Verum ijs quæ in uentriculo hærent, par uomitum ablatis: quod intestinis illapsum est, clystere acriore euacuabimus. Post hæc lac potui dabimus. nam ab hoc quod afficit, & uenenosum est, facillè immutabitur. Iam uero medicamenta omnibus communiter conuenientia offeruntur, quale est, minium lemniū, abrotanum, agaricū, erysimum, eryngii radix, pastinacæ erraticæ semen, uel nepitæ, nardum gallicum, castorium, medulla uiridis ferulæ, nerii, quod rhododendron est aut rododaphne flores, marrubii succus, laserpitium aut liquor ipsius, sagapenum, opopanax, peucedani liquor & radix, aristolochia longa, rutæ syluestris semen, folia cestri, quæ betonica dicitur. danturq; singula drachmæ pondere cum uino. Efficax in id est, polii herbæ decoctum & picis liquidæ linctus generosissimè etiam opitulantur antidota superius comprehensa, magisq; ex uiperis theriaca. non autem easdem uireis habent, si post medicamenta lethalia, assumantur, quas præsumpta. quæ enim ipsorum quantitas præsumpta ad affectum cauendum est sufficiens, hæc si quadruplo auctior, aut quintuplo post præstetur, adiuuat: idque non semel die, sed bis etiam. sic enim & Galeno illi admirando uisum est.

Enumeratio simplicium uenenorum. Cap. XXX.

INter uenena, animalia quidè sunt uitæ noxia hæc, cantharis, buprestis, salamandra, piceæ eruca, lepus marinus, rana rubeta, & mutescens palustris rana, hirudines deuoratæ: ex seminibus, altercū, coriandrū, psilliū, cicuta, melanthium: ex liquoribus, meconiū, opocarpasum, thapsiæ succus, elateriū, mandragora: ex radicibus chamelæon, aconitum, thapsia, ixia, ueratrum, agaricū nigrum, ephemerum, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in colchide nascitur: ex ramosis & oleribus, smilax, quam nonnulli rhymium uocant, Romani taxum, solanum furiosum, quod etiam dorycnion appellant, sardoe herba; quæ species est ranunculi, papauer corniculare, pharicum, toxicū, ruta syluestris, fungi: ab animalibus autem, sanguis tauri recens, lac cui coagulum sit admixtum, mel quod ad heraclia nascitur: metallica, gypsus, cerussa, calx, auripigmentū sandaracha, argenti spuma, adarce, plumbum, & quod uocatur argentum

argentum uiuum : ex iis quę domestica & in quotidiano uitę usu sunt, uinum copiosum raptim à balneo potum, aut passum aut frigida aqua similiter.

De cantharide .

Cap. XXXI.

Qui cantharidē assumpserunt, eos notę grauissimę comitantur . ferē . n . à stomacho usq; ad uesicam cuncta illis morderi sentiuntur, gustum similē pici aut cedri-
no liquori habent, dextra præcordiorum parte inflammationē experiuntur, urinam difficulter, sæpe etiam sanguinē per eam reddunt : item per aluū ipsis excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent, præterea animo linquuntur angunturq;, & uertiginibus laborant: tandem uero mente alienantur . Succurrit ipsis uomitus ex hydrelæo petitus, & lactis potio, terrę cimolię drachmę quatuor cum mulsā, nuclei pinei, cucumeris semen . Adiuuat bene & ius pingue ex bubulæ factum, aut anserinum, aut ouillum: carnesq; gallinaceorum, aut agninę, aut ouillę, aut porcellorū, omnesq; flaccescentes coctura longiore, & pingues cum lini semine elixę: uinum itidem dulce, & copiosum, thuris corticis drachmę quatuor. Post cibum iniicietur per clysterem cremor oryze aut chondri, aut tragi, aut ptisanę, aut maluzę, aut lini seminis, aut altheę, aut foenugręci. interim etiam mulsā cum nitro intestino absterso, conuenit hæc rursus inferere. postea uerò inflammatione occupata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire. per initia enim offendunt, deinde & lauacris aquę dulcis utendum est, item unguentum irinum rosaceumq; potui dabitur.

De buprestis .

Cap. XXXI.

Bupręsti potione absorpto, in gustu niroso simile quippiam percipitur, dolor stomachi uentrisq; uehemens comitatur, eademq; partes in speciem hydropici intumescunt, extima totius corporis cutis intenditur, urināq; cohibetur . Prosumt ipsis quęcunque aduersus cantharides opitulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & uomitu, & clystere factas, ficus aridę, item earum decoctū ex uino. Vbi uero periculum iam de suo acumine remiserit, declināq;, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulsō aut lactis potu, quantur, pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac muliebre bibere, conuenit .

De

*De Salamandra .**Cap. XXXIII.*

Quibus Salamandra data est, eis lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quodā & resolutione urget, partes quædam corporis in orbem liuoribus uariantur, ut subinde permanente ueneno, putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus quæ in cantharidibus dicta sunt propriè autem resinam è picea, aut pinu, uel galbanū cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum decocto chamæpityos, aut urticæ folia cū lilijs in oleo decocta, testudinis marinæ uel terrestris oua elixa, ranunculorum ius esculentum, in cocta simul ipsi eryngii radice.

*De pinorum erucis .**Cap. XXXIII.*

Pinorum eruca pota, statim sequitur oris palatiquē dolor, ualida linguæ inflammatio, stomachi, intestinorumquē cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi sentiantur: feruor itidem toto corpore affligit, & stomachi fastidium urget. Succurri debet nō aliter quā in iis qui cantharidas biberunt priuatim aut in ipsis loco simplicis olei melinum adhibebimus.

*De marino lepore .**Cap. XXXV.*

Leporis marini potum, gustus sequitur piscibus urosis nō absimilis, tempore procedente aluus indolet, urina supprimitur: si quando autē eruperit, purpurei coloris cernitur. præterea qui illum assumpserunt, auersantur oderuntquē; pisceis omneis: sudor foetidus erumpit, biliosusquē; uomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Adiutari autē debent hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo continuè exhibito, aut maluæ radice & foliorum decocto, aut cyclamini radice trita ex uino, aut ueratri nigri, aut scammonia liquoris drachma ex mulsa, anserique sanguine recenti adhuc calido. item caneros fluuiales solos, si sustinent, offerre oportet. Nota autem salutis est, quum piscem quoquē possunt comedere.

*De rana rubeta & palustri.**Cap. XXXVI.*

Rana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit, palloremquē; intensum, buxo similem, ægrè spiritus trahitur, os foetet, singultus infestat, aliquando etiā semen sine uoluntate prorumpit. facile autem post uomitum reficiuntur, multa meraci uini portione assumpta, arundinis radice drachmis duabus, aut cyperi totidem. Cæterum cogendi

PAULI ÆGIN.

z sunt

sunt obambulare celeriter & currere, ob torporem qui ex hoc malo contrahitur, adhuc quotidie lauare.

De hirudinibus.

Cap. XXXVII.

Hirudines deuoratas, cum aqua & adhærescenteis faucibus, inde adeò dignoscas, quòd uentriculi os ueluti exustione uellicatur mordeturq; atq; hæc etiã nota est hirudinis deuoratae, nonnunquam & sanguinem floridũ, hoc est uinum excreant, hirudinibus gutturi affixis, quas muria sorbitio expellit, aut betæ folia cum aceto, aut niuis glebula cũ posca epota. gargarizandum quoq; nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæserint, in calidam aquam descendant, item lupinorum farinam assument, frigida in ore retenta eximentur quippe frigida aqua appetentiores ad eam festinant profiliuntq;. Nonnulli cimices iis quibus sanguisuga deuorata erat, exhibuerunt ego autem (inquit Galenus) alliis in his utens, cimicibus nunquam opus habui.

De chamæleonte.

Cap. XXXVIII.

Chamæleonte nigro assumpto, ualida superuenit uetris erosio, dolor, cum totius corporis peruersione tremor, mox conuulsio incidit. item uomitiones pituitosæ & spumantes, quibusdam etiam singultus aduenit, uox nihil sonat, facies distorquetur. His autem conuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus, item dulce uinum aquosum calidum, uomitus, lactis potio, mollis clyster, fomentaq; ex cataplasmatibus. ad eum uerò qui suffocationem parit liuoremq;, absinthium bibitur, aut nitrum cum oxymelite, uel radiculæ: fofusq; præcordiorum congruet.

De alterco.

Cap. XXXIX.

Saltercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mente abalienatur ebrii modo: facilem tamen curationem recipit, multa liberalius pota, & lacte, præcipuè asinino: sin minus, caprillo, aut uaccino: siccumq; siccarum decocto, benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passò assumptum, præterea uinum salsum cum recenti adipe suillo & passò: urticae semen similiter, uel nitrum cum aqua conducit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, & alia, singula cum uino, sumpta. Cæterum conquiescere cogendus qui altercum hausit, ut id sicuti qui uinum biberuat, concoquat.

De

*De coriandro.**Cap. XL.*

Coriandrum latere propter odorē nō potest: potū uerō raucitatē facit & mentē mouet, consimiliter temulentis. Loquuntur itaq; qui id sumpserunt turpia, totius corporis ipsorū odor coriandrū indicat. Aduuantur, ubi id oleo aut irino unguēto, ut suprà monstratū est, eduxerint, uino meraciore cū absinthio, & p se poto: ouisq; uacuatis in sese detritis, cū muria sorptis: ad hęc muria ipsa bibitur, & ius falsum & gallinaceū & anserinū: postremo passum cum lixiuia sumitur.

*De psyllio.**Cap. XLI.*

Psyllij potu totum corpus refrigerat torpetq; cum resolutione & tristitia, ut animum despondeant. Præsidio sunt omnia quæ contra coriandri potum commendantur.

*De cicuta.**Cap. XLII.*

Cicutam potam caligo uertiginesq; insequuntur, ut nec minimum uidere liceat. item singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio comitatur: ultimoq; conuulsi qui eam sumpserunt, præfocantur, cessante à motu omni in arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodū & in alijs, uomitu eam eliciemus. deinde hac euacuatione usi, quod in intestina delapsum est, excernemus: ac tunc, ad uini meraci potionem ueluti præsentissimum remedium transibimus, per interualla eam exhibentes in quibus interuallis lac uaccinum, aut asininum, aut absinthiū cum pipere & uino, item castoriū, rutamq; & mentam cum uino exhibebimus, præterea cardamomi, aut styracis drachmā, aut piper cum urticæ semine ex uino, aut tenera lauri folia: similiterq; laserpitiū, aut eius liquorem cum oleo & passo. Item passum per se potum, præclare opitulatur.

*De papaueris liquore.**Cap. XLIII.*

Papaueris liquorē, epotum, subsequitur ueternus cum perfrictione & pruritu adeo uehemēti, ut subinde ueneno in crudescēte tanta oboriatur prurigo, ut qui id biberunt, ab ea excitentur, adhuc totò corpore ueneni odor sentitur. Soluti est post uomitiones oleo factas, acri uti clystere. item oxymel cum sale potum proficit: aut cum calido rosaceo, mel: præterea merum copiosius, cum absinthio & cinnamomo: necnon

acetum calidum per se: insuper nitrū cum aqua: origanum cum lixiuio, rutæ semen cum pipere, ipsumq; piper cum castorio & oxymelite, uel satireiæ, aut organi decocto, uino addiro. Cæterum excitare ægros oportet iis quæ naribus admouentur, & in aquam calidam deducere, fomentisq; propter accedentem pruritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum uino aut passio, uti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

De carpesiæ liquore.

Cap. XLIIII.

CArpesiæ liquor potus, soporem & strangulatum præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & cicutæ, auxiliamur.

De mandragora.

Cap. XLV.

Accidit mandragoræ potu quàm primū sopor, uiriū resolutio ualidus ueternus, ut nihil à morbo qui lethargus dicitur differat. quibus antequàm horum aliquod eueniat, uomitus cōducit: post hunc, aqua mulsa, nitrū, & absinthiū cum passio, aut uino dulciore sumpta, caput rosaceo foueri & aceto debet, corpus excitari, cōmoueriq;: adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriū, ruta cū aceto trita, pix liquida, lucernarū funiculi cōbusti extinctiq;. Quod si ægrè excitentur, etiā quæ sternutamenta mouent, adducenda, alijsq; communibus remedijs in his quoq; utendum est.

De aconito.

Cap. XLVI.

Aconitum statim quum potum est, in lingua cum astrictione quadam dulescit: inde uertigines, præsertim in exurgendo, & oculorū humiditates inducit, thoracis, grauitatē & præcordiorū, ita ut multi flatus erumpant. In quo uitio uomitu uenenum educi debet, & aluus clystere subduci. Portiones contra aconitū hæc proficiunt, origani, rutæ aut marubij cum uino, aut absinthii, aut erucæ, aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos Prodest ipsis & opobalsami drachma cum uino item coagulū hœdi, aut leporis aut hinuli cū aceto, adhæc ferri recrementū aut uinum in quo ipsum ferrum, aut aurum, aut argentū sit restinctum. insuper lixiuū cum uino, & gallinacei elixa cernium uel pinguiū ius cum uino assumptum. Cæterum chamæpitys quæ peculi ariter aduersus aconitū conducit, in Heraclia Ponti, ubi & aconitum nascitur, holocleros appellatur, Athenis, didionia: in Eubœa, sideritis.

De

*Deixia.**Cap. XLVII.*

IXia quæ & ulophonos dicitur, odorem habet & gustū quū sumitur ocimi, linguæ inflātionē ualidā inducit, mētem abalienat, atque omneis naturaleis excretiones suppressit, strepitus tumultusq; alui elidit cum animæ defectu, nec quicquam tamē eiicitur. Adiuuātur læsi ab ea, postquām uomitionibus fuerit educta maior ueneni portio, aut aluus soluta, absinthij diluto cum uino pleniorē aut aceto aut oxymelite potto: item rutæ syluestris semine, uel laserpitij radice, similiter tragorigani decocto cum prædictorū aliquo, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut Laserpitio, singulis oboli pondere. Profunt cum uino etiā nucis iuglādis nucleī læuigati, resina, castorio, & ruta additis, singulis drachmæ pondere. Proficiunt itidem chamæleæ drachmæ duæ, aut thapsiæ succi totidē cum aqua mulsā. utiliter & acetū calidum bibitur.

*De ephemero.**Cap. XLVIII.*

Ephemeron, quod nōnulli Colchicon eo q̄ in Colchide nascatur, uocant, aut bulbum agrestem, epotū protinus, totū corpus prurire facit, uelut urtica & scilla tactum irritatumq;: interiora erodit, stomachū urit cum ponderosa grauitate. Inualecente aut malo, cruenta strigmentis mista per aluum egeruntur. Succurrendum, ut salamandræ, uomitionibus & clysterijs: sed antequām uireis sibi asciscat uenenū, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorij, aut serpilli decoctū cum lacte bibendum: aut polygonij succus aut surculorum uitis, aut rubi, aut tenerarū ferularum medulla, aut myrtorum cum uino item ipsorum myrtorū in læuorem detritorum, maceratorumq; in aqua, dilutū potum auxiliatur: benefacit itidem castanearum interior tunicula, si cum aliquo ē succis quos prædiximus, assumatur: origanum quoque cum lixiuia potum, in idem efficax est. A deo uerò exactum præsidium est lac uaccinum calidum potum, & simul in ore contentum, ut hoc præsentē nullum aliud desideretur.

*De smilace.**Cap. XLIX.*

Smilax, quæ à quibusdam thymion, à Romanis taxus nominatur, pota perfrictionem totius corporis & strangulatum, mortemq; maximè præcipitē inducit: quibus omnia auxiliantur, quæ & cicutæ epotæ.

*De solano furioso, quod dorycnion à nonnullis
dicitur. Cap. L.*

Dorycnium potum, quod aliqui solanū furiosum appel-
lant, gustum quidem ceu lactis repræsentat, singultus
crebros facit, linguæ humiditatem, & cumulatam san-
guinis educationem: per aluum mucosa feruntur simillima tor-
minosis. Auxilio sunt, antequam horum aliquod fuerit secu-
tum, quæ in ephemero dicta sunt, uomitus dico & clyster, &
quæcunq; potum uenenum possunt excernere. Propriè autem
ipsi succurrit aqua mulsa aut lac asininum caprillumue, & dul-
ce usnum tepidum cum anisi modico potum: item amygda-
læ, & elixa gallinarum pectora, idem præstant conchyilia cru-
da pariter & tosta, in cibo, adhæc locustæ marinæ & gammari,
& ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

De sardonio. Cap. LI.

Quæ sardonio herba nuncupatur, ranunculī species est,
pota autem uel comesta mentem abalienat, cōuul-
siones adfert cum laborū contractione, ut risus ima-
ginem præbeat, à quo affectu etiam risus sardonius non lauda-
bili disterio inter homines iactatur. Cui uitio priuatim post
uomitionem conducit aqua mulsa liberalius exhibita, lactisq;
potio. itē corporis totius respersio inunctioq;, ex medicamen-
tis quæ calefaciunt perita uincit item in hydrelæum calidum
descendere, deinde corpus inungere & ualenter infricare. sum-
matim, ut in conuulsione tota curatio administranda est.

De papauere corniculato. Cap. LII.

Papauer quod corniculatum appellatur, esum potumve
eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem
quoq; curatur remediis.

De pharico. Cap. LIII.

Pharicum dictū toto gustu nardium syluestrem repræsen-
tat: potum uerò resolutionē cum furore & conuulsione
excitat. Aduersus quod, ubi uomitu fuerit eductum, absin-
thium cū uino propinatur: item cinamomū, aut myrrha, aut
nardū Cilicium, quod nonnulli isatin uocauerunt, aut spicæ nar-
di drachmæ duæ, myrrhæ oboli duo cū passo misti: aut iris cro-
ciq; flos ex uino Caput ipsorum derasum farina ordeacea cū
ruta trita, & aceto cataplasmatīs modo obducere conuenit.

De

*De toxico.**Cap. LIIII.*

TOxicum inde nomen uidetur accepisse, & barbari sagittas, quas toxumata uocant, eo illinant. ubi potum est sequitur labrorum & linguæ inflammatio, mētis furor, qui coerceri non possit, uariis obnoxius imaginibus. eoq; difficilem curationem recipit: rarò etiam nonnulli qui id biberunt uitæ restituuntur. Oportet igitur continere ipsos uinculis & cogere, & ui adigere, ut uinū dulce cum rosaceo bibant, reddantque per uomitum. Item raptum semen cū uino potum peculiariter ipsis confert, & quinq; folij radix, hircinus caprillusue sanguis potui datus ad hæc, quercus cortex aut fagi, aut ilicis cum lacte læuigatus potusq; proficit. Idem faciunt mala cotonea manducata, uel trita cum pulegio, ex aqua pota: prætera amomum, & balsami cum uino semē. Qui uero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum uitæ tempus transigunt.

*De fungis.**Cap. LV.*

FVngorum alij genere, alij copia offendunt, integri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt. his statim cōmuni præsidio resistendum est, & qui eos hauserūt, oleo ad uomitum cogendi. Mirificè his proficit lixiuium ex sarmentis, aut ex pirastri surculorum cinere cum posca, sale uel nitro, potum: item pira ipsa syluestria aut folia simul incocta, uim strangulandi quæ fungis inest, tollunt, eademq; in cibo conferunt. ad hæc oua gallinarū elixa & in posca pota, aristolochiæ drachma aut absinthij, cū uino, insuper mel de linctū potumq; cum aqua Prodest apiastrum cū nitro, panacis radix & semē cū uino, floces uini cōbustæ, cum aqua, aut atramentum sutorium cum aceto, raphanus itidem aut sinapi, aut nasturtium in cibo sumptum. Quoniam uero nonnulli fungi à uenenatis corioli non modò strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet absinthium copiosum & ficuum decoctū, origaniq; ad hæc ex aqua mulsa, uomitus confert, in calidam descendere, & crudam farinam ordeaceam præcordiis adinouere.

*De sanguine taurino.**Cap. LVI.*

Sanguis tauri recens occisi potus, spiritus difficultatem & strangulatum procreat, dum tōsillarum & gutturis meatus cum ualida conuulsione obstruit. Iam lingua ijs qui

sanguinem hauserunt rubens inuenitur, dentes tincti, & uestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo uomitus uitari debet, grumi enim attractu ad sublime relati, magis gulæ inculcantur. Exhibentur ergo quæ sanguinem coeuntem soluere, & aluum subducere possunt, ut grossi liquore suo pleni cum posca & nitro. huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & laserpitij radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficulneo: item cunilæ folia cum pipere, rubiq; succus cum aceto. Iam uerò aluus rectè subducetur. Solent iis qui seruantur inferius recrementa foedi odoris egeri: stomachus & uenter ordeacea farina cum aqua malsa obduci debent.

De lacte intus congelato.

Cap. LVII.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum, multam strangulationem parit, eo quod in grumos coit gelaturque. Auxiliatur huic malo, antidoti modo, coagulum, si cum aceto frequenter bibere compellas eum qui lac hausit. item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut laserpitii radix liquorue cum posca: idem præstat thymus cum uino, & è cinere lixiuia. falsum uerò nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum transit. nec uomitus in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit, strangulat.

De melle quod in Heraclia nascitur.

Cap. LVIII.

MEl quod in Heraclia Pōti prouenit, aut esum, aut bibitum, eadē pericula quæ aconitum, infert. quare & eadē utriusque cōueniunt remedia. Facillimè autem curatur qui id hauserunt, cōtinuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

De gypso.

Cap. LIX.

GYpsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: unde trāsferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos cōueniunt datur et in hoc malo malux decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas uomitiones procreet, corpora deradi non sinit: quod lapidescens gypsus facit. Porro cōducit & oleum in malsa, & ficuum decoctum, lixiuiaq; è ficulneo, aut è sarmentorum cinere facta cum uino copiosiore, item origanum, aut thymus cum lixiuia acetorum. Clyster ex passo & malux decocto in anum dabitur:

De

*De cerussa.**Cap. LX.*

Cerussa propter colorem facile apprehenditur, quoniam sponte sumpta palatum & linguam, dentiumque commissuras albefacit. præterea singultum, tussim, linguæ siccitatem, extremorum perfrictionem, cum menthis ab alienatione, & difficili corporis motu, inducit. His prodest aqua mulsam, aut ficuum, aut malvæ decoctum propinare. item lac calidum, vel sesamum cum uino tritum, aut lixiuium est uitium sarmentis: aut oleum amaricinum, siue irinum, uel persicorum ossa cum ordeï decocto: uel lachryma thuris, uel prunorum gummi, aut ulmi humor qui in folliculis ipsius seruatur, cum aqua tepida. Iam uomitus continuè cietur. Proficiet etiam succus thapsiæ, uel liquoris scammoniae terni oboli cum aqua mulsâ poti.

*De calce sandaracha, & auripigmento.**Cap.**LXI.*

Calx, sandaracha & auripigmentum pota, uentris & intestinorum torsiones cum uehementi rosione faciunt. quare omnia quæ temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quæ uomitiones facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hibisci & malvæ succus, decoctumque lini seminis, aut tragi, aut oryza: lac præterea copiosum, aqua mulsâ, iura pinguis, bonique succi.

*De argenti spuma.**Cap. LXII.*

Spuma argenti pota, quæ Græci lythargyron dicunt, grauitate stomachi, uentris, & intestinorum, cum torsionibus ualidis infert: nonnunquam & intestina potere uulnerat disrumpitque, urinam impedit: corpus eorum qui eam biberunt, intumescit, & coloris plumbi fiunt, & deformitatem acquirunt. Adiuuantur, secundum uomitiones, agrestis hominis semine cum uino: myrrhæ drachmis octo, absinthii, hyssopi aut apii semine: aut pipere, aut ligustri flore cum uino: palumbium fimo orido cum nardo & uino.

*De plumbo.**Cap. LXIII.*

Plumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argenti spumæ pericula: eademque requirit præsidia.

*De argento uiuo.**Cap. LXIIII.*

Et argenrum uiuum potum, eadem quæ spuma argenti infert, atque eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur.

uantur adhæc prodesse ipsis uidetur lac copiosè datum . cæte-
rum & hi uomitionibus sollicitabuntur .


*De ueratro albo , thapsia , elaterio , agarico nigro , ruta
syluestri , nigella , & pappis . Cap. LXV .*

HAbenda cura est & eorum quæ iuandi gratia exhiben-
tur, sæpe uero non minora aliis pericula adferunt . cu-
iusmodi sunt superius commemorata , nempe ueratrū
album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum, hæc enim strangu-
latus excitant, aut magis quàm opus est , purgant : in quibus
strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, cu-
rabuntur : nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent,
sistimus . Iam uero quæ paululum nocere uidentur, interim tã-
men pericula inferunt , negligi non debent : cuius generis est
syluestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt
spinæ quæ cactos dicitur, in quibus solus uomitus adhibitus la-
borantes sanitati restituit .

*De familiaribus ac domesticis, nempe uino & aqua
frigida . Cap. LXVI .*

AQua frigida subito ac cumulatim pota, uinumq; mera-
cius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu, ualē-
disq; exercitiis strangulatus & dolores concitat. in qui-
bus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminēs
periculum dissoluit .

FINIS LIBRI QVINTI IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE .






PAVLI AEGINETAE

I IBER SEXTVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.



Proœmium Chirurgicæ. Cap. I.



VONIAM chirurgica in parres duas diducta est, ut una sit quæ carnis vitia tractet, altera quæ ossium, tam in rupturis quàm luxationibus comprehendat, ab ea quæ carni seruit in præsentia exordiemur, consueto & hic usi cōpendio. Rursus igitur à superioribus auspicantes quomodo caput, præsertimq; eius uertex utat̃, exponemus.

Quomodo caput aduratur in lippientibus, egre spirantibus, & elephanticis. Cap. II.

CVM humor oculis influit supernè, cumq; difficilis urget spiratio, quæ humiditatis excrementitiæ copia è capite inferius in thoracè trāsmittit̃, & particulas indidem cōtinuo suo cursu offendēte cōtrahit̃, caput per mediū hoc modo urunt. Vertex ad cutē prius tondetur cutis adusq; os ferrentis candētibz, nuclei modo rotundis aduritur. quod, ubi crusta deciderit, raditur. Nōnulli uero ubi id ipsum os addusse- rint, faciūt ut squama inde recedat exigua, quò facilè humores illinc perspiratu dissipēt̃ euacuēt̃q; seruato diu ulcere, deinde sic ipsum ad cicatricē perducūt. At in elephantiasi curāda, quinq; nōnulli crustas in capite excitant, unam in priori parte
supra

supra sinciput, alterā hac inferiorem, paulo superius quā frōs habetur, ubi ferē pili desinunt: ac aliā in occipitio, quod Græci opisthocranion uocant, reliquas duas iuxta ossa à squamis dicta lepidoidē quæ superius aures conglutinant: unam ex his, parte dextra, alteram sinistra: atq; ita pruribus squammis detractis, & copiam, & crassitiem humorum euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina offendi prohibent. Iam leni quoq; aliud ferramentum adigunt, ut primo melancholici recremēti opifici per crustam in cute excitatam medeantur,

Cum humor capitis cutem inflat, eoq; intumescit & prementi digito cedit hydrocephalon dicitur. C. III.

SI humor natura aqueus capitis cutē subit, uiriū propriē hydrocephalon appellatur: accidit aut pueris quāprimū in lucē æduntur, capite ab obstetricibus parū dextrē pressō, aut ex causā latente, aut ex uasis unius, plurimūe ruptura & sanguine qui emanat in ociosā inutilemq; mutato substantiā, aut materia ob meatuū raritatē resudante, ac inter cutē & mēbranā quæ caluariā integit, pericranion Græci uocant, erūpente: uel. n. inter hanc, & cutem humor consistit, uel inter pericranion & os, uel inter os & cerebri mēbranas. Cui itaq; cuti & mēbranæ caluariā integenti, humor interiacet, tumor sequitur, tactu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sublimi, & paucis particulis subiectus: digitis prementibus facili cedit, & rursus assurgit. Quibus pericranion & os intercedit humor, reliqua sanē respondent, sed tumor durior multo est & lentē cedit, ut qui ēt pluribus corporibus sublit, dolorq; magis urget. Si inter cerebri mēbranam & os humor se receperit, tumor quidē erit, sed qui prementi nō cedat, neq; tactu sit mollis, tamē uolēter pressus cedat, siquidē os infantū recens adhuc cōpactū facili cedit, præsertim cū futuris rarefactis humori trāsitus foras pateat: cognoscitur ex facili inde qd humor cū illū cōstringere uolumus, ex aduerso repressus in altum effugiat. Dolor his acrior obuenit, caput totū in diuersa agitur, frōs ipsis foras producta est, oculis cernūt incōniuentibus, & crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatæ salutis nō est manus adhibēda, & si maximē nonnulli chirurgicorum terebra perforatum os exemerint, ut in capitis fracturis dicitur. At si intra cutem & mēbranulam quæ sub cute caluariam cingit,

cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo subflante, una linea per medium transuersa caput incidendum: si membranula caluariam inuolenti & ossi colluuiies interueniat magisq; caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se mutuo secantibus: si magis adhuc sit turgidum etiam, tribus, ad similitudinem H literæ. Vbi manu humorem exemeris, insertis linamentis commodè partem deligabimus, & usque ad tertium diem œnelæo perfundemus, inde solutam medicamento in linteolum illito persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur.

Cap. IIII.

IN longis oculorū defluxionibus, tum uertiginoso affectu, arterias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriæ si tus ex loci pulsu faciliè deprehenditur. deinde ipsam linea scriptorio prius atramento ducta, duos digitos longa, usq; ad os diuidere oportet. Quod si in conspectum ita non uenit, incidendum circiter triū digitorū interuallum, atq; tunc manus iniicienda, sic ut arteriæ transuersim dissecentur, quousq; & pulsatilis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentū os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quæ caluariā sub cute ambit, diuisa, ne extensione inflammationem contrahat, rosaq; osse penicillum ex panniculo uulneribus debet insinuari, & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si remaneat etiam hoc os lene, similiter id scalpello rademus.

Quomodo uasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorumque adustio sit administranda.

Cap. V.

IN hemicranicis, & in iis, quorū oculos aut longus, aut etiā acutus dolor ex calida, acriq; fluxione infestat adeo ut in temporum quoq; musculis calor, laxisq; tumor, œdema uocant Græci, excitetur, omnes medici uasorum diuisionem probarunt. Derasis igitur primum in temporibus pilis, digitis uasa notabimus, sic ut fomenta præcesserint, aut etiam ceruix ligata sit: ubi iam uasa oculis sese obiecerint, atramento notabuntur, & cutis ex lateribus, tum sinistræ manus nostræ digitis tum ministri lenabitur, ipsumq; uas superficiali linea incidemus, deinde ubi totum penetrauerimus hamulis eleuatum & a membranis

membranis uicinis instrumento quo illę detrahuntur, denudatum, suspendemus undiquaq; liberum, et si tenue uas fuerit, per hamulū cæcum, elato ei circumductoq; membranā detrahemus ita ut partem quoq; ipsius apprehendamus. At si magnum est, duplex acu funiculus subiicietur, aut linum crudum, aut aliud quoddam ualidum, ac quamprimum uas in rectum scalpello diuisum, sanguinis quantum satis est fuderit, in utroq; extremo quod denudatum est, lino ligabimus, quod intercedit excisum, aut protinus, aut cum soluetur auferre conuenit. Nonnulli etiam candentibus ferramentis citra sectionem uasa adurunt plagis satis altis. ubi iam ferro negotium absolutum est linamentis carptis siccis uulnere oppleto, splenium quoq; superac commodatum deligabimus postquam solutum fuerit, medicamenta carni generandæ accommodata, tum arida, tum quæ linteolis conceptis illinuntur, nec non cicatrici inducendæ apta, ad curationem absoluendam inducemus, nimirum ubi uincula deligaturæ computruerint exciderintque.

Quomodo frons incidatur, hypospathismus uocant.

Cap. VI.

Instrumēti species nomen administrationi dedit: utimur autē hypospathismo, in quibus fluor multus, & calidus in oculos defertur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidā & discursus ueluti uermium, aut formicarū oboritur. Derasis itaq; in fronte pilis iubebimus, ut inferior gena moueatur, cauētesque musculorū ad tēpora motionē, tres lineas rectas pari spatio distantes in fronte incidemus, latas quidem singulas duos digitos, altas adusq; os, trium digitorum interuallo inuicē discretas. secundum sectionem tenuem, spatham subiicientes à linea quæ in sinisteriore tempore ad mediam tendit incipiemus, totum quod interiacet excoriantes cum membrana quæ caluariam incingit, deinde rursus spatulā à media ad reliquam demitemus. Deinde scalpri quod scolopomachærion dicitur, aciem in primam coniicientes lineam, ut acutum ipse latus carni quæ ab interna parte cuti cohæret accommodetur, retusum uero, ossi, propellemus ipsum adusq; mediam lineam, omnia à capite ad oculos descendentiā uasa præcidentes, non autem usq; ad cutis superficiem: rursus à media ad postremam ipsum deducemus, similiter uasa amputantes. Vbi mediocriter sanguis

sanguis effluxerit, extusis grumis, tria linamenta tortilia singulis incisuris inferemus, panniculumq; implicitum aqua madentem superiniectionem deligabimus. Postridie œnelæo non solum ulceribus resperfis, sed etiam temporum musculis, auribusque propter inflammationem, tertio die cum solueris, superfusione diu utendum, & basilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ restat, absoluemus.

Quid agendum in sincipite secando, Periscyphium appellant Græci. Cap. VII.

IN quibus multa, & in alto uasa fluore copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transversus coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio periscyphismus Græcè uocatur. Hoc morbo laborantium comites notæ sunt tales. Primum oculi alimētum nō sentiūt, exigui, & ad uisum impotētes, sunt anguli erosi, palpebræ exulceratæ, & pili ipsorum deflui, lachrymæ tenues admodum & acres cum calore deferuntur. Dolor in alto capitis acutus & uehementis urget, sternutamentum continuū. Itaque; derafo capite, transversam lineam sine musculorum in temporibus, motus offensa, ut dictum est incidemus, quæ à sinistro tempore parte incipiens in alteram desinat, habeatque terminos, ubi motus nullus est, paulo superius quam frons habetur, ducta: sic ut sutura capiti per uerticem tendens ad aures, Græcis dicitur τετραπαιδια, uitetur. Leonides per mediam frontem lineam deducit. Cæterum osse detecto, penicillis, aut linamentis pluribus inuicem separabimus, extrema diuisionis deligabimus, & uino oleoque mixtis ut prius dictum est, aspergemus. A solutione cum inflammatio iam declinauerit, os radeatur, quoad caro suppullare incipiat, rationemque carnis producende accommodabimus medicamentis aridis in id efficacibus utentes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophoniarum resinæ partem unam. Item quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumice ad carnem creandum conficitur. Nam cutis crassiuscula cicatrice densata, & occlusa uasorum ora per initia pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

De superioris palpebræ sutura, aliisque modis.

Cap.

VIII

GRæci appellant διτιχίασιν, cum naturali pilorum palpebræ ordini, alij præter naturam pili succrescunt: Quod uicium ex fluida affectione contrahitur quando humor qui

quin influit, copiosus quidē, sed rosionis & acrimoniae expers fuerit. Nam acrior, aut falsus magis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebrae pilos corrumpit. Interim igitur in hac affectione, futura utimur: interim in phalangosi cum cilium introspectat pilorum acie simul cum eo inuersa, interdum etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbum compūgunt. Aeger itaque in sedili collocabitur, uel aduersus, uel à sinistra, superiorque palpebra inuertetur: siquidem longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus: sin admodum breueis, acus filum ducens per medium cilium in exteriorem partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sublata palpebra, dextra, cuspidē specilli post filum in rugas plicasque coacta inuertetur, & subtrus linea interius quā pili pungentes habeantur per cilium ducetur, à maiori angulo usque ad minorem pertinens. filo autem post interiorē sectionis lineam subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quoddam linamentum implicitum obijcientes, supercilium attollemus, aliaque parua linamenta implicita summis angulis imponentes famulo posterius stanti iubebimus, ut palpebras per ea attollat, atque tunc lineam uero modo rectam, obeliceam Graeci uocant, primum scalbello futuris aptato incidemus paulo superius quā naturales pili existant, ab angulo ad angulum tendentem, altam ut sola possit cutis diuidi: post eam, lunatam adhibebimus, incipientes quidem unde & uero similis linea inceperit, in tantam uero sublimitatē tendentes, ut totam cutem quae superflua est circumscribamus, desinentesque similiter ubi & illa iam commemorata linea. Postea cum cutis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem representet, angulo qui ad dextram nostram spectet hamulo transfixo totam hanc cuticulam excoriabimus, deinde uibicibus spongiater quaterve ablutis, oras uulneris contrahemus, à media auspicantes, acum uero per ipsam interiorē sectionem transmittentes: porro filum ex lana esto. Cæterum quod eius superfluum est amputabimus, non prope futuras, sed ut circiter trium digitorum longitudo otiosa pendeat, eamque per frontem exporretam, cum emplastro quodā conglutinate applicabimus, palpebrae autē pullos à futuris, cuspidē acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & communis & securus est. Nonnulli exco-
riationem

riationem fugiunt, eoq; post ductum subtus lineam, uolSELLA palpebris continendis accommoda, hoc est, ad palpebræ ambitum apprehendendum figurata, id quod superest cutis, eleuatū, scalp pro amputant, ac suturas, ut comprehensum est, adiiciunt. At si in parte aliqua solū palpebræ ex pilis oriatur punctura, illi etiam soli manum adhibere conuenit, deinde linamenta implicata posca madida imponemus, deligabimusque imbuentes ipsam partē posca aquosa usq; ad tertium diem, quo ligaturam soluemus, ac superflua fili parte abscissa oblinemus palpebras, uel croco, uel glaucio, uel aliquo collyrio, quod inflammationem arceat, ut, croceno diarodon. At si inflammationem futuræ patiantur, etiā emplastrum aliquod lene ipsis superaccommodabimus, & ueluti lacte infuso oculum leniemus, laxiores autem redditas suturas amputando abstrahemus. Notus mihi quidam est qui palpebra, ut dictū est, excoriata futuris non uteretur, sed medicamento cicatricem inducente curationem absolueret. Nam uulnere ad cicatricē ueniente, palpebram ex parte attollens pilos extra inclinare coegit. Quemadmodū igitur alius quispiam ne exeoriens quidem palpebrā neque externis duabus utens diuisionibus, sed inferiore solum adhibita, palpebræ rugas digitis uel hamo attollebat, item duabus arundinulis aut lamellis quibusdam palpebræ longitudinem æquantibus, latitudinem angusti scalpelli, quod uenis secandis adhibetur, superfluum totam cutē mediam prehensam cōstringebat, utriusq; ipsius terminos deuinciens. Atq; hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriēs, intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cum arundinulis aut lamellis excidebat, ita ut nulla ferē cicatrix appareret.

Quomodo palpebræ medicamento urantur. Cap. IX.

Visionem palpebrarum ex urente medicamento factam, omnes, ut uno uerbo dicam, ueteres damnauerūt, tum propter medicamenti acrimoniam oculis insidiantem, tum quod ex immodica uestione affectus nascitur, quem Græci lagophthalmum appellant, in quo hiantibus palpebris qualicunq; de causā lumen offenditur. Quoniam uerō multi a pilis semper punctionem experiunt, ne uocabulum quidem futuræ frequenter audire sustinentes detinent plerunq; nos etiā inuitos, tanquā aliis destituti prælijs uestionem per medica-

PAULI AEGIN. A mentum

mentum adhibemus. Compositio uerò medicamento hæc recipit, calcis uiuæ partes duas, saponis gallici uel cōis, totidē. Quidam ēt aphronitri partes quatuor læuigatas lixiuio, aut saponario, aut alio, ē ficu, aut quercu, aut urina pueri impubis excipiente s mucrone scalpelli palpebræ iniiciemus, tm̄ in myrtacei folij figurā, adurentes quantū etiam in descriptione cōprehenderimus. ubi iam primo medicamento imposito cutis fuerit adusta, eo spongia ablato rursus aliud iniiciemus, tam diu id cuti inhærere sinentes quousq; nigrescat. Sin id non affecuti fuerimus, etiā tertiō inducetur. Postquā uerò cutis nigruerit, & reliquū iam crusta oborta medicamentum ablueris, & balneis & superfusionibus, quousq; crusta deciderit, utemur. Inde rasilibus linamentis & penicillis teneris, cicatricem moliemur.

Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum dicitur. Cap. X.

Lagophthalmon uocant cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit aut hoc uitij, aut naturaliter, aut ex cicatrice uulneris, eiusq; uel sua spōte facti, uel ex sutura, uel ustione, ut nuper dicebamus, parū dextrè administrata: in qua etiā solum mediocris emendatio fieri potest si palpebra crassitiē amplā habeat. cōuenit n. ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentū diductis, etiā deligatura prorsus usq; ad absolutam curationē uti, ita ut non nimīū sicca, sed relaxantia magis unguina adhibeantur: quale est fœnugræci succus superfus & basilicum tetrapharmacū quod linteolis illinatur resolutum.

De inferioris palpebræ sutura & ustione per medicamenta. Cap. XI.

Quot pilorum affectibus superior palpebra opportuna est, tot etiā inferior. Etenim ultra naturæ suæ modum excrescēs, inuertitur, & phalangosim, & distichiā sustinet. Eodē igitur modo quo in superioris palpebræ sutura, utendum est, ordine inuerso: primū lunata incidi linea debet, ne sanguinis fluor opus impediatur, deinde recta. Subtus uitanda est sectio, quoniam palpebra inferior pondere suo genuino prout inuertitur. Cæterum reliqua curatio in superioris palpebræ sutura tractata, hic quoque conueniet, præter quā quod filorum excessus fronti sint agglutinandi. At si in hac etiam affectione manum extrimescens, ustionem potius ē medicamento

mento deligas, hanc quoque iam traditam habes.

De ectropio.

Cap. XII.

QUemadmodum superiori palpebræ uitiū uocatū lagophthalmon, ita inferiori ectopion oboritur: uerum id intercedit discriminis, quod hoc non è natura prouenit, sed nō nunquā ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione præcedente cōcitarint: nonnunquā ex sutura, aut inartificioſa uſtione palpebra inuertitur. Acu igitur duolina trahente carunculā tranſſuemus, à ſiniſteriore angulo ad dextrū deducta. Deinde lino utriſque ipſius extremis admoto, carunculā per acum attollemus, atq; ita ipſam ſcalpello excindemus, auferentes ſimul cum ea & acum. Atq; ſi figurā palpebra receperit, & æqualiter ſit conuerſa, ſatis manu profectū eſt. Sin autem poſtea quā caro fuerit ablata, adhuc inuertatur, auerſum ſcalpellū quam partē Græci cyathiscū nomināt, iuxta cuſpidem palpebræ ſectæ ſubiiciemus, ac in externa illius parte duas inciſas lineas, à duobus factæ ſectionis angulis, aſpicientes, in acutiē quandā ducemus, eaſq; in unū cogentes, particulā Græcorū literæ Δ ſimilem amputabimus, ut eius acuta pars infrā ſpectet oculum, latitudo ſuprà, cilium appellatum reſpiciat. Secundum hoc diductas oras acu ex lana filum ducente committemus, duabus futuris contenti. Quòd ſi uerò futuræ, aut uſtioni fertur acceptū ectropion, etiam ſub inferioribus palpebræ pilis per ipſam primam cicatricē lineā ſimplicem incidemus, labrisq; diductis linamenta inferemus, ac aliis præſidijs, quæ in lagophthalmis comprehenſa ſunt, utemur, præterquā fomentis, uſq; dum futura fuerit conglutinata.

De anabrochiſmo, & uſtione ferramento adhibenda.

Cap. XIII.

IN quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui oculū iritent, ſed circiter unus, aut duo, aut plurimū tres, inuicē propinqui, anabrochiſmū græcè dictū, probamus, iſq; ſit hunc in modū. Per acus tenuiſſimæ auriculā capillus muliebris, aut ſimpliciſſimum byſſinum linum tranſmittitur, duobus ſimul extremis commiſſis, ut quod inferitur duplicem habeat anſulā alterumq; huiusmodi filum, aut capillus anſulæ iniiciatur: traductaq; acu per cilium ubi pili enati apparent, pilū, piloſve anſulæ impoſitos, auriscalpio detrahemus. Et ſiquidem palpebræ

A 2 pilus

pilus prehensus est, anfulam attrahimus. Sin uerò unus, aut plures exciderint, per iniectum principium rursus anfulam deorsum trahemus, iterumq; pilo, seu pilis in eam positis, attrahemus. At si unus duntaxat pilus gracilis oculum pungat, etiam alterum ex naturalibus palpebrae pilis simul euellemus, inunctum prius gumi, aut alio quodam glutinante, deligabimusq; donec pilus coalescat. Nonnulli autem uisionem praeponunt anabrochismo: palpebram inuertunt, extractoq; uulsella pilo pungente siue uno, siue duobus, uel etiam tribus, candens aut specillum, quod utroq; extremo in cuspidem abeat, aut auriscalpium, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentum loco adigunt, unde pilus, pilive sint euulsi. Sic enim cute densata, nullus, pilus nascitur.

*De hydatide.**Cap. XIII.*

HYDatis pinguis quaedam est substantia, palpebrae cuti praeter naturam substrata. In aliquibus autem, & praesertim pueris ceu natura humidioribus augescens, maiorum superuenientium causa redditur, dum oculum pondere suo grauat, eoque fluxionem excitat, palpebrae igitur ipsis subter supercilia aquae inter eutem representant, nec ut par est sursum possunt attolli. Si uerò digitis ipsas deprimamus, inde digitos separemus, quod medium intercedit, inflatur. Horis autem antelucanis porissimum de fluxione tentantur, neque contra solis splendores cernere sustinent, sed tamen illachrymant, continuisque lippitudinibus instantur. figurato igitur commodè aegroto, digitis duobus, indice & medio paululum distantibus palpebram constringemus, collectionem quandam hydatidis ad medium digitis interpositum molientes. Ministri autem posterius stanti caputque aegrotantis firmiter continenti iubebimus per medium supercilij palpebram modicè attollat, Nos sumpto in manus scalpello, ipsam per medium lineam transversa diuidemus, non maiore quam in sanguinis per uenas detractione fieri solet, alta uerò ut totam cutem diuidat, uel etiam hydatidem ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi. plerique siquidem altius demisso scalpello, uel membranam quae à cornu similitudine Ceratoides dicitur, uiolarunt, uel certe palpebrae musculos conuulnerunt. Atque si quidem protinus hydatidis in conspectum uenerit, ipsam extrahemus: sin minus, iterum diuisionem leuiter moliemur. Vnde si apparuerit digitis cum linteolo molli apprehensam huc, illuc, nonnunquam etiam circumactam

cumactam mouendo extrahemus. ubi ablata fuerit implicitū panniculum posca madentem impositumq; deligabimus. Sunt autem qui & læuigatum salem specilli capitulo diuisionibus inferant, ut si ex hydatide quippiam fuerit relictum, ipsam consumat: postquam solueris si desit inflammatio collyrijs quæ illini possint, aut lycio, aut glaucio, aut croco curationem expediemus. Sin inflammatio urgeat, cataplasmatibus ad ea inscriptis, alijsq; præsidijis medebimur.

De palpebris commissis. Cap. XV.

Superior palpebra interim cum inferiori cilio coalescit, interim cū membrana adnata, interim etiam cum ea quæ ob cornus similitudinē græcè ceratoides appellatur, ac morbus oculum tractatu difficilem efficit. Conuenit igitur uel auriscalpio, lato palpebræ spatio subiecto, uel ea per hamulū eleuata coalitum scalpello ad pterygia excidenda idoneo dissoluere, cura adhibita ne cornea membrana uulneretur, atq; inde procidentix occasio fiat. Vbi incideris, succo in oculum infuso linamentis palpebras diducemus, ne rursus commissura fiat, lanaq; ouo madente imposita post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyrijs utemur.

De chalazijs. Cap. XVI.

Chalazium otiosi humoris in palpebra concretio est: quæ si ab exteriori parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus trāsuersa linea incidi debet: deinde auriscalpio, uel aliquo huiusmodi instrumēto Chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut dehiscit, futuris oras commitemus, ac emplastro utemur. Si exigua est, omissis futuris, curationē absoluemus. Si ab interiori parte fuerit, ut per cartilaginem ipsa pelluceat, inuersa palpebra & trāsuersim intus diuisa, chalazion tollitur: quo facto, muriā uulneri infundemus.

De uerrucis & encanthide. Cap. XVII.

Palpebrarum uerrucis, & in maiore angulo encanthidibus appellatis uulsella prehenfis, scalpelloq; amputatis chalcitidem læuigatam imponemus,

De ungue oculorum, quod pterygion à Græcis uocatur. Cap. XVIII.

Pterygion neruosa membrana est: quæ ab oculi angulo maiore plurimum initium capiens, per minorem ad interiora

riora progreditur, officitq; oculo, quod motū ipsius, bulbi cōtractione impediāt, & q̄ progrediēs, totā pupillā cōtegat. Cū igitur facilius curationē recipiāt, quæ tenuia sunt, & albicant, hūc in modū admouēda manus est. Diductis palpebris, unguē hamulo modicē inflexo exceptū attollimus. A cū uerō, pilum equinū, aut linū ualidū ducentē, ac paululū inflexā per summa ad unguis dimidiū trajicimus. Et lino quidē unguē deligatum sublimē eleuamus, pilo aut partē pupillæ proximā defecantes, usq; ad extremū excoriamus. Reliquam partē maiori angulo uicinā scalpello futuris dicato ex basi abscindimus, ita ut anguli carunculā relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper descendat, rhyada Græci uocant. Aliqui lino unguē eleuatum ut diximus, scalpello in id accōmodato, totum illum excoriāt, cauentes ne à cornu dictam Ceratoidem tunicam attingant. Post manus administrationem momento salis in leuorem detriti loco iniecto, lanam ouo imbutam illigabimus. Ab huius solutione, muriam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflammatio subsecuta fuerit, ad eam inscriptis auxiliis succurremus.

De staphylomate.

Cap. XIX.

Staphyloma est tunicæ Ceratoidis, una cū rhagoidi, debilitatæ: aut uitio defluxionis, aut exulcerationis, eleuatio. Admouemus aut huic uitio manū, non ut uisum abolitū restituamus (nā id fieri nequit) uerū ut moderatū ægrotanti decorē cōciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per basim staphylomatis traiecta, deinde alterā acum duplex linū ducentē ab angulo qui ad manū spectat, ad alterum per basim staphylomatis trāsmittere oportet, manenteq; prima acu, duplici lino amputato, staphylomatis aliā partem sursum, aliam deorsum filis deuincire: atq; tunc acu detracta lanam oui liquore imbutā imponere. Post solutionem blandis infusionibus oculū lenire, donec fila simul cum staphylomate decidāt.

De oculis purulentis, qui hypopyi dicuntur. Cap. XX.

DE oculis purulētis Gal uerba apponere abūdē est, quæ in eū modū habēt. Nostra ætate medicus quidā ocularius cognomēto lustus, ēt cōcussione capitis plerosq; hypopyos persanauit. collocās. n. eos in sella rectos, ac capita ipsorū utrinq; à lateribus cōprehendens, mox quatiebat adeo ut pus ipsis descēdere palā uideremus. māsit aut deorsum propter

pter grauitatē substantiæ, tametsi hypochymata nequaquā manerent nisi quis admodū diligēter ea infarxisset. Ac progressus iterū idē Galenus (inquit) frequenter autem multū simul puris uacuauimus tunica ea diuisa quæ cornus speciē refert, paulò supra locū quo uniuersæ inter se tunicæ cōmittuntur, nominant aut locū, Græci nuncirim, nunc Stephanem hoc est coronam. Hoc quidē Galenus in commentario de morbis curādis prodidit. Cæterum post puris euacuationem, ulcus ex mulsa aut fœnugræci succo, melle addito infusionibus repurgantes, deinceps reliquam purgationem accommodabimus.

*De suffusis.**Cap. XXI.*

Suffusio, ociosi humoris in cornea mēbrana iuxta pupillam cōcretio est. quæ uisum impedit, aut certē ne clare oculus cernat, efficit, Accidit potissimū ex perfrictione ac imbecillitate spiritus uisorii, eoq; senes magis & lōgo morbo confectos inuadit. fit ēt ex uomitu uiolētius cōcitato & ex ictu, aliisq; pluribus de causis. Verū de ijs suffusionibus quæ nondū radices egetūt, nullā manus administrationē requirētibus, tertio libro cōprehensum est. In hoc aut eas quæ iam cōfirmate sunt & ex toto cōcreuerunt, notis suis describemus. Oēs igitur suffusione laborātes lucē uidēt aut multā aut paucā, eoq; discrimine suffusiones ab hebetudine & glaucomate separamus, tū eo q̄ hebetudinē & glaucoma experti lucē omnino nullā cernunt. Rursus igitur Galenus docebit te suffusionū & cōcretionem & differentiā, itē quō his manu mederi cōueniet. Oculus suffusione tētatus cōcluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eiq; adducitur, simulq; hac illac exprimitur, deinde oculo aperto & mēte ei adhibita suffusionē conspicimus. In iis. n. quibus humor nondū coaluit, fusio quædā ex digiti impressione oboriūt. ac primū latior apparet, rursus in suā & figuram & magnitudinem recurrit. At in cōfirmatis suffusionibus nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniā uero cōe hoc est indicium & eorū in quibus modicē, & illorū in quibus suprā modū humor cōcreuit, colore ipsos discernemus. Nā si ferri aut marinæ aquæ aut plūbi colorē suffusio habeat, moderatē coaluit, & ad educationē idonea redditur: si uerō gypso & grandini similis color suffusionis est, supra quā par est concreuit Sed quia hæc à Galeno didicimus,

collocato ægrotante aduerso lumine citra solē, oculum sanum accuratē deligabimus, & diductis alterius palpebris recedemus ab iride appellata ad minorem angulū, quantū specilli cuspidis spatii continet, atq; tū punctorii stili mucrone locum designabis quem puncturus es: in sinistro quidē oculo dextra manu functionē obiens: in dextro autē sinistra. Atq; inuersa punctorii specilli acie quæ ad extremū rotunda est, ualēter impingimus, & partem designatam usq; ad uacuum intus sinū penetramus: idq; tā altē fiet, quā pupilla ab iride nūcupata distat. Ex superiori igitur parte uertici suffusionis stilum punctoriū adigentes, (uidetur autē cōspiciuē ferrū, quod tunica cornea pel luceat) humoris colluuiē per ipsam in subiecta loca deriuabimus. Et si protinus educta fuerit, sistemus quiescentes paululū. sin autē recurrerit, rursus ipsam deducemus. Euacuata suffusione, stilū tollemus, leniter circumuertēdo. Post hoc oculo aqua eloto pauxillū salis cappadocici instillabimus, lanamq; oui luteo cū rosaceo madescētē impositā deligabimus, ita ut sanū quoq; oculū cōprehendamus, ne una cōmoueatur. Cæterū collocātes ægrū in domuncula subterranea iubebimus prorsus ipsum cōquiescere, tenui uti uictu, ad usq; septimū diem illigatū, nisi quid prohibeat. Post hūc solutis ligaminibus uisum experiemur, ostendētes ei res quasdam uisibiles, quod dum manu curamus, aut postea, fieri dissuademus, quod ex cōtinuo nimīū intuitu promptē rursus suffusio repleatur. Si inflāmatio urgeat, etiā ante septimum deligatura soluta, aduersus hanc pugnabimus.

De ægilope.

Cap. XXII.

A Egilops, tumor est abscessorius inter maiorem angulū & nares proueniēs. Vix curationē admittit, tū partium tenuitatis causa, tum periculi, ne oculus consortii lege indolescat. Si igitur per summa ruptus fuerit abscessus, totum id quod eminet usq; ad os excidēdū. Et si ad malas subluuies deciderit, totam ipsam explicabimus, os autē cariem nodū sentiēs, rademus. Quod si iam carie uexatū est, ferro cādenti acuto ac in cuspidē abeunte, aduremus. Spongia frigida madente, oculo imposita. Sunt qui post carunculæ excisionē terebra usi, humorem, aut pus in nares deriuarint. Nos autē satis habuimus eousq; solum ferramentis ad ægilopem accommodatis adurere, ut squama abscederet. Ab ustione lēticula melle adiecto quod phacomeli

phacomeli uocant, uel malicorio cum melle reliquisq; siccantibus præfidiis utemur. At si ægilops serpat ad angulum, summaq; inuadat, nequaquam tunc scalpello, quo aut pterygia, aut uenas secamus, media anguli parte ad abscellum resoluta, carnes ex alto educemus, item mediocriter desiccabimus. Vitri autem puluis tenuissimus ipsis insparfus, mirabiliter desiccet. Ad hæc aloë similiter cum fuligine thuris. Reliquam uero Aegilopum medicinam, tertio libro sumus executi.

Si meatus auditorij non perforati sint. Cap. XXIII.

Hic affectus à prima natali die contrahitur, membrana quædam auditorij meatum obstruente, nunc per summa, nunc in alto, postea accidit præcedente in audiendi meatu exulceratione. siquidē caro supernascens ipsum occludit. Itaq; si membrana auditum impediens altè inhærescit, difficilis erit administratio. Tenrandū tamen est, tenui quodam instrumento ipsam incidere. si in summo fuerit, scalpro quod Græci scolopomachæ rion appellant, hæc diuisam, ubi usus exigat, et auferemus. At si caro supercreuerit, hanc pterygijs apto scalpello, aut specillo polytis idoneo tollemus, deinde tortile linamentum ex uiliore panniculo, spatioso meatus sinui aptatum aqua imbuemus, inuolutumq; chalcitide læuigata, aut huiusmodi quodam arido in meatum demitemus, ne rursus caro enascatur. Si inflammatio male habeat, protinus id auferemus. Si fundat sanguinem meatus, spongiam aqua frigida imbutam imponemus. alijsq; conuenientibus utemur remedijs.

Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt extrahenda. Cap. XXIII.

Solet etiam in aurem incidere, non modò calculus, sed et uitrum, faba, & filiquarum grana. uitrum itaq; & calculus suam seruant magnitudinē: fabæ autē, & filiquarū grana, alijsq; id genus, naturali corporis madore inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur uel auriculario specillo, uel hamulo, uel uulsella hæc extrahere. Aut uiolēta capitis cōcussione, aure super circulum quendam imposita. Iā uerò calamo hæc subinde extraximus, exurgentes et aquam auribus illapsam similiter, cera calami ambitum, qui auri iniicitur, obstruentes ne spiritui usquā sit exitus. Calculos, & eius generis corpuscula, ieduximus specillo lana inuoluto & in resinā terebinthinam,

aut

aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamēto quod sternutamentū pronocet, naribus indito, os & nares obturato. Si ne horū quidem nulli cesserit prius quā inflammatio, conuulsio, & omnino periculū fuerit subsecutum, manu, & ferramentis ipsa auferemus: figurabitur itaq; egrotus, ut aūris auersa sit ad basim ipsius post appellatā fibram, & lunata utemur diuisione exigua, auersaq; specilli parte corpusculū quod insidet, eximemus. Hoc ablato uulnus futuris commitemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

*De polypo.**Cap. XXV.*

Polypus tumor est præter naturā in naribus oboriens, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum q̄ illius carnē repræsentet, tum q̄ suo cōplexu quemadmodum ille, captantes ulciscitur, nares ipsorū cōprehendens, ita & uitium hoc laborantiū nares obstruit, id efficiens ut & difficulter respirent, & sermonē ægrè exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitētes, liuidi, & maligni, ceu cancri naturā induentes, attingi non debent. Molliores autē, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & nariū meatu sinistra manu explicato dilatatoq; spatula ad id facta in myrtacei folii modum acuta orbiculatim polypū, aut carunculam dextra præcidemus, illic acie ferramēti imposita, ubi naribus coaluit: secundū hæc instrumento in oppositū cōuerso, manubriolo ipsius, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidem purum naris meatū uiderimus effectum, ad curationem descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorii acie relictū corpus cum tensione, agitatione, & rasura ualenti auferemus. Malignos & peruicaces polypos candentibus ferramentis adurere cōsiliū est. inde remedijs ustioni dicatis uti. Postquam ferro satis effectum, sponsia detergemus, ac poscam, aut uinū in nares fundemus. Et si humor per palatum in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus à colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis nariū partibus, quam instrumenta non comprehenderit. Linum igitur mediocriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumue digitorum longitudinis in nodos co nāri-

constrictum, per specilli duplici cuspide præditi foramen transmittemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inferetur: idem per palatum, & os eicientes utraq; manu extrahemus, tanquam carunculas nodis desecantes. Deinde funiculari linamento meatum diductum habentes post triduum pastillo musæ, & consimilibus, reliquias absuimus simul & locum exiccabimus. Postea uero pastillis cicatricem ducentibus utemur, plumbeos canaliculos naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

Curta in auribus, & labris quomodo sarciri possint:

Græci uocant colobomata. Cap. XXVI.

Curta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci uocant, hac ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox oræ uulnere contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Dein suturæ illis iniici debent, & conglutinantia.

De epulidibus, & parulidibus. Cap. XXVII.

Epulis carnis tuberculū est iuxta dentiū aliquē in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuas infestans. Epulidē itaq; uulsella, aut hamulo eleuatā præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamēta inserimus. Vidi autē subinde scalpello, quo uenas secamus, ipsam dūtaxat punctam, & pure uacuato consanuisse. post ferrum, uino collui præcipimus. In sequenti die mulsæ, tertio Antheron, puluerē uulneri inducimus usq; dū curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si cōgruis medicamētis nō curetur: cādēti ferro ipsā aduremus.

Quomodo dentes eximantur. Cap. XXVIII.

Dens qui eximetur usq; ad receptaculū suum circumradi debet, inde forfice paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id forauē tenui linamento primum replendum est, ne constrictus sub forfice confringatur. Eo excepto, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea uino, aut posca os colluetur cum consanescat. Quoniā uero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui receptaculo adnati coaluerunt, scalpris excindemus: qui non coaluerūt, forfice tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam confractus fuerit, nonnunquam limula, id quod excedit, superfluumq; in eo est, deteremus, adiectasq; ipsis, ut uerisimile est, squamas

squamas auerso scalpello, aut rasorio, aut lima perpurgabim⁹.

De ligatione linguae quod ancylion dicitur.

Cap. XXIX.

Ligatio linguae quae ancylōglosson Græcis appellat, aliàs naturaliter accidit, mēbris durioribus magisq; à prima origine minutis linguā continentibus, aliàs ex acquisito ob cicatricem quampiam duriores sub ipsa ex ulcere contractam. Qui igitur ex natura hoc uitii habent, eo q̄ tardè sermonē explicare incipiunt & uinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non præcedente, cognoscuntur. Qui uero ex acquisito, cicatricem manifesto conspicuam habent. Collocari igitur debet ægrotus in sedili ea figura ut linguam ad palatū suspendeat, & nerueum illud uinculum transuersa plaga incidetur. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio pro uenerit, ea hamulo transfixa callum sursum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationē soluimus, cura adhibita ne particulas altè latentes incidamus. Nam sanguinis profusio quæ fisti nequeat, frequenter inde secuta est. Post hæc aqua frigida, aut posca uulnus debet elui. deinde medicina utendum quæ relaxet & carnem inducat.

De tonsillis. Cap. XXX.

Quemadmodum glandulæ scirrhus induratae, strumæ appellatur, ita etiam tonsillæ inflammationem expertæ, & supra naturalem modum auctæ, & uelutī desiccatae, deuorationi spirationiq; negotium exhibentes, e regione utrinq; sibi inuicem oppositæ, eodem partis uocabulo, tonsillæ, Græcè antiades uocantur. Quibus cum adest inflammatio, scalpellum ad mouere cautio est. ubi illa modicè conquierit, manum admoliermur, præsertim albis, contractis, angusta basi firmatis. Nam humiditatis flaccescentes, rubicundæ, amplam basim habentes, facillimè sanguinem profundūt. Collocario igitur homine aduersus Solis lumen, iubebimus ut ore hiet, ministro caput continente, alteroq; linguam spatula ad id facta quam Græci glossocatochon appellant, inferiori maxillæ apprimente, nos hamulo per tonsillam traiecto, etiam quantum licet ipsam attrahemus, ita ut non mēbranas simul euellamus. Deinde totam ipsa ex basi ambutabimus scalpro ligationi dicato, ἀγκυλότομον nuncupant.

pant. Sunt n. duo eiusmodi instrumenta, aduersos acie inflexus habentia. Postquam una fuerit succisa, ad alterā eodem modo uice conuersa ueniendum est. Functione scalpello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargarizabit. At si profluuiū sanguinis eueniat, etiā rubi & rosarum, & myrtiq; diluto egelido utetur. Si uero copia sanguinis prorumpat, plantaginis & symphyti succo: item electro, pastillo & lemnia sphragide posca soluta os collui debet. Cessante autē profluuiio, proximo die, rosarū flore, croco & amylo cū lacte perungentur ex aqua, uel oui liquore cādido, uel hydrorofato. Si sordes ulceribus increuerint etiam ex melle & collutiones, & illitus commodè adhibetur.

De uua.

Cap. XXXI.

G Vrgulio tanquam aliquod uocis plectrū subinde destillationem à capite recipit: idemq; præter naturā auctus, si oblongior, tenuisq; fuerit, Columella nuncupatur: si uero crassior ab ima parte, & rotunda, Vua dicitur. utrunq; autem nomen à similitudine factum est. Si igitur uniuersalibus, nempe & per sanguinis dimissionē, & medicamento adhibitis uacuationibus non abigatur, neq; etiā remedijs loco admotis, quæ astringāt, repellantq;, etiam discutere possint, cessērit, ad scalpellū ueniamus: ne cōtinuo irritatu, tussis, uigiliæ, interim etiam strangulatus subsequatur. Quæ igitur cōtractæ sunt rotundæ, non oblongæ, cruentæ, uel subnigræ, nō attingi scalpello debent. Tenuēs autem, oblongæ, per summa graciles muris caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ non admodū, sed albicantes, eæ curandæ sunt. hæ siquidē protinus inflammatione liberantur. Id autē ex uua præciditur, quod præter naturæ modum eminet. Etenim si ad finem illa præcidatur, extremam omnes thoracis regiones noxam percipiunt: & uox intermoritur. Itaque figuratu, ægrotatus in sedili contra Solis lumen, iubeturque magnum hiare deinde uulsella, aut forfice quod superuacuum est prehensum, inferiorique parti adductū scalpello uuis aut futuris accōmodato, præcidimus. inde quæ in uasorum sectione comprehensa sunt, agemus. Sepe uero, aut propter laborantis timorem, sanguinis profluuij metum, medicamēti uicissitudinem ferrum uitantes, adurente potius medicamēto hanc absuimus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in palpebrarum uisione dictū est, aut eius generis alio, uuæ uisæ sinus implere, ac homini magnum hiare iusso lingua per famulum

mulum forfice constricta, instrumento adaperto tam uue par-
tem comprehendemus, quantam etiam sumus amputaturi.
Cæterum spissitudinem medicamentum habebit neque liqui-
dâ, ne diffuens ab uua deerret, subiectas autem partes adurat
ob quod egro interdiciamus, ne per totum ustionis tempus de-
glutiat, neq; omnino duram, quò facilius uue incidat, & si ex
uno ipsius iniectu summa uuæ pars nigruerit, abundè est: sin mi-
nus, etiam bis utemur, egro per totum administrationis tem-
pus inclinante ore, in terram, ut salua eliquescens simul cum
medicamenti particulis extra os euadat, siquidè hora una emo-
ritur: excidit autem tertio, quatuorve die. Secundum ustionem
lana molli aut stuppa indice digito inuoluto quæ gurgulioni
circum adhærescunt, extergemus, uel etiam aqua os collui iu-
beimus. At ceruicis regionem fomentis ex chamæmelino,
tum in his, tum in illis quibus tonsillæ ademptæ sunt ex con-
fortij lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus, & perun-
ctionibus similiter utemur.

Quomodo spinæ gutturi eximantur. Cap. XXXII.

Deuorantur subinde inter edendum spinæ, aut piscium,
aut aliorum quorundam, diuersis in partibus. Quæ igitur
in conspectum ueniunt, uulsella, quam Græci pro-
priè appellant acanthobolon, eximemus: quæ inferius ad ipsas
fauces peruenerint, alio modo. Sunt qui dicant maiores mo-
les esse deuorandas, ut, caulem lactucarum, aut buccellam pa-
nis. Alij uero spongiam puram mollemque exiguæ magnitu-
dinis lino illigatam deglutire iubent, linoq; apprehenso retra-
hi, idque frequenter efficere ut spina impacta spongiæ educa-
tur. Leonides autem iubet cataplasmatibus uti, quæ concoquât,
cuiusmodi ex cruda ordeï farina conficiuntur, quò spina in pus
reducta sua sponte excidat. At si eadem hora aut etiam ante
uentriculi concoctionem in ægrotum inciderimus, eo quod in-
fixum est nobis non conspicuo, uomere iubeimus digitis
aut pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est infi-
xum unâ cum uomitu educetur.

Quomodo aspera arteria incidi debeat.

Cap. XXXIII.

Chirurgicorum præstantissimi hanc quoque administra-
tionem literis prodiderint. Antyllus itaque hûc in mo-
dum

dum scribit, In synanchicis quidem, ut in ea parte dicitur quæ uictus rationem tradit Chirurgiam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore autem & mentio inflammationem experiuntibus, aut etiâ tonsillis, asperæ arteriæ os operientibus, in columi sanè ipsa arteria, ratio est sectione uti, quò periculum strangulatus euitetur: deinde cum infra arteriæ caput spatium trium ipsius quatuorve circulorum manum adegerimus, partem nonnullâ ipsius arteriæ scalpello pertundemus, totam diuidere securum non est, tum quòd hic locus excarnis sit tum quòd uasa procul à loco diuiso sint diffusa. Itaq; inclinato ægroti capite retrorsum, ut arteria reddatur conspicua, transuersam lineam incidemus, inter duos circulos ipsam ducentes, ne cartilago, sed membrana cartilagine colligans, discindatur. At si meticulosior aliquis inter agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet: deinde sic ipsi arteriæ incidens, uasis, si fortè occurrant, præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus dixit: Coniiciens arteriam scalpello esse penetratam, inde quòd spiritus per eam cum murmure quodam erumpat, tum quòd uox intercisa sit. ubi uero de strangulatu metus amplius non est, oras uulneris renouabimus, mox futuris committemus, ita ut solam cutim citra cartilaginem suamus, utemurque medicamento quod cruentis facit. Sin minus conglutinetur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili uero curatione utendum etiam si quis nobis obtigerit qui mortis desiderio iugulum sibi inciderit.

*De abscessu.**Cap. XXXIIII.*

Quòd abscessus carniū, uel partiū carnosarū corruptela mutatioq; sit, quomodo generetur, quotq; eius sunt differentiæ, quarto libro abundè tractatum est. Nunc aut quæadmodū munu scalpelloq; ei medendū sit, exponemus, cū omnino in pus transierit. Hoc aut deprehēdimus inde quòd dolores, febris, si præcesserit, rubor, pulsus & reliqua inflammationis signa minora tunc appareant, ubi iam tumor in acutum fastigiatus est, & pus digitis innixis occurrat, præsertim cū summa occupat abscessus, tunc ad scalpellū ueniendū est. Si uero neque ad tactum occurrat, neq; fastigietur, eo quòd in alto delitescat, alij mutationis notis attendentes, manum admoilemur. Sciendum uero est crudos interim ipsos priusquam ex-

toto in pus mutati sint, incidi, si aut articulis, aut principibus particulis uicini sint, ne ligamentum, aut aliquod eis necessarium assidua putredine pariter contabescat. Porro abscessus ano proximos crudos antequam in totum ematuruerint, dissecari Hippocrates praecipit, ueritus ne perforationem experiantur. Inciduntur ergo non omnes simili linea, sed naturali quidem, ut in fronte: & pilosis locis, ut in capite. cura decoris quantum licet, habita. Recta uero linea artus secamus, ueluti in musculis, diligentiam adhibentes ne & neruos & arterias & principales particulas attingamus: interim in rectum, interim transversim abscessum prout cuiusque usus exigit, diuiso. In minoribus unam scalpello sectionem molimur, in magnis plures, iuxta amplitudinis rationem ubique ea quae tenuiora sunt & effluxioni idonea, incidentes. Illos sane abscessu qui plurimum fastigiantur, crudi tenues, & emortui sunt, praecidimus trianguli, aut mirtacei, folij, aut alterius anguli figura, cum circularis ad cicatricem recipiendam sit in idonea. Qui uero non in fastigium attolluntur, eos simplici duntaxat linea dissecamus. At ubi magnum sinum inuenimus, si cutis superinecta carnosae sit, & queat conglutinari, diuisione loci ea duntaxat utemur, quae humoris effluxui conueniat: Sin tenuis, admodumque ex carnis, totam in longitudinem simpliciter dissecabimus, & post simplicem diuisionem si corpora utrinque sita gracilia ualde & non carnosae uideantur, ipsa tollemus. Administrato iam scalpelli munere, spongia locus abstergi debet: si paruus, est abscessus, unaque diuisio, simplex linamentum inferemus: Si magnus est & plures incisae lineae, implicitum aliquod in longitudinem linamentum, lemniscum Graeci uocant, ipsis demittimus, ipsas similiter plagas linamentis replentes. Quod si erumpat sanguis, aqua frigida, aut posca utendum. si ita non substiterit, chalcitidis pollinem inspergemus, eoque frequenter ob flaccidam humore putredinem utemur. Splenia si hyems est, & partes sint neruosae, oenelaeo imbuta deligabimus: si aestas, & partes carnosae, aqua cum oleo. aut ipso quoque uino cum uino frigido tincta illigataque sequenti die eisdem liquoribus superfundemus. Post tertium diem ubi soluerimus, spongiaque deterferimus tetrapharmaco quod in linteola illinitur, utemur. Si inflammatione caret uomica, idem fomentum & medicamen linamentis illitum accommodabimus. Si inflammatio adest: cataplasma, quod concoquendi uim habeat,

beat, iniiciemus, superfusionibus antea usi ubi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum unus, glutinantibus remedij, ut quarto volumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

De strumis.

Cap. XXXV.

Struma quæ græcè chœras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis, & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet à chœradis petris, aut suis, quod numerosæ sobolis existant, aut quod colla habeant glandulosa. Oriuntur autem strumæ in prori ceruicis parte, aut in altera, aut utrinque, una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent attractu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam Carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus ipsas curationi quæ manu fit, non cedere. Morigeræ autem ac blandæ tum tactui, tum congruo medicamentorum usui, hoc modo tractandæ sunt. Superficiaræ igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbantibus dissoluuntur: orarum cute hamulis distenta, membranis liberantur, ut in uasorum cōsectione, quam angio logiam uocauimus, expositum est, ac paulatim eximentur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriatæ corporibus eas continentibus undiquaque liberantur, animo adhibito ubique, ne arteriæ, quas carotidas uocant, & nerui recurrentes uiolenter. At si uas aliquod diuisum opus obscuret, funiculo id excipietur, uel per medium amputabitur, nisi magnū fuerit: ubi in arctum strumæ basis uenerit, dextrè ipsa præcidetur: ac indice demisso tentabimus num & aliæ sint strumæ adiectæ quæ eodem modo auferentur. Quod si magnum aliquod uas aut etiam plura subinde iuxta strumæ fundum esse suspicemur, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere conuenit, quod particulatim citra periculū sua sponte excidat. quo tempore medicamento in linteola illito, curatio tentabitur. Si uerò inde excindatur, oras committemus. omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atque si nihil superuacuum habuerint, inde suturis iungemus. Sin ex strumæ tumore cutis redundet, parte ipsius myrti instar ablata, suturis utemur, & medicamen cruentis aptum iniiciemus.

PAULI ÆGIN.

B De

De steatomatis, atheromatis & meliceridibus.

Cap.

XXXVI.

HAec quoque in abscessuum genere comprehenduntur: sed hoc discrimine ab illis uariant, quod abscessus propriè dicti inflammationē doloremq; testentur, & acrem humorem, ac rodentem contineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Cæterum illa inter se quoque differunt, quod humor in steatmate contentus, sicut appellatio ostēdit, seuo sit persimilis. In atheromate, pulsi frumentaceæ. In meliceride, humor mel repræsentet. Agnosces ipsa hunc in modū. Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tardè quidem funditur: cito autem rursus succrescit. Curantur hæc quemadmodum strumæ, incisione, excoriatu, futuris & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana uulneretur, unde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & ne pars ipsius relinquatur, nam renascendi occasionem plerunq; in brachiali, talo & articulamentis motui dicatis exhibet, quemadmodū etiam struma uel tota, uel portio ipsius relicta. quod si huiusmodi quippiā fuerit deprehensum, satius est non fuere, sed exedētibus medicaminibus reliquias absumere.

De aneurysmate.

Cap. XXXVII.

Aneurysma tumor blandus tactu est, digitisq; cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de eo hunc in modū scribit. Arteriæ apertæ affectus, aneurysma uocatur. Fit autem eadē quoq; conuulnerata, quoties incumbēs ei cutis cicatricē quidē contraxerit, maneat autē arteriæ uulnus, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstructa. Agnoscuntur huiusmodi affectus arteriæ pulsū, imò etiā prementibus nobis tumor omnis euanescit, substantia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hæc quidē Galenus. Nos autē ipsa aneurysmata hoc modo inuicē discernimus. Quæ ad aperta arteria fiunt, prolixiora apparent, & in alto constituuntur: digitisque impressis ceu strepitus quidā ex auditur, cū nullus sonus in iis quæ rupturæ feruntur accepta percipiatur: illa uerò rotunda magis sunt, & per summa occurrunt. Quæ igitur alas, inguina & ceruicē infestant, aliāq; loca, eximie magnitudinis aneurysmata, curare propter uasorū amplitudinem non tentabimus. Quæ

Quæ uerò summas partes, artus uel caput affligunt, hac ratione aggredi conuenit. Si quidem ex aneurysmate tumor obuenit cutem linea recta in longū incidemus, deinde hamis ductæ oræ sicut in ualorū dissectione dictū est, excoriabuntur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria nudabitur: acu traiecta duobus funiculis deligabitur, puncta prius arteria scalpello per mediū: ubi cum ambienti membrana unita fuerit, curatione pus maturante utemur usq; dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ creatū sit aneurysma, torū id quatenus fieri licet, cū cute digitis apprehendendū est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transfluendū. Et post acus traiectum ansulam forcice præcidere oportet, atq; sic duobus fili, hic illic tumorem deligare, ueluti in staphysomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuolantur, altera etiā transmittēda est acus per totum quæ priorē premat similiter duo fila ducens: amputata an sua ex quatuor filis cōstata, ita tumorem ex lino deligabimus, uel tumore per mediū adaperto post excretionē, cutem adimemus, eam quæ ligata est relinquentes, ac splenium ex uino & oleo imponentes, remedijs in linamenta illitis utemur.

De asperæ arteriæ tumore qui bronchocele dicitur.

Cap. XXXVIII.

GRandis in ceruice, & rotundus tumor fit, nomen claturam ab internis partibus sortitus. Duplex eius tumoris differentia est, alius n. adipe tumet, alius partium illarū dilatatione accidit. Atq; hunc notabimus ueluti & aneurysmata, desperatūq; fugiemus, nō aliter ac uniuersa aneurysmata quæ periculosam habeāt administrationē: præcipuē uerò quæ circa ceruicē oriuntur, ob arteriarū magnitudinem. Qui adipe inturgescit, ita ut steatomata curari debet, discretis, præteritisque uasis, eo nimirum modo quem in strumis exposuimus.

De ganglijs.

Cap. XXXIX.

GAnglion, nerui est in nodum concretio, ex ictu, aut labore proficiscens, plerunq; uerò in manus iunctura, quā cū brachio committitur, talo, & articulamenti absoluitur: quanquam in alijs quoq; partibus proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor, concolor, tenitens, indolensque. At si uiolenter premas, stupidum sensum experitur, non in alto, sed ipsa sub cute

B 2 te radices

te radices agens:& ad latera quidē transferri potest:fin autē uī adigas:tum antē,tum post,nequaquā potest. Quæ igitur in cruribus aut brachiis aut summis partibus oriuntur,excindere tutum non est:periculum enim ne particula reddatur mutila. At quæ caput aut frontē inuadunt, cutē scalpello diuisa curamus,& si quidē parua fuerint,uulsella cōprehensa ex basi præciduntur:si maiora,hamis transfixa excoriataq; tolluntur:oras futuris commissas, medicamento ad cruenta apto persanamus.

De uenæ sectione.

Cap. XL.

ET si omnibus satis cōstet, quomodo uena incidi debeat, tamen ne parti chirurgicæ aliquid desit,& propter artificiosas ipsius distinctiones,omittendū non est. Primū itaque uenæ sectionis consiliū est,ut sanguis qui redundat,euacuetur. Copia uerō ipsius duplici modo capi demonstrata est,uno ad uires,uenæ licet plenæ nō appareāt:in quo statu, homo protinus imbecillis ac inualidus reddit:natura ceu ad graue aliqd onus ferendū impotēte. Altero, uasa quæ id cōtinent,in alia loca pondus transfundere spectātur:& si uirtus haud cū molestia ipsum toleret:in quibus ruptis interdū uenarū cōmerciis, sanguinis sputū, aut aliæ fluxiones accidunt. Copiæ igitur,quæ ex uiribus estimatur,corporis grauitas, nota est. Venarum copia tum extensione,tum quod illæ plenæ tument,agnoscitur.utraque autem,uacuationem necessariam indicat. Itaque primo quoq; die sanguinem usu id exigente demittes,sola in uentriculo ciborū concoctione, aut etiā perfectā in iocinore sanguinis elaboratione expectata. At si inter initia ob causam aliquā sanguinis detractio prætermissa fuerit, uel ultra septimanam cum mittere alienū non est,si necessitas postulet,& uires non dissuadeant. Cæterū qui uenā incisurus est,id habet inspiciendum,num multa stercoreis retentio intestina urgeat. Quod si ita deprehensum est,molli clystere aluus antea uacuari debet: ne uenæ putridam aliquam excrementorum colluuiē ab intestinis attrahant. Ijs igitur qui ob morbi necessitatē, sanguinis detractioem requirunt,quouis tempore uenam incidemus,si particularium duntaxat in febribus accessionum uigorem seu statum excipiamus. At si continens febris extiterit, matutinū omnino tempus magis idoneū est. Qui uerō nullo morbo urgente, sed præcauēdi illius gratia sanguinis uacuationem postulant,

stulant, his uero opportunū est. Porro in ætatibus usq; ad quartumdecimum annum sanguis mitti non debet, sicut ē post sexagesimum, nisi necessitas quædā inuitabilis huc nos cōpellat. in summa, imbecillis uiribus præditi, hanc uacuationē uirabunt. Cæterū in particulis recens inflāmatione tentatis, ex opposito inanitione in moliri conuenit: in uetustioribus, ex propinquo: liquidē ex multis corporis partibus sanguinē mittemus: frequētius aut ex interiori cubiti uena. Verū id cōsiderandū uenit, interiori & alariæ dictæ uenæ, per totū, arteriā subijci: mediæ neruū: superior quæ & humeraria dicitur, periculi expers est. Ac in capitis morbis humerariā inci dimus. In his qui infra ceruicē affligunt, alariā: media utrisq; conuenit. Fascia igitur arcta partem aliquā circa brachij musculos deligare oportet, & frictione manuū alternante, repletā uenā usui cōmodā transuersim per totā ipsius latitudinē solam diuidere. Etenim maiores hac plagæ, ægrē cicatricē admittunt. arctæ nimium inflammationē experiuntur, præterquam q̃ crassioris succi transitū impediunt. In quibus autem & secundo & tertio die, interim uerò & quarto sanguinē detrahendū esse speramus, obliquius uena secari debet, quò manus inflexu dehiscens non protinus cicatrice obducatur, sic. n. uisum est Antyllo. At quantum euacuabitur, ex uiriū robore, & morbi magnitudine metiemur. Si humoris copia subest, & materia efferuescit, una uice usq; dū anima deficiat extrahemus, uirtute uidelicet robusta, sic aut ut æger nō ex humoris in uentriculū confluxu deficiat: ob quod ē multi ante iustā uacuationē per initia statim animo destituuntur: uerū eius deliquiū his uacuati humoris ratione obuenire oportet. Iam uerò si magnā uacuationē res postuler, uires aut sint inualidæ, distribuenda erit inanitio: ac primū parcius detracto sanguine denuo idem auferetur: si res exigat ē tertio. Cæterū uacuare solemus corpus uniuersum non modo in plethorica affectione, ueluti & Galenus tradit, sed ē propter affectus magnitudinē, quanquā totū corpus humoribus uideas cōmoderatū, quemadmodū in sanguinis ex naribus, aut alia parte profluuiū, quod nō copia excitauerit: ac uacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam in ualida inflammatione idem faciendū est, sicut in colicis & renibus calculosis, lippitudine, & ijs quæ tā præcipiti modo urgent. Nā dolor & partis inflammatae calor defluxioni præbent

B 3 occasionem,

occasionem, licet uniuersum corpus superfluitatibus careat.
 Quapropter parcius id tunc faciundū est, uacuatione adhibita,
 quæ potissimū laborantis ætati, & naturæ cōpetere uideatur:
 cōsideratio ēt anni tempore, loco, & ægrotantis cōsuetudine.
 Porro in quibus propè uenā quæ diuidetur magna quædā est
 inflammatio, quemadmodū in pleuriticis & iocinorosis, opti-
 mum est expectare, dū color sanguinis, & substantia mutetur.
 Diuersus autē est in inflāmatione sanguis, à naturali: quoniam
 largus incalescens, siquidē prius erat crudior, rubicundior, ma-
 gisq; flauus euadit: si autē talis prius extiterit, in nigrū adustus
 mutatur. Nō tamen ex toto mutationē ipsius expectare consi-
 lium est: sed ēt ante illam nōnunquam cessare cōuenit, idque
 duplici de causa, aut ob uiriū imbecillitatē, quas solui ex pul-
 suum tactu cognosces: sunt. n. ipsi inæquales uehementia, &
 magnitudine, uel ēt languidi, & robur fluxionis inclinans im-
 becilles iam uires notat: ut propter inflammationis maligni-
 tatem: nonnunquā. n. nihil remittit, sed uehementer impacta.
 At si nihil horū obstiterit, ægerq; floridæ ætatis sit, expectanda
 est sanguinis mutatio, magisq; si ambiens aer temperatus fue-
 rit. Si uerò sanguis ante iustam uacuationē fuerit suppressus, id
 aut accidit, aut propter timorē, & animi defectū, aut sanguinis
 grumū, aut uiolentā constrictionē, cōtra singula pugnabimus:
 Animā deficientem, odoratis naribus admotis refocillantes: cō-
 strictionē, uinculo remisso soluentes: in grumū coactū sangui-
 nem, uel olei infusione, uel digitorū fotu dissoluentes. Reliqua
 sanguinis dimittendi præparatio nulli non cognita est: uerum
 hæc in cubiti uenis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahet
 in capitis doloribus ita: capite fomentis adiuto, fascia ceruicē
 uinciemus, digitis super guttur interpositis, ne suffocatu ægri
 intereant: repleta iam uena in fronte, acie scalpelli diuidetur.
 Eodē modo etiā circa guttur extantes uenæ sphagitides ap-
 pellatæ, ob uetustam lippitudinem aduersa scalpelli parte scin-
 dentur, ita ut sanguis erūpat. Item uenas linguæ subditas, ue-
 luti in anguis, transuersas incidimus, euitantes cōstrictionem.
 Nonnulli uero in maioribus oculorū angulis uenas eminētes,
 sicut in longis capitis, uel oculorū morbis similem in modum
 diuidunt. In quibus internas quoq; nariū uenas uel mucrone
 scapelli cōtundentes, uel quibusdā asperis irritantes disrūpūt,
 item post aures firas ob capitis affectus feriunt. Quæ uero po-
 plitem

plitem perreptant, in renū cruciatibus aperiūtur. Quæ extremas corporis partes intercurrent, superiacentibus uinculo exceptis & manuū frictione, & pedū incessu repletæ diuidētur. in sinistra quidem manu, cum lien malè habet, uenam quæ inter paruū & anularem digitū porrigitur, præcipuè incidemus. cum iecur affligitur, in dextra. Nam extremarum partium inanitio è longinquo magis facta efficaciorē molitur reuulsionem: in pede, ueluti cum coxendicum dolores, aut uteri uitia urgent, eam quæ supra interiorem talum eminet, diffecabimus.

De cucurbitularum usu.

Cap. XLI.

Cucurbitulis neq; per affectuum initia, neq; cū corpora sunt plethorica, utemur: sed ijs prius euacuatis, cumq; nihil particulæ influit. Vsus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Leuis itaq; cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachū suspendit, sanguinem attrahit, & profluentem rursus sistit, obiectis partibus admota: & quod alte conditum est, in summa rursus educit. in totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatu adhibetur, efficaciorē causis per spiratū præbet, sensibilibiter ex alto ea quæ nocent eliciens: quippe non modò sanguinem, sed alios quoq; humores uacuat, præsertim cum flamma ampliore adglutinata: uerū si à carnosis particulis detractionem moliri statuimus, primū cutis scalpello exasperanda, deinde cucurbitula imponenda est. Sin ex carnis magis pars fuerit, leuem prius cucurbitulam defigemus: ubi in tumorem particula eleuata sit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodabimus: & si paululum uacuare cogitamus, unā diuisio abundè est: sin amplius, plures adhibentur. Item si tenuiorem qui continetur sanguinē acceperimus, summa scarificari, si crassiorem, alta debent: quando etiam concretum ex ictu sanguinē educere animus est. Terminus autem moderatæ diuisionum altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarunt tribus scalpellis æqualibus simul iunctis, ut unica iniectione tres fierent plagæ: uerū hoc nos inutile purantes simplici scapello contenti sumus. Alii cucurbitulis usi sunt uitreis, ut sanguinis qui uacuatur mensura in extractione pellucescat: uerum æneæ cum maiorem sustineant flammam, multo sunt efficaciores uitreis, quæ faciliè dirumpuntur. Quinetiā

B 4 quæ

quæ ex cornibus, ore sugētes trahunt, minus quidem inaniūt, non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit, adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulæ in rectum figuratæ ex latere hanc defigemus. Si enim iacentibus ipsis super linamentū ex lucerna, simul cum flamma inducamus, in cutem decidens illa, grauiter adurit, usu hoc non postulante. Est cum cucurbitulæ magnitudo subiectę parti adæquabitur, eaq; de causâ permultū cucurbitulæ & paruitate & magnitudine differunt, quemadmodum etiam collo prolixiores & spatio inferiori latiores aliis efficacius extrahūt. Cauendum autem ne prope māmillas cucurbitula applicetur. nam lapsæ cucurbitulis nōnunquā mammæ & inturgescētes uehementer. haud facilè ipsas relinquunt, atq; tunc spōgias ex calida cucurbitulis circundare oportet, sic enim remittuntur: sin minus hoc modo fuerint laxatæ, perforari ipsas ratio est.

Quomodo alæ adurantur. Cap. XLII.

Humeri articulo luxato in nonnullis caput frequēter & continuè excidit, uel humiditatis superantis uitio, uel quod cōtinuæ luxationi opportunus locus euaserit, quando ad ustionē descendere oportet. Proinde ægro, aut supino, aut in sanum latus inclinato, interiorē alæ cutem quā potissimum articulus excidit, duobus sinistrę manus digitis, uel hamulis tenuibus & oblongis eleuatā, candenti ferro adurere oportet, quousq; ferramentum ex aduerso inflexum uno impressu duas crustas excitarit, & si magnū intercedens harū spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto aliam in medio crustā faciemus, adurentes usq; dum ferramentum urens scalpello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta utriusque dictæ mediā fieri cōsultat, æquali illis spatio distantes quadrangulæ figuræ modo. Altius autē cute non penetrabimus, q̄ nerui, glandulæ, ac aliæ particulæ quæ inflammationē difficultatemq; functionum, excitare possint, subiecta sint: curari uero adusta debent porro cū sale trito & imposito, tū aliis præsiidiis ad crustas inscriptis, postea manu operandum cautè erit.

De adnatis digitis & sexto digito. Cap. XLIII.

Ad nascuntur digiti in manu nunc propè maiores digitos, nunc propè exiguos, raro autē uisi sunt iuxta aliorum aliquem. Eorum uero qui adnascuntur, alii per totum

eum carnosum sunt, alii ossa in se continent, nonnunquam & ungues. Ossa habentium, hi ab articulo procedunt, cuius commissuram alteri digito communicant, alii ex naturalium digitorum fissura oriuntur: atque huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunquam. Carnosorum expedita est praesidio. nam scalpello quod superuacuum est in totum tollimus. Eorum qui ab articulo prodeunt, difficilior est tractatio illis qui à digitorum fissura originem traxerunt: primum caro orbiculatim usque ad os excinditur, ipsumque os excisum aut erasum, aufertur. Cæterum inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus quemadmodum etiam in ossium uulneribus declaratum est.

Quomodo purulentis adustio adhibenda.

Cap. XLIIII.

Vstio efficacissimum purulentis praesidium inuentum est. Conuenit igitur ferro candenti crustas excitare: unam inter clauiculae compagem cute sursum educta. duas autem exiguas iuxta mentum, sic ut ab arterijs quae carotides appellantur, recedatur. Duas item sub mamillis ampliores inter tertiam quartamque costam, alias duas inter quintam & sextam paulum in posteriora spectantes: aliam, per medium pectus: rursus aliam supra os uentriculi, tres posterius: per medium dorsum unam, utroque spinæ latere duas, quae in dorso facta crustam excedant non admodum extantes. Alii, ut tradit etiam Leonides, ferro mucronato candenti per medium costae spatium ubi abscessus est, adacto, usque ad pus uestionem moliri sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt, transuersa linea inter quintam & sextam costam ducta, & cute paululum oblique diuisa, deinde sic scalpello membrana quae costas succingit perforata, pus excreuerunt. Atque hi cum illis qui ferro usque ad imum adurunt, aut statim mortem inferunt, uitali spiritu confertim una cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

De cancro.

Cap. XLV.

Cancer, tumor est inæqualis, oris praetumidis, aspectu teter, liuidus, & indolens, interim sine ulcere, quæ Hippocrates latentem nominauit: is si cureretur, peior euadit: interim exulceratus: nam cum ex atra bile ducat originem, magna parte eroditur. Pluribus quidem corporis partibus accidit,

cidit, præcipuè fœminarum locis, & mammis, quæ uenas undiquaq; turgidas habent, quemadmodum cancer animal pedes, unde etiam nomen sortitus est. Quæ igitur per medicamentâ curatio adhibetur, quarto uolumine abundè explicata est: eius autem cancri qui uulnam infestat, tertio. Quoniam uero partes putrefactæ, aut quæ (ut simpliciter dicam) naturæ modum exceſſerunt, ablationem sui poſtulant: cancris autè uulnæ manus opera nec poteſt, nec utile eſt admoueri: eorum qui exteriora infestant, præcipuè mammas curandi adminiſtrationē trademus. Quidam enim totam partem uitiatam ferramētis candentibus abſumunt: alij totam mammam præciſam adurunt. Galenus ſolam adminiſtrationem quæ per ſectionem fit, recipiens, hoc modo ſcribit. Si quando cancrum ſcalpello curare audebis, incepiffe uacuationem à melancholici humoris purgatione oportebit, ubi iam totum quod uitiatum eſt exactè præcideris, ſic ut nulla radix ſuperſit, ſanguinem effluere finito, nec celerius eum cōhibebis, uerum etiam premēdo uicinas uenas, craſſiorem ex iſſis ſanguinem exprimes: deinde aliorum ulcerū modo curabis. Hæc quidē Galenus memoriæ prodidit Reliqua uero maligna putridaꝫ; ulcera nempe phagedænas, gangrænas & cōſimilia eodem tractare modo debes.

De ijs quibus mamma fœminarum modo inturgescunt. Cap. XLVI.

Quemadmodum fœminis, ita masculis quoq; pubertatis tempore, māmillæ modicè inflantur, ſed plerisq; rursus ſubſidunt, in nōnullis ſumpto initio creſcunt pinguedine ſubnaſcente. Cū itaq; indecora hæc corporis figura muliebris habitudinis notam repræſenter, digna eſt cui manus admoueatur. Lunata per imam māmillæ partem linea ducitur cute detracta: ademptaꝫ; pinguedine, ſuturis cōmittetur. At ſi fortè māmilla partibus iſſius ob magnitudinē ad ima, ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extremis inuicem coeuntes inferemus, ut minor à maiore cōprehendatur. Cute quæ intercedit cum pinguedine adempta, ſimiliter ſuturis utemur. At ſi aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod ſupereſt rursus adempto, ſuturas iniiciemus, & medicamentum cruentis idoneum accommodabimus.

Quomodo

Quomodo iecur aduratur. Cap. XLVII.

SI dolor cum grauitate iis oboriatur quibus iecur uomica laborat, carnea ipsa substantia uitiata ostenditur. Si acutus dolor magis urgeat, puris in tunica collectio: adurere hoc modo oportet: ferrum candens mucrone tenui, paulo supra inguen qua iecur desinit, iniicitur, ut crustam unam excitet: Vbi uero totam cutem adusserit, & usq; ad tunicam penetrauerit, pus excerneretur. Ab euacuatione phacomelitte, hoc est, lenticula melle addito utemur, tum ijs quæ mulsæ & speciebus ad carnem creandam componuntur: postea uero etiam cicatricem ducentibus.

Quomodo lien aduratur. Cap. XLVIII.

Cutis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totum ipsa aduretur, ut unico impressu duæ fiant crustæ idq; faciemus ter, quò omnes crustas numero sex habeas Marcellus autem tridente quam trianam Græci dicunt, aut tridenti simili ferramento utens, uno adactu crustas excitauit.

*Quomodo stomachus aduratur.**Cap. XLIX.*

IN longis stomachi defluxionibus, recēiores usi sunt aduisione. Alii ferramentis candentibus mucronatis tres crustas moliuntur, unam iuxta cartilaginem quæ ab ensis figura Græcis uocatur xiphocides: alias duas inferius trianguli figura, altas ut cutem diuidant: Alii unam duntaxat adhibent, ampliorem supra ipsum os uentriculi. Sunt, qui ne ferro quidem urant, sed iscis appellatis: sunt autem hæ spongiosa quædam corpora in quercubus & corylis nascentia, barbaris magis usitata. permittunt autem uulnera sine cicarrice diu manere, imò etiam magis adhuc diuidunt, ut maiore per ipsa difflatu os uentriculi ab influxionibus immune permaneat.

Quomodo aqua hydropicis emittatur. Cap. L.

Quomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius differentiæ, quæ causa, quæ notæ, quodq; remedium, tertio uolumine sumus executi: ubi & demonstratum est, illud solum aquæ inter cutem genus quo ueluti in utram
aqua

aqua colligitur, asciten dicunt, manus operam postulare. Atq; eam hoc loco explicabimus. Itaq; rectus homo statuitur, sin minus, in sedili collocatur: si ne hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeò sit inualidus. Stante recto homine ministris retro assistentibus, iubebimus ut tumorem ad pubem digitis premat, depellatq;. Nos aculeo, aut scalpello quo uena inciditur, si ex partibus iuxta intestina sitis originem contraxerit, directè sub umbilico tribus digitis interpositis imum abdomen usq; tenuem membranam quæ peritonæos uocatur, diuidemus. Sin autem primario iecoris affectui malum fertur acceptum, à sinistro umbilici parte dissecabimus. si à liene uitium trahit originem, in dextra non enim in illa parte sectionem moliemur, in quam decumbent. Ac cute quæ superiacet acie instrumenti excoriata, membranam quæ finit abdomen, peritonæos uocatur, diuidemus, quousque scalpellum ad uacuam usq; regionem penetrauerit. Deinde per foramen abdominis, & peritonæi, æneam fistulam scriptoriis calamis acie similem demittemus, & per hanc humor effundendus est pro cuiusque uitium ratione, quam ex pulsus tactu deprehendemus. Deinde exempta fistula, humor sisti debet, sistetur autem statim cum diuisio ipsa alternatim sit facta. At nos securitatis gratia linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recreatoque, per insequentem diem rursus momentum humoris quantum uirtus exigit fistula euacuabimus, atq; ita deinceps faciundū est, quousq; minimum humoris supersit, ita tamen, ut ubique subitam cumulatamq; uacuationem uitemus, multis siquidem imperitè manum admoliti una cum humore uitali etiam spiritu uacuato subito hominem iugularunt: qui uero securius rem agunt, modico humore educto, ut uirtus magno leuaretur pondere, reliquum medicamentis aquam ducentibus arena, sole, siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iam uero uestione super stomachum, iecur, lienem, imum uentrem & umbilicum usi sunt, quinque crustas adhibentes. Alii ferro tenui candenti: alii iscis nuncupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi materia, & pleriq; hac curandi ratione magis conspuerunt, interim nullam in totum compunctionem (quam paracentesis uocant) experti.

De umbi-

Vmbilicus indecorè prominere solet, quod uitiū Græcè exomphalon dicitur, interim mēbrana quæ abdomen finit, peritonæum appellauit, illic dirupta, ac procidente, aut omento, aut intestino, interim colluue otiosi humoris sub umbilico contracta, interim uero carhe subnata, aliquando sanguine irrupente, propter uenæ, aut arteriæ rupruram, ut in aneurysmatis, interdū non sanguine, uerū spiritū solū irruente. Si igitur momentū prociderit, circa umbilicū tumor cōcolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsū est, præter compressis memorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanescentq; nonnunquam strepitū elidens, balneis, & distentionibus magis increfcit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus autem non cedit, neq; decrefcit, neq; tamen augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneq; subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadē in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Hunc in modum curabitur: erecto homini iubemus ut spiritum contineat, quò in omnē partem distendatur: deinde omnem umbilici excrescentiā orbiculatim atramēto scriptorio norabimus, resupinatoq; homine scalpello tumore, quā nota atramenti est exasperabimus: deinde medium hamo eleuatum, lino aut neruo quā exasperatio, est circum astringemus (hoc enim pacto continebitur ne deuoluatur) ansulam supra deligaturam ponentes, postea tumore quē constrinximus iuxta uerticem ad apertū digitū indicem demittimus, tentabimusq; diligenter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac si quidē intestinum fuerit relictū laxata funiculi ansula, id introrsum pellemus: si uero omentum sit, eo retracto, quod superuacuū est amputabimus, uase quod (ut uerisimile est) coincidit, lino deligato: mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta hiatū per incisionem cutis factam traiectamus, & ansulis linorū præcis, quemadmodū in aneurysmate dictū est, ex quatuor imitiis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino deuincta computruerint exciderintq; medicamentis in linteola illitis curatio oblouetur,

soluetur, si cauam magis cicatricē fieri semper cupiamus. Hæc quidē ad momenti, aut intestini affectum pertinent. At si caro aut humor, aut sanguis uitū crearit, tumoris medio circulatim præciso deinde eo quod incumbit extra peritonæū, sublato, curationem carni generandæ dicatā tentabimus. Porro si umbilicus emineat, aut ex uasorum dilatatione, aut spiritu intercluso, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata.

De peritonæo, hoc est, interiore abdominis membrana conuulnerata item de intestini, aut omenti procidentia. ubi etiam tractatur, quomodo uentris uulnera sciantur ex commentarijs Galeni. Cap. LII.

Quomodo peritonæi, hoc est, interioris abdominis membranæ uulnera optimè queas manu curare, deinceps uenit considerandū. Si igitur paruū adeo uulnus extiterit ut inflatum iam quod procidit intestinum remittere non liceat: necessarium est, aut flatū elicere, aut uulnus ampliare. Satius autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere, si modo id consequi possis. At qua magis ratione id consequare, quàm si causam unde intestinū inflatur, è medio sustuleris? Quæ igitur ea est, nimirum, ambientis nos aeris refrigeratio: quare etiam remedium ex calore petetur. Itaq; sponsa molli aqua calida madenti, mox expressa calefacere intestinum oportet. Præparetur autem interea uinum austerū calidum. etenim hoc magis quàm aqua calefacit, ac robur intestino adijcit. At si per hæc intestini inflatio non cesserit, tanta peritonæi pars incidi debet, quanta id quod excidit, opus habet. Idonea uero ad eiusmodi sectionē habentur scalpella recta quæ Græci syringotoma uocant, id est, quæ ad fistulas incidendas sunt accommodatæ. Figura autē laboranti apposita fuerit, cum in inferiori parte uulnus factum est, si sursum uergat: cum in superioribus, si deorsum, & si in dextris uulnus sit, in contrariā partem corpus incumbet, si in sinistris, in dextram, atq; hoc tum magnis, tum exiguis uulneribus commune est. Cæterū cum intestina in proprium reponi locum debent, ex magno uulnere collapsa ministro dextro opus est: oportet n. ipsum, ubi manibus suis totum uulnus à foris apprehenderit, intro repellere, constringere ac exiguū semper sienti denudare: quinetiam id quod consutum est, mediocriter

diocriter comprimere, quoad totum exactè persuatùr. Porro quæ idonea suendi abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniam coire abdomen cum peritonæo conueniet, incipiendum quidem à cute est, atq; ab externo introrsus acus demittitur: ubi iam & cutem, & rectum musculum totum transferit, præterito quod ei adiacet peritonæo, per reliquam huius partem eam ab interno extrorsum, atq; inde per reliquum abdomen traiectabis: ubi hoc penitus pertransierit, rursus ab externo introrsum, idem abdomen perforandum est: mox ubi peritonæum quod illi quoq; adiacet præterieris, & ad oppositum perueneris, id quoq; ab interno extrorsum perpungi, unaq; eū eo totum ipsi cohærens abdomen debet. Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum opposito peritonæo consuendum. Ac rursus uicina etiam cute traiecta, iterum ab ea parte acus introrsum est injicienda, consuendumq; id cum opposito peritonæo, inibi quoq; uicina cute transmissa: atq; hæc iterum iterumque facienda sunt, quoad totum uulnus similiter consuerimus. Interuallum uero suturarum quod ad compescenda ea quæ subsunt, pertinet, breuissimum esse postulat. Quod autem ad firmitatem requiritur, inter suturas cutis ne alibi rumpatur, utiliter breue non est. quare uitato utriusq; excessu, eligenda mediocritas est. Iam hoc quoq; omnium ulcerum commune quodammodo est, sicuti etiam ipsius quo fiuntur, fili ratio. Quod enim durius est, cutem rumpet: quod mollius, confestim ipsum rumpitur. pari modo si proximè oras summas acū transigerit, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum uiolenter adducitur, rumpi cogitur. Sin plurimum ab iis recesseris, non parum cutis inglutinatum relinquetur. Hæc licet omnium sint ulcerum communia, maximè tamen seruanda in abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quemadmodum est expositum, consuetur, huc diligentia adhibita, ut peritonæum abdomini coalescere possit: quod uix sperare audeas, cum neruosum existat: aut sicuti quidā faciunt, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea committunt, utpote peritonæū peritonæo, abdomen abdomini. Id autem fiet in eum modum. A uicino nobis abdomine incipitur, atq; ab externo introrsum per id solum acus traiectatur. post præteritis utriusque peritonæi labris, ex obiecta parte à foris introrsum per utrumq; eius labrum acus reuocatur: dein hæc rursus reducitur, atq; ab interioribus

rioribus foras per aduersum abdomen transmittitur. Hic modus à communi, & ex prompto, quo nimirum uno adactu per quatuor labra acus traicitur, id differt, quòd peritonæum totū intra abdomen prorsus recondit. Cæterum medicamenta ad hæc idonea materiæ illius esse debent, cuius sunt ea quæ cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior consortij lege doleat, lanam conuenit mollem oleo mediocriter calido imbutam toti, quod inter inguina & axillas est, circumdare. Præstiterit autem si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Si uero non nihil in ipsis quoq; intestinis conuulneratum sit: quod iniicietur, uinum nigrum, austerū & tepens erit, eo-que magis sit totum usque ad interiorem meatū pertusum sit. Facile igitur curationem recipiunt intestina crassa: secus habent tenuia: ieiunum uero omnibus insanabile est, tum propter uasorum magnitudinem multitudinemq; , tum quòd tunica eius prætennis neruosaq; existat. accedit huc quod etiam bilem synceram totam recipiat: adde quòd omnium maximè iecori uicinum habeatur. Ventriculi porro in e partes carnosæ ulceratæ curari cum fiducia debent, siquidem fieri potest ut res bene succedat, non solum quòd hæ crassiores sint, sed etiā quòd sedes medicamenti quæ illas curabunt, adhibendis in eo loco est accommoda. At ulcerum quæ os & gulam infestant, solo transitu medicamenta attingunt: quæ autem orificium ipsius obsident, ij sensus quoq; in illo acutus sanationi aduersatur. Cū autē peritonæo rupto omentum prolapsum aut liuescat aut nigruerit, fune exceptum antequā nigrescat, ne sanguis profundatur, præcidere conuenit id quod post uinculum habetur, atq; ut in extremo inferiori iam cōmemoratæ abdominis futuræ uinculi fines pendeant, curabimus, quo scilicet facile eos cum ex uulnere suppurante eructentur, eximamus.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. LIII.

IN quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indecori gratia duplicem administrationis modū excogitant, nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occultetur: nunc subtrus interiorem cutem à glandis radice scalpello excoriantes, inde inferiorem trahentes, mox linteo quodam molli ambiens præputium deligantes, ita ut lin-teolum

teolum aliquod quâ cuti excoriata est, interponatur, ne præputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, longiore ipsum oratione exponens. Nos autem summam dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tum quod affectus nullâ munij obeundis difficultatem pariat, tum quod neque tantum indecori afferat, ut hac magis inquisitionem aliquam ex chirurgia deligas.

Quomodo glans penis conteſta aperiri poſſit, vitium dicitur hypospadiæon. Cap. LIIII.

Plerisq; glans ab origine non perforata est: uerum sub carne appellato quâ glans suspensa est, foramen habetur: unde neque urinam facere antea possunt, nisi particulam uersus imam uentris regionem, admodum inclinent, neq; liberis dare operam, cum semen ipsorum in uterum recta non possit eiaculari. Omnium itaq; simplicissimus tutissimisque curationis modus est qui fit per præcisionem. Itaq; resupinato homine glans sinistræ manus digitis ualide attolletur: deinde scalpelli acie ipsa iuxta coronam præcidetur, plaga non obliqua, sed sculpturæ simili, ut per medium eminentia quædam glandem repræsentans appareat. Quoniam uero sæpe sanguis profundi solet, si fieri potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus, tenuibus ferramentis aduremus.

De phymo.

Cap. LV.

DVplex phymi causa est: aliquando enim sic glandem præputium tegit ne nudari possit: aliquando retrorsum deducta reduci non potest. Hæc species propriè periphymosis dicitur. Prior itaq; differentia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex carnis incremento quæ illic coaluerit. Altera genitalium inflammationibus fertur accepta, quoties abducta cuti retrorsum glans intumuerit, nec ultra præputium receperit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curationem hoc pacto tentabimus: figurato homine, ut par est, præputium in anteriorem partem attrahemus, demissisq; in summum ipsum hamulis tribus, quaternisve, ministris continendum exhibebimus, iubentes, ipsum quantum fieri potest, diducant aperiantq;: deinde si ex cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte præputium in tribus quatuorve lo-

PAULI AEGIN.

C cis

cis incidemus lineis directis & æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrinsecus: est autem duplex in glande præputium: os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus, sic. n. contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum produxerit, carne tota ferro scarificata, præputium abstrahemus: carnem inter lineas eminentem rademus, postea plumbeum canalem glandi uniuersæ circumdabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Ha beat autem canalis foramen undiq; æquale. sic enim huius circumpositu præputium adductum rursus coalescere prohibebitur, dum & à plumbo & papyro inuoluta distentium seruatur: intumescens enim ex deligatura magis adhuc cutem diducet. Hoc igitur faciundū est, siue ob cicatricē, siue carnis excrescentiam phymo generato manū adhibuerimus. Sin autē periphymosis appellata creetur, uetustate temporis coalescit, & curationem non recipit, nisi quis eo modo uelit tractare quem ad regendam glandem usurpamus. Sin autem nondum coaluerit, uibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiam pluribus circularim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso, extrorsum attrahemus.

Si præputium glandi adhærescit. Cap. LVI.

GLans & præputium inuicem committuntur exulceratione præcedente. Conuenit igitur subtus cute, quantum licet, excoriata, acie scalpelli, aut spathula polypo accommodata, ea quæ resistunt dissoluere, id potissimum conantes, ut glandē putē à præputio adhærescente discernamus: quod si non fuerit expeditum, glandis potius nō nihil ad præputium assumere, quàm e contrario: cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissurā dissolueris linteū tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, uino astringente cicatricem ipsis obducemus.

De circuncisis. Cap. LVII.

NON de ijs qui religioso gentium more circuncidūtur, nunc uerba faciemus: sed de ijs quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaq; in ijs totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cū melle utendū, uel etiam malicorio, & eruo medicamento instar quod linteolis illinitur. Si uerò sanguis quandoq; profluat, fer
ramentis

ramētis lunatis candētibz utendū, quæ utrisq; simul inijcian-
tur, & ipsi sanguinis profluuiō, & uulneri depascenti. At si tota
interim glans absumpta fuerit, exigū ē plumbō canaliculū im-
ponētes meatui, per ipsum ægroto urinā reddere iubebimus.

De thymis naturalium.

Cap. LVIII.

Thymi carnosā sunt tubercula, nunc in glande, nunc in
præputio prouenientia. Ex his, alij maligni, alij nō sunt.
Mitiores itaq; scalpelli acie deradere conuenit, & chal-
citidem ipsis inspergere: in malignis, eo quod uiciatum est, exci-
so, adustione utendum. At si ex opposito aduersoq; sibi inui-
cem in præputio fiant thymi, hi, intra ipsum, illi, extra, nō opor-
tec omnibus ipsis confestim manum admoliri, ne præputium
structura tenue, imprudenter pertundamus. Sed primū interio-
res auferre consiliū est, ijsq; cicatrice obductis, tunc quoq; ex-
teriores aggredi. Nonnulli uerò recentiorū forfice ipsos auel-
lentes equino pilo deligatos, curare solent, quemadmodum
alii refrigerato ferro candenti eosdem deurant.

De catheterismo, & clystere uesicæ. Cap. LIX.

Cum urina non redditur, quod iter ipsius obstructum sit
aut concreto intus sanguine, aut calculo, aut alia qua-
dam causa, catheterismo id quod superfluum est exi-
memus. Sumpto igitur cathetere, ætati & sexui conuenienti,
probè ipsum dirigemus, quod hoc modo fiet: lana exigua lino
deligata per mediū, linoq; ex acuto iunco per catheteris fistu-
lam traducto lanam foramini adaptabimus, quod iuxta cathe-
teris mucronē est, ac forfice præciso eo quod ex lana eminet,
catheterē in oleū demittemus, ægro in subfelliū collocato, &
fomentis si nihil prohibet, irrorato: catheterē in rectū infere-
mus usq; ad colis basim: deinde naturalia ad umbilicum incli-
nabimus, etenim ab hac parte obliquus uesicæ meatus existit,
deinde sic cathetera adigemus. Quum uerò iuxta regionē in-
ter scrotum, & anum, propè sedē fuerit, rursus genitalia impo-
sito instrumento deflectemus, in naturalem reducentes figu-
ram. nam à peritonæo uesicæ meatus sursum tendit, propelle-
musq; catheterē usq; dum uesicæ sinum penetrauerit: secundū
hoc, linū catheteri iniectū retrahemus, quod urina simul cum la-
na attracta subsequatur, quemadmodū in syphonibus accidit:
atque talis demittendi catheteris modus est. At quia subinde

C 2 exulce.

exulcerata uesica collui desiderat, siquidē auricularij clysteres, id quod iniiciendū est possint trāsmittere, illis in prædictū modum utemur, in uesicā demissis: si fieri nequit, catheteri pelle, aut uesica bubula adaptata, eoq; indito, uesicam colluemus.

Quæ curatio calculosis adhibeatur. Cap. LX.

CVM alibi demonstratū sit qua ex causa calculi generentur, tum, quod pueris in uesica magis: prouectioribus, in renibus crescant, nunc rationē exponemus, qua excindi possint, ubi notas prius eorum qui uesica habentur, designauerimus. Vrina igitur aquosa est, quod in eis subsidet, arenosum: pundendū cōtinuo uexatur pruritu, laxatur sine ratione, rursusq; arrigitur, crebro id contrectant irritati ægri, & maximè pueri cum calculus in ceruicē uesicæ incidit, etiā repentē urina supprimitur. Porro inter eos quibus calculus excinditur, pueri quidē usq; ad quatuordecim annos propter corporū molitudinē, faciliē curationē recipiunt: senes, quod corpus ipsorū contumax sit, uix consanescūt: mediæ horū ætates etiā in hoc, medio quodā modo habēt ac rursus faciliē sanantur qui maiores calculos habēt, quod inflammationibus assuerunt: qui minores, difficulter sanantur, contrarias ob causas. Hæc cū ita se habeant, ad chirurgiam profecti, cōcussione utemur prius, interim per famulos, interim ipso ægroto ex alto quodā loco desiliēti, quod calculus ad uesicæ ceruicē propellatu, deinde figurari æger debet, ceu rectus in sedili, manibus subter femora porrectis, quod in angustū uesica compellatur. Si igitur cōtingentibus nobis calculus in regionē scroti & anī intermediam prociadat concussione exturbatus, inde ad sectionem conuertemur. Sin minus occurrat, indicē sinistrae manus digitū, si puer sit qui ægrotat, uel etiā mediū, si ætatis sit prouectioris, oleo perunctum, in anū demitemus, & supinis digitis perquirentes, calculūq; occurrentē paulatim traducētes, in uesicæ ceruicē coarctabimus & digito uno, pluribusq; propellētes ipsum in exteriora, impactū, ministro altero manibus uesicā premere iussu, alteri præcipientes dextra manu testiculos sursum teneat, sinistra regionē inter scrotū & anū mediā extēdat in alterā partē, ab ea qua sectionē moliemur: ipsi assumpto scalpello ad calculos aptato, inter anū & testiculos, non per mediū locū inter scrotū & anum, sed in alterā partem iuxta sinisteriorē clunem obliquam

obliquam super lapidē qui subijcitur incidēdis, ducemus lineā, quæ extrinsecus latū habeat spatiū, intus nō amplius, quā ut calculus per id queat excidere. Interim siquidem digitis super anū innixis, aut digito una cū sectione sine euulsione calculus leniter exilit. sin minus exilierit, unco huic rei accōmodo iniecto eximemus. Calculo iam ablato, medicamētis sanguinem coercentibus ex fuligine thuris, aloe, symphito, uel ēt misy, & cōsimilibus sanguinis profusione sistētes, lanas, aut linamenta implicita, uino & oleo madentia imponemus, & ligaminibus sex processū ad calculos accōmodatis utemur. At si profluuij sanguinis metus, sit linamentū implicitū ex posca, aut rosaceo aqua admixta injiciendū est, & ægro decūbente crebrius locū perfundemus. Postquā tertio die solueris, & hydrelæo copioso irroraueris, tetrapharmaco linteolis illinito utendū, ita ut frequētius ipsos soluas, curesq; propter urinæ acrimoniā. At si inflammatio quæpiā superuenerit, cataplasmatibus & superfusionibus ad eā inscriptis adiuuabimus, ac in uesicā rosaceū, aut chamæmelinū, aut butyrū nisi aliqua nos inflāmatio impediāt, demitemus similiter ēt si ulcus pascendo, aut alio quodā modo serpat, aut maleficū fuerit, singulis cōgruētia adaptabimus, cū ulcus inflāmatione caret, lauacrū adhibetur, inde emplastrum diachylon, tū lumbis tū imo uentri super accommodatur. Per totū uero curationis curriculū, femora inter se cōuenit deligare, & cū remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli incidērit & per urinā reddi nequeat, præputium ualidē in anteriora attractū deligabimus iuxta glandis summitatē, itē posteriore parte pudēdi colē uinciēmus, iuxta terminū ad uesicā spectantem cōstrictione adhibita: deinde infra colē diuidemus, super lapidē ipsum qui excidendis subijcitur, flexo autē cole calculū eiiciēmus, solutisq; uinculis ulcus sanguine concreto uacuabimus. Posterius itaq; uinculum iniectum est, ne calculus retrorsum recurrat: antē, ne post calculum exemptum præputij soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

*De testiculorum partibus.**Cap. LXI.*

PArticularū quæ circa testes habētur, finitiones cū ad rami cum incidendorū doctrinā cōferant prius describemus q̄ ad illā ueniamus. Igitur testiculus substantia quædam est glandulosa, fragilis, ad genitricem seminis effecta. At nerui testium,

stium, quos Græci paraftatas & cremafteras ab eo appellāt, q̄ ex illis genitales partes depēdent, spinalis medullæ ex cerebri mēbrana propagines sunt, cū uenis arteriosis ad testiculos pertinentes, per quos semen in naturalia permeat. Seminaria aut̄ uasa, uenæ sunt à caua uena in testiculos sinuosis anfractibus pertingentes, unde testiculi alimentū capiunt. irē tunica erythroides naturæ neruosa, in gibba quidē parte, atq; anteriori, à testiculo libera est: in cōcaua & posteriore, ipsi adhærescit, ex peritonæo originē trahēs. Vocāt aut̄ partē hanc qua testiculo adnata est, posteriorē prosphyfin, quasi dicas adnexū. Darti uero mēbranæ sunt, quæ exteriorē testiculū cōglutināt, iuxta tunicā erythroidē dictam ei adhærentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autē ipsa cutis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon dī.

De aquoso ramice, hydrocele dicitur. Cap. LXII.

Hvmoris ociosi in particulis scrotū implicantibus collu-
uites, tumorē excitās sensibilē, hoc nomē sortita est. Ira-
que humor magna ex parte, in tunica erythroide appel-
lata, testiculū ambiente, in partē anteriore colligitur, qua po-
tissimū mēbrana illa à testiculo separāt. Raro extra mēbranā
hanc erythroidē uitiū cōtrahitur. Subinde peculiari tunica hu-
mor cōprehenditur: uocantq; hoc malū chirurgici in superad-
nata ortū. Quare si ob causam præcedentē, exēpli gratia, par-
ticularū imbecillitatē uitiū oboriat, sanguis alimēti ratione
adductus, in aquosam serosam uē, & inutile substantiam muta-
tur: si ex ictu, sanguinea, aut fæculenta substantia cōprehendi-
tur. Cōis igitur nota est, tumor indolens, firmus, ac stabilis in
scroto, quacunq; tandē occasione nō euanescens, sed in iis qui
modicū cōtinent humorē, cedēs: in illis qui copiosum habēt,
nō item. Ac quibus in erythroide tunica humor cōprehensus
est, tumor rotūdus paululū, & oui modo lōgiusculus apparet.
His testiculus in cōspectū nō uenit, ut qui undiquaq; sit impli-
citus. Sin aut̄ extra erythroidē mēbranā sub dartis habeatur,
propter paucitatē particularū occurrit. At si humor in mēbra-
na superadnata coierit propter cōtractionē ex omni parte, &
ro tunditatē, tumor alterius testiculi imaginē exhibet: & cum
a quosus humor exterrit, tumor cōcolor pellucet: cum autem
fæculentus fuerit, aut sanguineus, aut rubicūdus, aut liuidus ap-
paret.

paret. At cū in utraq; scroti parte hæ notæ apparuerint, duplicem ibi ramicē esse cognosces. hoc modo scalpello curantur: derafa pube & scroto, nisi puer fuerit, ægrū super sedile resupinabimus, podici panniculo multiplici subiecto, scroto aut spongia iustæ magnitudinis, ac sedētes à sinistra ægrotātis, ministro qui ad dextrā sedebit, iubebimus ut genitale in alterā partem protendat, & cutē scroti ad abdomen eleuet, nos scalpello scrotum à medio iuxta lōgitudinē usq; ad pubē ferē recta linea incidemus, quæ uicina sit lineæ scrotū per mediū secanti, diuidemusq; tūc tunicā etythroidem. Porro si humor in adnata membrana hæreat, quā uertex eiusdē tunicæ eminet, illac diuisionem moliemur. Hamulo aut oræ uulneris diducētur, & cultro ad hydrocelicos aptato scalpelloq; dartos deregemus, crudata uero erythroidi, scalpello quo uenæ incidi solent, mediam ipsam diuidemus, per illas potissimū partes, in quibus à testiculo recedit. Humore iam toto, aut maiore ipsius portione in uase aliquo excreto, erythroidē membranā hamulis eximemus, quā fieri licet tenuissimā ipsius partē. Inde uerò Antylus futuris & medicina cruētis accōmodata utitur: recētiores ea, quæ q̄ carnē inducat, sarcotice appellatur. At si testiculus putredinē expertus aliōue modo uitiatus deprehendatur, uasa cū neruo, qui ab inguinibus dependet, cremastere dicto, fune excipiemus, ipsoq; cremastere præciso, testiculus eximetur. Itē in ijs qui duplici laborant ramice, similiter bifariā curationē moliemur, utrinq; per scroti partes ad inguina lineas incidentes. mox specilli mucrone per diuisionē deorsum ad scroti extremum demisso, ipsoq; scrotū attollentes, acuto scalpro lineam qua humoris est emissariū, incidemus, ut & sanguinem cōcretū & pus per eam excernamus, ipso uerò scalpelli mucrone linamentū in longitudinē implicitū superiori diuisioni inferemus, & uibicibus per spongiā deterfis lanā oleo madentē per sectionem infra ad testiculū, insinuabimus, extrinsecus alias lanas uino & oleo imbutas scroto, imo uentri, inguinibus, regioni inter scrotū & anū & lumbis superiniiciebus, ac ubi linamentum triplex super hæc implicitū deligauerimus uinculo in sex processus expotrecto, congruisq; fasciis, homo decūbet lanis scroto subiectis, ut cōquiescat, pelleq; super ipsas molli explicata, quo fomenta excipiantur. Superfundemus autem oleo calente, usq; ad triduum. post hoc ubi solueris, tetrapharmaco lin-

teolis illito in uulnere, uteris, linamentum in longitudinē implicitum ex farinaceo polline superaccommodans, extrinsecus fomenta rursus propter inflammationē usq; ad diē septimum inijciuntur: inde medicamēto quod linteolo seruetur utemur. Vulnere expurgato, & catne iam mediocri obducta, deinceps etiā lauacris adhibitis linamentū in longitudinē implicitū auferri debet, & reliqua curationis parte subsequente, quēadmodum prius explicatū est, utemur. At si inflammatio quāpiā fuerit, aut sanguinis profluuiū, aut aliquid eiusmodi interea superuenerit, cōuenienter unicuiq; occurrere cōuenit, ne semel dicta iterū repetā. Si uero uisionē potius in aquoso ramice, sicut recentioribus uisum est, adhibeamus, omnia quæ ante chirurgiam, & post eā dicta sunt, exequemur, ipsum uero chirurgiæ opus sine ferro tantū & diuisione per humoris emissariū fieri debet. Decem itaq; aut duodecim ferramētis literā græcorum Γ imitātibus, & duobus gladiolis primū scrotū ferro Γ referētī per mediū aduremus, cultello aut, aut cæco hamo membranas excoriantes ferramēto ensi simili, has ceu præcidentes, aduremus. Nudata uero tunica erythroide, faciliē aut cum alba & tenuis existat, cognoscitur, acie ferramenti instar Γ literæ facti perurentes humorē excernemus, postea totam ipsam detectā hamulis attollentes, ferramento gladiolo simili auferemus.

De carnosof ramice & tophaceo. Cap. LXIII.

CAro in particulis quæ scrotū implicant alibi succrescēs carnosum ramicem producit. Nascitur aut ea, ex causa latēte, testiculo fluxionem scirrhūq; experto, aut exitu, aut imperita post ramicis succissionē curatione: subsequitur aut hos color ubiq; sui similis cū duritia. Si aut tumor in scirrhū coaluerit, nullus nec color, nec sensus adest: si malignus sit, dolor urget punctorius. Itaq; manū admouētes egro, figurabimus ipsum, sicut & prius, diuidemusq; similiter, & si quidem ex generata carne, uitiū testiculi creatū sit, & darton membranā & erythroidē cōsimiliter discindemus, deinde testiculo eleuato, eoq; extra erythroidē exēpto, cremastere segregato à uasis, hęc quidē cōstringemus, illū uero nepe cremastere amputabimus: testiculū aut qui cū adnata carne coaluerit, ceu alienum eiiciemus. Sin hęc carnis generatio in tunica aliqua, aut, uase fiat, scroto diuiso subiectisq; carni membranis, totum

totum quod in carnē cōcreuit auferemus, q̄ si posterior commissura carne fuerit obducta, iis quæ ambiunt ipsam adeptis testiculū simul cū ea excipiemus: quippe fieri nequit, ut testiculus sine hac permaneat. Cæterum tophi & in testiculo & in membrana erythroide occalescūt, renixu multo, duritie, & inæqualitate à carnosio ramice & aquaso discreti. His igitur manum sicut etiam carnosio ramici admolierur.

De uaricoso ramice & uentoso. Cap. LXIII.

Vasa in scroto, aut dartis mēbranis, dilatata, uarices simplici uocabulo nomināt. Alia uero quæ testiculum nutriunt, si uaricū more dilatentur, uaricosum ramicem, Græci cirsiocelen uitiū nuncupant. Notæ horū euidentes sunt, quippe pars affecta tumidior, obliqua modicè uuæ in modū, & testiculi relaxatio antea apparet, tū aliæ nonnullæ in agendo difficultates maximè in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo curamus: ubi cōmodè ægrum figuraueris, scrotum manu permulcetur, neruus cremaster in partē inferiōrē repellitur. Facile aut is dinoscitur, ut qui tenuior uasis sit, solidior, renitēsq; ceu potēs ualidusq; æger quoq; ad depressionē ipsius indolet, & iuxta colē turbatur: uasa aut digitis nostris & ministri exapta in scroto, ualideq; distenta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentum quod uasis cedendis supponitur secabimus. deinde per hamulos ea quæ cuti subiacent eleuata excoriantur. uasis ut in capite de angiologia & aneurysmatis disputatū est, denudatis, acus duplex linū trahens transmittitur: ansaque lini abscisa, uasa & in prima ipsorū dilatatione & inferiori extremo fune deligabimus, & per mediū recta incisa linea, & sanguine qui coierat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus moueat, ut ēt funiculi cū uasis sua sponte excidant. Leonides autem præcipit, q̄ si aliqua ex uasis testiculū nutrientibus dilatata fuerint, hoc modo esse faciendū: sin autē omnia, testiculum cū ipsis capi oportet, ne uasis alentibus destitutus contabescat. Porro uentosus ramex, quū genere aneurysma existat, Leonidi quidē nō attingendus uidetur, propter periculū quod in uaricibus ab incessabili sanguinis profluuio accidit. Recentiores autē quum duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor uasis testiculum alentibus, alia ab arteriis darton membranam & scrotum intercurrentibus: hunc quidē ceu desperatæ salutis,

tis, repudiant : illum priorem scalpello curant, discernimus autem ipsos, quod qui ab arteriis enascitur, facile ad digitorum constrictiōem euanescat, qui à uenis testiculum nutrientibus, aut neutiquam, aut cum multo metu. Cæterum curamus ipsos, ut in uaricosis ramicibus comprehensum est, singulas uenas fane excipientes deligantesque.

De intestinorum ramice. Cap. LXV.

INtestinorum ramex, quem Græci enterocelen dicunt, est cum intestina sunt in scrotum deuoluta : id quod fit aut peritonæo circa ilia dirupto, aut eodem extenso. utraq; igitur, ruptura (dico) & extensio ex uiolenta quadam occasione præcedente proueniunt, nempe ictu, aut saltu, aut clamore. At qui laxationi fertur acceptus, propriè & propter resolutionem, & alias corporis imbecillitates, accidit. Notæ utriq; communes sunt : conspicuus in scroto tumor : item q̃ in exercitiis, itinere, spiritus recentione, aliisq; occasionibus, idē maior quàm prius euadat : cōpressus, tardè quidem recurat, celeriter autē rursus deuoluatur, supernè intestinū resupinatis in loco permaneat, donec exigantur. Stercus autem in scrotum receptū periculum subinde ipsis intulit : dolent enim, nonnunquam etiā impressis digitis sonitum elidunt. Peculiaria ramicis ad relaxationem relati indicia sunt, q̃ ob causas quolibet, nonnunquam intestinum deuoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutum est, peritonæo constricto. Ex ruptura facti ramicis signum est propriū, q̃ una uice ac subito ab initio intestinū deuoluatur, idq; ob causas uiolentas duntaxat : q̃ tumor immensæ magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute emineat, quoniam intestina extra peritonæum elabuntur. Si igitur rupto peritonæo omentū duntaxat in scrotū inciderit, uitium omenti ramex, Græcis epiplocele appellatur : si intestinum quoq; delabatur, omenti intestiniq; ramex, Græcè epiploenterocele dicitur : si uero & aqua in tunica erythroide apparuerit, cōposita ex tribus quoq; appellatio sumitur. Cæterū neq; hos, neq; ex ruptura intestinorum ramicē chirurgiæ subiicimus, solum uero ex relaxatione ramicē intestini manu curamus, hūc in modū. homine resupinato & cute iuxta inguina per ministrū eleuata, trāsuersam lineā incidimus, ut in angiologia explicitum est. Nonnulli uerò
non

non trāuersam, sed rectā lineā ducūt, hamuloq; defixo diuisionem explicant, quæ testiculū retractū mēsurā adæquet, deinde rursus tot hamulis per quartā cutē transmissis quot uulneris magnitudini sufficiant, cæco hamo, aut cultro membranas & pinguedinē subtus excoriantes, scalpello præcidimus. detecto aut undequa; peritonæo, demissoq; indice digito ad posteriorem scroti partē inter peritonæū & dartū membranā, posteriorem cōnexū soluemus, deinde dextra manu extremum implicantes ad interiora scroti, simulq; sinistra peritonæū retrahentes ad diuisionē retrahemus testiculū una cū membrana erythroide, ac ministro uni iubebimus testiculū eleuet, ipsi uerò posteriorem adnexū ex toto simul cū membrana erythroide dissoluentes, explorabimus digitis nū intestini inuolutio quædam in tunica erythroide relicta sit, & infra hanc ad aluū propellemus, deinde acu bonæ magnitudinis linū ducente duplex, decies implicitū ad peritonæi terminum qui diuisionē respicit per mediū trāsuemus. † Succis aut linis quatuor faciemus initia, atq; his per uinculū rursus implicatis, utrobiq; peritonæū ualēter destingemus, iterumq; initiis circunvolutis, astringemus quidē strenuē, ut nullū ex uasis nutrientibus adhuc possit cedere ne inflāmatio inde cōciteretur, itē secūdum extrinsecus uinculum iniiciemus minus quā duos digitos à priori distās; Post hæc uincula digiti instar ex peritonæo relinquentes, totum ipsum orbicularim præcidemus, auferētes simul nimirum & testiculū: rursus diuisione iuxta emissarium scroti adhibita, linamētum in longitudinē implicitum inijcitur, & fomētis oleo imbutis uinculisq; ut in aquoso ramice iniectis, oīa quæ restant, quēadmodum illic expositum est, perficiemus. Nōnullos autem nō imperitos chirurgos noui, qui membrana erythroide excisa, ferramētis cādentibus extremum ipsius adurent sanguinis profluuij metu, ut est uerisimile. Hi autem ipsi post scalpelli administrationem ægros protinus in folio oblōgo ligneo, cui aqua inesset calida ad septimum diē usq; lauabant, quinquies per diem noctemq; id facientes, præsertim in pueris, & mirificè res processit: nā citra inflammationem ipsi secabāt, & funiculi una cum corporibus protinus decidebant. Interea uero dum ægri lauabā, prædictæ superfusiones inijciuntur. Alius quispiam præter cōmemorata etiam pipere trito cum oleo ceruicem ipsorum eodem tempore infricabat.

†Hic

†Hic locus sic legi in ueteri cod. κόψαντες δὲ τὴν διαπλῶν τεσσαρας ἀρχὰς ποιήσωμεν, καὶ ταύτας κατὰ χιασμὸν ἀντεμ- πλέξαντες ἐξ ἀμφοτέρων, i. postquam sciderimus duplicatum linum quatuor capita faciamus, & his decussatim implicatis ex utraq; parte peritonæum ualidè constringamus.

De inguinum ramice, bubonocoele uocatur.

Cap. LXVI.

INtestini ramice ex relaxatione creatū, inguinū hernia præcedit: primū. n. peritonæo nimis intēso, intestinū laxatum tūc quidē in inguina abscedit, facitq; ramicē, quē Græci bubonocelen dicūt. Hūc uerustiores in eū modū scalpello curāt, linea trāuersa per inguina intumescētia, tres digitos lōga inciditur Hinc mēbranæ & pinguedo eximūtur, aduerso aut specillo peritonæo per mediū detecto qua fastigia adigi debet, id n. intestina in altū repellit. Itaq; peritonæū intus restitutū utrobq; aduerso specillo, suturis inuicē cōmittemur, deinde specillum extrahemus, neq; peritonæū præcidētes, neq; testiculum, neq; aliud quippiā retinētes, sed præsidio cruentis idoneo per sanātes. Qm̄ uero recētiores ustionē potius in inguinū ramibus probarūt, hāc quoq; non præter institutū trademus. Homo mediocriter moueatur, tussi uiolēta, intēctione, spiritūq; retēto. ubi tumor in inguinibus apparuerit, locū qui uri debet, atramēto scriptorio, aut collyrio, figura triāgula circumscribemus, transuersam lineam per inguina sursum ducētes, injiciemusq; signū per trianguli mediū. postquā æger decubuerit, cādens ferrū per mediā notā imprimemus, primū clauatum, inde per triāguli costas Græce Γ literæ figurā representans, tertio laterculari, aut lenticulato totū triangulū adæquabimus, ministro per totā ustionē saniē panniculo extergente: tā altè uero aduremus quousq; pinguedinē pertingamus, idq; in habitu corporis moderato, neq; n. in gracilibus ob siccitatē ferrū altius admouendū est, ne imprudentes peritonæū aduramus, neque tamē in crassioribus pinguioribusq; in quibus uel ante iustam ustionē pinguedo apparet, sed quantum uti conueniat artificiosa deprehendemus coniectura. Secundum ustionem salua cum porro tritus crustæ insinuabitur, & inguinatio in literæ Χ similitudinem ligamento utemur, per insequētes dies remediis crustā adimūt, nepe phacomelite & similib⁹ curabimus.

De scioto

De scroto attenuato, laxoque attritorum panniculorum modo.

Cap. LXVII.

L Axata scroti cute siue interioribus ipsius particulis uitium maximè indecorū gignitur, quod Cræci racosin appellāt. Leonides igitur resupinato homine, quod in ea superfluū erat scalpello super asserē, aut durū coriū, quod incidendis subijcitur excidebat, orasq; uulneris futuris committebat. Antyllus autem tribus etiam quatuorve futuris superfluū cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post futuras auferebat, futurisq; adunitam ut cruenta.

Quomodo fiant eunuchi.

Cap. LXVIII.

C Vm ars nostra huc tēdat, ut corpora à statu qui præter naturā est in naturālē deducat, eunuchos faciēdi ratio, quam Græci eunuchismū dicunt, contraria promittit. uerum quia & inuiti subinde à præpotentibus quibusdā eunuchos facere cogimur, explicandus cōpendiosè modus est, quo illis satisfaciamus. duplex itaq; est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidē in hunc modū. Pueri adhuc infantes. in aquæ calidæ soliū collocantur: deinde ubi corpora eodem folio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, usque dum aboleantur & euanescant, dissoluti non amplius ad tactum occurrant, Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotū cū testiculis sinistrae manus digitis premitur: quo facto duas lineas rectas unā per alterū testiculū scalpello incidet: ubi exilierint testiculi cute de tracta execabuntur, ita tenuissimū solū naturale uasorū commercium relinquatur, atq; hic modus, eo qui per contusionem fit magis probatur. Nam qui contusionē testiculorum sunt experti, nonnunquam uenerem appetunt, parte aliqua ut uerisimile est testiculorum inter contundendum delitescente.

De hermaphroditis.

Cap. LXIX.

H Ermaphroditon uitium ex compositione Mercurijs, Veneris appellatum est, multū utriq; sexui adferens in decori. Cū. n. quator Leonide autore differentiae existant, tres quidē in uiris, una in mulieribus constituitur. In uiris siquidē aliās iuxta regionē inter scrotum, & anū aliās in medio scroto muliebris pudendi pilis obsiti forma apparet. Tertia uero ad hæc accedit in qua nonnulli ueluti ex pudēdo quod in
scroto

scroto est urinā profundū. In mulieribus supra pudendū iuxta pubē uirile frequēter genitale inuenitur tribus quibusdā extantibus corporibus uno tanquā cole, duobus autē ueluti testiculis. Tertia itaq; uirorū deformitas qua urina per scrotū excernitur, curationē non recipit, reliquæ tres curantur corporibus superuacuis è medio sublatis & ulcerum modo tractatis.

Quomodo nympha excidenda sit, & cercosis emendanda. Cap. LXX.

CAruncula in sinu muliebris pudendi subsultans Græcorum lingua nymphe dicitur: quibusdā immensæ magnitudinis efficitur, & non decentis inuerecundiæ notam præse fert. Quemadmodum uero nonnulli memoriæ produnt, sunt quæ hanc partem arrigunt, uiris similiter, & in uenerem ruunt. Quapropter resupinata muliere uulsella nymphae superfluum prehensum scalpello exindimns: diligentia adhibita ne altè ipsam penetremus: unde fluidus affectus, rhyda uocant, excitetur. Porro cercosim, cum sit carnis ab uteri ore propago quæ muliebri pudendum repleat, interim foras caudæ modo procidat, nymphae consimiliter auferemus.

De muliebrium locorum thymis condylomatis & hæmorrhoidibus. Cap. LXXI.

THymus eminentia quædam est, nunc rubens, nunc alba, plurima parte sine dolore, thymi corymbis similis: condylomata uero, excreſcētiae sunt rugosæ, quemadmodū hæmorrhoides ijs quæ in auro sunt respondētes, interim & sanguinem profundunt. omnes itaq; eiusmodi in mulieribus excreſcentias, quæ in conspectū ueniunt, inter detegendū uulsella cōprehensas, ferramenti quod ex dimidio spathā refert, acie excindemus, utemurq; galla leuigata, aut scisso alumine. Nam è lino deligaturam in his maiores chirurgi non admittunt.

De non perforatis & phymo. Cap. LXXII.

Genitales mulierum partes clauduntur, interim ex natura, interim ex accessorio, morbo quodā præcedēte, aliàs in imo, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatio, idque aut secundū naturā aut ex obstructione. Quod autē foramen intersepit intercluditq; uel caro uel membrana est. Cæterum hoc mali graue fit impedimentū, modo in coitu, modo in conceptu

ceptu uel puerperio, aliquādo mēsum purgatione, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupauerit, in quibusdam. n. medium foramine patescit. Causa igitur inuenta, uel ex promptu uel etiam demisso speculo, si quidē cōmissura solū fuerit, hanc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus: sin autem distentio; hamulis per mediū corpus siue id membrana siue caro existat transfixis eleuatum, scalpello diuidemus, ac sanguinis fluore medicamentis sine rosione siccantibus suppressiois quæ cicatricem ducunt utemur, pessarium aliquo cicatricem inducente unctam subiicientes, in quibus potissimum non altē admodum administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant. Iam phymus in ostio uulvæ succrescens pari modo curatur.

De abscessu uulvæ.

Cap. LXXIII.

VBi abscessus circa os uulvæ prouenerit qui manu tractari queat, non promptē ad sectionē properare consilium est, sed cum affectio fuerit absoluta, inflammatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incumbūt, attenuata, idq; propter uteri excellentiā. Inter agendum uero mulier in sella resupinabitur cruribus ad abdomen, & femina contractis, inuicē diuarcatis: cubiti ipsius sub poplitibus subiiciuntur, & funiculis congruentibus ad ceruicē deligabūtur, medicus autē ex dextra sedens tentabit speculo, quod dioptrā dicunt ætati accōmodato. conuenit autē specillo sinus muliebris altitudinē metiri, ne maiori speculi tridente, uterū premi contingat, & si amplior ille sinu reperiatur, linamēta implicita alis imponuntur, ut super ipsa speculū firmetur. Cæterum cōuenit speculi tridentem qui testulam habeat, in superiore parte intro demittere, & specillū à medico cōtineri, testulā à ministro conuerti, ut laminis tridentis diductus sinus aperiatur. Iam uero si abscessus occurrens mollis & tenuis existat, qui digiti tactu subsider, iuxta uerticē diuidetur spathula, aut specillo: ori uulvæ pure uacuato, linamentū in longitudinē implicitū, lemniscondicunt, tenerriimū ex oleo rosaceo imponetur, uel potius extra diuisionē sinui muliebri sine compulso inferetur. Extra uero summas oras & super pectinem lumbosq; lanæ succidæ aut puræ, oleo madētes accōmodabuntur. Tertio die insidebit mulier in hydrelæū calidū, aut maluæ decoctū: absterfis sudoribus linamentum

linamentum in longitudinē implicitū in fissuram tetrapharmaco per se, uel cum discocto melle inunctum leniter insinuabis: erit autē solutum butyro aut rosaceo, exterior regio cataplasmatibus obducetur dum inflammatio cessauerit, & uulua abscessu purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui debet auriculario clystere ex iridis decocto, aut aristolochiae aut melle. Cicatrix duci debet emplastro ex cadmia, soluto uino per linamentum madidum. At si intra os uuluae abscessus fuerit. Attingi non debet.

Qua ratione partus ex utero excutiat excidaturque. Cap. LXXIIII.

Quomodo aegrè parienti succurratur tertio uolumine tradidimus: sin autē eo nihil proficiatur, ad chirurgiā merito diuertimus, id primū notantes, mulier superstes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc manum admoliamur: sin contrā, attingi non debet. Quae igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiendi necessitate ut in lethargo sopiuntur, resolutae sunt, & uix possunt excitari, ac si excitentur, imbecilliter respondentes, rursus graui sopore praemuntur. Nonnullae conuulsionis modo contrahuntur, aut neruis commouentur, aut alimentū non sentiunt, pulsus ualidè inturgescens deprehenditur, sed languidus & imbecillis: quae incolumes futurae sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Oportet igitur resupinam mulierē in lecto sic collocare, ut figura ipsius magis sit decliuis, crura ipsius elata mulieres utrinque continerent, aut quaedam ministræ. Si uerò non adfuerint, mulieris thoracē uinculis quibusdā lectulo adfirmabunt, ut ne corpus attrahentes sequens, tractionis uim dissoluat, ac alis uuluae diductis, per ministrū † sinistram manū contractam cum ualentibus digitis extenuatis, in ostiolū inferemus, idemque pertētabimus, & oleo infuso relaxabimus disquirentes ubi uncū quo foetus extrahetur, defigi conueniat. Idonei uerò loci sunt quibus iniicietur, si in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta palatum, mentū, clauiculæ, & sub costis sitae regiones, adhuc praecordia, quae Græci hypocondria appellant: si in pedes conuertitur, ossa super pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus & deinde uncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particulæ cuiuspiā
ex

ex prædictis usq; ad uacua transmittemus. huic alter opponetur, quod attractio recta procedat, neq; alterâ in partem inclinet, deinde æquabiliter trahetur non solû recta, sed etiam in latera quemadmodum in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea remittere iterû non conuenit, postea uerò indicem digitû unctum, aut etiam plures demissos inter os uulvæ & corpus impactû, orbiculatim circumagere, ueluti excorians: si autē iuxta rationē uncus subsequatur, in superiora transferre cōueniet, atq; sic agere dum perfecta foetus sit extractio. Si autē manus obiecta fuerit, nec propter obstructionē queat conuerti, circumposito panniculo, ne reuoluatur, modicè attrahere oportet, ac prolapsam totam ab humero abscindere, idemq; facere etiam si duæ manus prociderint. similiter etiam pedes procidentes, corpore reliquo nō subsequente, ab inguinibus amputari oportet: deinde reliquum corpus dirigere conandum. At si caput iusto maius obstructionē pariat, & hydrocephalon sit, id est, aquâ in capite infans collegerit, spatula polypis dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomechætion dicitur, inter digitos occultato, caluariâ diuidemus ut uacuata concidat. q̃ si naturaliter amplû sit caput, similiter diuisam caluariâ forspice qua dentes aut ossa extrahuntur, cōprimemus. Si ossa emineant, hæc quoq; auferre ratio est. At si capite ad thoracem adacto, obstructio prouenerit, eodē instrumento clauicularum compages usq; ad interiora spatia diuidentur, ut humore uacuato thorax concidat & collabatur: quod si non concidat, diuisas etiam clauiculas ipsas auferemus, tunc n. collabatur. Porro si imus uenter mortuo foetu sit inflatus, aut aquam subter cutē collegerit, eadē ratione ac uia eum uacuare cū ipsis interaneis aggrediemur. Cæterû si in pedes deferuntur, foetus declinati facile ad uteri os diriguntur: quod si iuxta thoracem aut abdomen fuerit impactus, linamento ipsum attraheamus, eodemq; modo ea quæ ambiunt, diuidemus. At si reliquis ablatis caput ad superiora reuersum inhæserit firmitus, sinistra manus demittetur in uterû, & si os ipsius pateat, manû in ima transferemus, ac caput inuestigatû digitis ad os deuoluemus: deinde uncum unû aut alterû defigētes, propter orificij inflammationem non propellemus, sed infusionibus pinguibus copiosisq; utemur: itē in seffibus, fomentis, & cataplasmatis, ut diducto ore auferatur, quemadmodum superius cōprehensum est.

PAULI AEGIN.

D

Porro

Porro latera foetus, si quidem in rectū diriguntur, praedictis utemur rationibus: sin minus, totū ipsum intus dissectū particulatim extimemus, cura adhibita, ne particula quæpiā ipsius nobis nesciis intus relinquatur. Postquā manu scalpelloq; administrationem obierimus, remedijs ad inflammationem inscriptis utendum est. quod si profluuium sanguinis oboriatur, huius quoq; curationem accepisti.

† Huius loci multo uerior est scriptura in ueteri codice, τὴν ἐν ὧν μοι χεῖρα συνκνήμενι μετ' εὐρώτων δακτύλων λελιπασμένην, id est, dextram manum contractam cum fortibus digitis pingui aliquo inunctam, &c.

Si secundæ fuerint relictæ. Cap. LXXV.

Foetu excusso frequenter accidit, ut uelamentū illius in utero firmiter adhærescat, quod nostri secundas, Græci chorion, & deuterion appellant. Diducto igitur uulvæ ostio, secundæ quæ inibi relictæ sunt, & in partē aliquā orbiculatim conuersæ, facile educuntur. Manu siquidē sinistra calida, inunctaq; in fundum demissa, secundas sublabentes oportet eijcere. Si autē fundo uteri fuerint adnatæ, demissa similiter manu comprehendentes tendemus, neq; in rectū, ne uulva procidat, neq; uiolenter admodū, sed leniter primum deducemus, huc illuc circumagentes, deinde paulo ualētius. hoc. n. pacto obsequuntur & à connexu dissoluuntur. Quod si uulvæ os conuiere fuerit deprehensum, remedijs ad hoc cōmemoratis utendum est. Si uires nō fuerint inuolidæ, etiam iis quæ sternutamenta prouocant, & aromatum halitu ex festili uapori conueniet: & si os uteri diductum sit, manu inserta, secundos ut dictū est extrahere conabimur. At sine sic quidem exemptæ fuerint, terrere nos non debet, secundum paucos. n. dies putrefactæ & in saniē resolutæ excidunt. Quia uerò grauitate odoris & caput opplent & stomachum peruertunt, suffius conuenientes excitabuntur: ad eos autem cardamomum & ficus aridæ commendantur.

Quomodo coxendices adurantur. Cap. LXXVI.

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa propter humiditatis copiam nonnullis excidens, uisionē postulat, quod Hippocrates his uerbis testatur. Quibus coxa ea diuturno ipsius cruciatu loco suo mouetur, crus conbescit & claudi fiunt, nisi uisionem experiantur. Conuenit igitur

tur tunc illum præsertim locum adurere, è quo articulus excidit: sic. n. humor redundãs deficcabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suspiciet, quare etiã penitus illic ulsionem moliri conuenit. Recentiores autẽ tres crustas adhibent, unam retro urentes in acetabuli sinu, alterã supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorem talum, quã est carnosior.

De fistulis & fanis.

Cap. LXXVII.

Cum locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatim de omnibus fistulis uerba facere. Itaq; fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens particulis, magna uerò parte ex abscessibus oritur parũ dextrẽ curatis. Callus autẽ continua quãdam caro est, albida, madoris expers eoq; etiam doloris, neque uena, neq; neruo ad ipsum pertinente Interim sinus siccus, interim humidus est, nunc humor incontinenter fluit, nunc certis quibusdã temporibus remittit, ore ipsius oppleto iterumq; adaperto: Alias fistulæ in os definunt, aliàs in neruum, aut aliã quampiam principẽ particulam, uel rectẽ intus tendentes, uel obliquẽ, item uel uno ore, uel pluribus peruiæ. Quæ igitur in grandes arterias aut neruos, aut tendines notatu dignos, aut membranã costas succingentẽ, aut aliquam principalẽ particulam deueniunt, uel nequaquã, uel certe, cum artificiosaq; diligentia attingere debemus reliquis hunc in modũ manum ad moliemur, primum tentabimus, si quidem rectẽ intus tendant, cultro excisório: si oblique, specillo duplici cuspidẽ, flexili. Huiusmodi autẽ sunt quæ ex stagno fiunt, itẽ ex ære tenuissima. In quibus autẽ duæ pluresue oræ habentur, notationi per specillum non obtemperantes, sinu per unum ipsius orificiũ adusto, ex clysteris in reliquas oras transitu deprehendemus, num una fistula sit pluribus oris dehiscens, in plures: ac ubi tentatũ est, siquidẽ per summa habeatur sinus, arctusq; sit, demisso specillo explicantes, scalpello figura cõmodiore callum tollemus, aut unguibus, aut acie scalpri deradentes: at si latitudinem habeat, corpora superflua, tolli debent: sin autẽ non summa occupauerit, sed penitus rectẽ tendat, eo quatenus licet in alto diuiso, orbiculatim totũ callum auferemus: quod si reliquæ ipsius aliquæ remanserint, medicamento adurente eas consumemus, quod si amplius quũ sit medicamento non cedat, ferro can-

D 2 dent e

dente crustas ei inducemus. Cæterū si fistula in os terminatur, hoc idē quod integrum est, duntaxat rademus: ubi uero cariem aliamve quandā corruptionē experitur, quod uitiatū est, totū excisorijs, aciē inter sese oppositā habentibus tollemus, si opus sit, prius terebra perforatū, siue ad perspiratū duntaxat, siue ad medullam usq; fuerit uitiatum. At si os quoq; emineat, caulis modo porrectum, ferra ipsum adimemus. Sumptis itaq; duobus loris, unius quidem medium ossi, eminenti subijciemus, ipsumq; per ministrū attollemus: alterius autē quod crassius est, uel ex lana quoq; factum, similiter medium carni quæ ossi subiacet adaptantes, initiaq; infrā prehendentes, per ipsum lorum carnem deorsum iubebimus detrahi, ne ipsa ferræ dētibus peradatur, atq; hoc pacto nos excretionē molimur. Vbi uerò particula quæpiam princeps subiecta est, exempli gratia, membrana costas inuoluens aut spinalis medulla aut eiusmodi aliqua, inter excidendum aut ferra concutiendū os, lamina, quæ quod membranam cerebri custodit meningophilax græcè dicitur, subijciemus: non uitiato autē osse, totum orbiculatim carne nudum ferra eodē modo deradetur. Fieri nanq; haud potest, ut ossa circulatim implicita carne obducantur. Simili ratione si ossis terminus prope articulū fuerit uitiatus, idam ferra auferri debet. At si totum subinde os, nempe cubitus aut radius aut tibia aut eiusmodi aliquod contabuerit, totū adimetur. Femoris autem caput, aut coxa, aut spinalis medullæ uertebra affecta, attingi non debet, periculi quod ex arterijs adiacētibus accidit euitandi gratia. Hoc igitur modo ac uia faciendū est, in singulis ubiq; particularum uitiarum situ, uicinitate, & naturæ consortio inspecto, item morbi magnitudine, & laborantis uitium robore considerato. Cerion autē, hoc est fauæ quū sinus sit fistulosus, mellea diffuens humiditate, eandem administrationem curationemq; cum fistulis & alijs sinibus requirit.

De ani fistulis.

Cap. LXXVIII.

ANi fistulae latentes quidē notantur inde q̄ ore nō apparente dolor ipsis oboriatur, & purulenta humiditas per anum profundatur. Plurimis abscessus quoq; indicia præcesserunt: manifestæ autē cultro excisorio, aut seta porcina demissa noscuntur. Nam instrumentū ad ima penetrat, & digito indice in sedem transmissio occurrit, fistula nimirum ad interiora

interiora perforata. At in ijs quæ perforatæ nō sunt, instrūm digito, nō statim occurrit, sed obstat in medio corpus nō perforatū. Tortuosas aut & labyrinthi modo flexuosas agnosces inde, q̄ instrū paululū procedat, pus aut ad illarū portionē copiosum efferať. At quæ prope intestinū oriunt̄ fistulæ, agnitionem sui præbēt, q̄ nōnūquā & lumbrici & stercus per orificiū erumpat. In oībus aut ferē callus aliquis in orificio prominet. Itaq; fistula isanabilis est, quæ uesicæ ceruicē perforauerit, aut quæ ad femoris articulū sit, aut quæ ad ipsum lōganonē tēdat. Aegrē uerō cōsanescit, quæ orificio caret, tū quæ delitescit & in os terminat̄, multifariamq; fistla est: reliquæ in uniuersum facile curant̄, administratione hūc in modū adhibita: resupinato hoīe, ut cruribus sursum porrectis femora ad uētre m inclinēt, quēadmodū sit in ijs quibus clyster in aluū mittit̄, si fistulæ extremū in summo occurrit, culter, aut auricularū specillum per orificiū demittit̄, subiectaq; cutis simplici linea excidit: si autē altē intra sedē fistulæ terminus finiat, demisso per orificiū cultello, siquidē perforatā ipsam inuenerimus, demisso iuxta oppositam affecto ano manū indice digito, eiūdē cultelli initiū adigentes, & deflectētes, ipsum foras reducemus, ac corpora quæ incūbunt cultello, simplici diuisione liberabimus. At si nōdū fistula perforata reperiāt, in altū uero ani duntaxat terminet̄, & tentatibus nobis indici digito occurrat, corpus intercedens cū squamosum mēbraneumq; sit, uehemētius mucrone cultelli perforabimus, traductoq; per sedē cultro, rursus scalpello corpora quæ ei incūbunt dissoluemus, quēadmodū prius explicatū est. Si igit̄ terebræ, aut scalpelli ad fistulas accommodati acie sinus fundū iuxta sedē perforauerimus, ipsum instrūm per anum inferentes, illinc totū quod interiacer acie terebelli pertundemus, & post excisionem uulsella, aut forfice corpora diuisionē ambientia (calli aut sunt) prehensa ex toto adimemus, musculum qui anū cōstringit, spinct̄er dī, ubiq; uirantes. Nōnulli siquidem rudius dū in alto sectionem molirent̄, ipsum cōuulnerarūt, atq; inde inuolūtaria stercoris excretio homini accidit. At si qui timi diuisculi chirurgiā fugiant, Hippocratica ut debent ē lino deligatura. Iubet siquidem Hippocrates, linū quintuplex crudū cultro foratro uel specillo p̄ fistulā demittere, & lini principia cōiungi, ac quotidie cōstringi donec corpus totū quod duabus oris intercedit, dissectū, linū eructet. Si uerustate

D 3 malum

malū cōtraxerit, quum dissolues, ēt psaro, aut eiusmodi quodā arido illito linum oportet pertrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicatæ insertū linū iuxta prædictā rōnem propellant, quod meo iudicio nō cōuenit. Dūm.n. chirurgiā uitant, præter q̄ hanc requirunt, ēt curationem remorantur. de latentibus autem fistulis Leonides in hunc modum tradit. Cum autem alta pars stringentis anum musculi in fistulam dehiscit, quæ uel à sede incipiat, uel longius procedat, post notas iudicatas, disquiretur instrū quod ad sedem diducendā sit aptatum. dico aut̄ exiguo per specillo quod Græci dioptrion appellant, anū ut muliebrem sinum, distendi. At cū fistulæ os clarè apparuerit, per ipsum specilli mucro demitteretur, propellereturq; in imū: lamina uero subiecta tota fistula super eā diuideit semipathula, aut spatha fistulis incidēdis peculiari. Nos aut̄ cum in talem incidissemus affectū, hoc administrationis modo uti non potuimus, q̄ ductus fistulæ in cōspectum nō ueniret. Nā inter anum & eius fibulā dextra parte sita erat, instrū uerò quod ei diducendæ erat impositū, magis operationē adumbrabat: at per digitos distendentibus anū nobis, rima quædā inter unam quandā ani rugā ceu fistulæ emissarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandē uero cultelli mucronē in fistulam demittebamus ceu manu ab ea ducti, deinde dextræ manus indice digito, ani fistulæ inserto, cū inuenissemus quoddam inter digicum & instrū, tenue corpus, cumq; uiolentius cultellum digito adegissemus, fundum fistulæ sursum cōuersum perforauimus, ubi iam digito mucronem instrumenti foras traiecitassimus, conspicuum nobis factum totum corpus quod inter fistulæ orificia habebatur, dico autem ea quæ initio ad humoris emissarium sita erant, & ea quæ nunc à nobis facta sunt scalpello præcidentes dissoluimus.

De hæmorrhoidibus. Cap. LXXIX.

CUm hæmorrhoidum notæ ex ipso quod uacuatur innotuerint, antequam manum admoliamur, clystere utemur copiosissimo, simul intestini superuacua inanientes, simul & anum, ut prōptius interuertatur & extremā ipsius pars exeat, irritātes. Resupinato igitur ægrotante aduersus lumen clarum, siquidē cōstriictione usi fuerimus, linū quintuplex ferramēto quo ora uenarum in ano extantia adurūtur, uel quo

uel quo uux, labris hæmorrhoidum circumponentes unamquamq; hoc fune astringemus, una duntaxat relicta, qua sanguis superfluus emanet, quod etiã Hippocrates præcipit. Post astrictionē linamento implicito oleo madēte, & ad sedem accommodato ligamine, usi, ægro quietē indicemus, oleo tepido, aut malsa uentri medicātes, deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco utemur. Vbi hæmorrhoides exciderint uino cicatrix ducitur. Leonides aut nō è lino deligat, sed forcipe prehenſas ampliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, fuligine thuris utendum & amylo, chalcitide, uel eo medicamento quod usta spongia simul & pice cōstat, itē pastillo faustino ad absolutā adustionem. Alii uero instrumēti quo uux uruntur, concauo, medicamine quod adurat repleto, quēadmodum uuam, sic etiam hæmorrhoidas ufferunt.

De condylomatis, tuberculis, & rimis. Cap. LXXX.

A Nī condyloma loco solum ab eo quod muliebres locellos infestat, differt, rugosa & ipsa sedis excrescētia, aut inflāmatione, aut rima quæ dicitur rhagas præcedente. Per initia itaq; tuberculum appellatur: cum occalescit autem, condyloma: quare conuenit, hæc quoq; , quemadmodum illa, uulsella apprehensa excindere, & medicamentis crustam ducentibus curationem absoluere. rimas autem à stercore potissimum indurescentes, & quia dum cicatrix generatur, occalescunt, inueterascuntq; , recentes, faciemus, uel unguibus uel scalpello radentes & cicatricem ut par est, inducemus.

De ano non perforato. Cap. LXXXI.

P Veris receus natis, anus ex natura nō perforatus interim inuenitur, membrana nidelicet cōstructus. hæc igitur si fieri pōt, digitis ipsis dirumperur: sin minus, acie scalpelli eam excidentes, uino curabimus. Qm̄ uero & prouectis subinde ob ulcus non dextrè curatum anus committitur, conuenit hanc unitionem instrumento cōuenienti disruptam curare, fistula plumbea, aut obturamine quodā ano usq; dum in totum consanescat, cōmodè imposito, ne rursus coalescat. Porro obturamentū medicamine quodā cicatricē ducēte obliui debet.

Quomodo uarices excindantur. Cap. LXXXII.

V Arix uenæ dilatio est, aliquando in temporibus, aliquando in ima uentris parte sub umbilico, nonnunquā

D 4 etiam

etiam circa testiculos, sed maxime in cruribus. Hic igitur originem plurima parte ex materia melancholica trahit, eorum autem qui testiculis oboriuntur curationem per scalpellum iam in capite de uaricum ramice tradidimus, atq; his similiter crura infestantes aggrediemur, ab interiori femoris parte incipientes, ubi etiam origo ipsorum magna ex parte inuenitur. interius enim, in plures distributi propagines difficilius tractantur. Loco igitur humore, funiculum superiori femoris regioni circundamus. iubemusq; ut inambulet inde repleta uenam atramento scriptorio, aut collyrio notabimus iuxta uaricis situm trium digitorum, aut paulo ampliori spatio interposito, decumbente ægro cruribus extensis, alterum funiculum supra genu iniiciemus. Elata autem in tumorem uena, scalpellum adigimus, quâ atramenti nota est. tam altè, ut cutè duntaxat scalpellum penetret, ne uenam diuidamus. ubi oras uulneris hamulis diduxerimus & membranas cultro inflexo ad ramicem aquosum accommodo excorauerimus, uena detecta & undiquaq; explicata femoris ligamenta soluemus, uasè per cæcum hamum suspensio, acum duplex linum trahentem subiiciemus, plexumq; lini amputabimus, & diuisa scalpello per medium uena, detrahemus sanguinis quantum usus postulat: deinde funiculo superiorem uasis partem constringentes, erectumq; crus eleuantes manu expressu, sanguinem qui in crure est euacuabimus: deinde infra rursus uas denuncientes, uel id uenæ quod inter uincula est, abscissum tollemus, aut manere id sinemus usq; dum sua sponte cum funibus excidat, & uulnere siccis linamentis oppleto, splenium uino & oleo madens, iniectum deligabimus, medicamentoq; ad pus faciendū apto quod linteolis illinatur persanabimus. Noui autem ueteres nonnullos, funibus non usos: alios inde uas denudatum ex cindere: alios altè ipsum eleuatum cum uolentia extrahere abruptes. Verum omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem supra diximus. Porro uarices in imo uentris suborientes consimiliter tractabimus item eos qui tempora infestant, quemadmodum in angiologia comprehensum est.

De dracunculo.

Cap. LXXXIII.

DE dracunculo quomodo medicamentis potissimum emendetur, quarto libro peregrinus.

De ex-

*De extremarum partium præcisione, acroteria smon
appellant. Cap. LXXXIIII.*

SUmmis partibus nonnunquam putredine cōsumptis, nēpe manu aut pede, ut etiam ossa ipsa contabuerint, uel ex causa exterius adueniente, fracta, uel etiam ex interiore causa putredinem experta, & ferrula præcidi postulent, ante hanc necesse est corpora ossibus circumdata primum diuidere. Verum quia dum hoc primum fit, deinde longiore temporis spatio serræ administratio peragitur, sanguinis profluuij metus subsequitur, rectè Leonides non omnia primum corpora præscindit, nisi ex toto putredine contabuerint, sed partē, ubi non plures neq; grandiores esse uenas aut arterias existimet principio celeriter usq; ad os refecat, deinde os protinus serræ præscindet, panniculum lineum partibus sectis circumponēs, ne serræ per ipsa tracta dolores pariat. Atq; tunc reliqua parte excisa, ferramenta candentia uasis iniicit, & sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & conuenienti deligatura adhibita, remedio utitor quod pus moueat.

De unguium pterigijs. Cap. LXXXV.

Pterygium in unguibus carnis incrementum est partem unguis operiens. Fit autem in pedis manusq; potissimū pollicibus: in pedibus quidem, ex offensione plerunque: in manibus autem, ex neglecta reduuia, inflammata, & in pus mutata. Siquidem hoc, pus dico. spatio temporis unguis radicē exedit, ipsumq; corrumpit, subinde totum abolet, sæpe mediū unguis admodum infestat. Iuxta unguis autem radicē ipsam, nonnullam ipsius partem putrefactam, aliquando totam radicem à rosione immunem relinquit. Est quum & os corrūpat, odor ædā grauis, digitus per summa dilatetur magisq; liueat. his igitur manes deber admoueri, ita ut totam unguis partem relictam acie scalpelli refecemus auferamusq; deinde exulceratam incisamq; partem ferramentis aduramus. Etenim pterygium genere depastio est, quæ nome Græcè dicitur, neque subidet, nisi adustum, adeoq; si negligitur, digitum corrumpit. At si osse & ungui à uitio immunibus, exterior unguis angulus qui delitescit, & carnem ipsi agnatam pungit, & inflammationem excitat, conuenit pungentem unguis particulam tenui cultro aut eiusmodi quodam subiecto sublimen eleuatā, acie

acie scalpelli adimere, & quod eminet medicamento crustis faciundis idoneo consumere. Pleriq; hoc modo administrationis confanuerunt. Si amplius fuerit uitiū primū scalpello circum adimemus, mox remedium ex medicamētis petemus.

De ungue contuso.

Cap. LXXXVI.

Quoniam uero subinde ex ictu unguibus contusis dolores subsequuntur, qui ad manus operationem nos pertrahant, satis est Galeni uerba hic apposuisse, quæ sonant in hunc modum. Unguibus contusis præsens planè remedium ad dolorem auferendum sanguinis detractionem experti sumus, quum pulsus doloresq; uehementissimi oboriuntur. Cæterum linea obliqua, non recta in imum, supernè deorsum scalpello acuto debet incidi, ut sanie excreta, secta hæc unguis particula ueluti operculum quoddam subiacētium efficiatur. At si in rectum supernè deorsum lineam duxeris carnis excrescentia quam Græci *ὑπερσάρκωτια* uocant, diuersum nimirum corpus à carne quæ ungui subijcitur per mediam diuisionem suppullulante, gignitur, inde rursus doloresprehendunt, quos in reduuiis nominauimus, carne quæ sub ungue succreuit, compressa. Quia igitur ex huiusmodi sectione dolorē protinus ægro adimi uidere licet, per dies insequentes commodū est, nobis subsectam unguis carnem leuiter attollentibus, unguis saniem excernere, ac rursus subiectæ carni quemadmodū dixi unguem operculi modo imponere: reliqua uero digiti totius medicina uti conuenit quæ leniat, discutiatq;.

De clauis, myrmecijs, & uerrucis. Cap. LXXXVII.

Clausus rotundus callus est, coloris candidi, clauorū capitibus similis: toto corpore, sed pedū solo digitisq; præcipuè enascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentum. Itaq; circumsarificatus uulsellisq; apprehensus, scalpro acutæ aciei, aut quo uenæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro utuntur. Myrmecia uerò cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundū, & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoq; totum corpus, præsertim aut manus infestat, nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt ueterum gallorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta,

adacta, ex basi myrmeciam auferre. Alij ærea, aut ferrea fistula, idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam uulsellaq; apprehensam, scalpro, clauorum modo excindere. At uerruca, quæ acrochordon græcè dicitur, exigua cutis eminētia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustam, ut suspensa esse nideatur. Nominata uero sic est, quod choræ nexui respondeat. Extendentes igitur, eminentiam excindimus: sin autem hoc non fiat, lino saltem, aut pilo deligabimus. Noui plerosq; & has & prædictas omneis excrescentias ferramento extincto, ut dicunt, consumpsisse.

De telis è corpore extrahendis. Cap. LXXXVIII.

CHirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maximè necessariam esse poeta Homerus his uersibus innuit.

Vir medicus multis alijs præstantior, ut qui

Corpore tela trahens, medicamine uulnera curet.

Primum itaq; telorum differentiæ enumerari debent, differunt autem tela materia, figura, magnitudine, numero, habitu, uiribus. Materia quidē quatenus hastilia, aut lignea sint, aut arundinea. Ipsa uero tela aut ferrea sunt, aut ærea, aut stâneæ, aut plumbeæ, aut corneæ, aut uitreæ, aut osseæ: aut arundineæ, uel etiam eadem linea, tot enim dñe potissimum apud Aegyptios reperiuntur, figura autem, quatenus alia sunt rotunda, talia unguulosa, nempe triagula, alia sulcata quæ & gonchota dicuntur, alia trifulca, atq; alia cuspidata, alia cuspidibus carēt. ac cuspidatorum, hæc cuspides posteriora spectantes habent, ut dum extrahuntur cōtra defigantur, illa in anteriora, ut propulsata idem faciunt: quædam obuersas cuspides habent, fulminis instar, ut dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infigantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, cōtractas, quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine uariant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut unum digitum æquent, quæ sanè & myiata apud Aegyptios uocantur, alia medium inter hæc locum occupant, Numero autem quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insutum, alia cōcauum: ac quædam firmiter ligno infixa

infixa sunt, quaedam negligentius, ut in extractione separata
 intus remaneant. Viribus differunt, quatenus ueneno quaedam
 sunt oblita, quaedam non. Atque haec sunt telorum discrimina.
 Nunc dicamus quomodo extrahantur in conuulneratis, & in bello,
 & extra bellum, sponte, & inuito, quacunque occasione, ac qua-
 libet ex materia confecta. Ceterum dupliciter tela in carne
 extrahuntur, tum euulsione, tum propulsatu. In quibus n. per
 summa telum impactum est, euulsione eximi debet. similiter et
 quae altè inhaerent, obiectae uero partes si conuulnerentur, san-
 guinis profluuium, aut dolore ex consortij lege periclitantur. At
 propulsatu utimur in quibus altè telum infixum est, & partes
 obiectae breue spatium continent, neque nervus, neque os, neque
 eiusmodi aliquod diuisionem impedit: osse autem conuulnera-
 to euulsorium modum assumit. Si igitur telum conspicuum fue-
 rit, inde extractionem moliemur: si occultatum est, conuenit
 autore Hippocrate, modò uulneratus possit, in ea figura con-
 stitutum notare, in qua est uulneratus est: si non possit, iacen-
 tis certè quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus,
 & si quidem in carne fixum est telum, manibus extrahemus,
 aut eius hastili quod etià attraction appellant, nisi exciderit, li-
 gneumque; id potissimum sit: si excidat forcipe quae dentes radi-
 cesue, euelluntur, aut ferramento quod à telo extrahendo be-
 lulcum Graeci uocant aut alio quopiam instrum. accommodo,
 extractionem moliemur, nonnunquam etiam carnem prius
 incidentes, si uulnus instrum. non recipiat. At si etiam in oppo-
 sita telum processerit, nec illac ipsum possit extrahi quàm infi-
 xum est, diuisis ijs quae opposita sunt, per illa ipsum eximemus,
 uel euellentes ut dictum est, uel per eam partem in qua teten-
 dit propellentes, uel si hastile exciderit, demisso instrumento
 propulsorio ita ut neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut
 eiusmodi aliquod necessarium uitemus, protrudere oportet,
 turpe siquidè est, dum telum extrahimus, peius eo malum effi-
 cere. Et siquidè caudatū telum sit (hoc aut specillo deprehen-
 demus) femina propulsorii instrum. demissa accommodataque;
 telum propellemus: si concavitatem, marem. Telum uero ex e-
 ptum si sculpturas quasdam habere, ceu aliorum tenuium ferra-
 mentorum quae ipsis imposita esse possint, appareat, specillo rur-
 sus usi, si illa inueniamus, eadè rōne & uia auferemus: si opposi-
 tas cuspides, ut uerisimile est, telum habēs nō exilierit, uicinus
 ei locus

ei locus dissecari debet, si nulla pars necessaria contigua sit, de-
tectumq; telū eleuantes, modeste extrahemus. Nonnulli uero
exigua arundine cuspidibus ipsis circumposita sic telum euel-
lunt, ne carnes à cuspide radantur. & si uulnus inflammatione
uacauerit, futuris usi cruentorum modo curabimus: si inflam-
mationem experiatur, fomentis, cataplasmatis, & consimilibus
medebimur. Porro si uenenato telo quis ictus est, totam car-
nem quæ ueneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præci-
demus. Agnosces autem eam quod è sana carne differat palli-
da enim, subliuida, & ueluti emortua apparet. Aiunt autē Da-
cos & Dalmatas cuspidibus elenium & ninum dictum obline-
re, idq; ubi sanguini uulneratorū obuenerit, hominem occide-
re: comestum uero ipsis innocuum esse, & nihil mali, efficere.
At si telum ossi inhæserit, rursus instrumento experiewur, & si
quidem caro impediat, hanc adimemus aut diducemus: si uero
etiam altè in osse lapsus est, quod cognoscimus si firmiter id
infixum nulla ui cōmoueatur, excisorio cultro osse quod iux-
ta est exempto, aut etiā terebra prius perforato, si crassum sit,
telum liberabimus. Porro si in principem aliquam particulā
telum defigitur, exempli gratia, cerebrum, aut cor, aut guttur,
aut pulmonem, aut iecur, aut uentriculum, aut intestina, aut re-
nes, aut uulnam, aut uesicam, quum iam notæ lethales apparue-
rint, & euulsio præsertim multum cruciatum exationemq; ac-
ceritura est, nihil tentabimus, ne præterquam quod nihil su-
mus profecturi, etiam conuitiandi occasionem idiotis præbea-
mus. Si uero exitus fuerit obscurus nec in conspectum ueniat,
præfati periculum, opus aggrediemur. Multi siquidem absces-
sū quoq; in aliqua uitæ necessària parte oborto, præter opinio-
nem consanuerunt, quum & iecoris fibram, & ouenti partem,
peritonæique, & totam uulnam subinde ademptam fuisse, nec
mortem inde subsequutam, memoriæ prodatur. Est quum gut-
tur de industria subinde in angulis diuidamus, ut in capite de
ipsius incisione dicebamus telum itaq; si in his relinquatur, in
præsentaneam mortem præcipitat, præterquàm quod artem
etiam inhumanum ostendat: si eximatur, fortè etiam salus sub-
sequitur. Porro principalium particularum uulneratarū agnitio
non est difficilis, ut quæ ex accidentium proprietate, ex cremē-
tis, & particularū situ, inueniatur. Si enim cerebri membrana
uulnus accepit, dolor capitis ualidus subsequitur, oculi feruēt,
rubentq;

rubentq; lingua agitur, mens desipit. Si cerebrum percussum est, ægri concidunt, uox nihil sonat, facies peruertitur, bilis uomitus sequitur, sanguis per nareis erumpit, per autem humor albus puliculæ similis emanat, sanies per uulnus exit. At si in uacuam thoracis regionem telū defigatur, foramine spatiofo permanente spiritus erumpit. Corde uulnerato iuxta mamillam sinisteriorē, telum apparet non penetrant, sed ceu alteri impactum, ac nonnunquā pulsatilem motū ædit, sanguisq; niger effertur, si transitus pateat: extrema frigescunt, sudor emanat, animus deficit, & sine mora exitium subsequitur. Pulmone icto, si spatiosa laxitas est, sanguis ex plaga spumans uacuatur: quum non est, ore magis per uomitū redditur, ceruicis uasa attoliuntur, lingua alium colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri, frigidi appetentes. In septo transuerso uulnerato, telum quidem iuxta spurias costas defixum apparet, in spiratio autem magna oritur, cum gemitu & dolore per totā humeri partium compagem. Quod si abdomen uulnus acceperit, id ex recrementis innotescet, quum latum intus spatium existat, uel etiam telo exempto, uel hastili intus fracto, succus ex uentriculo euacuatur, ex intestinis stercus, interim & omentum, uel intestinum procidit. Vesica autem uulnerata, urina ex cernitur. Itaq; in cerebro eiusq; membranis ictis, caluaria perforata telum eximimus, quemadmodū in capitis fracturis mox dicetur. in thorace autem, nisi telum subsequutum fuerit, per mediocrem intercostalium incisionem, uel etiam una excisa costa, lamina quæ membranam custodiat subiecta, euellemus. Similiter in uentre, uesica, cæterisq; in alto particulis, si quidē telum subsequatur, citra negotium eximemus: sin minus, rursus disione adhibita medicina utemur, quæ cruentis cōueniat. In uentre, si res postulet, etiam suendi eius ratio, quæ gastrographia dicitur accommodabitur, quem in modū comprehensum est. At si in grandiore quodam uase, exempli gratia, in iugularibus uenis quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiam magnis arteriis quæ alas uel inguina intercurrunt, telum dextrum, copiosius sanguinis profluuiū propter exemptionē minetur, ratio est hæc funibus antea ex utraque parte constringere, deinde reli euulsionem moliri. At si particulæ plures confixæ fuerint, uerbi causa, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito cum aliis corporis particulis, uel pedibus

dibus inuicem, siquidem non per totas utraq; partes telū penetrauerit aut hasta, apprehensa hæc extrinsecus, ueluti etiam in una euellemus: sin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte ferra refecata, particulatim singula faciliore figura extrahimus. Quoniam uere & lapides subinde uel buccina, uel plumbum, uel simile quippiam ex funda mittitur, tum ui, tum quod angulosa sunt defiguntur. Agnosces igitur ea, quod moles aspera & inæqualis illabatur, item quod non omnino in rectū tendit diuisio, sed amplior, & caro ueluti cōtusa liuidaq; appareat, adhæo, quod cum grauitate dolor affligat. Hæc igitur conuenit agitata instrumento quo quid attollimus, aut aduersa scalpelli parte, aut uulnerario specillo recipere. si autem fieri potest, etiam forfice extrahemus. Multis autem infixæ tela integra intus insederint, quæ uulneribus cicatrice obductis, deinde longiore temporis spatio partem eam abscessu occupante & dirupto exiliere.

† Hic locus sic descriptus est in vet. Cod. | τὰ δὲ γωνιώτα καὶ τούτων τὰ μὲν διχλῶχινα, τὰ δὲ γλωχινώτα καὶ λόγχωτα καλούμενα, τὰ δὲ τριγλῶχινα, i. alia angulis habentia, & horū quidē alia duos angulos habēt, alia uerō angulū habentia, quæ lonchota, id est, longa ut hasta, alia tres habent angulos &c.

De fracturis, & quot ipsarum sint differentiæ.

Cap.

LXXXIX.

Proximū fuerit tradita carnis uitiorū manu scalpelli, uel curandorū ratione, etiam de ossiū fracturis, dico sanè etiā luxationibus, sermonem instituere, quoniā & ipsæ chirurgiæ generi subijciuntur. & primū de fracturis agam, ijsq; prius quæ in capite fiunt, tum quod inter carnis & ossiū chirurgiam medium locum obtinent, tum quod omnibus partibus caluaria præcellit. In uniuersum igitur fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, à uiolentia quadam extrinsecus accidēs. Cæterum plures fracturarū sunt differentiæ, alia siquidem dicitur fieri raphanidon, hoc est, ad raphani speciem, alia schidacidon, alia eis onycha, alia alphithidon, alia cata apothrausin, id est, iuxta refractionem. Raphanidon igitur ruptura ossis est transuersim per crassitudinem facta, quæ etiā sicyedon & cæledon nonnullis appellatur, ex cucumerū & caulū fractorū similitudine. Schidacidon autem, quasi assulæ modo, est oblonga
ossis

ossis fissura. et onycha, quasi dicas in unguem, iuxta partē aliquam recta est fissura, in extremo lunata: quæ etiam calamidon appellatur. Alphitidon, ad farinæ similitudinē dicta, est quū os in multas tenuis partes finditur, quæ & ipsa caryedō à quibusdam uocatur. Refractio aut, quæ apothrausis dicitur uel etiam præcisio, est quū pars ossis per summitatis rupturā aufertur, ut ablata superinnatet. Atq; tot fracturæ constant differentijs.

De fracturis capitis.

Cap. XC.

Fractura in capite peculiariter caluariæ est diuisio, nunc simplex, nūc multifida, à ui quadam exteriore facta. Porro differentiæ capitis fracturarū hæc numerantur. Rhogme, id est fissio, Eccope, hoc est excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma, id est corporum appropinquatio, Camarosis, hoc est restudinatio, in infantibus etiā Thlasis quod est contusio. Rhogme igitur caluariæ per summa est diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os uitiatū foras emouetur. Eccope caluariæ fissura est cū ossis offensi ruptura. At si à reliquo osse pars offensa discesserit, apocseparnismos nonnulli uitiatū appellant. Ecpiesma in multas partes caluariæ effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo premant. Engisoma caluæ ictus est, in quo os uitiatū ad interiorem cerebri membranā descenderit. Camarosis diuisio caluariæ est, in qua pars affecta cameræ modo exaltata relinquitur, ut Galenus tradit, ac intro à sanis fracturæ partibus ossa magis recedunt, membranæq; innituntur, quemadmodum in ecpiesmate sic enim ille existimat. Alii etiam trichismos, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autē trichismus arctissima rhogme, sensum plerunq; fallens, eoq; latens: quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adferat. Thlasis caluariæ diuisio non est, eoq; nec fracturam rectè dixeris eiusmodi affectionē, uerū est ossis caluæ in interiorem partem impulsio, aut inflexio, concauitatē integra caluæ continuitate tantū efficiens, ut licet in plumbeis ex crudoq; corio confectis uasculis, si foris percutiantur illidanturue, cōspicari. Porro contusionis huius duæ existunt differentiæ: uel enim calua per totam ipsius crassitiē contunditur, ut frequenter etiam cerebri mēbrana abscessū occupetur: uel omnino à caluaria hæc per totum aut non per totū premitur, sed iuxta exteriorē duntaxat

taxat superficiem usque ad laminam secundam deprimitur. Sunt qui his differentiis apechema, quasi dicas ab Echo respon-
sionem, addiderint. Ea est, à contraria ictus parte facta calua-
riæ fractura. At falluntur hi, quoniam non fit in hominis cal-
ua quemadmodum in uitreis quibusdam uasculis fieri illi do-
cent. illa siquidem uacua sunt, ideoq; id patiuntur: calua autē
hominis undiq; plena & alioquin solida est, ac rhogme seu fissu-
ra caluariæ, quæ aliarum complurium capitis partiū ictarum
lapsu, uel citra cutis continui solutionem generatur: quæq; po-
stea abscessu in ea facto, eodemq; secto, apparuerit, in opposita
ictus parte factā esse ipsius uidetur. atq; hoc uitiū quemadmo-
dum prima dicta rhogme curatur. Si igitur fractura capitis fa-
cta fuerit, speciem ipsius ex corpore quod percussit, deprehen-
des, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, aut uiolenter impa-
ctum. Item ex symptomatis quæ icto superueniunt, exempli
gratia, uertiginibus, uoce amissa, aut subito collapsu, præser-
tim in engisomate, aut cōtusione, aut ecpiemate, aut interiori
camarosi cerebro cōpresso: item ex notis quæ à sensu capiun-
tur. Si n. ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam promptè cogno-
scemus: si n. autem diuisio non per totū ierit, aut angusta sit, fra-
cturam tamen esse suspicemur, cutē diuisa, & oculis, & specillo
demisso eam pernoscemus. Si n. ex alijs quæpiam fracturis fue-
rit, inde manifestum euadet: at si rhogme solum angusta & pilo-
sa sensum fugiens, medicamento aliquo nigro, liquido, uel etiā
ipso atramento scriptorio infuso, os rademus, ipsa nanq; rhog-
me nigra ostenditur, conuenitq; rasuræ tam diu insistere, quo-
usque signum rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membranam
usq; peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabi-
mur utrum membrana ab osse recesserit, an affixa permaneat.
Si enim ipsa manet, inflāmatio nulla uulnus infestat, eger pau-
latim febris liberatur, & pus coctum apparet: si recesserit mem-
brana, augentur dolores, & febris similiter, os alium sumit co-
lorem, pus tenue & crudum effertur, & si medicus rem negli-
gentius tractet, nec perforatione utatur, hoc grauiora oboriun-
tur symptomata, nempe bilis uomitus, conuulsio, mentis deli-
rium, febris acuta, in quibus manum admoliri non oportet.
Quod si his absentibus membrana cerebri nō abscesserit, rhog-
me autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, uel si us-
que in altum penetret. Sin autem tantum usq; ad laminam se-
cundam,

PAULI AEGIN.

E

cundam,

cundam, quæ diploe dicitur, fractura peruenerit, eo usq; fādendum est, uel etiam confractum os eximendum, quemadmodum docebitur. At si in tenuia frustra os fuerit comminutum, hæc quoq; diligenter instrumento idoneo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. Ab initio autē quū uulneratū susceperis, hieme quidē ante diē quartū de cimū omnino os auferre tenta co:æstare, ante septimū priusquā cōmemorata oboriantur symptomata. Cæterum manum hoc modo admolieris.

Caluariæ fractæ curatio.

DEraso super uulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuò se secanteis, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. harum autē alterā esse conuenit, quæ iam antea erat, deinde quatuor in uertice angulos excoriantes, ut totum os, quod perforabitur nudum existat: si quidem sanguis fertur, linamentis ex posca obiectis cohibebimus: sin minus, siccis deinde implicito linamento ex uino & oleo iniecto, conuenienti uinculo utemur. sequenti die, nisi recentius aliquod symptoma prohibeat, perforare os uitiatum aggrediemur. Collocato igitur in sedili agroto, aut recumbente prout uulneri conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter sonitum qui ex appulsu redditur, uinculum aliquod uulneris soluemus. linamentis omnibus exemptis, & spongia deterfis sordibus, iubebimus ministris duobus, ut tenuibus fasciis circumpositis, quatuor angulos corporum quæ fracturæ incumbunt, attollāt, & si quidem os fuerit imbecillum, aut natura, aut fracturæ uitio, id scalpris excisoriis acie inter se aduersis, auferemus, primum cauis excisorijs scalpris, quos Græci cycliscos uocant, à latiore incipientes, mox angustioribus, deinde specilli modo angustis, malloleolo sensim adaectis, ad capitis concussionē utemur. Si autem ualidum os fuerit, prius eo terebellis quæ mergi non possint, quas ab argumento a baptismos dicunt, perforato, (eiusmodi uero sunt quæ paulo interius quā cuspis acuta est, eminentias habent, quæ ipsas ad cerebri membranam demergi prohibeant) per scalpra circuncisione usi, id quod uitiatū est, auferemus, non subito, sed particulatim, siquidem fieri potest, digitis: si non, forcipe, aut uulsella qua uel ossa uel pili apprehenduntur, aut eiusmodi quodam instrumento. Locus autē qui inter foramenta est, tantum spatium continebit, quantum maximi mucronis

mucronis specilli longitudo, tam altè uerò descendet, ut interiorē ossis superficiē accedat, cura adhibita, ne membranā cerebri terebra attingat. Quare etiā terebram ossis crassitudinī respondere conuenit, cōpluribus id genus ad hoc præparatis. At si fractura caluariæ usq; ad secundam laminā duntaxat peruenit, ad hanc etiam usq; solum foranda est. Ossē iam ablato, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ prouenit, rasorio aut quodam scalpello excisorio adæquabimus, laminam quæ membranæ custos est, subijcientes, ac ossiculis quæ remanserant, ut uerisimile est, aut spiculis ingeniosè ablati, linamenta inseremus, quē modum diamorosi appellat. Hæc ratio chirurgiæ communior simul & promptior est, & periculo uacat. Item modus qui per lenticulatum excisorium scalpri, fit mirū in modum Galeno commendatur, sine foratione, post insculptionem cycliscis scalpri factam, ipsum adhibenti. Scribit itaque hunc in modum. Si uerò unam semel partem nudaueris, ac scalprium qui in cuspidē præfixam habet retusam leuēque lenticulæ speciē, aciem uerò per longitudinem erectam, submiseris, ubi latam partem lenticulæ super membranam defixeris, malleolo feries, diuidesq; sic caluariā. ita siquidem agentibus, omnia quæ requiruntur, euenient. Nam membrana, ne si dormitans quidē, agas, latæ tantum lenticulæ parti occurrens uiolari non potest. Quod sicubi adhæreat caluariæ membrana, huius quoq; adhærentiam innoxia dirimit rotundum lenticulæ extremū, subsequitur autē præeuntem eam à tergo ipse scalper caluariam secans. Quare nec qui minore cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum inuenias. At quæ administratio ferris & mediolo, quē chœnicion siue chœnicida Græci uocant, peragitur, recentioribus, ceu noxia, improbata est, sed administrationem quam in rhogme exposuimus, probant. Idē uero modus ossium excindendorum conueniet in reliquis etiā caluariæ fracturis. Quantū uero excidere conueniat, Galenus nos, docebit, hunc in modū manifestò scribens. Quod uehementer est confractū id totum auferri debet: si uero ab eo fragmenta quædā longius excurrant, quemadmodum aliquando cernitur accidere, hæc persequi ad extremū nō oportet, illud probè scientes, nullā inde noxā sequuturam, modò reliqua omnia ritè sint confecta. Post chirurgiam panniculo simplici lineo uulneri æquali, rosaceo madeti, cerebri membranam

branam operiemus, exiguamq; lanæ stuppā similiter rosaceo imbutē prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicatū duplex in uino & oleo aut ipso rosaceo tinctū, toti uulneri circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neque hoc astringentes, uerū ut linamenta solū retineat. Viſtus adhibebitur qui inflammationē arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo, superfusa. Post tertium diem, ubi uincula dissolueris, & sordes spongia deterſeris, remedium induces quod crentis iniicitur, & inflammationē repellit superaccommodans membranæ aliquod ex cephalicis dictis aridis, usq; dū carne oppleatur. Nonnunquā os radetur, si hoc res postulet, propter quasdā summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorum materies, ut in uulneribus comprehendimus, ad moueri debet.

De cerebri membranæ inflammatione.

Quoniam frequēter cerebri quoq; membrana post chirurgiā inflammationem experitur, ut non solū caluariæ crassitudinē, sed etiā cutem ipsius excedat cū renixu, & ut naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & conuulsio aliāq; grauiā symptomata uel ipsa mors subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuti quadam ossis eminentia pungere ducitur, aut ex linamentorū grauitate, aut perfrictione, aut multo esu, aut uini potione, aut alia quadā occasione latente. Si quidē ex manifesta occasione inflammationē contraxerit membrana, ea protinus amputanda est: sin ex latēti, magis pugnare cōuenit, † ut pote sanguinis dimissione, si causa nō obstiterit, uicū qui inflammationi cōgruat. Itē loco induci remedia debēt, calētis rosacei foras & superfusio ex altheæ decocto, aut fœnugræci, seminis lini, chamæmelorum, similiumq; cataplasmata uerō ex cruda ordeī farina, aut lini semine, cū prædicto decocto & gallinarū adipe, adhæc fomētū ex lana adhibebitur. Capiti & occipitio meatuiq; auditorio oleū aliquod inflammationem prohibēs instillabitur. Viscerū quoq; cura habēda est, cataplasmatibus adhibitis, itē toti corpori prospicere, consilium est, in calidā id aquam, ut par est, collocantes inungentesq;. Si perseverat inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamento quod bili ducendæ est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.

† Rectior

ἡ κείνη ἐστὶν ἡ φλεβοτομία χρωμένως ἐν μηδὲν κολύσι, ἢ ασιτία, ἢ τὴν πρὸς φλεγμονὴν ἀρροζούσῃ διαίτῃ. Id est magis pugnare oportet, uel uenam secantes, si nihil prohibet, uel inedia, uel uictu inflammationi conuenienti.

Si membrana cerebri nigruerit.

Cerebri membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, † mel triplum rosaceo miscētes & per linamenta id applicātes, curabimus, deinceps & reliqua admouētes. At si nigrities sua spōte prouenerit, idq; in imo potissimū, cū aliis grauib; indicijs, attingi tūc non debet, ut quæ natiuū calorē emortuū innuat. Noui quendā qui post annum quā̄m affectu cōflētaretur, caluaria perforata superuixerit, erat enim fractura in sincipite ex telo facta, emissariumq; habēs per quod etiam membrana ab offensā immunis conseruata est.

† Græcus codex antiquus μελιτι τριπλῶν μίξαντες ῥοδίνω. Id est, melli triplum rosacei miscētes.

De naribus fractis contusisq;. Cap. XCI.

Narium pars ima, quū sit cartilaginosa, frangi nō solet, sed contundi, sima fieri & perueri: superior quæ ossēa est, nōnunquā frangitur. In his autē deligaturā damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquā in his quæ ex ictu per medias nareis emineant. in his enim cōuenientē fasciā, cū medicamine imposito assumit, ut cōpressæ nares naturalē figurā recipiāt. Fractis igitur naribus, in ima quidē parte, ind ce aut paruo digito demisso in exteriora dirigētur: in interiore, ēt scalpelli nucleo id faciundum est, primo statim die, aut nō multo post. Quū uero decimo die naris ossa cōtinentur, extrinsecus indice magnoq; digito hāc efformare cōgruit. Vt autē figura quā fingis non cōcidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, unum singulis nasi foraminibus, & si altera dūtaxat naris pars sit peruersa: eaq; sinere cōuenit, donec os aut cartilago contineat. Nōnulli fistulas ex anserū pennis pāniculis replentes, naribus insinuarūt, quò figura custodiatur, & respiratio nō impediatur, quod nō necessariū puto, quū spiritus per os trahatur. At si inflammationē nares sentiant, medicamentū aliquod quod eam arceat indemus, exēpli gratia, ex succis inscriptum, aut quod

oxelæo constat, aut eiusmodi aliquod, uel ex triticea simila & thuris fuligine seu gūmi una incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationē, tum ut nares cōtineātur. Quod si in alterā partē nares distortæ, Hippocrates postquā commodē eas figuraueris, oblongā habenulā digitali latitudine iubet circundari, alterā ipsos extremū taurino glutine, aut gūmi illitū summæ nariū parti agglutinari, ex latere quō inclināt. ubi illa exaruerint, habenā transferre per aurē oppositā uersus occipit. & frons ē oportet, deinde ipsi sub altero habenæ principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediam dirigātur figuram, quod nō admodum recentioribus placuit. Porro minutim confractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut superiorē ipsarum partē cōuenit, ac frugmenta ossiculorū uulsella auferemus, suturis diductas partes cōmittentes accommodantesq; ipsis remedium quod cruentis aptum est, & cōglutinat. Sin autem extra nares ulcus fuerit excitatum, linamentis in longitudinem implicitis curabimus. Sūt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci dicūt, usq; dum cicatrix fuerit obducta usi sunt, ne caro ex ulceribus supercrescat.

De maxilla confracta, & aure contusa. Cap. XCII.

DE aure contusa tertio libro tractatum est, tanquā huiusmodi affectio ad fracturas non pertineat. Maxilla multas ob causas frāgitur. Si igitur extrinsecus solum offensa, non per trāuersum fissā, introrsus cauata fuerit, promptum sanē est cognoscere, Opus autē est altera manu, siquidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si altera, sinistra. indice igitur & medio digito in affecti os demissis, interiorē fracturæ extrantiam, probe foras cōpellere conuenit: altera manu foris eā excipiente. Rectitudinē uerō maxillæ ex eiusdem dentium æqualitateprehendemus Quod si fractura per transuersum facta fuerit, primū tensione, deinde retractione, quā antitaxi uocāt, partis in cōtrariū, usus, ministro eā cōtinente, ut dictum est, dirigere aggredieris: porro denteis in parte cōfracta diductos, inter se, ut Hippocrates præcipit, auro deligare, nēpe lino ab auro chrysolino dicto, aut chrysonemate: qm̄ uero huius facultas nō omnibus cōceditur, lino ualido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo, Verūm si quidē cū ulcere fractura

Atura euenerit, specillo tentandū, nō tandem ēt refractio ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os unū refractum, aut plura remanserint, idoneo instrō auferentes, suturis oras ulceris cōmittemus, & medicamento cruētis apto usi deligabimus: sin aut citra ulcus cōtigerit, ceratū simplex maxillæ impositū conuenienter deuinciemus. fasciæ medium per occiput dispeniabitur. habenulæ utrinq; per aureis ad summā maxillā, inde rursus ad occiput, mox ad mentū, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub imā occipitii partē, distribuentur, ubi & fasciā desinere oportet. Super hæc rursus uinculum aliud fronti circumdatum, quod epislema Græci dicunt, post caput cōiugetur, oēs prædictæ fasciolæ id circum astringēt. Alij uero tenuem ferulā, quē admodum alij corium, quod æquē sit longū impositum maxillæ, deligant, ut commemoratum est: reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiā, quasi dicas capistrū, utuntur. At si utraq; maxilla in summo mento auellatur, qua etiam parte coeunt, ambabus manibus parum inuicem distantibus, rursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo diximus, deligato: † ac congrua usus ligatione, tenui ac sorbili alimento ægrotantem nutrirī iubeto. Nam mandere ipsi inimicum est. Si aliquid emotū à figura conuenienti putaueris, tertio die soluens, iterum illigato, quod tam diu facies, quā callus fracturam firmarit. firmatur autem maxilla intra treis potissimū septimanas, quoniam laxa & medullæ plena est. Quod si inflammatio aliqua superuenerit, ne aduersus hanc quidem tum fomenta, tum cataplasinata negligere oportet. Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te cupierim.

† Antiq. codex, καὶ τῇ προσήκῃσι χρησάμενος ἐπιδέσει κέλευσον ἡρεμεῖν λεπταῖς καὶ ῥοφηματώδεσι τροφαῖς χρωμένοις, & congrua usus ligatione, iubet ut quiescat & tenui ac sorbili uictu utatur.

De ingulo confracto.

Cap. XCIII.

Ingulum, quod etiā clauicula dī, quū naturaliter figuratū est, interiore ipsius extremo, cū pectore cōmittitur: exteriore, cū summi humeri cōpage, seu articulamēto adunit. eoq; si humerū, aut ipsum sustinēs brachiū, fracturā quacunq; tandē parte experiatur, quā humerū suū spectat, p'lerunq; infra interius extremū fertur, una cū brachio detractū. Præstite-

E 4

rit au-

rit autē per transuersum potius quā assulatim, aut arundinis modo, hoc est, in longitudinē clauiculā frangi, quod uulgo receptum est. Nā trāsuersim cōfractū, extensione cōpressionēq; digitorum prōptē in naturalem figurā reuertitur: cætera uero eminentias habent, quæ ægrè possint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinē quocunq; modo, iugulū fractum fuerit, duo ministri, unus ad humerū eiusdem lateris fractæ clauiculæ manibus circūinectis, brachiū ad exteriora simul & sursum trahens, alter oppositū humerū, aut certē ceruicē attrahens, retractionē à se, quā Græci uocant antitafin, molientur: medicus suis digitis fracturā diriget, prominētiora pellendo, ima foras attrahendo. Quod si maiorē retractionē à se desideret, orbiculū bonæ magnitudinis ex panniculo, aut lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subijciens, curbitū lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictū est, exequetur: si aut id nequeat, extremum clauiculæ iuxta humerū in alto sitū ad superiora, agrotāte resupinato, educet ceruicali quodā mediocri, dorso subiecto. ministro humeros duos ad ima deprimēte, ut os clauiculæ quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturā conformabit. Porro si partē aliquā iuguli refractā, instabilē. aut ēt pungentē percipiamus, scalpello in rectū diuisam eandē auferemus, ac reliqua scalpris excisoriis, lamina quæ à tuendis cerebri mēbris menyngophylax dī, aut alia quæ ex cidēdis supponit propter firmitatē clauiculæ subiecta, exæquabimus & siquidē inflammatione careat, suturis: sin aliter est, linamētis utemur. & spleniis diuersis præparatis ad ossis eminētis inclinationē, maiora ex eis & crassiora superaccōmodabimus, si inflāmatio infestat, oleo imbuta: si minus, sicca, ac mediocri ex lana orbe propter alā subiecto, cōuenientem inducemus deligaturā, per axillas, affectā clauiculā, scapulasq; prout res exigit, deligātes. & si quidē ad ima tetenderit pars clauiculæ humero proxima, latoris habenulæ dimidiū, eiusdem cubito subiicientes, totum brachium ex collo suspendemus: altero autē uinculi dimidio, manū, quemadmodum in iis sit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si uersus superius extremum inclinauerit, quod raram est, brachium suspendi non debet, uerum resupinus æger decumbet, & tenui nutrietur uictu. si uerò opus est, etiā fomentis adiuuabitur, sed pro ratione, usq; dum callus eam firmarit. id quod fit plurima ex parte diebus uiginti.

De sca-

De scapulis. Cap. XCIII.

Scapulæ quæ latæ sunt & mensæ figurâ repræsentant, non franguntur: iuxta spinam uero fracturam sustinent, nunc compressæ, nunc rupturam simplicem expertæ, interim etiam refractæ. Compressionem itaq; tactu cognoscimus, si caua occurrat, stuporem proximi brachij, & dolorem pulsatile inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci doloreprehenditur: ambo autem ratione qua inflammationē arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur: leuis ac modica fascia conuenienti adaptatur: aucta uero & pungens ablatione per scalpellum adhibita & futuris, ut prius dictum est. Fasciæ autem & hic similiter ut in clauicula iniiciuntur: incubitus oppositi lateris conueniet.

De pectore. Cap. XCV.

Medium pectus, diuiditur imprimiturq;: summū, refringitur. Rupturam itaq; per medium factā dolor loci & inæqualitas sequitur, & strepitus digitis innixis eliditur: impressionē uero dolor uehemēs, spiradi difficultas, tussis, membrana quæ costas incingit dispūga, nōnunquam etiam sanguinis eruptio, partis cōfractæ cauitas, & in cedendo faciliras. Cura rationem eam adhibere oportet, quā in scapulis prodidimus. In impressione autem adaptatio Hippocratis adhibebitur, quā ille in clauicula quæ foras processerit, usurpat, per incubitum supinum cervicali dorso subiecto, scapulisq; constrictis, ita ut costæ utrinq; manibus simul contrahantur. Iam uero costis lana obtectis circularem adhibebis deligaturā, loris prius in rectum subditis, postea duorum initia inuicem excipiuntur, quæ orbiculares fascias decidere prohibeant.

De costis. Cap. XCVI.

EX costis quæ pleuræ & spathæ Græcis dicuntur, ossæ quidem omni in parte rupturam sustinent: spuria autem in ea tantum quæ spinæ adiacet. nam hic solum ossæam habent naturam: in exteriori parte in cartilaginē degenerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. Notæ ipsarum nō sunt difficiles, etenim inæqualitas digitis explorantibus occurrit, strepitusq; & ad cōfractum adductio. Quod si intro spectauerint, dolor uehemens punctorius sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, q̄ aculei modo membranam costas

stas integrentem conuulneret, item ægra respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde comitatur. & reliquas utiq; declinationes digitis licet cōformare, eam uero quæ intrò spectat, nequaquam, q̃ tendi nequeat. unde alii cibum flatulētum uberemq; assumi iubent, ut fractura ex inflatione & tensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto. Nihil. n. cōmune ad hoc inter se habent, tū thorax, tum uiscera nutritoria, præterquam q̃ inflammatio ēt ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulam adglutināt, q̃ à ratione & uia curandi alienum non esset, nisi particularū ex attractu, collectione, fracturam amplius ad interiora propellerent. Quapropter Soranus hunc in modum scribit. Lanis oleo calido madentibus partes cōtegentur, & linamentis implicitis intercostale replebitur, ut deligatura æqualis iuxta orbicularem circumductū ueluti in pectore fiat. Omnia uero ut in pleuriticis fieri debent. ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compellat, q̃ membrana costas cingens uehementer cōpungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem deregere. deinde lamina, ne tunica costas tegens cōuulneretur, prius subiecta, officula quæ pungunt ingeniosè excindere ac eiicere oportet. postquam hoc feceris, ea sanè quæ inflammatione carent cōiunges. & cruentorū modo curabis: quæ aut illa affligūtur, linamētis oleo madidis operies uictū curationemq; adhibens inflā mationi dicatā. Decumbēt ægri ea figura quā facilins tulerint.

De coxarum & pectinis ossibus. Cap. XCVII.

COxarum aut ilium ossa rarò quidem franguntur, sed easdem cū scapulis differentias sustinent. Frangūtur. n. in extremis, rumpunturq; in longitudinem, & per medium comprimantur. Comites notæ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, punctiōis pulsusq; sensus, cruris in eodem latere subitus stupor propter cōpressionē, adaptationem uero scapulis simile postulāt, auersantur aut solam ex chirurgia eius quod fractū est, exemptionem per externas partes. nā si opus sit, digitis cōformantur. deinceps aut etiam aliam curationem moliri oportet, & fomentis utendo, & cōcaua ilium linamentis adimplēdo, quò deligatura ceu fasciis circularibus, superiniectis, æquabilis efficiatur. Eadem ēt dicenda sunt, de pectinis ossibus, nihil enim peculiarius de ipsis dicere habemus.

De uer-

*De uertebriis, spina dorsi & sacro osse.**Cap. XCVIII.*

VErtebrarum complexus interim sanè contusionem, raro uero & fracturam experiuntur, propter quæ contusis spinalis medullæ mēbranis, uel ipsa ēt medulla, nervi in doloris consortium adducuntur, & mors præceps subsequitur, magisq; si ceruicis uertebra affectus infestarit, unde præfatus periculum, siquidem fieri potest, audebis ēt sectione ossiculum quod premit eximere: si minus, ratione saltē qua inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus uertebra- rum aliquis unde spina constat, fuerit refractus, digitis tentantibus promptè occurreret, dum refractio mouetur, rursusq; in locum transponitur. Conuenit aut id quod refractum est auferre, cute extrinsecus incisa: futurisq; commissa, remedio cruentis idoneo uti. Cæterum osse sacro confracto, index sinistrae manus digitus in anum demittendus est, dextra manu quod confractum est, quatenus licet, in naturalem figurā reducere oportet. Si autem aliquid refractum sentiamus, hoc quoq; diuiso, deligaturam curationemq; congruam adhibebimus.

*De brachio.**Cap. XCIX.*

IN brachio confracto Hippocrates quidem intentionem hoc pacto molitus est. Lignum, inquit, oblongum manubrij ligonis modo, per summa fune deligatū, obliquum ex trabe quadā suspendere oportet: collocato autem homine in sublimi quodā erectius, quā iuxta figuram qua recta ceruice dormimus, orthocatheudon dī, manū ipsius super cōmemoratum lignum traducere, ut mediū ligni alæ eius transuersim adaptetur. manum aut inflexo iuxta rectū angulū cubito, minister procūbens continebit, deinde graue aliquid, exēpli gratia, lapidē aut pondus plumbeū uel eiusmodi quippiam ex cubito suspendens, sinensq; pendere sublime, ita fracturam cōformabis: uel loco ponderis, famulus ad ima brachiū detrahat. Nonnulli uerò loco manubrij ligonis gradu scalæ usi sunt. Soranus hunc in modū tradit: ægro in sedili collocato, uel, quod satius est, resupinato quò minus molestiæ sentiat, manu fune ligata iuxta compagem qua ipsa cum brachio cōiungitur, & ex ceruice suspensa, ut angulosa ipsius figura seruetur, ministris duobus

bus iubeamus, huic, supra fracturā, illi, infra digitos circumponant, atq; sic tensionem perficiant. Quod si ualētior opus sit tractione, duos funeis æqualeis brachio circundamus, unum, supra fracturam: alterum, infra. atq; uni famulo super ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funiū tradentes, iubeamus in diuersa brachiū distendere. At si summus humerus fracturā senserit, dimidio uinculi, quod circa dicitur, alæ subiecto, reliquā partem iuxta caput teneri iubentes, alio quod oppositū est retrahente, antitafin, hoc est à se retractionē uti dictum est, moliemur, quēadmodū sanē si cubitus confractus fuerit, illi uel iuncturæ manus cū brachio funis iniicietur. Ossibus iam fracturæ probè coaptatis, distentio quidem remitteretur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem deligabitur. Porro si fractura inflā matione uacet, recensq; sit, lineis utendū fasciis oblongis abūdē, circa treis quatuorue digitos latis, aqua madētibus, aut ēt posca: si inflā matio adest, lanis tenuibus mollibusq; oleo imbutis: & si quidē in medio brachij fuerit fractura, initiū fasciæ super fracturā iniiciet: ubi his tēruē illigaueris, sursum fasciā ducere cōuenit, ut (quēadmodū inquit) sanguinis influxiones excipiātur, atq; illic finiat. Iam uero & secūda fascia uti oportet, initiū eius similiter supra fracturā iniiciēdo, atq; alia eo modo quo in priori: rursus aut supernē deorsum, atq; iterū sursum reuocare, illic ēt sic terminabitur. Porro cōstrictio mediocris esto, tū nostri sensus, tū ipsius ægrotantis iudicio. At si iuxta summā humeri cōpagē cōtigerit, priore fascia illā & scapulas, & pectus cōprehendes, ut deligatura fiat quā Græci geranida appellāt, perq; secundā usq; ad cubitū dispēsabis, ac inde ad supraposita recurre, cū summo humero scapulas pectusq; cōprehendens, primæ fasciolæ similiter. Quod si iuxta cubiti flexū fractura obuenerit, ēt cubitū colligare expedit, ita ut angularis figura cōseruetur. similiter in aliis quoq; artubus, nimirum cubito, femore, tibia, cū fractura in parte, aut ēt iuxta articulamentū & nō in medio mēbro existit, post articulū fasciam iniicere expedit Recētiores itaq; secundum deligaturam protinus ferulas ēt iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione postulat: ueteres autem, à die septimo ferulas accommodarunt. nam intra hunc inflammatione declināte membrū redditur tenuius At Hippocrates tertio quoq; die ligamēta solui iubet,

iubet, ne tensio quæpiã, aut motus præter solitũ cõtectæ parti-
culæ obueniatur, aut eius quod iam infixum fracturæ est, perspi-
ratus prohibeantur, propter quos non solum noxijs pruritus
quibusdam accidit, sed etiam erosa è saniei acrimonia nonnun-
quam cute, exulceratio concitatur. Itaque aquæ temperatæ
tantum superfundere ratio est, quantum saniem discutere suf-
ficat. Post septimum diem, ex maiore interuallo soluere con-
uenit, ceu partes non amplius saniem excernere desiderēt. imò
etiam calli obfirmatio hoc modo feliciter prouenit. Cæterum
ferulæ iuxta sequentem rationem debent iniici. Splenia tri-
plici oleo imbuta super fascias circundantur. Si igitur mem-
brum crassitudine fuerit æquale, similiter: si inæquale, partibus
magis concauis per splenia repletis, æquale ipsum crassitie fe-
rulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut stuppa ferula
mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circundamus, non
minore quàm digiti spatio inuicem distantes, easque mode-
ratè constringemus: ita tamen, ut quatenus fieri licet, ferulas
propius accedere articulum prohibeamus, præsertim iuxta in-
teriore flexus partem. ulcera siquidem in ipsis nonnunquam
& neruorum inflammationes pariunt, uerum. illic laxiores ip-
sas esse oportet, quemadmodum ualentiores, ubi fractura cur-
uatur. Præstiterit autem thoraci etiam brachium mediocri-
ter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruertat. At
si quandoque inflammatio fuerit, (eam uerò agnosces ex am-
biente tumore, ac rubore, & quod membrum nunc multò ma-
gis quàm prius stringatur) uel si confractum membrum, di-
stortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, uel
econtrario strictiora, quàm par est, inueniantur solutis ipsis de-
ligatura instauranda est. Resupinari igitur egrotus debet, ita
ut super stomachum manũ contineat: brachio subijciatur mol-
le quiddam pellem super se habens, ut superfusionum influxus
excipiat. Superfundetur autem quotidie oleo calido, præser-
tim quum urget inflammatio, quando etiam cibus tenuis exhi-
beri debet: postea mediocris, ad calli generationem quies indi-
citur usque dum fracta occalluerint. occalescunt autem bra-
chium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solue-
ris fascias, & lauacro usus fueris, emplastris ad fracturas factis
perfanare conuenit. hæc tractandi ratio omnibus alijs prope-
modum confractis artubus conuenit.

De

Cubitus radiusq; interim uterque iuxta eundem locum frangitur, interim alter duntaxat, uel in medio, uel in parte iuxta flexuram, aut brachiale. Omnium itaq; deterrimum est quā ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, alijs facilius curatur. siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut ueluti insideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maximè intentionem ualidiorem moliemur: si uterq; similiter intēdemus, manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur. sic enim cubitum radio subiici contingeret. At si ualentiore opus sit intentione, ambobus potissimum confractis, non solū manibus, sed etiam funibus intendere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Cæterū omnis deligatura, & reliqua præsidia, una cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum uendicat, præter ea quæ ipsi subiiciuntur.

De summa manu, & ipsius digitis. Cap. CI.

Brachialis & aduersæ eius partis, & in digitis articularū ossa, quā laxa fistulosaq; natura sint, contunduntur quidem plerunq; raro autem franguntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus in altero quodā æquali aduersus sedebit, priusquā manū imponat: ac tensis per ministrum iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa cōformabit; pollice & indice digito prius cōpressā. deligatura utetur, quo tempore urget inflāmatio. Nā propter laxitatē facilē in ipsius callus amplior concrefcit. At si acies digitorū, aut digitus simpliciter confractus est, siquidē magnus & pollex appellatus, fuerit, post commodam deligationem ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dimoueat: si ex alijs quispiā, uel index, uel paruus digitus, proximo colligabitur: sin aliquis ex medijs, iis qui utrinque habentur, uel etiam omnes deinceps ligari unā debent, melius enim conquiescunt. quemadmodū si confracti ferulis quoque colligentur.

De

De femore.

Cap. CII.

EAdem de femore dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus. peculiariter autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorē promouetur. etenim in his naturaliter dilatatum est, instauratur autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus, una, supra fracturam posita: altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdato, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partem contineat, trademus: infra autē fracturam fune circumposito initia ad intentionem alteri ministro exhibebimus. Quod si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra fracturā injiciemus, initia eius ad extensionem dispensamus, genu etiā ipsum implicito quodam fune continemus. hanc autem partē restituiamus ægro decumbente, & crure exporrecto: quæ pungunt ossa ut subinde dictum est, eleuata, superius tollemus. reliquam curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circà diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinā, comprehensum est.

De patella.

Cap. CIII.

Patella os laxū est ac molle, ualidè corporibus superiore & ima parte cōprehensum. frequēter sanè contunditur, rarò autē frangi solet. sustinet autē rupturā per crassitudinē, & in tenuia fragmēta finditur, cū uulnere, uel sine uulnere. Nota uero cōspicua (motus. n. continuitatis intercidit) & cauitas & sonitus. Instauratur autem pars cruris extensa, nam quæ bifariā fissā est digitis eousq; cōmittitur, donec fracturæ labra supra sese contingant, & inuicē iungantur: quæ uero in tenuia fragmenta fissā est, manu cōformatur. etenim callo nō generato, eo quod pars utraq; per musculos cognatos & neruos, à femore & tibia in contrarium non retrahatur, tamē multitudo distentionis contrahet, & functionis difficultas affectis inducet, neq; enim laborātibz ipsis diutius genu sustinet, & obambulādo illi impediūtur, præsertim ascensuri: siquidē in æquabili per planiciē motu actionis difficultas occultatur in ascensu autē, eo quod genu, in crucis eleuatione & positi non inflectatur, deprehenditur. Iam uero ossiculum si quod pungit, eleuatū prius eximito, ac curationē consentaneam adhibero.

D

*De tibia.**Cap. CIIII.*

Tibia cubito respondens, eandē curationem recipit. etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone Graecis, quasi fibula, latinis sura dictū easdem fracturarū differētiās recipit in omnem enim partem distorquetur, quū ambo ossa confracta fuerint. in treis autē, quum alterum, intra & extra: tibia quidem, retro: sura, anterieus quapropter etiam ipsa similiter restituitur manibus, aut funiculis superioribus, quā fracturæ funes sunt, interim ipsi tibiæ circumdatis, interim femori. Nam quum genu sit ualidius, articulum integrum per tentiōnem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ funiculo, ut in cubito dictū est: reliqua ut in capite de brachio tradidimus.

*De pede summo.**Cap. CV.*

Talus nequaquā frangi solet, eo quod undequaq; tibia, sura, & osse quod ob tessaræ similitudinē uocatur cyboides custodiatur minuaturq;. At os quod à cymbæ figura dicitur scaphoides, & supernæ pedis regionis, item pedis digitorum ossa, ipsumq; cyboides, similiter iis quæ in brachiali & opposita eius parte, manusq; digitis sunt, franguntur. quare etiā quæ de illis diximus, ne eadem repetantur, illinc huc transferre consilium est.

*Quomodo crus reponi debeat.**Cap. CVI.*

Femore fracto, aut tibia, non minori cura repositionē ipsius, quā reliquā curationē obibis. Nā: partiū confractarum æqualitas, hac potissimū probè administrata, conseruatur. Nonnulli igitur canali, quā solenam Græci dicunt, nunc lignea, nunc fictili, membrū fractum, aut etiam crus ipsum reposerunt: alij uerò sola ea quæ cum uulnete fracta sunt. eo q̃ hæc ferulis nequeant constringi. in totum uerò solenarū usum posteriores damnarunt, multis sanè de causis, sed præcipuè, q̃ ipsarū duritia partibus negotiū facesseret. Neq; tamen alienū est, artus cū uulnete fractos ferulis excipere, ut ostēdemus. Aeger itaq; resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum cruri æquale, in longitudinē utrobq; contractū & inuolutū, ut canali per mediā concauitatē oblongā proportionē respōdeat, subijciatur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones excipiat, deinde in longū crus concauitati huic canalē

nalet referenti, insinuabitur. à lateribus alia uestimenta lanae ve apponentur, ne membrū in latera declinet, pedis autem ima pars asserculum rectū panniculo circumdat ū, propter molitiē, assumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarū duarum trium ve, uestimēto canalis modo præparato subiicientes fractum membrū ipsi leuiter deligabimus. At si æger non tolerans conetur pedem totū contrahere, conuenit id facere quod in superiore pedis parte dictum est, deinde blandè cum asserculo deligare, ne inuiti inter dormiendū, ut uerisimile est, pedem contrahant. Aliqui uerò etiā stragula lecti per medium perunt, ut ipsi sint immobiles, & per foramen urina & stercus reddatur, usq; dum callus coalescat.

De fracturis qua cum uulnere incidunt. Cap. CVII.

Fractura cū uulnere facta, siquidē sanguis profundatur, hunc prius sistemus: si inflammatio fuerit, præsiidiis in eam efficacibus utemur. Carnibus contusis, partē affectam scarificabimus, metu, ne in gangrænā incidat, sublato: at si illa quoq; accesserit, aut alia quæpiā serpens putredo, conuenienter occurremus habes autē horū singulorū curationē quarto uolumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, neq; ossa largiter denudata sint, hamulis, suturisq; usi, remedio cruentis apto, his medebimur, sic, ut ossicula refracta, ut uerisimile est, & pungentia innatantiaq; primū auferamus. Quod si magnū aliquod os emineat nō commissum propter magnitudinē, in intentione huic prospicies. Siquidē Hippocrates femorē & brachio contractis ossa excedentia statim eiicere dehortatur, periculū his futurum prædicens ex inflammatione, quam tensio crearit, uel etiam cōuulsione, ut credibile est, musculorū neruorumq;. Tempus uerò nōnunquā administrationē cōmodam inuenit. In quocunq; igitur ossē quod ex sede sua excidit, manū admo- uere uolumus, nequaquā in inflammatione aggrediemur, sed primo statim, die, antequā inflammatione occupetur: aut no- no, inflāmatione iam finita. Adaptamus uerò ossa uectē quam Græci mochliscon uocāt, est autē ea instrumentū ferreū septē octo ve digitos longū mediocriter crassum, ne inter cōmouen- dum inflectatur, acutū in summo latumq;, & leuiter inflexū, cuius acutum extremū superposito ossis tuberculis subiicien- tes, ex altero in oppositū tendentes simul, & mediocri inten-

PAULI AEGIN.

F sione

sione membri facta, inter se finis fracturae commitemus. quod si facere nequeamus, scalpris excisorijs obuersas acies habentibus quod eminet auferemus, aut ferra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus: ossiumque asperitudine adaequata, & membro directo, medicamentis quae in linteolis inmanetur, curabimus. Maximè autem animum adhibere oportet in membris coniugalibus, aut à iugis appellatis, altero autem in ipsis ossè particulatim ferra abscisso, ut membrum in contractum maneat, etiam intensione accurata utemur. deligatura uerò hoc modo adhibenda est. Circulares itaque fasciae, partibus uulneris utrobique iniici debent: obliquae uerò, per ulceris longitudinem, ut in litera Graecae X similitudinem conclusio omnium fiat. Si sordidum adhuc ulcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quae carnem inducunt, linteolis illita, aliamque comprobata usu materiam. Hippocrates pissera emplastro in linteolis utitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulae iniicientur. aliqui uerò per initia ipsas accommodant, ulceris locum uitantes, & pro usu urgente ipsas constringentes, uel rursus remittentes. In quibus autem squama ab ossè recederet, notabimus quidem hoc, inde quod copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem ulceribus uacua inanisque facta attollatur: deligatura quidem laxiore ad curationem utemur, hamulo autem, aut eiusmodi quopiam squamam euellentes, iterum ualidiore deligatura utemur. porro per totum ulceris tempus medicamen aliquod ex ijs quae inflammationem arcent linamento illitum, uulneri incumbet, ac simplices fasciae iniicientur, quae singulis curationibus solui debent, quum aliae supra dictae maneant, ut in capite brachio expositum est.

Si praeter modum fracturis callus obducatur. Ca. CVIII.

Immodici fracturarum calli indecoram omnino specie efficiunt, nonnunquam etiam functiones impediunt, si prope articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remedijs admodum astringentibus utemur deligatura ipsa accommodantes. Nonnunquam uero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur, efficimus. At si lapidosus solidusque fuerit, incidentes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes: si res exigat, etiam terebris usi.

Si

Si distortum membrum callus firmarit. Cap. CIX.

Q Vibus membrum distortum callus firmaverit, difficultate functi onū obeundarum haud exigua subsequente, præsertim si in pedibus fuerit, repositionis quidē modus nō recipiendus est, ut qui extrema inferat discrimina, uerū si callus nondū radices egerit, laxatibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficis pinguibus & colubarū stercore, alijsq; medicamentis quæ à callo soluendo porolytica dicuntur, utimur. Insuper per manus frictione, & contractione hunc dissoluemus. Quodd si lapidosus euaserit, scalpello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortiū ab osse liberabimus, deinde fracturæ medebimur, ut superius à me dictum est.

Si fracturæ callo non firmentur. Cap. CX.

F racturæ nonnullæ sine callo permanēt, suprā definitū naturæ tēpus, aut ob cōtinuas resolutiones, aut immodicas superfusiones, aut motū intempestiuū, aut fasciarū copiā, aut quia totū corpus alimentum nō percipit, in quibus etiam tenuius fieri membrū contingit. Itaq; cum alias occasiones, tū maximè corporis inediā tollere conandum est, partim per calidiora alimenta materiam particulæ distribuendo, partim cibū subministrando sufficientē, item lauacra, & reliquas animi uoluptates. Porro notæ eos qui callo iam firmanentur comitantes, hæ inter alias sunt præcipuæ, si fasciolarū cruorē referāt, et non ob orto uulnere, quod forsā accidit, calli substantia quando coalescit fistulis ossium inspersas sanguinis guttas extūdentes.

De ossibus luxatis. Cap. CXI.

Q uum luxationes fracturis proximæ sint, de ijs uerba facere aggrediemur. Luxatio igitur est, ut summatim dicam, quum articulus à proprio sinu, ad insolitū excidit, in qua motus arbitrarius impeditur. differentias ipsius alias dicere non habemus, nisi eam dūtaxat quæ ex maioris minorisq; ratione sumitur quum enim articulus in totum exciderit, communi generis uocabulo affectus Græcis exarthrema, latinis luxatio dicitur: quum aut aliquatenus duntaxat emotus est, aut usq; ad superficiem è sinu elapsus, pararthrema.

De maxilla. Cap. CXII.

R uersus à superioribus incipientes de maxilla dicamus. Nam quum malæ sint immobiles, luxatione non periclitantur.

clituntur. maxilla autē toto loco non mouetur, quod capita ipsius malis firmiter ac tutò insinuata sint: modicam uerò peruersionem quam pararthrema uocauimus, subinde experitur, quòd ob musculos qui ipsam continent ex continuo mandendi loquendiq; exercitio in mollitiē elanguescentis, qualibet de causā facile laxetur, quod uerbū apud Hippocratē *σχαται* dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus spòte in proprium locū reuertitur. uerū de maxilla in totū luxata, satis est illius uerba exponere, quæ compendiosa, integra, & perspicua existunt. Scribit itaq; hunc in modū. Excidit quidem maxilla rarò, laxatur autē subinde oris hiatu, quomodo etiā aliæ plures musculorū neruorumq; peruersiones, id efficiunt. Clarū itaque hinc potissimum est, quandocunq; exciderit. Nam maxilla in anteriora prope litur, & ad contraria eius unde prolapsa est, peruenit, ossisq; tuberculum iuxta malas tumidus apparet, difficulter ægri maxillam cōmittunt. Qualis autē repositio ipsi congruat, manifestò liquet. alium. n. continere caput oportet, alium comprehendentē ab interiore parte & euteriore digitis iuxta mentum hiantē homine quā mediocriter potest, primū quidem maxillā commouere aliquādiu, & huc, illuc manu diducere, ipsiq; homini iubere, ut laxam maxillam habeat, simulq; remittat, & concedat, ut repentē potissimum laxetur. tribus pariter figuris, mente adhibita. Ratio siquidem est illam ex peruersione in naturalem statū reducere. Oportet autem maxillam in posteriora propellere, item cōsequenter his committere, neq; hiare. Insertio igitur hæc etiā in aliis figuris fieri non poterit. medicīna autē modica sufficiet, spleniū, appositum ceratum fascia laxiore deligare. Sed tutius est, resupinato homine firmare caput ipsius puluinis subiectis quā plenissimis, ut quā minime cedat. Cæterum ulnerati caput aliquis continebit. Sin autē utraq; eadem maxilla eluxata fuerit, curatio quidē adhibebitur: uerum cōmittere minus hi os possunt, ut quibus prominentiores maxillæ sint. rectitudinem autē in deflexam maximè cognosces. dentiū & superiorū & inferiorū terminis, secundū horū directam aciem confert illas quam citissimè inferere. quomodo autem inferentur, expositum est. Quòd si locis suis non insinuentur, & periculū de anima subsequetur ex febribus continentibus, & torpido Caro. Nam musculi hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, Carū inducunt.

inducant, uenter solet his biliosa deijcere, uel syncera pauca & si etiam uomant indiscreta eijciunt. hi igitur decimo die potissimum moriuntur. ac hoc modo iniectionis nos subinde usi sumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per spongiam super luxatam maxillam adhibitis, quando potissimū ægrè potest restitui, homineque humi collocato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum est, operamur.

De clauicula & summo humero. Cap. CXIII.

Clauicula interiori quidem extremo nō excidit, ut quo pectori committatur. unde ne mouetur quidē in ipso. At si uiolentia cuiusdā acuti extrinsecus ferientis auelatur, quemadmodum fractura ipsius instaurari debet. Extremum autem, ipsius quod humeri articulo inferitur, non admodum sanè excidit, à bicipiti musculo summoq; humeri tuberculo prohibitum imò neq; uiolento quodam motu clauicula priuatim agitur, propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animantia clauiculam obtrinet: quam si in palæstra, ut uerisimile est peruerri contingat, conformatione per manus dirigitur, & splenijs multiplicibus accommodatis unā cum deligatura decenti: eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum cartilagineum quod clauiculam scapulis colligat, in ressecatis mortuorum cadaueribus occultatū, quod loco motum, imaginem imperitis exhibet, brachij caput excidisse, etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concuum autem, id unde excidit. uerum notis quas deinceps subiungam ipsa discernentur.

De humero luxato.

Cap. CXIIII.

Brachii caput scapularum sinui insertum, excidit quidē frequenter, uerum neq; in superiorem partem, ut quod scapularum processus ancoræ similis impediatur: neque in posteriorem, propter ipsas scapulas: neq; tamen in anteriore, ob muscoli bicipitis tendinē, ipsumq; humeri fastigium. Sed raro quidē in interiorem exterioremq; prolabitur, continuè uerò præsertim macilentioribus, ad ima atq; his sanè facile & excidit & rursus inseritur: multa autem carne præditis contra, raro quidē elabitur, sed ægrè in sedem suā compellitur. Quibus itaq; etiam nō luxatis, ex ictu frequenter elapsi loco membri

F 3 suspicio

suspicio oritur, eo quod ualida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imata partem luxatus humerus est, hoc modo agnoscas: affectus humerus si cum sano conferatur, multum differt, quum exterior eius pars unde excidit, cōcaua appareat, ut in summo humero eluxato diximus, quod acutius quam naturaliter esse debet, apparet, & brachij caput elapsum in ala manifestò occurrit, ac manus huius cubitus à costis magis recessit, quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admouetur, neque aegri manū extenso cubito ad aurē possunt reducere, neque alium motū multiplicem per eā moliri. In pueris itaque uel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, ēt nodo medii digiti flexi eminente medici manus, uel ipsius affecti, sanæ manus, si nō puer sit, frequenter restituta est, ut inquit Hippocrates. ualentius autē hoc modo luxata inferuntur. Homo lotus & superfusionibus laxandi uirtute præditis usus, resupinari humi debet, & pila mediocris uel coriacea, uel alia quæpiam nō admodum mollis alæ accōmodabitur, ac sedēs medicus aduersus ægrum, iuxta latus affectū, si quidē dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcē superponet pilæ alæ suppositæ, si sinister, sinistri, ac affectā manū prehensam ad pedes trahet, simulque calcaneo alam in diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerū resistat, ne corpus circū diuellatur. Est & alia ratio immittendi, quæ humero subnixo perficitur, quod Græci κατωμίξεν dicunt. Adolescens, aut longior ægrotāte, aut altius consistens iuxta affectū latus, ægri indidē collocari alæ suū ipsius humerū subijciet, & manum eleuatā ad uentrem suū attrahet, ut reliquū ægri corpus post eū qui humerū suum alæ subiecit sublime pendeat. At si æger leuior fuerit, alius quispiā puer leuis ex ipso suspēdetur. Nā manu ac reliquo corpore in contraria detractis ad ima, subiectus alæ humerus faciliē elapsū articulū reponit, atque hoc ēt ligno quod Græci hyperon dicunt, efficiamus. Est autē id lignū oblongum, rectū, quod in pauimēto super aliud quoddā solidū ponitur. huius igitur summū extremum rotundū, quod non admodū crassum neque tamen tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedētis, subiicietur, iuxta totā ipsius lōgitudinē. Ac manu per lignū istud porrecta & detrahta, reliquo autē corpore contra inferius uergente, uel sua sponte, uel alio quodā trahente, restitutio fiet, atque hoc in scalæ gradu fieri debet, quemadmodū in confraeto brachio per tensionem fieri dicebamus.

dicebamus, hic autem rotundum quoddam corpus super gradum deligatur, quod ægrotantis alæ possit adaptari & brachii caput propellere. Porro si ob uetustatē affectus, aut corporis duritiem, repositio nobis faceat negotiū, utemur et ratione quæ per spatham ligneam, amben appellatā sit. Est autē ambe lignū quod longitudinē duorum cubitorum habet, latitudinē quatuor digitorum, crassitudinem instar digiti, alterum extremum rotundum, quod etiā promptē in alæ sinum ingreditur, perinde ut ligni quod hyperon uocatur, extremum. hoc itaq; extremum panniculo circundatum, quò lenius existat, capitulo brachii iuxta alam accommodabimus, totam uero manum ad lignum intensam cū eo deligabimus, iuxta brachium, cubitum, & eius extremum, deinde ligno obliquo inter duas columnas rectas adaptato, uel rursus supra scalæ gradum manu traiecta cum ligno, ut ala per trāuersum gradus accommodetur, manum infra trahentes, sinemus in alteram partem reliquum corpus in sublimi pendere, tunc n articulus ingreditur. Vbi fuerit repositus, mediocris ex lana pila si quidem inflammationem pars non sentiat, sicca: si sentiat, oleo madens alæ iniecta, deligabitur. per hanc autem alam & humerum & alteram alam uinculi deligationes literæ X figuram potissimum apparebunt. ita ut in hunc modū facta deligatura super affectum humerum accommodetur, brachium autem costis colligetur, ipseq; cubitus & summa manus, ex cervice deuinciantur, ne rursus de integro articulus excidat. Post septimum diem uel tardius ubi fascias dissolueris, mediocri uti frictione præstat, eo q̃ corpore solidiore facto, articulus ita firmetur, ut nō facilē prolabatur. Quod si aut crebro prolabatur, aut humiditatis uitio, aut ob aliā quampiam iam diu factā elabendi uiam, ad uestionē ueniendum est, sicut supra comprehendimus. Quum autē uel infantibus in utero aut æditis quidem in lucem, sed adhuc incrementibus, particula fuerit luxata, necdum reposita. in humero quidem carnes nihil à naturali figura deficiunt, neq; enim manus quodcunq; opus perficere impeditur, os autem brachii breuius permanet, non augescens, ac tales nominantur galiancones. In femore etiam os incrementum non sentit, & totum crus contabescit, quum enim pondus corporis ferre nequeat, non exercetur, ac in aliis membris luxatis manentibus quæ subijciuntur partes, omnium iniuriis expositæ sunt.

De cubito. Cap. CXV.

Q Vanto cubiti articulus humero magis uariis creatus est, tanto plus negotii prolapsus exhibet, & tardius quidem existit, sed difficilior reponitur, propter tuberculorum sinuumque frequentiam. Nonnunquam igitur solum aliquatenus detorquetur, quem casum pararthrema dixi, saepe uero etiam ex toto in omnem partem probabitur, praecipue in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, in quodcumque prolapsus sit, & sinu unde excidit apparente. Haec uero potissimum sani cubiti inspectio coarguit. Conuenit autem protinus membrum reponere priusquam inflammatione occupetur: siquidem eam expertum, difficulter curatur. Quaedam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maxime si in posteriora prolapsa sint. Haec enim luxatio omnium quae in cubito fiunt maxime dolorifica est & periculosa. Quod si modice articulus inuersus sit, moderata etiam intensio restituitur. sic ut ministri manum exporrectam iuxta brachium cubitumque contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suae manus palma quod excessit in suam sedem compellat. Hippocrates in priora luxationem subito manus inflexu instaurat: ut palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora uero, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, uiolenta potissimum extensione efficitur: quae in posteriora, flexu similiter uehementi. Quod si luxatio perseveret, etiam ualidam magis intensiorem usurpabimus, eiusmodi uero est potissimum quam Hippocrates in brachio confecto exposuit, ubi ligonis manubrium adhibebat. Porro recentiorum aliqui hunc in modum adaptant, ministris duobus manum ut dictum est, intendentibus, ita ut alter sursum ad alam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus aegrotanti consistens, duabus palmis iuxta articulum, brachium circundat, ac ubi iusserit uestimentum contractum in oblongum uel latam fasciam manibus ipsius simul & aegrotantis brachio circundare, & in exteriora imaque propter summam manum retrahere, ipse deinceps cum tensione constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedant. Caeterum manus prius oleo illini debet, ut lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentium manum

manum uī premantur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modum figurata manu, ex splenijs & conuenienti deligatura curationem petemus.

De brachiali & digitis luxatis. Cap. CXVI.

Brachialis digitorumq; luxatio nullum fa cessit negotiū per se, nisi cum ulcere facta fuerit. de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum ulcere sunt tractabitur. At si ne ulcere luxatis, mediocri intensione, & remedijs quæ inflammationem pellunt, medebimur.

De uertebri spina. Cap. CXVII.

Vertebrae spinæ si ex toto prolabuntur exciduntq; præsentaneam mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ uel quamlibet cōpressionē nō sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si cōtundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus aut subinde affligitur, nūc in priorem partem distorta, ac uitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin à loco gibbato uocant: interim uero in latera, quod scoliosin nūcupant. Quū igitur multæ simul uertebrae paululum adeo peruersæ fuerint, plurium simul peruersio ex circulari flexus rotunditate fieri apparet, ac putant nonnulli decepti, ab una uertebra ampliter peruersa id fieri. Nā magna distortio non rotundum, sed angularem spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est, eo q̃ per uentrē, antè oppositio fieri nequeat. qui. n. in scala sic affectos intendūt, aut cucurbitulas admouent, aut sternutamenta aut tussim, aut flatus excitāt, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abundè ostendit. Quoniam uero subinde cuiusdā ossiculi spinæ refectio facta, cauum locū repræsentat, quemadmodum in capite de fracturis cōprehensum est, aliqui uitium lordosin esse crediderūt, deinde hoc celerius persanato (promptè. n. callo firmatur) lordosin curatu facilem existere pronuntiarunt, & si nullam curationem, aut certè difficilem recipiat. his etenim urina supprimatur, alius nō respondet, corpus inhorrescit, postea etiā sine uoluntate excrementa prorumpunt. Hæc autē eueniunt, neruis & musculis consortij lege lacescit, ac celeriter ægri moriūtur: præsertim si superiores & ceruicis uertebrae affectum fuerint

rint expertæ. Cui uerò iam inde à paruulo potissimum uertebræ gibbatae protuberant, uitiū longum esse neq; celeriter morreni, sed morbū accersire, & insanabile Hippocrates prodidit. At quibus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ quidem per scalam, & rectam ægri suspensionem ac uteri inflationem adhibita, ridiculae sunt. sola autem Hippocratis adaptatio sufficiet. Conuenit enim, inquit, lignum magnum quod tantā longitudinem, ac latitudinem habeat, ut hominē excipiat, aut scamnum huic æquale, prope parietem deponere, ac iuxta hūc ita extendere, ut in longitudinem pede non amplius abāt, & uestimenta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus infringatur, (erit autem hic lotus antequam super lignū scamnumue insideat,) deinde loro pectus ipsius bis circumdatum, per alas iuxta dorsum uincire, initia lori ligno oblongo pistillo simili deligare, atq; hoc super pauimentum iuxta ligni, aut scamni subiecti extremum constituere, & ministro post ægri caput stanti ex superiore parte continendum tradere, ut imo quidem extremo contra fixo, altiore supra caput tracto, opportuna fiat intentio: altero autē loro pedes simul & superiores talorum partes deligantes, & rursus alio, superiora ilium & lumbos ita ut huius in lumbis fiat connexio, iterum extrema horum ligamentorum cōiungemus: alii autem ligno pistillo respondententi, similiter prædicto illigantes, statuemus in ligni aut scamni extremo quod iuxta pedes est, lignum pistillum repræsentans, ad prioris similitudinem, deinde famulis iubebimus ut per ligna retractionem in diuersa moliantur. Quidam uero a felis dictis hanc efficiunt. sunt autem hi axes qui contra rectum lignum uertuntur: utroq; huius magni ligni, aut scamni latere iuxta extrema ad pedes, caputq; sita, lora inuoluantur. Quum aut sic intentio ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus: si aut usus postulat, etiam super ipsum insidebimus, nullum ueriti periculum. At si ne sic quidē spina instaretur, & æger pressionem ferat, utile est parietem adiacentem in longum canalis modo exculpere è regione gibberi, ut sculptura cubiti longitudinem habeat, neq; altior sit ægrotantis spina, neq; multo humilior, imò sculpturā prius præparatā esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio prope parietem poni maluimus. deinde asseris mediocris alterum finem ad ima comprimemus, donec sensibilibiter spina dirigatur. uerum,

uerum, ut inquit Hippocrates, sola intensio citra asserem, rursusq; per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc uerum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensiorem prædictam, sine cōstrictione uidelicet, moliri: post adaptationem uero, lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis uertebis comprehendat, loro lineo, aut stuppa propter duritiē inuoluta, uertebis ipsis imponi & conuenienter deligari debet, uictus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu utendum est. alii qui uero plumbeam laminam usurparunt.

De coxa luxata. Cap. CXVIII.

QUum alia corporis ossa interim paulum excedant, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus soli luxationi opportunus est, qua tota sede promouetur, atq; ex his, magis coxæ articulus, quoniam sinum & rotundum, & profundum possidet, ad hæc, q̃ elatioribus marginibus munitus sit. At si quandoq; articulus ob uim quandam uehementē sinu suo exciderit, etiam multæ luxationis secundum minoris, maiorisq; rationem dñæ, proueniūt, quatuorq; modis, imò locis coxa luxatur, uel enim in interiorē partē, uel exteriorē, uel priorem, uel posteriorem, prolabitur: uerum intrò quidē & extra continuē, & multo frequentius intrò: in anteriora autem & posteriora, rarius. Quibus itaq; in interiorē partem coxa prolapsa est, iis crus affectū, si cum sano conferas, longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere nequeūt, & in regione scroti & ani intermedia tumor manifestus occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quibus aut in exteriora promota est, iis contrariæ notæ eueniunt, siquidem crus breuius apparet, & inter scrotum & anū in sinum dehiscit, iuxta clunes in tumorem attollitur, & genu interius demergitur, crus inflectere ægri possunt. Si in priorem partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non aut ad interiorē partem inclinare possunt, incedere conantes. Urina his supprimitur, inguina intumescunt, nares rugosæ ex-carnesq; apparent, calci inter ambulandum innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, nō aut poplitem, aut genu extendunt,

dunt, neq; inflectere possunt prius, quàm inguina flexerint, atque his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nares femoris caput eminet. Quibus sanè iam inde à pueritia, aut certe longiore tēporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, et præsidium nihil promouerit, mēbro iam in orbē coacto. Quibus aut continenter excidit, hi curationem Hippocratis assumunt, quapropter statim reponi luxata debent, uetustæ siquidē coxæ luxationes, nullo modo cōsanescunt. Communiter itaque in quatuor luxationibus instauratio congruet, tum quæ conuersione articuli & circumductu fit, tum quæ intensiōne. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnunquam femur continentes circumagentesque huc illuc, articulum reposuimus. Quod si in interiorem partem luxatio declinauerit, etiam crure tantum subito & ualenter ad inguina quàm intimè flexo, id quod requiritur effecimus: sin autē his non cesserit, intensiōne utendum, primū per manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per femur tibiamq; constringant, ex superiore autem parte, sub alis corpus circumdēt. Quod si etiā ualentior desideretur intensio, funibus contextis aut implicitis, uel loris crus deligare, omnino quidem supra talum: ut aut genu nihil patiat, hoc quoq; superius, oportet: at pectoris regionē uincire necesse non est, uerum, ut dictū est, manibus subter alas cōprehendatur, loricq; mollis & ualidi medium iuxta regionem inter scrotum & anum adaptatum in humeros reducemus antè per inguina & clauiculam: postè, per summas partes, duoq; lori initia ministro trademus, deinde oēs simul trahentes, ut ægrotantis corpus eleuetur, intensiōnem molientur. hic quidem intendendi modus cōis est quatuor femoris luxationū differentijs, priuatim aut in singulis modus quo ossa uectè in sedē suam cōpelluntur, Græci molliam dicunt, euariat. Intensiō enim homine si quidem in interiorem partem articulus exciderit, lori per regionē quæ scrotū & anum interioret, traiectionem medium inter femoris caput ipsamq; regionem à scroto ad anum tendentem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. Ad adolescens quidā duabus ulnis affectū femur, qua crassius est, circumdatum, in exteriora ualenter extrahet. Atque hic modus inserendi alijs expeditior est, cui si articulus non cesserit, alijs quoq; utēdum, uariis quidem magis, sed hoc efficacior.

efficacioribus. intendi etenim hominē super lignū grādius aut
 scānum oportet, in quo ēt spinæ gibbero uitiatos intendimus.
 Insculpētur aut per totū ferē oblongæ quædā ceu fossæ, quæ la-
 titudinē altitudinemq; triū digitorū, non maiorē habeāt, disti-
 dentes inuicē nō magis quā digitos quaternos, ut uectē iuxta
 extremū in ipsis resistēte, in quancunq; partem cōueniat resti-
 tuatur, membrū. Per mediū autem lignū aut scamnum, aliud
 impingatur lignū pedalis lōgitudinis, ligonis manubrij modo
 crassum, ut sub hoc intētio homine, lignū mediū inter regionē
 à scroto ad annm porrectā & femoris caput cōsistat. Simul. n.
 corpus iis qui à pedibus trahūt porrigi prohibebit, eoq; ne usū
 quidē sæpe uenit in contraria ex superiore parte intētio: simul
 aut intensio quoq; homine ipsum lignum femoris caput foras
 propellet. ac intētio ad superius dictū modū administrabitur,
 præsertim pedis. Quod si ne sic quidē in sedem suam redierit,
 impactum lignū rectum auferri debet ex latere autem huius si-
 tus utrinque singula ligna infigentur, tanquam postes, nō mi-
 nus quā pedalis longitudinis. his aliud lignum adaptabitur
 gradus scalæ modo, ut tritum lignorum figura H literā repræ-
 sentet, nam paulò inferius summis, medium lignum accōmo-
 dabitur. Deinde in sanum latus iacente hominē sanum quidē
 crus inter hos postes subter gradum quodammodo ducemus,
 affectum autem crus ex superiore parte super hunc ponemus,
 ut ipsi femoris capiti accommodetur, substrato prius ei multi-
 plici uestimento, ne femur contundatur. aliud autem lignum
 mediocriter latum tantam habens longitudinem ut à femo-
 ris capite usq; ad talum subiectum pertineat, intrinsecus cruri
 alligabitur. Vbi iam facta est hæc intensio, aut per pistillum, ut
 in gibbero prius diximus, detrahēre ad ima crus cum alligato
 ligno oportet, ut niolentia hac femoris caput in propriam se-
 dem reuertatur. Cæterum est & alius reponendi modus sine
 intensione per lignum, ab Hippocrate commendatus. Manus
 enim, inquit, ægrotantis molliter costis alligare oportet, & pe-
 des utrosq; ualido loro molli per talos & super genu deuinci-
 re, ut quatuor digitorum spatio inuicem distent: intēso autē
 affecto crure duobus digitis magis quā alterum, hominem
 suspendere, ut caput cubitos duos à terra ab sit. Adolescens ue-
 ro aliquis peritus ulnis suis femur affectum cōprehendens quā
 crassissimum est, ubi & caput femoris, subito pendere ex ho-
 mine

mine cogetur. facile nanque articulus ingreditur. Hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, ut qui non multo apparatu peragatur, sed ueluti miserabilem ipsum, plerique medici uersantur. Porro si in exteriora membrum fuerit laxatum, homo superius intendi debet, lorum autem iuxta regionem inter scrotum & anum per oppositas partes ferri conuenit, inguina dico & clauiculam, medicum autem ab exteriori parte introrsum agitare iuxta conuenientē foueam ex iis quæ insculptæ sunt, ministro quodam uectem ad sanum clunem ne cedat, obijciente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine inteso uir quidam ualidus dextræ manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet, simul ad ima, genu uersus constringet. At si in posteriora prolapsus est articulamentum, non opus est quidem hominem in sublime usque intendi, sed in solido iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intenditur, uinculis non perilia, sed in crure, ut nuper dictum est, porrectis. Iam uerò uti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, ubi & articulus excidit. atque hæc sanè de coxendice ex causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniam uero propter copiam humiditatis, ueluti humurus, sic etiam coxa prolabitur, unctione utendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

De Genu articulo.

Cap. CXIX.

Genu in treis partibus promouetur, interiorem nimirum anteriorem, & iuxta poplitem. in priorem enim prolapsi opposita patella prohibetur. Eiusdem igitur intentionis utentes modis, interim per manus solas, interim etiā funibus decenter deligabimus, reliquamque adferemus curationem, hoc spectantes ut particula dilutius immobilis conseruetur.

De tali articulo, ubi etiam de pedis digitis agitur.

Cap. CXX.

Tali articulus si paulum excessit, modica etiam intentione curatur: si toto loco mutatus est, uehementiore indiget auxilio. Tentandum itaque & hic per manus ualidiore intentione uti. Quod si non reponitur, homine humi resupinato extensoque, longum aliquem & ualidum palum inter

ter duo femora iuxta regionem scroto & ano interiectam humi per ima rectum defigemus, ut corpus aduersus eum renitens, ad pedis intentionē non cedat, imò prius defigetur, quàm homo decumbat. Quòd si magnum illud lignū adest, quod pedale aliud lignum per medium habere defixum diximus, super hoc intensionem moliemur, ministro uno femur cōtinente retrahentēq; alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus dirigit, alterumq; pedem alius ad ima continet. A repositione deligari tutò per debet fasciis, ad superiorem pedis partem, alijs ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem constringatur. In hoc casu usq; ad dies quadraginta in quiete homini perseverandū est. nam incedere ante absolutam curationem tentantes, particulam reddunt inutilem. At si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit, uel etiam aliam quampiam inflammationis affectionem excitarit, blanda quādam intensione, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter usque dum consanuerit, in lectulo perseverante. Cæterum digitorum peruersio, ut in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruehisq; postquā instaurata sunt & conquerint, inflammationem in articulis, ut uerisimile est, remanentem, aut tumorem, quæ etiam diu membra à functionibus impediunt, mollientibus remedijs persanabimus, quorū materiam nullius qui in artis operibus uersatur, ignorat.

*De luxatis cum ulcere.**Cap. CXXI.*

IN luxatis cum ulcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam & mortem inferunt. inflāmati enim extensione iis qui adiacent neruis & musculis, dolores ualidi, conuulsiones, & febres acutæ oboruntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quo principalibus sunt uiciniora, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaq; horū repositionem, ualentiolemq; deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntq; præsidis, per initia uti præcipit. Sic enim ipsis superesse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis consulit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac inter initia statim quū pars adhuc inflammation


inflammatione caret, prolapsum articulum mediocri intensio-
ne reponemus. quod si secundum auium institutum euenerit,
persistemus, sola ratione quæ inflammationem arcet, utentes
si inflammatio quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædicto-
rum contigerit, rursus eijcere ipsos necessarium est, siquidem
citra uim porrigantur. at si hoc quoque discrimen metuamus,
(non enim porrigentur forsân inflammata) satius est per ini-
tia in maioribus quidem articulis repositione supersedere. ubi
uerò inflammatio declinauerit, (id autem fit post septimum
nonum uel diem) præfati etiam periculum, quod ex repositio-
ne futurum sit, tum quòd si non repositum fuerit, claudi omni-
nio superuiuent, conabimur tunc, administratione obire, uten-
tes, propter cōmoditatem, etiam uectæ. Porro ulceris curatio-
nem ut in fracturis cum ulcere dictum est, administrabimus.

De luxatione cum fractura facta. Cap. CXXII.

AT si luxatio sine ulcere cum fractura euenerit, commu-
ni intensioe & per manus conformatione utendum
est, ut in simplicibus fracturis docuimus: cum ulcere
autem rursus ex fracturis cum exulceratione & luxationibus
priuatim exposiris, congruam administrationem petemus.

FINIS LIBRI SEXTI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.



PAVLI AEGINETAE
 I IBER SEPTIMVS,
 IO ANNE GVINTERIO
Andernaco Medico Interprete,

De temperamentis, quæ per gustatus quali-
 tates deprehenduntur. Cap. I.



SENSILIVM corporum tempe-
 ramento, coniecturam ex odoratu ali-
 quam sumere, haud est securum. Nam
 inodora, substantijs crassa quidē sunt,
 sed quanto sint calore, & frigiditate
 prædita non ita constat: odora uerò, &
 tenuia quodāmodo sunt & calida, sed
 quatenus id sint, neutiquā ostenditur,
 eo q̄ substantiā habeant inæqualem.

Multo adhuc minus ex coloribus exactè quid licet colligere,
 cum in singulis calida, frigida, humida & sicca reperiuntur. Ve-
 rum in gustatu omnes similiter particulæ corporū gustabiliū,
 ut hoc uocabuli usurpē, linguæ obijciuntur, sensumq; mouent;
 ut manifestò ex ipso quoq; temperamentorū uires deprehen-
 damus. Quod igitur astringit, cogere, obturare, dēfarcire, repelle-
 re, incrassare. atq; ante hæc omnia, refrigerare, siccareq; est ido-
 neum. Acidū incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpur-
 gare citra calefactionē potest. Acre, similem acido effectū præ-
 stat, extenuando purgandoq; sed acidum refrigerando euariat
 acre, calefaciendo: præterea illud repellit, hoc attrahit, dissipat,
 rumpit, crustas inducit. Pari modo etiam amarum, meatus ex-

PAVLI AEGIN.

G purgat,

purgat, abstergit, extenuat, incidit, succorum spissitudinem, sine calore manifesto. A quo sum frigidum, incrascat, cogit, contrahit, obturat, sensum aufert, stuporemq; inducit. Salsum contrahit, stringit, condit, siccatur, citra insignem caliditatem frigiditatemve. Dulce laxat, concoquit, emollit, rarefacit: oleosum humectat, emollit & laxat.

De ordine & intervallo temperamentorum.

Cap.

II.

Moderatum sanè medicamentum ita ut temperatura ei respōdeat cui admouetur, inde quod nec siccet, nec humectet, nec refrigeret, nec calefaciat, ipsum neque siccum neq; humidum, neq; frigidū, neq; calidū nominare conuenit. Quod autē siccius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius, à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in unoquoq; excessu, quatuor, quantū ad usum spectat, ordines stituisse: calidum quidem nominantes in primo ordine quod utique nos calefacit, sed non euidenter, ut illius rationali quadā demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum, & humidum quodcunq; demonstrationem requirat, nondum actionem ualidam neq; euidentem sortitum. At quæ manifestò iā siccare uel humectare uel calefacere uel refrigerare possunt, ad secundum huiusmodi ordinem referentur. quæ uehementer iam sed non summè id faciunt, tertio annumerantur. quæ uerò sic calefaciunt ut crustas inducant, quarti sunt ordinis. similiter quæ refrigerant, ut iam sensu priuent, hæc quoq; ad quartum relegantur. Porro siccius medicamentum nullum est inuenire quarti ordinis, si non urat. Nam si quod summè exiccat, id planè urit: huius notæ sunt, chalcitis, misy & calx. Tertij uerò ordinis siccantium potest aliquod esse etiam non urens, quemadmodum quæ uehementer astringunt omnia, è quorum numero est omphacium, rhus, & alumen.

De particularium simplicium medicamentorum facultatibus.

Cap. III.

Abrotanum.

Abrotanum & calefacit & siccatur in tertio abscessu, discutiendi incidendiq; facultate præditum, modicè uerò astringit, totiq; corpori cum oleo infricatum, rigores circuitu remeantes per sanat, stomacho minus amicum est. crematum

matum maiores in siccando, uires acquirit, quàm quòd ignem non est expertum. Capillorum defluuia quas alopecias uocant cum tenui quodam oleo inunctum explet.

Agallochum.

A Gallochum, lignum est Indicum Thuiæ ligno similæ, odoratum. Mansum animæ suauitatem commendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota drachmæ pondere, flaccidum ex superflua humiditate stomachū resolutumq; cōfirmat. Ad hæc iocinorosis, dysentericis, pleuriticisque opitulatur.

Agaricum.

A Garicum radix est, in arboris trūco prognata, corpore fungoso, quæ ex aëria terrestriq; substantia coaluerit, uis eius est discutere & crassos humores incidere. Viscerum maximè obstructionibus purgando medetur.

Ageraton.

A Geraton uim habet discutiendi, & leniter etiam inflammationem quodammodo arcet.

Agnus, qui uitex dicitur.

V itex qui græcè agnus uel lygos appellatur, in tertio ordine tum calefacit tū siccatur, substantia tenuis est, eoq; flatus abolet, castitati conseruandæ facere creditur, non modo cōmanducatus potusq; uerū etiam in cubitū substratus. Semen ipsius etiam iocinoris & lienis infarctus liberat epotum. Frixū autem minus est flatulentum, & facilè in membra distribuitur.

Agrestis, gramen.

G Ramen Parnasi admodū utile est. Siccatur & modicè refrigerat: tenuiumq; partium & subacerbū existit. eoq; cruenta uulnera glutinat: Decoctum eius calculos confringit.

Anchusæ quatuor.

Q uatuor sunt anchusæ, non eiusdem omnes facultatis. Nam onocleæ appellatæ radix astringendi uim habet & quiddam subamarum, ad lienis renumq; dolores efficax, cataplasmatis autem modo cum polentis applicata erysipelatis succurrit: folia minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profluuiū bibuntur. Quæ dicitur lycopsis, astringens quodammodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onochelos uerò seu Alchubiadios nuncupata medicatior quodāmodo,

G 2 uiperarum

uiperarum moribus succurrit forma cataplasmatibus adhibita, alligata, & comesta. Quarta omnibus alijs breuior, sine nomine propemodum, maiore quàm Alcibiadios, amaritudine donata: latis alui lumbricis instar acetabili pota benefacit.

Adarce.

A Darce ueluti spuma quædam est aquæ sanæ in cremis & arundinibus concreta, tantum uerò acrimoniæ habet & caloris, ut extrinsecus cum alijs imposita ferè urat, intrò eam assumere nulli licet.

Adiantum.

A dantium siccatur, extenuatur, & modicè discutitur, calore ac frigidityte medium quodammodo est: Alopecijis igitur medetur, tumores discutit, calculos potu confringit, è pulmone reiectiones deficcatur, alui profluuium sistit.

Aizoon, semperuium.

Semperuium duplex, refrigerat quidem ex tertio abscessu, deficcatur autem astringitq; mediocriter. Hac ratione igitur ualet erysipelatis, & ad herpetas inflammationesq; ex fluxione concitatas conuenit.

Aetonychon.

DE Aetonycho in capite de lapibus pertractabitur.

Athera.

Athera pulicula est sorbilis è zea molita, aut è frumento confecta infantibus accommodatur. Item cataplasmatibus uice illinitur.

Aegilops.

Aegilops discutiendi facultate prædita est, unde etiam induræcentibus inflammationibus & ægilopi quæ oculorum fistula est, opitulatur.

Aegiros populus nigra.

Populus nigra in primo ordine calefacit, modicè siccatur, & tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto cataplasmatibus instar applicata, podagricos dolores sopiunt. Quæ uerò ex ea distillat refina, floribus calidior miscetur acopis: & malagmatis, fructus cum aceto potus comitiales auxiliatur.

P *Aedæon, hoc est pudendum masculi cerui.*

Pudendum cerui masculi siccatur tritumque ex uino potum,

tum, uiperarum moribus subuenit, miscetur autem compositis remediis.

Aethale, fuligo.

Aethale & lygnys in litera L. exponetur.

Aethiopsis.

Aethiopsis similia uerbasco habet folia, radices decoctum, potu datur ischiadicis, pleuriticis & sanguinem reiicientibus, & arteriæ asperitates cum melle lenit.

Aima sanguis.

Sanguis frigidus nullus est, uerum suillus, humidus est, & minus calet, humano maximè temperamento similis. Columbarum uero, palumbi & turturis, temperatus quodammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagmata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranæ infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Nocturæ sanguis cum uino, aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, uirginum māmillas tuetur, & pilorū incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarū, chamelæontis, & ricinorum qui in canibus hærentes inueniuntur, sanguis facit. Galeus autem hæc facto rei experimento falsa esse pronunciat. Caprarum uero siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle potus iuuat, renumq; calculos cōterit. Gallinarum cohortalium sanguinis è cerebri membrana profluuia coerces. Agnus comitalibus prodest: hædinus nuper coagulatus circa hemina dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, syluestriū caprarum, hyrcorum, & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equarum quæ sunt expertæ admiscitur, remediis exedentibus, ΣΚΗΤΙΚΑ Græci uocāt, admiscetur. Antidotum ex sanguinibus quod in lethalia medicamenta efficax est, anatis, hædi, & anseris, sanguinem recipit.

Aera, lolium.

Lolium calore & siccitate ad tertium ferè ordinem pertinet, iridi facultate simile.

Acacalis.

Acacalis fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis claritati oculorum efficacibus miscetur.

G 3

Acacia

Acacia.

A Cacia tertii quidem desiccantium ordinis est, primi uero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerbata & terrestris.

Acalyphe, urtica.

U Rticæ & fructus & folia tenuem habent substantiâ, citraque rosionem siccant, tumores discutiunt, abstergunt, uentrem subducunt, mediocriter flatulenta, quare et ad uentrem incitant.

Acanthus.

A Canthum alii à nigro colore foliorum melamphillo appellant, alii pæderoten, nis eius est discutere & siccare.

Acanthium.

A Canthium tenui calidaque natura præditum, conuulsis auxiliatur.

Acantha leuce, spina alba.

S Pina alba radicem siccantem & modicè astringentem obtinet, eoque & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumque doloribus succurrit: semen tenue calidumque est, qua ui conuulsioni quoque medetur.

Acantha, id est, spina Aegyptia, uel Arabica.

S Pina Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit siccataque; impenso, unce & sanguinem, & alias defluxiones retinet.

Acinos.

A Cinos ocymo similis, mediocres astringendi uires habet, ideoque aluum & menses pota sistit, applicata uero panos & sacros ignes persanat.

Aconitum.

A Conitum, quod quidem pardalianches dicitur, exedentem lethalemque uim habet, quam ob causam intro non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, uti licet. quod uero à lupis lycoctinon dicitur, similes priori uires sortitum, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat.

Acoron.

A Coron in tertio abscessu calefacit & desiccet, radice ipsius ad ciendam urinam, lienisque scirrhum utimur: cæterum membræ oculorum, ob cornus similitudinem ceratoidis dictæ, crassitiem extenuat.

Acrides

Acridæ, locustæ.

Locustas urinæ angustis præsertimq; mulierum, odoris sif-
fitu profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus
cum uino salutariter bibitur.

Æte, hoc est, sambucus & chamaæte, id est, ebulus.

Sambucus, & ebulus qui chamaæctæ dicitur, quasi humilis
sambucus, uterque deficiendi facultatem obtinet: modicè
discutit & conglutinat, potus autem & manducatus, aquâ per
aluum educit.

Als, sal.

Sal quilibet uim habet uehementer siccam & astringentem
unde quicquid in corporibus humidum est, id omne depa-
scit, reliquum astrictione leuiter contrahit, qua ratione ad con-
dimenta omnia adhibetur, putredinemq; arcet: crematus ue-
ro sal magis discutit.

Althæa.

Althæa seu ebiscus species est maluæ syluestris, uis eius di-
scutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phymata con-
coquit, radix autem & semen reliqua sanè intensâ habet, uerū
exterit etiam uitilignes abstergitq; præcipuè autem semen
calculos quoq; confringit.

Alimon.

Alimon dissimiliariū partiū est, salsum gustu & leuiter astrin-
gens, maxima ipsius pars calore temperata cum humidita-
te insuperabili est, lactis itaq; & seminis uberratem conciliat.

Alcæa.

Alcæa syluestris maluæ & hæc genus est, in uino pota in-
testinorū torminibus & erusionibus medetur, multo ma-
gis ipsius radix.

Alcyonium.

Alcyonij genera omnia quidem abstergunt discutiuntque,
acri qualitate prædita, sed milesium (est autem uermiculū
purpureumq;) cæteris præstat: quare combustum, pilorū de-
fluuia, quæ alopecie dicuntur, impetigines, uitilignesq; abster-
git. Porro, q̄ in superficie lauiorem habet & uehementer acre
est, nō modò abstergit, uerum etiam excoriat. Postremò, quod
lanis succidis responderet, omnium est imbecillimum.

G 4 Alme,

Alme, quæ maria dicitur.

MVria nulli alteri miyta substantiæ, similes habet sali vires, sed imbecilliores aqua cōtemperata: at salforum piscium oliuarumq; colymbadum muria ualentius abstergit, contra intestinorum tormina & coxendicum dolores clystere iniicitur.

Aloe.

ALoe calefacit in primo, siccatur in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq; aluū subducit, lota uero minus detergit, sed stomacho gravior est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricem inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus.

Alos Anthos, id est, salis flos.

FLos salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acre, & abundè discutiens.

Alos achne, id est, salis spuma.

SAlis spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidē illo magisq; discutiens, sed minus contrahit.

Alfine, auricula muris.

ALfine, quam alij muris auriculam uocant, uim habet helxinæ similem quæ refrigerat humectatq; quapropter ad feruentes inflammationes conuenit.

Alypon.

ALypi semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymo mensura sumptum cum sale & aceto, ueruntamen intestina leuiter exulcerat.

Alysson.

ALysson quod à cane rabido morsos iuuat, sic appellatum est, cæterum siccatoria, discussoria, absterforiaq; ui præditū, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorq; cutis est, exterit.

Alopes, uulpes.

VUlpes uiua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendi uim oleo conciliat, adeo ut humores altè fixos in cutē extrahat hinc articularij in solio eo repleto diutius immorari, incipientem quidem affectum finierunt, inueteratū uero moderatiorem reddidere.

Amaracus

Amaracus.

A Maracus tertio in ordine calefacit, secundo deficcat.

Amarantus.

A Marantus extenuat, incidit, menseis cum uino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cum mulso omneisque fluxiones deficcat, stomacho inimicus.

Ambrosia.

A mbrosia cataplasmatibus modo imposita uim habet astringendi repellendique.

Ami.

A mi ad tertium calefacientium siccantiumque ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ mouendæ efficax, semen ipsius longè utilissimum est.

Amiantum.

A miantum in Cypro nascitur alumini scisso simile, quod in ignem coniectum accenditur quidem inflammaturque, sed non cōburitur, utuntur eo nonnulli in deficcantibus psilothris.

Ammos, arena.

A rena littorū maris affatim deficcat, seruata Sole aquas subter cutem exhaurit, corporibus hydropicorū in ea cooptis: torrefacta autem ad sicca fomenta in salis, & milij uicem adhibetur.

Ammoniacum thymiama, quod latinis ammoniacum suffimen, & ammoniaci gutta dicitur.

A mmoniacum thymiama liquore est tanta molliendi uirtute præditus, ut scirrhos & tophos discutiat.

Amurca.

A murca secundi calefacientium siccantiumque ordinis est, eiusque intensi, hac etenim ratione ulcera in ficcis quidem corporibus curat: in aliis autem intendit, irritatque.

Ampeloprasum, agreste porrum.

A mpeloprasum, seu porrum sylvestre acerrimū est calidissimumque in summo ordine, quamobrem etiam exulcerat, inciditque, uiscerum meatus recludit, stomacho inimicum.

Ampelos agria, uitis sylvestris.

V itis sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi facultate pol-

te pollent, item nonnihil astringens obtinent.

Ampelos humeros, uitis sativa.

Vitis sativæ facultas respōdet sylvestri, sed imbecillior est.

Ampelos leuce, uitis alba, quæ & bryonia dicitur.

Vitis albæ, quam & bryoniam & pfilothron appellant, germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæque ciendæ sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem cū ficis applicata scabiei & lepræ medetur.

Ampelos melana, uitis nigra.

Vitis nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori consimilis est, nisi quòd inefficacior.

Amygdala.

Amygdala quæ quidē amara sunt extenuant, viscosos crassosq; humores altius hærentes euellunt, tum cutis vitia abstergunt: arbor eandē uim repræsentat: dulcia uero amygdala moderato calore donata sunt.

Amylon.

Amylon ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quā superfuderis, furfures secernere ficareq; ad solem oportet protinus antequam acescat. Cæterum uis eius est refrigerare mediocriter, & ficare, & acria lenire.

Amomum.

Amomum acoro uirtute, respondet, sed hoc quidem ficit magis: illud autem expeditius concoquit.

Anagallis.

Anagallis utraq; uim habet abundè abstergentem subcalidam quoq; nonnullam & attracticem, ut etiam aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

Anagyris.

Anagyris frutex est grauis odoris, acrisq; calefacit & discutit, semen tenuius, & uomitui ciendo est.

Andrachne, portulaca.

Portulaca tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat,

humectat, qua de re etiam caufone laborantes uentriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suo dentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictione uero, & intestinorum tormina & sanguinis profluvia coerces.

Androsamon.

Androsæmi duplex genus est, alterum ascyrrhon uel ascyrrhoides nominatur specie hyperici, alterum dionysias, semen ipsorum purgat, folia autem magis deficcant.

Androsarces.

Androsarces amara acrisq; herba est uis eius est discutere & deficcare potu tum ipsa, tum semen ipsius urinam promouet.

Anemone.

Anemone omnes uim habent acrem absterforiamq; item extrahendi, & oris uasorum recludendis, idonea qua pituitam illiciunt, lepras tollūt appositu, & lac in mamas suggerūt.

Anethum.

Anethum calefacit in secundo ordine intenso siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum discutit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat, ustum tertii calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, ex humiditate nimia flaccidis ulceribus applicatum confert: uiride autem humidus minusq; calidum est, & concoquit.

Anthyllis.

Anthyllis duplex quidē est, sed utraq; ulcera perficcat, quæ chamæpityi respondet, tenuior est, quare etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem abstergit.

Anisum.

Anisi semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens, siccaturq; hinc utiq; & urinam mouet, & flatu discutit.

Antirrhinon, uel anarrhinon.

Antirrhinon siue anarrhinon persimile inguinaræ uim obtinet, sed minus efficacē, atq; ex illo hoc quoq; cognosces.

Anonis, uel ononis.

Anonis siue ononis calida facultate est, præsertimq; eius radix, cuius succus cum uino potus urinam ducit, calculos conterit, crustas rumpit & dentes mitigat.

Aparine

Aparine.

AParine, quam alii philantropon, alii omphacocarpon appellant, modicè abstergit & deficcat, item tenue quippiam in se continet.

Apios, pirus.

APios tēperatura inæqualis est, terrestre aliud sortita, aliud aquosum ob quod manducata stomachum iuuat sitimque arcet, admota uero forma cataplasmatiss, ficcata refrigeratque mediocriter.

Apocyon, aut cynocrambe, canina brassica.

APocynon aut cynocrambe, dicitur autem & cynomoron q̄ celerrimè canes enecet, eademq; ui maleficium & lethalis homini est, foedi admodum odoris, & calida citra siccitatem unde etiam discutiendi facultatem applicata repræsentat.

Apochyma.

APochyma pix est uetus quæ à nauigiis deraditur, tumores diffundit, ficcata & discutit.

Arachne, araneus.

ARaneus cum emplastro subactus, impositusq; fronti, & temporibus tertianarum febrim circuitus finit, ut Dioscorides memoriæ mandauit, tela ipsius applicata sanguinis fluores sistit, & ulcera in summa cute ab inflammationibus tuetur.

Argemone.

ARgemonæ facultas est abstergere simul & discutere.

Arisarum.

ARisarum mulro breuius est aro, acriusq; radicem oliuæ magnitudine obtinet.

Aristolochia, malum terræ.

ARistolochia omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subacris, ad medicinas utilissima. At Rotunda, tenuior, & in omnibus efficacior est. Clematidis hoc est sarmentacea, odorata quidem, sed imbecillior. Longa uerò præter alia, media harum est, sed non minus calida, quam rotunda.

Arcentos, Iuniperus.

Iuniperus calefacit & ficcata in tertio ordine, fructus autem calefacit quidem similiter, sed in primo gradu ficcata.

Arction

Arction.

ARction, prosopites, folia habet cucurbitæ similia, maiora autem & duriora, discutii quidem siccatur, & astringit, quapropter & folia ipsius uetusta ulcera persanant.

Arction.

ARction uerbasco simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem, uis eius est tenuis, siccatur, & mediocriter astringens.

Armeniacum.

ARmeniacum, uim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astrictione, hinc etiam oculariis, medicinis miscetur, & augendis palpebrarum pilis usum habet.

Arnabo.

ARnabo, odoramentis adnumeratur, ob quod unguentis potissimum expetitur, calida siccaque potentia præditum in tertio ordine, cassiæ & carpesio simile, unde Posidonius ubi cinnamomi copia non datur, hoc utendum esse censet.

Arnoglossum plantago.

Plantago refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astrictione nonnihil adsit, quare ad maligna ulcera, fluxiones, putredinesque, temperamenti moderatione accommodata est, sanguinis quoque profluvia cohibet & plurimis congruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

Aron.

ARon calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri calida & absterforia substantia & hoc generatum, radices ipsius calidiores sunt dracunculus autem efficacior.

Arsenicum, auripigmentum.

ARsenici uis est caustica, utuntur eo & in pilis abolendis, quod si diutius adhæserit, etiam cutim ipsam attingit, uultum uerò tenuius redditur.

Artemisia.

ARtemisia utraque secundo in ordine calefacit, siccatur in primo, tenui substantia prædita, eoque renum calculos comminuit, & uteri fomentis accommodatur.

Artos

Artos, panis.

PAnis illitus magis discutit quàm triticum, ceu & salis & fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ altè hærent, fermentum idoneum est.

Asarum.

ASarum similem acoro uirtutē habet, sed magis intensam.

Asbole, fuligo pictorum.

Fuligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis sumitur, uim habet discutientem, adeoq; acrem, ut & urat, & exedat, cæterum fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Ascalabotes, stellio transmarinus.

Ascalabotes animal ad reliqua sanè inutile est, sed scorpionum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: expetitur etiam naturalia intendentibus medicinis.

Asclepias.

Asclepias calida, sicca, & tenuis substantiæ, torsionibus cum uino pota competit, uenenatorum autem moribus & maleficis mammarū muliebriumq; locorū uitijs applicatur.

Ascyrrhon.

Ascyrrhon in adrosæmo expositum est.

Aspalathus.

Aspalathus dissimili constat uirtute, acri & astringēte, & ob utramq; siccatur, idcirco & putredini, & fluxionib. utilis est.

Asparagus.

Asparagus petræus, aut myacanthinus abstergit utiq; sed calore, & frigidityate medius est, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen. Itē dētiū doloribus medetur.

Asplenon.

Asplenon tenue quidē est uirtute, non tamē calidū, hac utique ratione, & calculos confringit, & lienes consumit.

Astaphis, uua passa.

Astaphis domestica sanè concoquit simul & astringit, & leuiter discutit, syluestris autem acris adeo est, ut pituitam per os educat, & uehementer abstergat.

Aster atticus, siue inguinalis herba.

Aster atticus, quam alij herbam inguinalem uocant, ob hoc ipsum

ipsum quòd non tantum emplastri modo imposita, uerum ad-
alligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixtæ est uirtutis,
discutientis, & refrigeratoriæ.

Astragalus.

Astragalus frutex est exiguus cuius radices astringunt, ipse
non ignauiter desiccatur: ulcera itaque uetusta ad cicatricem
perducit, & aluum fluentem radix in uin pota sistit: plurimus
in Phæneo Arcadiæ nascitur.

Asphaltus, bitumen.

Bitumen ficit, calefacitque in ordine secundo, quare ulce-
ra cruenta glutinat.

Asphodelus, hastula regia.

Asphodeli radix uim habet detergentem discutientemque,
concremata autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior
euadit, quo fit ut alopecijis medeatur.

Atractylis.

Atractylis seu cnicum syluestre ex spinosorum genere ha-
betur, ui siccante, & mediocriter calida.

Atriplex.

Atriplex humectat sanè in secundo, refrigerat in primo or-
dine, qua de causa etiam uetrem celeriter permeat: semen
ipsius ui pollet absterforia, unde ictericis ex iocinoris obstru-
ctione accommodatum est.

Aphace.

Aphace lenticulæ modo astringit, sed māducata ægrius con-
coquitur, ualentius siccatur, mediocriter calefaciens.

Aphronitrum.

Aphronitri uis est discutere & abstergere, ut non solum for-
dida exerat, sed etiam pruritu, quippe saniem dissipat, me-
deatur, potum uerò stomacho nocet.

Aphros, spuma nitri.

Spuma nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior
substantia, ob quod & læuis, farinæ, modo existit.

Achras, pirum agreste.

Pirum agreste eandem piro domestico uirtutem habet, sed
magis intēsā, quapropter magnis uulnerib. glutinādis est.
Absinthium.

Absinthium.

Absinthium calidum primo abscissum est, siccum tertio, astringenti, amara, & acris simul donatum qualitate: qua biliosos in uentriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astringentem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENVMERATIO EORVM QVAE

AB INCIPIUNT.

Balanus myrepfica, glans unguentaria.

Quod intra unguentariam glandem ueluti carnosum est, abstergeredi incidendi; cum astringente uim habet, eamque ob causam drachmae unius pondere cum mulla pota, facile uomitiones ciat, & inferiorem uentrem subducit, cum posca uero ad uiscerum obstructions conuenit: item cutis uitia cum aceto perunctum abstergit cortex uero ipsius ualde astringit.

Baccharis.

Baccharis odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris: huius radice decoctum meatus obstructos aperit, urinam & menteis citat, folia ipsius quum sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

Balaustium.

Balaustium, syluestris punice flos est, ualide astringens, sicca & frigida facultate praeditum, itaque summæ cutis ulcera ad cicatricem perducit, & fluxiones cohibet.

Balsamum.

Balsami, quod ueluti lignum est, siccatur & calefacit in secundo ordine, subtiliusque habet substantiam, liquor autem multo tenuior est, fructus proxime hunc uirtute accedit, sed minus tenuis est.

Ballote, marrubium nigrum.

Ballote quod alij marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforie facultatis, impositum cum sale rabidi canis moribus medetur.

Batus, rubus.

Bati fruticosum, abunde astringit & siccatur, qua de causa & uulnera committit, & defluxiones sistit, radix autem praeter astringentem, non parum etiam subtilis est, unde renem calculos confringere est

re est idonea. fructus si maturus est, magis calefacit, simulq; mediocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est, immaturus autem & acerbus est & ualide siccatur, præsertim retorridus. Eadem etiam flos efficit.

Batrachion, ranunculus herba.

Ranunculi quatuor sunt genera, omnia excellenter calida, sicca, acria, urentia, adeo ut ulcus cum dolore excitent: quibus si modice utaris, cutis uicia tantum exterunt, radix autem arida sternutamentis ciendis est medicamentum.

Batrachi, ranæ.

Ranæ aduersus uirulentorum morsus in iusculo eduntur. Crematarum ranarum cinis maxime siccans redditus, sanguinis eruptiones sistit & alopeciis cum pice liquida medetur.

Bdellium.

Bdellium tum Scythicum tum Arabicum scirrhos emollit, præsertimq; recentes, Arabicum uero urinæ ciendæ est, calculos comminuit, & cruda concoquit.

Betonica.

Betonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nasciutr potissimum locis petrosis, qua & in renu medicinis utuntur. Est autem apud Romanos alia quedam betonica dicta, quam Dioscorides nominat cestron, alii uero psychotrophon, eoque frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet præter actionem: at ultra quod urinam ciat, etiam aliis multis benefacit, potissimumq; radix ipsius, cum hydromelite pota uomitionem mouet, folia autem aluum subducunt.

Bechium tussilago.

Tussilago, quæ Græcis bechion siue bechion inde dicitur, quod tussis & recta ceruice spirantes, suffitu iuuat, constat ex calida aquosaque substantia.

Blitum.

Blitum esculentum olus est, humidum frigidumq; in abscessu secundo.

Bulbus.

Bulbus esculentus amari simul & astringentis modice compos est, siccatur glutinatque uulnera, & abstergit. Qui autem uomitum cit, calidiorem quam alter repræsentat.

PAULI AEGIN.

H

Botrys

Botrys.

BOtrys, quam alii ambrosiam, alii artemisiam dicunt, planta est insigniter odorata, hæc cum uino pota, subrecta ceruice spirantibus quos orthopnoicos appellant, succurrit.

Bubonium, inguinalis herba.

Bubonium in attico astere dictum est.

Buglossum, lingua bubula.

Buglossum humidum calidumq; temperamento est, eamq; ob causam uino iniectum lætitiā animi conciliare dicitur.

Bunium.

Bunium quod alii arction appellā, calidū est, urinæ & mensibus educēdis accommodatū, huic respondet & pseudobuniū.

Buprestis.

Buprestis animalculum est cantharidi simile, reponitur itaque sicut & illa.

Butyrum.

Butyrum concoquit & modicè discutit, in teneris corporibus, bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præsertim in infantibus dentientibus, item humores in pectore fixos, linctum concoquit.

Buphthalmon.

Buphthalmon similem habet chamæmelo florem, sed multo maiorem acrioremq; ideo & discutientem, adeò ut cerato mixtum duritias remolliat.

Brathy, herba Sabina.

Sabina, cupresso similis calefacit siccataq; in tertio ordine, tenuissimaq; est, extenuat & discutit pota, tum in putredines cupresso similiter efficax est.

Britannica.

Britannica astringit & conglutinat, syluestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes persanat.

Bromus auena.

Auena similem hordeo obtinet facultatem, siccata autem & modicè citra, corrosionem discutit, iam & nonnullius astringentis compos est, unde & alui profluuiis subuenit.

Bryonta-

Bryonthalassion, muscus marinus.

Muscus marinus, refrigerat simul & astringit, eoq; feruentibus inflammationes cataplasmate admotus, iuuat.

Bryon, muscus.

Bryon, quod alii splanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisq; inuenitur, discutiendi simul & molliendi uim moderatam obtinet potissimum quod cedris adhæret.

Bryonia.

Bryonia dicta est uitis alba.

Initium literæ G.

Gala, lac.

Lac omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde etiam butyrum efficitur. Serum ipsius uim habet abstergendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas. id uerò quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atque ideo acrimoniam obtundit: coctum uerò lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, præsens fit remedium dysenteriae, & acrium in uentrem defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores, aliasque acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebre est, mox caprillum, hinc asininum, ouillumque, postremo uaccinum.

Gale, mustela.

Mustelæ concremata cinis abundè discutit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat: inarefacta autem inueteraq; mustela comitialibus auxiliatur.

Galion.

Galion à coagulando lacte dictum est, aparinæ simile, siccan- di uim, mediocremq; acrimoniam habet: flos eius ad sanguinis eruptiones & ambusta, congruit.

Galopsis, uel galiopsis.

Galopsis, quā alij galibdolon appellant, urticæ similis herba est, læuior aut, & fœdi odoris, scirrhosos tumores dissipat & emollit, itē ad ulcera serpentina facit in cataplasmate imposita.

Garum.

Garum calefacit exiccatq; efficaciter, ac idē o aduersus ulcera putrida

ra putrida extrinsecus eo utitur, propterea contra intestinorum tormenta & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

Genciana.

Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

Geranium.

Geranium id quod foliis respondet anemonae, radicem habet esculentam, quae cum uino drachmae modo pota uteri inflationes dissolvit. altera geranii species ad medicinam inutilis est.

Ge, terra.

Omnis terra desiccatur, quae uero alterius substantiae expers est, etiam sine morbo id facit. at si ignea quaedam ipsi qualitas admixta sit lotionem hanc quoque deponit. Inter cultas igitur terras quaelibet pinguis omnium particularum quae siccare postulant curationi accommodata est, Aegyptio igitur luto utuntur contra aquas cutem subeuntes, & lienosos affectus, item ad fungos laxosque tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnium minus, quae sphragis dicitur, siccat pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta praesentis antidoti vires habet, ulceribus malignis cum aceto aut uino medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, & depascentem dysenteriam intestino mulsa prius, deinde muria per clysterem eloto, coercet. Minus rubricum uehementius, quam lemnium obstruentibus quae emplastica dicuntur, miscetur medicinis, & pota lumbricos interimit, sed multo lenior est Samia quam Lemnia terra, seu glutinans & uiscosa, quare utendum ea est in his quae leniri oporteat. & sanguinis reiectiones, quacunque ex parte fiunt, compescit. Selenusia & Chia maiore abstergendi uirtute pollent, ideoque mulieribus ad nitorem cutis & laeuorem in facie utilis est, ulceribus carnem & cicatricem inducit, praesertim ambustis. Cimolia mixtae facultatis est, refrigerantis discutientisque, idque illota illota uero magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampelitis, est autem ea quae uitis inungitur, quod innascentes ipsis uermes enecet, siccat & discutit egregie citra erosionem. Cretica, aerea est, & sine rosione abstergit. Eerethrias euidenter astringit, concremata uero & elota sine rosione desiccatur, praestantior uero est cinerea, Pnigitis similes cimoliae vires repraesentat, sed colore nigrescit Armenia, quam etiam bolum nominant,

nant, summè desiccatur, unde dysentericis, alui fluxionibus, putro cruento, tabi, spiritus difficultati ex humiditate, ulceribus humidis, & pestilentialibus uitiis strenuè opitulatur. Cæterum cum uino tenui diluto bibitur: si febris adsit, cum aqua. Alana autem gleba Armeniæ uim obtinet. Ochra uim habet discutiendi exedendiq; reprimi igitur supercrescentia ulcera, & caua cum cerato mixta replet.

Geras, seneſta, anguis.

Seneſta anguis affatim siccatur: aceto igitur subferuefacta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuiam cum melle tritū delitumq; oculorum aciem maximè iuuat.

Ges enteræ, terræ intestina, seu uermes terreni.

Lumbrici terræ detriti neruorum uulneribus imponi, repente euestigio mirabile adferunt præsidium.

Gigarta, nuclei acinorum uux.

Nuclei acinorum uux, desiccant ordine secundo, refrigerant primo. quum itaq; abundè sint acerbi omnibus alui uitiis fluidis, conueniunt.

Gingidium.

Gingidium calorem non adeò manifestum sortitum est, cæterum siccatur in abscessu tertio, & astringit, qua de caula & stomacho utile est.

Glaucium.

Glaucium astringit, sed ita ut etiam nonnihil gustanti sit ingratum, manifestè refrigerat, eaq; ui erysipelatis non tam ualidis succurrit.

Glaux.

Glaux herba calida & humida temperamento est, unde ad lac generandum efficax est.

Glecon, pulegium.

Pulegium calefacit, & extenuat uehementer, unde si cataplasmate applicetur ruborem excitat, & crassos uiscososq; humores è thorace & pulmone emolitur.

Glæos, sordes balneorum.

Sordes balneorū calefaciunt modicè, emolliunt, discutiunt, rhagadibus ani & condylomatis accommodatæ.

H 3

Glycyrriza,

Glycyrriza dulcis radícula.

Glycyrriza tepidi humidique temperamenti est, alicuius etiam ascriptionis particeps, unde & asperitates læuigat, non arteriarum tantum, sed etiam vesicæ scabiei medetur, eadem sicim arcet.

Glycysside, pæonia.

Glycysside quam alii pentameron, nonnulli pæoniam uocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & siccantem, cui etiam ascriptionis nonnihil inest, quapropter menses ciet, renes & iecur purgat, instar amygdalæ posita cum uino: at si hoc austerum fuerit, alui quoque fluores coercet, ad alligata uero puero, morbum comitalem abigit.

Gnaphalium, centunculus.

Centunculus dictus est gnaphalium quod folijs ipsius teneris loco tomenti, gnaphalon dicitur, utamur sunt autem calida & modicè astringentia, atque hinc ad dysenterias cum uino austero bibuntur.

Gongylis, rapum.

Rapi & radix & semen flatulenta & semini creando sunt, ueneremque excitant.

Gordilium.

Gordilium alii seseli appellant, calidum est, urinæ & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctâ, quæ in thorace hærent, educit.

Gyris, pollen farinaceus.

Pollen uirtute respondet amylo, sed calidior est.

Gypsum.

Gypsum uim habet siccantem opplentemque, propter quam ad sanguinis eruptionem conuenit temperatum cum polline candido oui liquore,ustum uim opplendi non similiter retinet, uerum magis siccât & repellit, præsertim cum posca.

*Quæ à D incipiunt.**Dades, tedæ.*

Tedæ acre quiddam habent, item uim concoquendi, & abstergendi nonnullam, unde aceto incoctæ dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtæ etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

Damascena

Damascena.

DAmascena, quum ad pruna uentum erit, exponam.

Damasonium.

DAmasonium abstersoriam quandam uim obtinet, qua calculos conterit, & quæ per aluū diffluūt, ad urinas deriuat.

Daucus.

DAucus, quod & staphylinus dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & uenerem mouet. Syluestris dauci semen minimè flatus creat, sed urinam & menseis citat, quemadmodum & herba ipsa.

Daphne, laurus arbor.

LAuri arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoq; fructus: radicis cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iocinorosis opitulatur cum uino odorato triobolari pondere potus.

Daphne herba, laurus alexandrina.

DAphne herba, quæ & Alexandrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menseis & urinas commouet: laureola uero, quæ daphnoides græcè nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas homilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

Derma, pellis.

PEllis ouina recens detracta, calens adhuc ijs qui flagris cæsi sunt circumposita, mirificè auxiliatur. At hippopotami pellicula cōbusta & cū aqua leuis imposita phymata discutit. At uiperæ pellicula detrita impositaq; alopeciiis mirabiliter pilos reficit.

Dermata, hoc est, pellos seu coria ueterrum calceamentorum.

COria ueterū calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatoriū, unde ex calceis pedum attritibus nondum inflammatis, ambustis, intertriginibus, & tuberculis medentur.

Dictamnion.

DICTamnū tenuius est uirtute pulegio, cætera simile, quod autem uocatur pseudodictamnion imbecillius est.

Dionysias.

DIONYSIAS dicta est in audrosamo.

H 4

Diphry-

Diphryges.

Diphryges mixta est facultatis: habet enim quippiā astringens & mediocriter acre, ideoq; malignis ulceribus præsens est remedium.

Dipsacus, quod labrum ueneri dicitur.

Dipsaci spinæ radix in secundo ordine deficcet, nonnullam uera abstergendi uim simul obtinet.

Dorycnion.

Dorycnion simile temperamento est papaueri & mandragoræ, immodicè refrigerans: siquidem modicum, stuporē inducit: copiosius assumptum, interimit.

Dracuntium, dracunculus.

Dracunculus simile quidam aro habet, sed eo acrius, amarior, calidius, tenuiusq; est. Itē astringentis nonnihil habet coniunctum. Radix ipsius pota uiscera purgat, & peruicacium seu malignorum ulcerum excellentissimum est remediū: folia respondent: semen ualentius est.

Dryopteris, filicula.

Filicula dulcis, actis, & leuiter amara est: radix acerba est, cæterum uim habet exedentem, qua & pilos abolet.

Drys, quercus.

Quercus & folia & fructus siccante & tepida ui pollent, quamobrem uulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio membranofum, fructus carnē ambit, cum ualentius astringat, ad fluxum muliebrem, aliosq; fluidos morbos exhibetur.

*Quæ ab E incipiunt.**Ebenus.*

Ebeni ligni uis est excalfactoria, deterforia, & subtilis: unde etiam caliginem oculorum abstergere creditur, aliisq; oculariis miscetur medicinis.

Encephalos, cerebrum.

Cerebrum leporis coctum detritum, comistumq; infantium dentitionibus utile esse fertur: nonnulli uero tremoribus succurrere manducatum, literis prodiderunt. At galli cerebrū cum nino porum ad uenenatos mortus efficax esse Dioscorides pro-

des pronuntiat, & sanguinis ꝑ cerebri membranis eruptionem cohibere Cameli cerebrum Galeno autore siccum cum aceto potum, comitiales per sanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum suffusiones efficax est. Cerebrum ouillum similiter præparatum, infantium dentitionibus exactè opitulatur.

Elea, olea.

OLeæ ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerant, fructus qui exactè ematuruit, moderatè calidus est immaturus maiorem tum astringendi tum refrigerandi vim repræsentat.

Elea, hoc est olea, Aethiopica.

OLeæ æthiopicæ lachryma ammoniaco tenui similis, vires habet exterforias, quare ad cicatrices, albugines, hebetudinesq; oculorum ea utuntur, & ad dentium dolores, si cauis ipsorum injiciatur, efficax est: nonnulli uero syluaticam esse hæc oleam asserunt.

Eleon, oleum.

OLeum ex oliuis drupis dulce calidumq; mediocriter est magis humectans: at quod ex immaturis oliuis exprimitur, Græci omotribes appellant, tantæ astrictionis particeps est, quantæ etiam frigiditatis. Enotum uero oleû morfu ac rosione caret. uetus quato diutius reseruatum, tanto magis calefacit, discutitq; præsertim si iam inde ab initio tenue extiterit: iudicatur autem id, si purum sit, pellucidum, si paucum magnam corporis partem inungat, & ex facili cutem penetret combibaturq; huiusmodi nimirum est Sabinum: quod autè ex agresti olea funditur, abstergit simul & astringit, squalidissimumq; id est, pro oleorum ratione. ricininum uerò æquales ueteri vires obtinet: reliqua uerò nempe sesaminum aut raphaninum & quæ eius sunt generis pro substantiis ex quibus constant, vires quoq; diuersas præ se ferunt.

Elæomeli.

OLeum in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum potum cū aquæ hemina, crudos humores biliososq; ex aluo educit: qui uerò id bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

Elate-

Elaterium.

ELaterium succus sylvestris cucumeris fructus appellatur, in secundo ordine calefaciens: quod menseis prouocat, fetus appositum propter summam amaritudinem necat, euacuationem etiam ex naribus cum lacte instillatum molitur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam, nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

Elate, abies.

ABies arbor calefacit siccaturque; ut nigra populus similiter: de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

Elatine.

ELatine herba est parietariae similis, mediocri frigidityte & astringitione donata.

Elaphoboscus.

ELaphoboscus uirtutis est calefactoriae & siccae in secundo abscessu, substantia tenuis.

Elelisuacus, saluia.

Saluia euidenter calefacit & leuiter astringit.

Helenium, inula campana.

Helenium calidum est & siccum cum excrementitia humiditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos thoraci humores educit, ac ex eo in particulis ruborem excitant.

Eleoselinon, palustre apium.

Eleoselinon in aquosis natum locis idem potest quod hortense apium, licet maius ipso existat.

Ebur.

EBoris ex ungue ramenta si obducantur, reduuijs profunt: item ossium dentiumque; ipsius quum sint siccae facultatis & absterforiae, huiusmodi miscentur medicamentis.

Helcysma, argenti recrementum.

Helcysma, argenti est excrementum, uiribus plumbagini respondens. quippe astringit, simul atque extrahit, quod fit ut emplastris quas phaeas appellant & iis quae cicatricem ducunt, admisceatur.

Helleborus, ueratrum.

Veratrum utrumque; calefacit & desiccatur in tertio abscessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa cutis uitia

uitia conuenit : nigrum uerò si fistulis inferatur tribus diebus callum exerit.

Helechryson.

Helechryson alii chrysanthon, alii amaranthum appellant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quæ cū uino pota urinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, ex mulso pota mensis educit, sanguinemq; concretum dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

Helxine, parietaria.

Helxinem alii perdicium, alii parthenium, quidā fideritim, quidam heraciam nuncupant, uis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

Helxine.

Helxine quæ & cisampelus dicitur, uim habet discutiendi.

Elymus, quæ & meline dicitur, panicum.

Panicum simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus inductum, cæterum & alui fluores deficcat.

Empetron.

Empetron, quod ab aliis prasoides nominatur, pituitam & bilem purgat, est etiam salsum, quare absterfionibus accommodatur.

Epithymum.

Epithymum in tertio abscessu siccatur & calefacit, thymo efficacius.

Epimedium.

Epimedii uirtus est mediocriter frigida cū humiditate aquosa, quod si obducatur, mammas erectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

Epimelis.

Epimelis, quæ etiam ab Italicis rusticis uocatur unedon, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

Epipactis.

Epipactis, quæ & elleborine appellatur, aduersus uenena & iocinoris affectus hibitur.

Erehinthus, cicer.

Cicer quod quidem cōsuetum legumen est, flatu creat, ualentis

lentis materiae, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem menseis elicit: at crios appellatum, hoc est, arietinum, aliis magis urinae ciendae est decoctum ipsius praesertim nigri calculos quoq; in renibus conterit: quod autem orobiaum ab eruo uocatur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modo domesticis sunt ualidiora.

Eria, lanae.

Lanae quidem sordidae fomentis utiles sunt, nam pinguitudo ipsarum, quam aesypon Graeci appellant, butyri modo, concoquit: at quae sordibus carent materiae rationem duntaxat obtinent: concrematae uero uim habent acrem, calidam, ficcam simul & tenuem, ut etiam flaccidas ex uligine ulcerum carnes protinus absumant.

Erice.

ERice ui pollet discutiente citra rofionem, sed flore ipsius potissimum, & foliis utendum est.

Erinon.

ERinon aquatica herba est, cuius seminis drachmae duae cum mellis drachmis quatuor illiti, oculorum fluxiones sistunt, succus aurium doloribus benefacit.

Hermodactylus.

Hermodactyli radix & per se, & ipsius decoctum uim habet purgandi, priuatim etiam arthriticis tunc quum humores defluunt exhibetur, uerum stomacho nimis quam aduersatur.

Herpyllum, serpillum.

Serpillum calefacit, ut & urinam, & menstrua commoueat.

Erythrodanon, rubia.

Erythrodanon rubia tinctorum radix est, acerbamaraq; lienem, iecur & renes ita purgat, ut cruenta quoq; per urinam & menseis euocet: ac cutis uitia quae abstersionem postulant, exierit.

Erysimon.

Erysimi semen igneum calefactoriumq; est, uti nasturtium, quare in fermento tostum, thoracem purgat in eclegmatibus assumptum, duritiasq; emollit, & caecos cancos inductum adiuuat.

Euzomon,

Euzumon, eruca.

ERuca, & ipsa priori similis temperamēto, flatulenta est, ob quod ad uenerem instigat, semen ipsius urinam quoq; mouet. Cæterum syluestris domestica ualentior est.

Eupatorium.

EVpatorium tenuem uim & incidentem sine conspicuo calore habet, qua iecur obstructum expurgat, est & nouulius astrictionis particeps.

Euphorbium.

EVphorbium adurentem uim sortitum est subtilemq; , aliis liquoribus similiter.

Ephemeron.

EPhemeron, non uenenū illud sed quod iris syluatica nominatur, mistæ potestatis est, & repellentis, & discutientis.

Echidna, id est, uipera.

AIperæ carnes calidæ & siccæ tēperatura euidenter existūt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc multi quos elephantia malè habebat, esu potuue ipsarum consanuerunt: quæ in maritimis, alijsq; locis aridis degunt, magis ad sitim faciendam sunt efficaces.

Echinus herba.

EChinus herba quidem, acerbæ est, quæ repellat, & siccet.

Echinus, erinacius.

ERinacei autem terrestres, caro inueterata siccataq; ualidè discutit exiccatq; : pota igitur elephantice, malo habitu præditis, & alijs plurimis auxiliatur: pellis ipsius cōcremata uehementius siccatur & discutit, alopecias cum pice liquida peruncta sanat. Marini erinacei quod esui idoneum est, urinā citat, & aluum reddit facilem: testa cremata, terrestri responder.

Echion.

EChion, alii doriada, nonnulli alcibiadion uocant, spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum uino pota auxiliatur, sed præsumentes quoq; percuti non patitur.

Hepsema, sapa.

EPssema mustum decoctum, quod alii siræon appellant, calefacit modicè & concoquit, est autem medicamentum & empla-

& emplasticum, & rofionis expers.

Quæ à Z incipiunt.

Zea.

ZEa tritico uiribus respondet, medium inter calorem, & siccitatem obtinens, leuiter exiccat. necnon uim opplendi quàm uocant emplasticen, obtinet.

Zingiber.

ZIngiberis radix impensè quidem calefacit, sed non primò statim occurſu, quòd ineuictæ cuiusdam & crassioris humiditatis particeps sit, propter quam etiam facillè perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

Zythus.

ZYthus compositæ est substantiæ, etenim acris est, ceu ex putredine procreatus, & frigidus, ex qualitate acide, eoque prauis succi habetur.

Zyme fermentum.

Fermentum & ipsum contrariis constat qualitatibus, quippe acoris cuiusdam frigidi, ac è putredine nati caloris, tum eius qui ex salis & farinæ natura contrahitur, compos est: quare non mediocriter calefacit atque discutit.

Zomos, Piscium ius.

Recentium piscium ius esculentum aluum per se, & cum uino potum deijcit, priuatim uerò in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, & saxatilibus aliis teneris simpliciter cum aqua, oleo, anetho, & sale. Item eorum quæ testacea cute integuntur, tellinarum, hiatularum, conchularum, & ueteris galli cum sale diutissimè excocti iusculum, uentrem subducit, e contrario gallinæ ius comprimit.

Quæ ab H incipiunt, quod Latini in E longum uertunt.

Hediosmus, Menta.

Menta in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta existit, cuius causa etiam in uenerè incitat: sed amari quoque non nihil obtinet, quo lumbricos enecat. Quæ uerò acerba est recentes sanguinis reiectiones coerces.

Hedysarum.

He dysarum .

HEdysarum aut pelecinos amarum est, leuiterque astringit, unde potum stomacho gratum redditur, cæterum uiscera obstructa repurgat .

Helitropium .

Heliotropium maius, quod & scoriurum uocant, calidam, siccam, & abstergentem uim præ se fert, cuius decoctum potu educit pituitam, bilemque : applicatum uero semen ipsius myrmecias & huius notæ uitia perficit . Minus autem heliotrophium, & hæc abolet & latas tineas interimit, si cum semine suo adiecto, nitro, hyssopo, & nasturtio bibatur .

Electrum, Succinum .

Electrū populi albæ lacrymā dicunt, quæ iuxta amnē Eridanum destillat, & in spissitudinē coit, aureo colore, quod si leuigatū bibatur, stomachi & alui fluxiones, & sanguinē cōpescit .

Hemerocalles .

Hemerocallis radix uiribus lilio respondet, perinde ac illud ambustis opitulatur .

Hemionitis .

Hemionitis astringens simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit .

Hepar, Iecur .

Iecur rabidi canis tostum comestumque, ijs qui ab eo commor si sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris inassati sanies lusciosos iuuare instillata : uaporemque eius decocti oculis recipi iubent: idem quoque iecur esse manducatum uero comitiales coar guere . Idem præstare & hircinum ferunt . Adhæc lacertæ iecur dentibus corrosis impositum, dolorē sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur . Asinum tostum comitiales, si ieiuni id manducent, adiuuat. Apri iecur recens inarefactum tritumque cum uino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi iecur siccum epotū, calculos eiicit .

Erigerum, senecio herba .

Senecio mixtas habet uires, refrigerat & modicè discutit.

Eryngium .

Eryngium calefacit quidem non manifestò, siccitatis autem haud obscuræ, nec modicæ particeps .

Quæ

Quæ à T H incipiunt.

Thalassion hydor, marina aqua.

Aqua marina acris, calfactoria mediocriter, desiccans, & pota stomacho quidē contraria est, uentrem autē turbat, pituitamq; educit: si calida superfundatur, extrahit, & discutit.

Taliethrum.

Thaliethrum siccandi uim sine rosione habet, hinc ulcera inueterata cicatrice obducit.

Thapsia.

Thapsia acris est, & ualenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumq; eadem discutit.

Theion, sulphur.

Sulphur trahendi & ipsum uim obtinet, calidum & substantia tenue, ut aduersus pleraq; uirulenta animalia resistat, præsertim turturem marinum draconemq; uel siccum inspersum, uel saluæ quoque mistum, uel urinæ pueri, uel oleo, uel melli: item scabiosa corporis uitia mirificè persanat.

Thermos, lupinum.

Lupinum, esculentū quidē opplēdi uiribus pollet: amarum uerò, abstergit, dissipat, & sine rosione desiccatur, tineas occidit inductū, & potū, itē uiscera purgat cū ruta & pipere potum. nam cutis uitia extergit, tumores dissipat, cū oxymelite applicatū: syluestre aut amarius est & omni ex parte satiuo ualētius.

Thelypteris.

Thelypteris, quam nonnulli nympheam uel ptelin appellant, filici similis facultate, quæ cum uino pota latas & teretes uentris tineas interimit, foetum in utero corrumpit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

Thlaspi.

Thlaspi semen est uiribus acre, ut intestinos abscessus potu rumpat, menseis prouocet: ab inferioribus partibus inectum coxarum dolores finit, cruenta uacuans, ac alioquin supra infraq; biliosa instar acetabuli potum, expurgat.

Thridax, lactuca.

Lactuca olus est non summè frigidum humidumve, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus

mationibus conuenit, præterea sitim potu restinguit, & geniturae fluorem uenerisque insomnia cohibet: Syluestris lactuca hac minus & refrigerat & humectat, uerū succulentior existit.

Thymus.

Thymus in tertio ordine calefacit & desiccat, glutinosos crassosque humores incidit.

Thymbra, satureia.

Satureia agrestis quidem eadem quæ thymus præstat, hortensis aut in omnibus quidē imbecillior, sed ad cibū laudatior.

Thymelæa.

Thymelæa, unde granū cniidiū fit, simileis ei uires obtine.

Quæ ab I incipiunt.

Idea radix.

Idea radix gustu acerba & uiribus, sanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus imposita accommodatur.

Hidros, sudor.

Sudor per se contrahere efficax est, miscetur autem in palæstris exercitantium sordibus, quibus astringendi uis duntaxat inest, ac redditur totum discutitorium. Mammis igitur inflammatione tentatis efficax est remedium, & feruori ipsarum restinguendo benefacit etiam bubonibus: at si fuerint sicciores, cum cyprino, aut rosaceo emolliiri debent.

Ixos, uiscum.

Viscum calefacit cū acrimonia, humores ex alto ualidè elicit, & thapsiæ modo discutit, hac tamē multo est ignauius.

Ion, uiola.

Violæ folia aquea frigidaq; substantia præpollenti constāt.

Ios, ærugo.

Aërugo acrem gustu qualitatem præ se fert, item discutit, consumit, inciditq; non teneram modò, sed duram quoque carnem: at si momentum ipsius cerato copiosiori misceas, medicamentum fiet quòd citra rosionem abstergat.

Hippocampus.

Hippocampus marinum animal est, cuius concremati cinis

PAULI AEGIN.

I nis

nis cum liquida pice alopecias explet.

Hippolapathum, grandis rumex.

Hippolapatum in palustribus locis nascitur, lapathum con- simile.

Hippomarathron, grande fœniculum.

Hippomarathrum cachryi proximum, magis quàm fœnicu- lum desiccatur, unde & aluum, fluentē sistit, & calculos con- fringit, mensesque mouet semen ipsius coriandro simile, re- spondet quidem ei uiribus, sed imbecillius est.

Hippopotamus.

Hippopotami quod est equi fluuiatilis, testiculus aridus po- tus ad serpentium morsus efficax est.

Hipposelinon, grande apium.

Hipposelinon cum apio domestico uirtute conuenit, nisi esset imbecillius.

Hippuris, cauda equina.

Hippuris astringentem cum amaritudine qualitatem possi- det, eoq; ualenter simul & sine rosione desiccatur, ac uulne- ra maxima committit, intestinorum ramicibus opitulatur, & uitiiis fluidis cum uino pota medetur.

Hippophaes, lappago.

Hippophaes, quod alii hypophyes uocant, quo ueste is ex- poliunt furculosus frutex est, è cuius radice rhapsiæ modo liquor colligitur, qui cum erui farina instar drachmæ datus, bi- lem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex siccatus ad pur- gationes accommodatur.

Iris.

Iris affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussi utilis, humores in pectore contumaces faciles ad excre- tionem facit, torsionibus uentris medetur, sordida ulcera pur- gat, eum mulla pota aluum inanit.

Isatis glastum.

Isatidis domestica qua tinctorum utuntur, siccandi uireis & astrin- gendi habet. his etiam magna uulnera in duris glutinat cor- poribus, sanguinem erumpentem compescit, laxos cedenteq; tumores discutit, ac omnibus malignis ulceribus resistit. Syl- uestris autem quum magis rodat, magisque ideo siccet, ualen-
tius

tius aduersus humiditas putredines pugnat, ad cætera deterior. ut quæ mordeat : cæterum ob uirium uehementiam lienosis quoque utiliter adhibetur.

Isopyron, aut phasiolum.

Isopyrum phasiolumve semen amarum ac modicè acerbum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & abstergit & incidit, sic ut corpora contrahat stringatq; , hinc etiã quæ al-
tè desident expurgat, excreationibus sanguinis nō aduersatur.

Itea, salix.

Salicis & folia & flos facultate constant quæ citra rosionem siccet, habent etiam nonnullam astrictionem, cortex autem paulo siccior est cuius perusti cinis ex iis habetur. quæ uehementer exiccet, quippe clauos & myrmecias, cū aceto ex terit.

Ichthyocolla, gluten piscium.

Ichthyocollæ uis est opplere & siccare. rectè miscetur em-
plastris capitis & glutinantibus, & iis quæ ad lepras tollendas & erugationem faciei conficiuntur.

Quæ à C incipiunt.

Cancanus.

Cancaui radix modicè siccatur, & sine rosione ad opplendum infarciendumq; accommodata, quare ex uino linctâ man-
sæque tragacanthæ & dulcis radiculæ modo, arteriæ scabri-
ciem iuuat.

Cancamum.

Cancamum lachryma est arboris in arabia, myrrhæ similis, odore grato, qua etiam ad suffitum utuntur. uis eius est ob-
esos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

Cadmia.

Cadmia utraq; siccatur, sed quæ botrytis, quasi acinosa appel-
latur, tenuioris est substantiæ, placitis autem dicta crassio-
ris. Cæterum concremata cadmia sine morfu desiccatur, abster-
git, caua ulcera tum in oculis tum in toto corpore explent, &
præsertim humidiora in naturis mollioribus, in durioribus
efficacium magis usus est.

Cacalia.

Cacalia uiribus & usu cum cancano conuenit.

I 2

Calamagrostis,

Calamagrostis, gramen arundinaceum.

Calamagrostis ficit, hinc succus decoctumque radicem ipsius oculariis miscetur medicinis, semen urinam cit, & stomacho benefacit.

Calamintha, nepita.

Nepita tertio ordine calida & sicca temperamento, est tenuis acrisque, menta longè ualentior, siquidem est uelut syluestris menta: facile igitur quæ aliè hærent ad se trahit, eoque sudores mouet, totum corpus digerit, ac rigores febrium qui circuitu remeant, finit, extrinsecus cum oleo infricata strenuè. quinetiam ad coxarum dolores ab inferioribus iniiciunt, & uitiosos humores in cutem erumpentes abstergit.

Calamus.

Calamus odoratus in secundo ordine calefacit, & ficit, in est ei quippiam & subtile & astingens, urinam itaque citat, & stomachicis, tum quæ utero & iocinori faciunt medicinis temperatur. Calamus autem phragmites extergit, folia, ipsius uiridia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit ficitque in tertio fere abscessu: radicem cum bulbis applicatam spicula & aculeos extrahere prædicant.

Campæ, eruca olerum.

Erucæ olerum cum oleo inunctæ, tutos à uirulentorum animalium moribus conseruare dicuntur.

Cantharides.

Cantharides quæ in tritico reperiuntur luceis transuersim cingulis inuolutæ, aceti feruescentis uapore suffocata, ad plurima utiles redduntur, quippe ungues scabros cum cerato eiiciunt, clauis scabiosisque affectibus opitulantur, iam uerò & exedentem urentemque uim habent: nonnulli uerò etiam medicamentis urinam prouocantibus momentum ex ipsis admissum exhibuerunt.

Cannabis.

Cannabis semen flatum discutit, & ficit, ut & genituram exarefaciat, succus ipsius uiridis ad aurium dolores ex obstructione creatos efficax est.

Canapon.

Canapon sambuci flos est, de quo prius eictum est.

Capnion,

Capnion, secundum alios capnos, fumarina.

FVmaria inde nomen sortita est, quod succus ipsius copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem: acris amaraque est, unde urinas biliosas liberaliter prouocat, iocinoris obstructioni languorique medetur, stomachum confirmat & aluum emollit.

Capparis.

CApparis radix extergit, probè purgat, incidit, discutitque: tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate contrahit, stringit & densat, quæ propter lienes induratos & pota & extrinsecus imposita, iuuat, mensis promouet, pituitam per os educit, maligna ulcera sanat, dentium dolores sopit, tumores discutit, & uiligines, quas alphas dicunt, aurium uermes enecat: folia autem & fructus similem quidem, sed imbecilliores uim possident.

Cardamomum, nasturtium.

Nasturtij semen sinapis modo urit, unde etiam inductum ruborem in cute excitat: cæterum crassos humores, cum aliis potum incidit, herba uerò arida uiribus respondet, humida moderatior, ideoque crudam ipsam assumunt,

Cardamomum.

Cardamomum acre quidem & ipsum est, uerum; nasturtio inualidius: compositus est etiam nonnullius amaritudinis, qua tineas alui interimit, & scabiem cum aceto exterit.

Caris.

Caris in pollinem detrita & cum radice bryoniæ pota tineas occidit.

Cancræ.

Cancrorum cõcrematorum cinis, fluuiatilium sanè siccatur, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substantiæ proprietate, canis rabidi moribus potu mirabiliter efficax est: ut in aliis dictum est, marinorum cinis eximia donatus siccitate his quidem non conuenit, sed ijs qui magis siccari desiderant, proficit fluuiatilis cancer tritus si inducatur, spicula & aculeos eiecit.

Caros.

Cari semen & siccatur & calefacit in tertio ferè gradu, flatus
I 3 discutit,

discutit, urinam mouet, idq; non semen duntaxat : sed etiam tota planta.

Carpesium.

CArpesium odoratum est tenue, uiscera obstructionibus liberat, urinas mouet, & renes calculo laborantes purgat.

Carya, nuces.

NVx arbor tum in coliculis tū in foliis aliquid habet astringens, plurimum autem in nucū coriis existit. succus itaq; eorum decoctus cum melle, stomachicum fit medicamentum: interius inde putamen carinatum uisum extenuandi uim acquirit, & sine rosione siccatur, quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facile in bilem conuertitur, confectumq; ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutiendi uim obtinet. Flaccescentes autem uetustate nuces, cutis uitia abstergunt. At auellanæ, quas & ponticas uocant & leptocarya, frigidiores sunt & austeræ, in cæteris, inglandibus æquales.

Caryophyllon.

CAryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India ueluti flores cuiusdam arboris festucacei & nigri sunt, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi & sicci in tertio prope modum ordine : qui multiplicis usus sunt, tum ad obsonia, tū ad alia multa medicamenta.

Cassamum.

CAssamum hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quo supra egimus.

Cassia.

CAssia calefacit & siccatur in tertio ferè abscessu, tenuis abunde, acris & modicè astringēs. incidit igitur simul & discutit, roburq; instrumentis adiicit, postremo & mensis euocat.

Castorium.

CAstorium calefacit siccaturq; cum extenuandi uiribus eximiiis, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum malè habent, affectibus, congruit, & refrigeratos facile recalfacit, & extrinsecus applicatum & potui datū, idq; ita, ut nullam aliam offendat particulam etiam si medicocriter

riter febris affligat, quemadmodum in uerernis & lethargis, sed & mensibus retentis proficit, & secundas expellit, at in cerebri & pulmonis uitiis etiam suffitus castorii inspiratu haustus, præclare opitulatur.

Caucalis.

CAucalin alii daucum syluestrem appellant, nam dauci modo calefacit, siccaturinam mouet, & fassamento ad repositionem conditur.

Cenchros, milium.

Milium refrigerat in primo abscessu, siccatur, in secundo habet etiam modicam extenuandi facultatem extrinsecus igitur in sacculis ad fouendum & cataplasmatismodo adhibitur, desiccare consuevit.

Cedrus.

CEdrus & quæ fruticosa est iunipero similis, & quæ arbor, calefaciunt, siccantq; in tertio ordine, confectum ex eis oleum quod cedream appellant, etiam quartum attingit, subtilis admodum substantiæ. hinc teneras carnes expedit & citra dolorem exedit, duras autem præsertimq; demortuas siccatur & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & aurium uermis interficit, aliaq; plura facit.

Centaurium.

CENTaurij maioris radix acris, calida, & terræ astrictionis compositus est, mensis itaq; promouet, foetus corrumpit, eiicitq;, uulnera glutinat, sanguinem spuentibus, & reliquis pectoris uitijs præsens est remedium. Minoris centaurij radix inefficax, est, coliculi ualide & citra morsum siccatur unde non solum ad quæ maius centaurium ualet, sed etiam coxendice labosantibus, ipsius decoctum inferius injectum, biliosa uacuat, nonnunquam & cruenta, ac ualide proficit.

Ceras, cornu.

CORNU caprillum hircinumq; concrematum denteis nitidos reddit, gingiuas nimia humiditate flaccidas composit. Cerui autem cornu cum uino maceratum tritumque, deinde circumlitum mobileis sistit denteis. Crematum, mox lotum, dysentericis, celiacis, sanguine expuentibus, & arquaticis, duorum cochlearium instar auxiliatur: miscetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.

Cerasia.

Cerasia dulcia quidem citius per alium descendunt, austera stomacho utiliora sunt, acida uerò ob incidendi uim quam habent pituitosis excrementosisq; stomachis prosunt, gummi uerò cerasi arboris arteriam exasperatam læuigat, & calculo laborantibus cum uino potum succurrit.

Ceratonia arbor.

Ceratoniae fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & astringendi uirtutis, nonnullus etiam dulcedinis particeps est.

Cephalæ capita.

Menarum sale conditarum capita cremata, uim siccandi non admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratum Scyrro sanant. Smaridis caput totum combustum ad alopecias cum adipe ursino proficit. Idem præstat etiā muris caput crematum cum melle. Milui aridum sine plumis, modo qui tribus digitis comprehendi queat, cum aqua potum ani dolores finit. Lacertæ uerò caput aculeos educere tradunt, myrmecias, uerrucas, & clauos exterere.

Cecis, Galla.

Galla, omphacitis, quidem medicamentum est affatim astringens, eamq; ob causam siccant, fluxiones repellit contrahitque, laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectibus accommodata est: ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quæ flauo colore, inanis magnaq; est non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes & procidentias excocta iuuat: gallæ uerò combustæ & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

Cepæa.

Cepæa portulacæ similis est, folia ipsius contra uesicæ scabies utiliter bibuntur, radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

Cera.

Cera quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficitur, ipsa uerò per se ex ijs est, quæ læuiter obsterunt, nam & discutientem & calidam uim exiguam obtinet.

Ceryces.

Ceryces, buccina.

BVccinorum testa concremata excellenter desiccatur citra ro-
sionem, unde ulceribus maleficis accommodatur, at in ijs
quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut uino, aut oxyme-
lite ipsis utendum est, oleum in quo ueluti caro ipso adhuc
uiuientium excocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

Cici, ricinum.

Ricini fructus quemadmodum purgat, abstergit, discutit, sic
etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

Cinnabaris.

Cinnabaris acreis mediocriter uires habet, item nonnihil
etiam astrictionis.

Cinnamomum.

Cinnamomi uis est summè tenuis, nō item æquè calida, sed
tertiū ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi calorem re-
ferunt adeò ficit, propter substantiæ tenuitatem. Cinnamo-
mis autem ueluti inualidum quoddam cinnamomū est, quod
nonnul i pseudocinnamomum uocant.

Cirœa.

Cirœæ radix calida est & odorata, quæ cum uino pota fœ-
minarum locos purgat: semen in sorbitione sumptū lac
generat.

Cisseris, pumex.

Pumex absterforius est præsertim dentium, non modò uiri-
bus, sed etiam scabritie, coniicitur autem in medicamenta
quæ carni ulceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis la-
bes exterunt, Crematus tenuior quidem, sed mordax redditur:
lotus, id quod mordet, deponit.

Cisthos.

Cisthos, aut Cissaros frutex est astringens & modicè frigi-
dus uirtute, folia ipsius & germina adeò siccant, ut etiā uul-
nera conglutinent: at flores quum in secundo ferè gradu sic-
ciores sunt, dysenterijs, alijsq; fluidis uitijs accommodati sunt:
extrinsecus illiti, putrida ulcera compescunt.

Cissos hederæ.

Hederæ contrariis constat uiribus, ut quæ astringat & refri-
geret. Item acris est & calida, aqueæ substantiæ & tepidæ
quum

quum uiridis est, particeps : cuius folia uino incocta uulneribus glutinandis, ambustis, & lienosis salutariter adhibentur, succus ipsorum naribus ad pituitam educendam infunditur. item diuturnis aurium defluxionibus succurrit : lachryma hederæ, ut quæ acrior sit, pediculos enecat, & pilos abolet.

Citrium, quod & malum medicum dicitur.

Ciprij medium acidum, aut qualitatis expers est, in quo semen tertij refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acri uirtute præditus, caro ipsius crassi succi est pituitæ generandæ apta, & frigida : semen discutit, & in secundo ordine deficcatur, folia arboris siccandi discutiendiq; uim repræsentant.

Cichorium, intybus syluestris.

Cichorium picrisue tanquam syluatica seris est, refrigerans siccansq; in primo abscessu : habet etiam uim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

Clematis.

Clematis quibusdam daphnoides, aliis myrsinoides, nonnullis polygonoides, sarmenta habet oblōga, crassitudine iunci quem holoschoenum dicunt, folium uero lauri, siccandi uirtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhiam dicunt, dysenteriam, & dentium dolores finit : contra uenenatorum morsus rectè imponitur.

Clematis altera.

Clematis altera arboribus sinilacis modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius semen cum aqua potum, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas inducuntur.

Clinopodion.

Clinopodij uis est calida siccaq; nondum uero adurens, sed tertij ferè ordinis.

Cnicus.

Cnici semine ad purgandam aluum duntaxat utimur, si quis extrinsecus eo utatur, tertij siccantium ordinis erit.

Conchylia.

Conchylia buccinis facultate proxima sunt.

Coelia,

Cælia, uenter.

VEnter mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior alui membrana sicca potui data: uerum Galenus experimēto falsum utrunq; se inuenisse scribit. Palumbi uerò auis uentrem paulatim potum calculos per urinam elice, testis est Dioscorides. Mustelæ alius pota contra quælibet uenenata amuletum dicitur.

Coccus cnidios, granum gnidium.

Granum gnidium semen est thymelæ, non chameleæ, ut quidam opinati sunt, acri & adurente facultate præditum, hoc epotum, per inferna aquas detrahit.

Coccus baphicos, granum tinctorium.

Granum tinctorium leniter siccatur, unde magnis & neruorum uulneribus, cum aceto aut oxymelite læuigatum, cōmodè imponitur.

Coccymelæa, prunus.

Pruni fructus uentrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius, gutturis inflammationes utiliter colluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidendi uim extenuandi; testatur, ob quod nonnulli frangendis uesicæ calculis esse cum uino potum affirmant: ex aceto, puerorum impetigines per sanare. Syluestrium prunorum baccæ euidenter astringunt, uentremq; reprimunt. Nominatur hæc planta in Asia prumnum. Domestica uerò pruna siccata apparent, quæ nunc Damascena appellantur, quemadmodum Galenus memoriæ mandauit.

Colla, glutinum.

Gluten quod ex simila & polline conficitur, emplasticam uim & concoctricem repræsentat.

Colocyntha, cucurbita.

Cucurbita humidi, frigidiq; in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si applicetur, calidas refrigerat inflammationes.

Colocynthis, cucurbita sylvestris.

Cucurbita sylvestris ualidam purgandi uim obtinet: uiridis ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur,
Comaros,

Comaros, arbutus.

ARbutus, & arbor, & fructus acerbæ qualitatis est, uocant eū in emyrcoelon: cæternū stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

Commi, gummi.

Gummi siccante ui & emplastica pollet, & nimirum asperitatibus medetur.

Conia, lixiuium.

Lixiuium ueluti cineris lotium nominatur: omnium maximè absterforium & siccans est, quod ex fici & rithymalli cinere præparatur, ac ferè iam exedens: q̄ si calx etiam cineri addatur lixiuium redditur adurens: quod iam etiam protoſtaſton nuncupant, clysterium potissimum medicinis miscetur. Vehementissimū uero omniū est, quod ex sola calce cōficitur.

Conyza.

Conyza utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc etiā Coleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeātes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum menseis citat, & foetus extrahit: quæ uero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est.

Copros, stercus.

Stercus quodlibet calefacit, maximè siccatur & discutit: uariæ autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, & uictus ratione. itaq; canum quum ossa uorauerint fimus inarefactus, dysenterias cum scisso lacte, quod Græci schiston uocāt potius, sanat: idem uetusta ulcera reficit, si medicamentis in ea efficacibus misceatur. Hoc anginae, tonsillarumq; inflammationes cum melle inunguntur. At puerorum qui uictu non superfluo educati sunt stercus, huic malo magis prodest. Luporū quod & ipsum candidus in fructibus reperitur, coli doloribus strenuè succurrit, non potum modò, sed corpori etiam adalligatum: alligetur autem ex lana ouis à lupo enectæ, aut pelle ceruina. † Caprillum stercus acrius, magisq; discutiens, scirrosos tumores applicatum dissipat, præsertim in duris corporibus: crematum uerò ualentius abstergit, extenuatq̄. Bubulum extrahendi quandam uim obrinet, ideoq; uesparum & apium ictibus medetur: quinetiam toti corpori in sole oblitum aquas inter curem præclare iuuat. Quum uerò cū aceto myrmecias,

myrmecias, acrochordonas, furunculos & clauos, perfanat. Columbarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, aliis longè acrius cum nasturtij semine cutem exulcerat. Gallinarum ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, uomitione stranguantes fungos educit, præsensq; est remedium: hoc quoq; colico dolore conflictantibus potui quidam exhibebant. Nonnulli uerò & ciconiarum fimum orthopnoicos potum auxiliari affirmant. Murium fimus reliquis abstergit efficacius, eoq; alopecias curat, & infantium sedi appositus, ad excretionem proritat. Sturuorum qui oryza pasti fuerint, abstergendi uim præ se fert, qua cutis asperitates, quas ephelidas Græci uocant, exterit. Terrestrium crocodilorum fimu, uirilignes, quas alphos dicunt, extergit: quemadmodum fluuiatilium, oculorum albugines extenuare creditur.

† In Cod. antiquis, hoc uerba ita leguntur. κόπρος αἰγῶν, σπύραθαι δὲ ἰδίως ὀνομάζονται, δριμύτης καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δύναμειος τοῖς σκιρῶσιν οὐγκοῖς ἀρμόττεισθαι, οὐ σπληνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μερῶν. ἐγὼ γὰρ ἐπὶ γόνατος ἔχοντος οὐγκὸν χρόνιον, δύσλυτον, ἐχρησάμην αὐτῇ δι' ὅσον κράτε καταπλάττειται κελεύσαι ἀλδύρον κρίθινον ἐμβαλλομένης τῆς κόπρος. Quæ uerba qm̄ conuersa sunt in latinum sermonem ab interprete Aetij, ex quo huc tralata, tu apud eum auctorem lege.

Corallium.

COrallium ueluti arborea planta est in lapidis duritiæ coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, colore rubrū, lapidi simile, siccandi ualidam, astringendi mediocrem uim possidet, ideoq; cruentis sputis, & dysentericis utile.

Coris animal, cimex.

CImex acri uirtute pollet. Scribunt igitur quidam cum aceto potum hirudines eiicere.

Coris herba.

COris herba, quam alij uocant hypericon, acris est, & odorata, semen eius ad urinam & menseis ciendos bibitur: succurrit & phalangiorum moribus, item ad opisthotonon cum oleo inungitur.

Corianum seu corium, coriandrum.

COriandrum ex contrarijs uiribus compositum est, tenuis substantiæ, terrenæ, amaræ, aquosæ autem humiditatis tepidæ

pidæ particeps, habetque, modicam uim astringendi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admodum feruentibus conuenit, tumores molliusculos cum quodam in id efficaci discutit. Semen modicè quidem cum passio bibitum, tineas pellit: liberalius autem sumptum mentem tentat.

Corydos, aut corydallus, Galerita siue alauda.

ALauda auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem continuè & sæpe cum ipso iure debet.

Coronopus, pes cornicis.

Coronopodis radix & ipsa ad colicos cruciatus proficere manducata creditur.

Costus.

Costus modicum quidem amaritudinis, plurimū uerò acris & calidæ qualitatis habet, unde in quibus uel calefacere particulam quampiam cogites, uel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugiendum est: urinam igitur & menses ducit, tineas enecat. Quum uerò & flatulenti cuiusdam particeps sit, uenerem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febrium rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

Cotyledon, acetabulum.

Acetabulum refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminuere, & urinam ciere creduntur.

Cochlea.

Cochleæ concrematae impensè siccant, & mediocriter calefaciunt, conferunt dysenterijs, quas nondum putrelago obedit, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars una, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si cum regumentis in pollinem coactæ uentri imponantur, aquâ subter cutem exinaniunt, prosunt item articularijs doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in uniuersum humorem altè insertum ualidè deficcant.

Crania, cornus.

Corni arboris fructus acerbus, si edatur, ualidè uentrem astringit. folia autem & germina acerbitate uehementer ficcant,

siccant, adeò ut etiam maxima durorum corporum uulnera conglutinent.

Crambe, brassica.

B Brassica quæ edendo est siccata, & manducata, & à foris imposita, non tamen acrem conspicuè uim ostendit, eoq; uulnera glutinat, & dolosa malignaq; ulcera, ac tumores solui cõtumaces persanat: habet etiam nonnihil absterforium, quo lepras exterit. Semen ipsius potum tineas occidit, præsertim Aegyptiæ: caulium crematorum cinis adurente ui cõstat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Syuestris autem brassica, satiua in omnibus ualidior est, unde nec intra corpus citra noxã sumitur. Marina, subsalsa leuiterq; amara, aluuũ solent.

Cratægonos.

C Ratægoni herbæ semen & acre gustanti deprehenditur & frigidum, milio simile.

Crethmon.

C Rrethmon falsum est simul & amarum, sed modicè, quare & uis ipsius est asterforia & desiccans.

Crithe, hordeum.

H Ordeum refrigerat siccataq; in primo abscessu, uerum non nihil etiam extergit: cæterum fabarum lomento siccitate præcellit, minus flatulentum est, polenta hordeo multo magis siccata, pitisana præterquàm quod largius humectat, etiam † abstergit uehementius.

† In altero manu scripto his uerbis hæc sunt adscripta, οἱ δὲ ἐκ τῶν κριτῶν γινόμενοι ἄρτοι ἀτροφώτεροι τῶν ἐκ τῶν πυρῶν εἶναι, i. panes qui ex hordeo conficiuntur, minus alunt quàm qui ex tritico. Quæ huc traducta sunt ex Aërio.

Crimnon.

Quod in tritici & zeæ & farina crassius est, crimnon apellatur, ualidius nutriendum quàm polenta: ægrius autem conficitur.

Crinon, lilium.

Lilij flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia, terrestri & nonnulla aquosa temperata: quapropter oleum quo iuc ex eo confectum discutiendi uireis, molliendiq; repræsentat, uulug inflammationibus accommodatum. Radix ac folia

ac folia ficcant, abstergunt, discutiuntq; mediocriter, quò fit ut ambustis conferant: succus ipsorum, & neruorum uulneribus cum oxymelite prodest.

Crocodilion.

CROCODILIJ semen & succus calidam, siccam & discutiētem uim præ se fert, urinas itaque & menses mouet: radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per nareis ducit.

Crocus.

CROCUS ad secundum calefacientium ordinem, primum ficcantium refertur astringit & concoquit.

Crommyon, cepa.

CEPA ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quam obrem hæmorrhoidas appositu aperit: item abstergit: uirilignes, alphas dictas, cum aceto exterit, & alopecias ocus alcyonio pilos restituit, succus oculis suffulis aut crassi humoris uitio hebetibus auxiliatur.

Cyamos, faba.

FABA non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiam absterforiæ qualitatē est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ nonnihil quoq; astringat, tota ipsa faba in posca decocta celiacis, & dysentericis conducit, inducta uero cataplasmatē modo inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

Cyanos.

CYANOS acrem habet uim detrahendi, & discutiendi maiorem quàm cinnabaris: astrictiōis quoq; particeps est.

Cyclaminus.

CYCLAMINUS uarias uireis habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discurit: cum melle, suffulis proficit, per nareis purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, & sed & ipsa uehemens adeò est, ut cum mulla instar trium drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis uitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon uocant,

uocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut potum priori similia faciat.

Cyminum, cuminum.

CVminum in tertio ordine calefacit, urinam mouet, & flatus discutit.

Cynosbatos, rubus caninus.

RVbi canini fructus non instrenue astringit: folia id præstât mediocriter. at quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum cauere debet.

Cyparissus, cupressus.

CVpressi galbuli & turiones siccandi uiribus polleant, nullo calore conspiciuo: quapropter uulnera magna in duris corporibus conglutinant, & superfluis putridinibus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumque ramificibus opitulantur.

Cyperus, iuncus angulosus.

Iuncus angulosus calefacit siccaturque: citra morsum, hinc etiam humidioribus ulceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris ulcera per sanat: habet & uim quandam incisoriæ, qua calculos comminuit, urinam & menstrua promouet.

Cypros.

Cypri folia & surculi mixtis constant uiribus, discutiente & astringente, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: ideoque decoctum ipsorum ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas uocant, commanducata, per sanat: item medicinis leni dicatis miscetur.

Cytisus.

Cytisi folia discutiētis leniter, & tepide naturæ sunt, quemadmodum & maluæ.

Conium, cicuta.

Cicutæ uires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

Conos.

Coni cortex & folia, pinum uiribus repræsentant, sed aciora efficacioraque sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, uiridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facilem excretionem accom-

modatur esculentus in aqua maceratus ut acrimoniam exuat temperatus redditur, rosionis expers, opplens obstruensque, ut etiam asperitates læuiget.

Quæ ab L ordiuntur.

Lagopus.

Lagopus siccae facultatis est, qua alui fluores desiccant.

Ladanon.

Ladanon à cistho ladone dicta gignitur, quam depascentes capellæ barbis suis & uillosis cruribus succulentum & pinguis ex herba deferunt, quod congestum ladanon est medicamen præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discuties & concoquens, eoq; uteri affectibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnullas astringendi uireis quibus defluos capillos confirmet.

Lathyrus.

Lathyrin & ipsam tithymali speciem esse dicunt, quod eius succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuam purgandi uim habet.

Lapsana.

Lapsana māducata stomacho nocet, inducta uero cataplasmate nonnihil abstergit discutitque.

Lapathum, rumex.

Rumex mediocriter discutit: acuta rumex, quæ oxylapathum dicitur, præter id etiā pauxillum repellit: semen aut præsertim oxylapathi, astringēs, alui profluvia, diarrhoeas dicūt & dysenterias persanat, folia uerò semini cōtraria faciunt: hæc etenim comesta aluū mouent, illud potū ipsam comprimit.

Lemonium.

Lemoni fructus austerus cum uino cœliacis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

Lichen herba.

Lichen herba in petris nascens muscum representat, uis ei est exterendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare: impetigines sanat, inflammationes arcet, & ut Dioscoridis uerbis utar, sanguinis eruptiones sistit.

Lichenes

Lichenes equorum.

Lichenes equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium uenatorum moribus mederi feruntur.

Leontopetalon.

Leontopetali radix & sicca & calfacientis in tertio ordine facultatis est, necnon discussoria.

Lepidion.

Lepidion, quam & hiberiada uocant, ex quarto calefacientium gradu est, nasturcio proximum uiribus, minus autem eo deficcet.

Lepis, squama.

Squama omnis ualide siccat, astringit, nec ignauiter mordet. Sed æris amplius siccat, extenuatque, cui nonnihil æruginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clauis raditur, quam propterea etiam helitum quasi clauarem appellant. At ferri squama, liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quæ propter ad contumacia malignave ulcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

Leucacanthum.

Leucacanthi, quod alii polygonatum, alii ischiada uocant, radix incidit quidem, & in tertio ordine siccat, in primo autem calefacit.

Leucas.

Leucas calfacit siccatque in tertio ordine, acrimonia uerò præpoller.

Leucoion, uiola alba.

Albæ uiolæ totus frutex abstergendi extenuandique uireis possidet, magis autem flores, & ex eis, sicciores: idcirco & mensis stimulant, foetus corrumpunt expelluntque, ac si quis aquæ mistura uim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducent, præsertim uteri: radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: aceto inflammationibus in scirrhum indurescentibus imponuntur.

Leuce, populus alba.

Populus alba aquosa, tepida, terrestrique constat substantia, uiribus absterforiis.

Libanotides, rosmarinus.

Libanotides tres numerantur, una sterilis, duæ fructum ferentes, vires illis extergendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi, succus earum oculis & humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur: coronariæ uerò libanotidis decoctæ ius regio morbo laborantibus rectè bibitur.

Libanotos, thus.

Thus in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet & modicam quandam vim leuiter astringentem: cortex ipsius manifestò astringit, siccaturque in secundo abscessu absolute, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, cœliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tum intrò assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccaturque; tertio in abscessu, atque nonnihil extergit: quocirca oculorum ulcera, & purgat & explet.

Lygnis, fuligo.

Fuligo specierum quarundam concrementarum, nempe thuris, myrrhae, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, ueluti tenuissimus quidam pulvis est, qui Græcis æthale dicitur, cum fumo ascendens. obtinet quidam siccantem & terrestrem tenuemque substantiam particulares autem ipsius differentiae secundum materiam combustionis ratione fiunt. Utuntur ea potissimum in medicinis oculariis, & ad honestandas palpebras accommodatis. at thuris fuligo omnium est utilissima, ut quæ mitior: contra pini, coni, & piceæ ualentior est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras, destillantes & erosos oculorum angulos, illachrymantesque, rectè adhibeatur.

Ligusticum, ligusticum.

Ligustici & radix & semen adeò calefaciunt ut mensis contentent, flatusque probè discutiant.

Lithargyros, argenti spuma.

Argenti spuma medijs inter metallica ordinis est, eoque; ceu materie ipsa alijs medicinis mista subinde utimur, siccatur tam mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus persanat.

Litthi, lapides.

Lapides omnes terræ modo desiccant, sed hæmatites astringit & abundè siccatur. quare etiam oculorum asperitates exterit,

exterit, quum quidē inflammatione carent, ex aqua: quum uerò illa tentantur, ex ouo: cæterū ad spura cruenta bibitur utiliter; ulcera supertrescentia compescit. Schistos lapis superiori quidē consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, i. lactarius sequitur. Melitites cuiusdam ē calor compos est. Moroxus, quem etiā, leucographida uocant, quò prædictis omnibus minor est (nullas. n. habet uireis efficaciores) eò moderatior, magisq; dolorē lenit, eamq; ob causam in teneris corporibus cū cerato ad cicatricē ulceribus obducendam illo utuntur. Iaspis qui subuiridi colore est, quū efficacior sit, oculorū cicatrices & pterygia extenuat: uiridis autē Iaspis adalligatus & in anulo gestatus stomachū adiuuat. Iudaicus dictus, renū calculos conterit, unde ē recentiores tecolithon appellāt. Pyrites ex eorum numero est, qui ualidē discutiunt tumores, sanguinemq; in grumos concretū: cuius quum facultas nō est, molari utuntur. Phrygius præter quam q̄ ualenter desiccet, nonnihil etiā astringit roditq; unde & repellere & discutere potest, eoq; oculariis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiendiq; uirtutis cōpos, gutturis inflammationē iuuat. Asiæ petra flos ram subtilem naturā habet, ut carnes humiditate flaccidas citra rofionem absumat. Gagates affatim siccans inflationibus præsertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heracliū lapidē uocant, æquales hæmatiti uireis repræsentat. Arabicus ebori similis, siccandi detergendiq; uireis habet. Alabastritæ combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentibus purgandis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, renum calculos frangūt. Similes his uireis habent qui in Argæo Cappadociæ monte nascūtur. Similiter & ophites dictus, qui adalligatus contra uiperarū morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à terra quam intra se cōplectitur appellatus, abundē siccare feruntur, ideoq; inflammatis tumoribus mederi. Naxiæ cotis detrimentū refrigeratorium esse dicunt, ut & uirginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, reprimat. Quod uerò ex olearia cote detritum fuerit, absterforia uī donatum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra hæmorrhoidas ualere perhibent. Sapphyrus potus, scorpionum ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Armeniacus, inferiorem uentrem purgat, sed stomacho nocet.

K 3 Litho.

Lithospermon.

Lithospermon, quod alij Liosporon, alij heraclion uocant, herbae aetonychi dictae, semen est lapidosum, album, quod cum uino albo potum calculos frangit, & urinas eiecit.

Linospermon, lini semen.

Lini semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaq; medium manducatum flatibus creandis est, etiā si frictum fuerit.

Linozostis, herba mercurialis.

Herba mercurialis aluum liberaliter subducit, inducta cataplasmatis modo discutit. Sciendumq; est eius semen infricatum corporis excrescentias præter naturā, quas uulgus uocat naphia, abolere, sicut experientia cōprobatū est. Sed uiride semen esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare.

Litrum, nitrum.

Litrum mediū inter aphronitriū & salem uirtute est: creatum magis extenuat discutitq;, & si intro sumat, crassos uiscososq; humores plus cæteris incidit & extenuat. Chalastreū uerò (est aut Calastra Thessaliae locus) acri⁹ siccātiusq; ē, quare ad capitis destillationes & articulares cruciatus eo utūtur.

Lenchitis.

Lenchitis, cui semen triangulum est, cuspidis modo, radix dauco æqualis urinam mouet: eius uerò quæ scolopēdrio respondet, folia uiridia, uulnera glutinant, sicca uerò cum aceto pota lienibus scyrrho induratis, medentur.

Lycopsis.

Lycopsis radix quum sit astrictoria, cum polenta admota in cataplasmate. Erysipelatis auctore Dioscoride cōuenit: si læuis cum oleo iungatur, sudores elicit.

Lycium.

Lycium ex diuersis genere substantijs constat, calida, tenui, & discutiente, terrestri uerò frigida & leuiter astringente, ut in secundo abscessu desiccet, calefaciendo refrigerandoque medium est, hac de causa ceu absterforio, in oculis obscuratis eo utuntur: tanquam astringenti, in coeliacis, dysentericis, & maleficis ulceribus: at contra inflammationes, ut discutiēt: cæterum primas obtinet Indicum.

Lygima-

Lysimachum.

Lysimachum uim habet excellenter astrictoria, qua & uulnera glutinat, & sanguinem compescit, tum ipsum, tum ipsius succus, dysentericos & potum & ab inferioribus partibus iniectum, sanat.

Lychnis.

Lychnidos coronaria semen calidum est & siccum in secundo abscessu, eoq; absoluto.

Lotus herba.

Lotus domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, abstersorias uireis obtinet & modicè siccantibus, calore temperata est. At syluestris loti semen ad secundum calefacientium ordinem refertur, habet autem nonnihil etiam abstersorium. Aegyptiae semen in panes quoq; effingitur.

Lotus arbor.

Lotus arbor extenuat, siccatur, & mediocriter astringit, quae de causa ad fluxum muliebrè, alui fluores pota cum uino aut aqua, aut et in aluum data, salutaris est, pilos defluos confirmat.

Quae ab M auspicantur.

Macer.

Macer cortex est qui ex India importatur, tertio ordine siccatur inter calorem & frigiditatem medium obtinet: est etiam astringens tenuisq; unde coeliacis & dysentericis auxiliariis habetur.

Malobathron.

Malobatri folium aequales spicae nardi uireis repraesentat.

Malache, malua.

†Malua syluestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autem, seu humidior, etiam imbecillior est: semen tantum uiribus praestat, quanto & siccus est.

† Huic capiti addita sunt quaedam in ueteribus manuscriptis de dendromalache, quae quia totidem uerbis apud Aetium leguntur, adscribenda non putaui.

Mamiras.

Mamiras ueluti radícula herbae cuiusdam est seu geniculis frequentibus nodosis, quae cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate praedita.

Mandragoras, mandragora.

MAndragora tertii refrigerantium ordinis est, mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, unde soporem grauem homini possunt accersire: at radice cortex uehementissimus, non refrigerat modo, sed etiam siccatur: interior eius pars imbecillior est.

Manna thuris.

MAnna thuris simileis thuri uireis habet, sed remissas & sensim altringentes.

Marathron, fœniculum.

Fœniculum calefacit in tertio ordine, in primo siccatur, hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

Mastiche.

Mastiche, Chia quidem calefacit, siccaturq; in secundo abscessu, cæterum composita est facultatis, astringentis simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, uentris, intestinorum & iocinoris inflammationibus conuenit. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoq; dissipat.

Melan, atramentum Indicum.

Atramentum Indicum auctore Dioscoride in genere leniter astringentium est, quæ inflammationes laxosq; tumores, œdemata uocant, rumpunt, ulceraq; purgant.

Melantheria, creta sutoria.

Creta sutoria impensè astringit extenuatq;.

Melan, atramentum scriptorium.

Atramentum quo scribimus abundè & ipsum desiccatur, solum uerò posca ambustis si illinatur, præsentis est remedio.

Melanthion.

Melanthion in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiam tenui natura præditum unde destillationibus in fauces, olfactu prodest, intus assumptum discutiendis flatibus singulare: est etiam amarum, unde tineas interficit: abstergit & incidit, hinc orthopneis quoq; conuenit, item lepras exterit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

Meli, mel.

Mel calefacit & siccatur ordine secundo, abstergitq; insigniter: coctum

coctum uerò minus quidem acre redditur, deterforium, & uentri subducendo accommodum, sed magis nutrit. Amarū mel, sicut & id quod in Sardinia fit, mistas habet uireis, terrestrem & calidam. At mel, sachar quod ex felici Arabia conuehitur, minus dulce nostro est, sed æqualeis uireis obtinet, præter q̄ qđ nec stomacho noceat, nec sitim faciat, quēadmodū hoc Noltras.

Melia, fraxinus.

FRaxinus nota arbor est, folia eius pora uiperarum moribus succurrunt, cortex crematus, illitusq; ex aqua lepras separat, ligni uerò ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

Melilotos, fertula Campana.

Sertula campana mixtis facultatibus pollet: astringendi, discutiendi & concoquendi.

Melissophylon, apiastron.

Apiastrum uiribus marrubio per omnia respondit.

Memæcylos.

Memæcylos arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

Mespila.

Mespila, alii triocca quasi trigania uocāt, fructus est assatim acerbus, & uix esculentus, aluumq; continēs: germina foliaq; mespili impensè acerba sunt.

Medion.

Medij radix uireis semini contrarias præ se fert, quippe austera est & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem fluxū sistit: semen quum tenuis incidentisq; sit facultatis, menseis quoq; proritat.

Necon, papauer.

Papauer multiplex est, hortensis quidem, quod etiam thylacitin ceu utricularium uocant semen est esculentum, si cū pane assumatur, mediocriter somnum concilians. Arrhœas appellatum, inde q̄ semen ipsius celeriter defluat, ualidius hortensi est: manducatur itaq; non per se, sed momentum copiosiori melli mixtum. Quod ueluti decidenti, ac depressio calyce est, nigrum semen habet, & medicatum, nimis quā frigidum. Quod prolixiore & proceriore constat calyce, medicacius quā cætera omnia existit, ut etiam stuporem inducat, quousq; intemiat. Nā & ipsum & eius lachryma, quam per excellentiam opion

opion nuncupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur. Cornicularum papauer abstergendi uireis sortitur, ideoq; radicis ipsius decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia autē & flores perquam sordida ulcera expurgant, crustasq; tollunt. Heraclion & aphrodes, id est spumofum papauer dictum, semē habet pituitæ purgandæ accommodatum.

Mela, mala.

MAlis omnibus frigida & excrementitia inest humiditas: & quæ in eorū censu resoluta & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant: dulcia, aquosa quidem, non tamē manifestè frigida sunt austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida: acida frigida quidem & ipsa, uerum incidendi humores uentriculo inhærentes uim testantur: acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata temperamento, uentrem supprimunt, uulnera glutinant pari modo folia, succi, & cortices arborum inter se differunt.

Melea, malus, persica.

MAli persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; umbilico imposita, tineas enecant: fructus autem ipsius nempe persicum hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumq; existit.

Melea, malus Armeniaca.

MAli armeniæ fructus, quæ nunc uocant mala præcocia, consimiles persicis uireis refert.

Meon.

MEi radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideoq; urinam & menses cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

Milax.

Milax tam læuis, quàm aspera, arbores amplexa, calidam acremq; facultatem possidet.

Misy.

Misy medicamentum est ex ijs quæ crustam faciunt & adurunt, ualenterq; astringunt, minus autem quàm chalcitis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori uetustate in misy mutantur, ut ait Galenus; à superficie incipiente statim mutatione.

Molibdena,

Molybdena, plumbago.

Plumbago argenti spumæ uireis habet à medio temperamento ad frigidius digressa.

Molybdos, plumbum.

Plumbum refrigeratoriæ uirtutis est, habet & humidæ substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Quod si id perfundatur teraturq; aut uino, aut immaturo oleo, aut quodam succo refrigerante, ad naturalium & sedis ulcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina uero plumbæ super lumbos gestata, ueneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsum dissipat. Concrematum plumbum ualidius quidem siccat, sed & acrimoniæ non nihil obtinet: si eluatur, tum sine rosione siccat, tum maleficis ulceribus præsentaneum est remedium.

Moræa, morus.

Mori fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamentis stomaticis aliis quæ moderatam requirunt astringentem utiliter miscetur, immaturus ubi exaruerit, per quàm obstruens fit medicamentum: cortex aut radicis arboris etiã amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoq; latas uetris tineas occidit: foliorum autem furculorumq; uis, subducentium & comprimentium media quodammodo existit.

Myagros.

Myagri semen pingue est, quod in eo oleosum habetur, opulendi uireis repræsentat.

Myaces, mituli.

Mytuli cõbusti, eundẽ cū buccinis effectum præstant, propriè uerò eloti palpebrarũ asperitatẽ & albugines cum melle exterũt, caro ipsorũ canũ moribus utiliter imponitur.

Myaron.

Myaron, quam alij melampycnon appellant, herba ferulacea est & pinguis, uidetur autem ipsius pinguitudo corporis asperitates læuigare.

Myelos, medulla.

Medulla facultatis est quæ indurata ac in scirrhum concrementa corpora emollit. Laudatissima est ceruina, mox uitulina: taurina uero hircinaq; actior est, magisq; siccat, & quæ

quæ in artubus continetur, pinguior est magisq; emollit: quæ de spina elicitur, durior squalidiorq; est.

Mycetes, fungi.

FVngi frigidi & humidi admodum temperamento suat: nonnulli ipforū manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participi.

Myosote, muris auricula.

MVris auricula dicta est alsine.

Myxa.

MYxa arboris fructus est minor quidem prunis, facultate uerò consimilis.

Myrica tamarix.

TAmarix incidit extergitq; ita ut manifestè non siccet, habet autem astrictionem nonnullam, qua de causa decoctū ipsius potum lienes adiuuat, item dētium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius gallæ uirtute proximus est: cinis arboris uehementius exiccat.

Myriophillon, millefolium,

Millefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera conglutinet.

Myrrha, uel myrrhis.

MYrrha in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisq; est, mensibus mouendis, & humoribus & thorace & pulmone repurgandis idonea.

Myrrhine, seu myrsine, myrtus.

MYrtus ex diuersis cōposita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua ualenter siccatur: at myrtula quæ folioles myrti est, tuberosa, caudicem ipsius & ramos amplexa, uehementius astringit & siccatur. iam uero & folia aridiora uiribus magis siccant: item fructus succusq; tum foris applicatus, tum intus assumptus persimileis uires præ se fert.

Moly.

MOly, quod nonnulli rutam syluestrem, alii zarmalam dicunt, Syrii besasam, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenue, hic crassos humores uiscososq; incidit, discutit & urinam promouet.

Quæ

Que ab N incipiunt.

Nascaphthon.

NAscaphthon, sunt qui nascaphthon dicunt, Indicū est odora-
mentū, qđ ad astrictos fœminarū locos suffitu uaporetur.

Napy, sinapi.

Sinapi calefacit siccātque in quarto abscessu.

Nardostachy, spica nardi.

SPicæ nardi radix calfacit in primo, siccāt in secundo ordine;
Sparticeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris, &
subamaræ, iocinori igitur prodest & stomacho extrinsecus ad
mota & ebibita, urinam mouet & interaneorum fluxiones de
siccāt: sed Indica ualentior est quàm Syriaca, & nigrior.

Nardus Gallica.

Nardus gallica superiori uireis habet similes quidem, sed
imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam: calidior
enim est quàm illa, minusq; astringit.

Nardus montanus.

Nardus montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisque di-
citur, commemoratis est infirmior.

Nartex, ferula.

Ferulæ semen extenuat calfacitque medulla ipsius uiridis
adhuc, astringit, eoque sanguinem spuentibus & cœliacis
accommodata est.

Narce, torpedo marina.

Torpedo marina uiuens capiti imposita dolores eius arcet,
idq; forsan eodem illo torpore quem membris eam con-
tingentibus inducit: oleum in quo uiua decocta fuerit, ad acro-
res articulorum cruciatus leniendos inungitur, eadem torpe-
do anum procidentem coercere apposita fertur.

Narcissus.

Narcissi radix adeo desicc at, ut maximis uulneribus sit glu-
tinandis, imò etiam tendinum præcisionibus confert, cæ-
terum abstergendi & attrahendi uim quandam habet.

Neuras, seu poterion.

Neuras, quod alij poterion uocant, sine rosione desiccāt, ut
& ipsa nervos præcisos glutinet: radices autem potissi-
mum hunc effectum præstant, & impositæ, & potæ.

Nerion

Nerion, aut rododaphne.

Nerion extrinsecus applicatum uim refert discuttoriam : si intus assumatur, occidit.

Nymphæa.

Nymphæa uireis habet sine rosione siccis, quibus & uentrē reprimat, & genituram arefacit: uerum alba radice donata ualentior est, eoque fluxum muliebrem cum uino nigro & austero pota persanat : quæ nigram refert, deterforia quoque uir nonnulla pollet, eaq; utiligines, alphas dictas cum aqua exterrit: alopecias cum pice liquida illita replet.

Quæ ab X ordiuntur.

Xanthion, aut phasganion.

Xanthion phasganumve fructum fert discutiendi uiribus præditum.

Xiris, aut Xyris.

Xiris naturæ tenuis est, discutforiæ, & extrahentis, ac nimirum siccatoriæ, præcipuè semen, quod & urinam cit, & lie ni in scyrrhum indurescenti medetur.

Xiphion, gladiolus.

Gladioli radix trahit, discutit, & siccatur.

Quæ initium habent ab O,

Oe, sorbus.

Sorbus arbor cuius fructus oia, à nonnullis & dicitur, astringendi uim obtinet, sed minorem mespilo.

Othonna.

Othonnam, alii herbæ esse succū in Arabia ad Aegyptū nascentis affirmant, alii lapidem Aegyptium: detergit autem eroditq; omnia quæ claritati oculorum officiant, extercens.

Oenanthe.

Plurimus sanè usus syluestris uitis: florem abundè astringentem esse fatetur: & uentrem potissimum corroborare. Dioscorides autem aliam describit oenanthem contrariis donatam uiribus, unde secundas eam eiicere, & urinæ stillicido, morboque regio mederi tradit.

Oenos, uinum.

Vinum ex ijs est, quæ in secūdo ordine calefaciūt, siccantq; : quod

quod admodū uetustum est, in tertio: Mustum uerò in primo.

Oesypus, lanæ pinguitudo.

Oesypus in sermone de lanis explicata est.

Olynti, grossi.

Grossi acrem & discussoriam uim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. coeli igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

Olostium.

Olostium siccatur astringitq; . hinc eo ad rupta utuntur.

Omphacium.

Omphacium succus est uuæ immature, astringens egregiè & siccans in tertio abscessu: eoq; fluidis affectibus & . præsertim stomachicis, accommodatur.

Onagra.

Onagra, quā nonnulli onotheram, alii onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix inducta, ferocientia ulcera mitigat.

Onoma.

Onoma, uel onomis, uel phlomitidis, uel ononis, acrem, amarāque uim obtinet, eamq; ob causam folia eius cum uino pota foetus occidunt expelluntque.

Onobrychis.

Onobrychis ui rarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phimata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

Oni, asini seu multipedæ.

Multipedæ quæ sub aquarijs uasis agunt, & in orbem se con duplicant, discutiunt siccantq; , potæ cum uino urinæ angustis & arquato medentur, anguinæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detritæ cum rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter, instillantur.

Onyches, conchulæ Indicæ.

Onyches conchyliorum Indicarū opercula sunt, quæ suffitu, strangulatione uuluarum concidentis foeminas excitant, item comitiales: potæ uerò aluum turbant.

Ononis.

Ononis radice constant quæ in tertio ferè gradu calefacit,
cortex

cortex ipsius extergit, & incidit, unde etiam calculos conterit.

Oxos acetum.

A Cetum mixtæ est naturæ frigida & calida, sed utriusq; tenuis, frigida tamen calidum excellit. cæterum in tertio ordine siccat.

Oxiacanthos.

O Xycanthus arbor piro sylvestri & figura & uiribus similis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fructus ipsius myrti baccis respondet.

Opos, liquor.

L iquores, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus per excellentiam dicuntur, calidi natura, & spirituosi insigniter: uerum Cyrenaicus cæteris est calidior tenuiorque.

Origanum.

O Mnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi uiribus in tertio abscessu ostendunt.

Oreoselinum apium montanum.

A Piū mōtanū uiribus domestico æquale est, sed inualentius.

Orobanche.

O Robanche sicco & frigido temperamento est, secundum primum ordinem.

Orobos, eruum.

E Ruū calefacit in primo gradu, siccat in secūdo, amarumq; est, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orminon.

O Rminon marrubio specie simile est, calidū, mediocriter siccum & abstergens, uenerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos quæ œdemata uocant, discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico est ualentius.

Oryza.

O Ryza uim quandam astrictoriam præ se fert: qua etiam uentrem mediocriter cohibet.

Orchis herba.

O Rchis herba (nominatur autem etiam cynosorchis, id est, testiculus

testiculus canis,) radicem habet bulbosam & duplicem: uis autem maioris, humida & calida, eoq; ueneri incitanda est: minus, calida & sicca, contra igitur uenerem coercet.

Orchis, serapias.

Orchis, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, priore ualentius desiccatur, quare laxos tumores cedentesq; dissipat, ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpes abigit: in arefacta autem magis siccatur. Quoniam uero substringere idonea est, aluum quoque cum uino pota retinet.

Osyris.

Osyris, ex qua medicamenta ad exterendam, læuigandamque cutem, Græci coremata uocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi uireis habet.

Ossa, ossa.

Ossa concremata uehementer discutiunt siccantque: præsertim id facere dicuntur humana: atqui sui illius talus combustus inflationibus & circa umbilicum torsionibus mederi dicitur, quin etiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem, & articulares dolores abigunt. Bubulus talus uetus, mobileis firmare dentes prædicatur, cum melle potus teretes tineas educit, cum oxymelite lienem consumit, & uirilignes, quas uocant leucas, illitus abolet, item ad uenerem commendatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

Ostraca, testæ.

Testæ fornacium tritæ siccant exterguntque, hinc dentifricis accommodantur, illitæ cum aceto prurigini, pustulis, quæ appellantur exanthemata, conferunt, cerato exceptæ strumas discutiunt.

Ostrea.

Ostreorum testa cremata æqualem buccinis uim, sed minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, & dentibus nitorem conciliat: elota rosionem amittit, ad carnem cicatricemque humidis ulceribus induendam accommodata.

Ouron.

Vrina quælibet calida est & acris, sed humana omnium aliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. cæterum

uehementer abstergit, quapropter nonnulli, potione eius in peste usi, mortem euaserunt, eadem lepras, ulcera putredinem experta, capitisq; manantia ulcera, quæ uocantur achores, & furfures perlant. item pedum attritus, nondum inflammatio ne occupatos. At pueri uenerem non experti urina omnium efficacissima est, unde etiã chrysocola conficitur. Mulorum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & chamelorum, aluum deiicit. ideoque contra aquam subter cutem bibitur.

Quæ à P incipiunt.

Pancration.

PAncration & specie & uiribus seyllæ simile est, uerum imbecillius.

Paliuron.

PAliuri folia & radix astringunt, eoq; aluū fluentem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutiunt: Semen eius tam uehementi incisoria uirtute ualet, ut & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxilietur.

Panaces.

PAnaces Herculeum est ex quo opopanax dictus cōficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans, emolliens, discutiensque: radicis cortex liquore imbecillior, habet nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneū: semen ipsius mensis quoque citat. Asclepion panaces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus ipsorum & semine ad malefica ulcera & phymata utuntur.

Papyrus.

Papyrus ignem non experta, materia quædam efficitur: usta, siccatur chartæ crematæ modo, uerum papyri cinis uiribus inferior est.

Paronychia.

PAronychia inde nomen accepit quòd digitorum reduuiis, quæ græcis dicuntur paronychîæ, medeatur, uis eius est exrenuare & siccare, idque citra rosionem.

Pentaphyllon, quinquefolium.

Quinquefolium in tertio ordine desiccatur, minimè acre, eoque in multos usus accommodatur.

Peplon,

Peplon, herba.

Peplon nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

Peplion.

Peplion quoque liquorem habet & magna ex parte maritimis locis nascitur, cætera quidem inutile, semen autem ipsius feruidi saporis ut peplum expurgat.

Peperi, piper.

Piperis radix costi uireis refert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidius natura & calidum: fructus ueluti acerbus immaturusque, album est piper, nigro acrius, ut quod impendio magis affatum sit: utrumque uerò & calefacit & desiccatur.

Pepon.

Pepon abstersoria facultatis est, inde ueluti caro ipsius ephe-
lidas & consimilia faciei uitia exterit, semen renes obstructione liberat.

Periclymenon.

Peryclimeni folia & semen incidendi simul & calefaciendi uireis obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad sex dies pota: semen autem ad quadraginta dies potum lienosos & ægregiè spirantes adiuuant.

Peristereon, uerbenaca.

Verbenaca adeò desiccatur astringitque, ut uulneribus glutinandis, † & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

† Totus hic locus in antiquis sic legitur. περιστερών εἰς το-
σόνδε χρᾶναι τε καὶ σίφει ὥστε δύνασθαι κολλᾶν τραύματα, ὅθεν
ἐπὶ τῶν κακῶν θῶν τε καὶ φαγεδαϊνῶν αὐτῷ χρῶνται. Id est.
Peristereon usque adeò siccatur & adstringit ut possit glutinare
uulnera. Itaque eo utuntur in malignis ulceribus & ad partes
vicinas serpentibus.

Persæa seu persica.

Persæa arbor est, Aegypti, cuius folia & siccant & astringunt
eoque sanguinis eruptionem compescunt.

Petasites.

Petasites tertio siccantium, ordini ascribitur, unde & malefica & phagedenica ulcera eam usurpant.

L 2

Petroselinon.

Petroselinon.

Petroselini semen calidum siccumque est in tertio abscessu, ui incisoria praeditum, urinam, menseisque copiose trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

Peucedanum.

Peucedani liquore & succo affatim calefacienti, discutienti, extenuantique utimur, tum naribus admoto, tum in potione assumpto, ad pulmonum & pectoris uitia ex humorum crassitudine contracta: irem ad lienem scyrrho induratum: dentibus autem perforatis impositus, dolorem protinus sopit, nervorumque affectibus idoneus est: radix squamas ossium separat, maleficis ulceribus succurrit, in tertio ordine & calefaciens & desiccans.

Peuce, pinus uel pinaster.

Pinus piceae uiribus respondet, sed moderatior est.

Peganum, ruta.

Ruta sylvestris ad quartum calefacientium siccantiumque ordinem refertur: satiuia, ad tertium, cuius uis est crassos lentosque humores incidere, & dissipare, urinam mouere, attenuare, & flatus discutere, unde & uenerem coercet.

Pissa, pix.

Pix arida quidem in secundo abscessu desiccet, minus calefacit: liquida e contrario, imò etiam extergit, maturat, discutit, acrisque est, eamque ob causam unguentis scabros educit, impetigines exterit, tumores maturat. Valentior autem est liquida, ut etiam suspiriosis & purulenta excreantibus, lincta subueniat: sed arida uulneribus magis glutinandis est.

Pisselæon, oleum picinum, seu pici flos.

Picinum oleum ex liquida fit pice, qua natura tenuius existit.

Pistacia.

Pistaciorum fructus esus stomacho mediocriter conducit, iecur obstructum laxat, praecipue summi & odorati eorum operimenti, ex uino decoctum, profunt etiam contra serpentium morsus.

Pityides.

Pityides fructus sunt picearum, mistae facultatis, astrictoriae & acris, quam ob rem reiectionibus pectore opitulantur.

Pityocampæ,

Piycocampæ, picearum erucæ.

Picearum erucæ eiusdem sunt uirtutis quam cantharis & buprestis obtinet.

Pityos plæos, piceæ cortex.

Piceæ cortex altringendi uim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitus persanat, uentrem potus reprimat: folia etiam uulnera conglutinant.

Pityusa.

Pityusam quoque nonnulli tithymalli speciem affirmant, quoniam & liquorem habet, & perinde ut illæ purgat.

Platanus.

Platanus ui humidior & frigidior pollet, eaq; de causa folia uiridia ad inflammationes nascentes proficiunt: cortex & pilulæ quoniam imbiorem siccandi potentiam habent, in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanant. Cortex autem crematus siccatur uehementius & abstergit, eoq; lepras pellit, & humidis ulceribus medetur.

Pneumon, pulmo.

Pulmo agninus, suillusq; attritus pedum ex calceis curare credit: uulpinus sale inueteratus si bibat, suspitionis proficit: marinus recēs detritus podagris & pernionibus succurrit.

Polemonium.

Polemonium, quod aliis phileterion dicitur, tenue est, & siccandi uiribus donatum, inde nonnulli contra coxendicis dolores, dysenterias, lienem scyrrho induratum, radicem eius, cum uino propinant,

Polium.

Polium minus, quo & in antidotis utimur, tertii calefacientium siccantiumq; ordinis est, itaq; omnia uiscera obstructa laxat, urinam mensensq; trahit: uiride adhuc, magna glutinat uulnera, aridum maleficis inspersum ulceribus proficit.

Polygalon.

Polygalon folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoq; generare putatur, calidi humidiq; temperamenti compos.

Polygonaton.

Polygonatum uariæ particeps est facultatis, asfrictoriæ,
L 3 acris,

acris, amaræ, & cuiusdam gustu ingratae, quæ uerbis neque ac-
 exprimi: quapropter in multipliceis usus haud est accommo-
 datum: radicem ipsius nonnulli uulneribus inducunt, & faciei
 labes, quas ptilos dicunt Græci, eo abstergunt.

Polygonon sanguinaria.

Sanguinaria habet sanè uim quandam astringendi, sed humi-
 ditas in secundo ordine frigida in ea præpollet, stomachi fer-
 uori frigida inspergitur utiliter, erysipelatis, inflammationibus-
 que calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atque
 hac ratione siccatoria esse putatur: foemina autem mas effica-
 cior est.

Polycnemon.

Polycnemon in secundo ordine calefacit & desiccatur, eoque
 uulnera glutinat.

Polypodium, filicula.

Polypodium siccatur abundè citra morsum: potum, inferius
 purgationem molitur.

Pompholyx.

Pompholyx sine rosione siccatur, ideoque; cancriosis ulceribus
 aliisque maleficis opitulatur, item cum oculariis medici-
 nis miscetur.

Porphyræ, purpuræ.

Purpuræ crematae testis similem uim sortitæ sunt, opercu-
 la ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cū
 aceto pota lienes tumidos sanant: suffitu foeminas locorum
 strangulatu concidentem excitant secundasque; eiiciunt,

Potamogeton.

Potamogeton refrigerat & astringit, perinde ut herba san-
 guinalis ipsdem uirtutibus præditum.

Poterion.

Poterij, quod alij phrynion dicunt, radices, concisæ neruos
 præfectos & uulnera conglutinant, decoctum ipsius epotū
 neruorum affectibus auxiliatur.

Prasion, marrubium.

Marrubium in secundo ordine calefacit, amplius autē sic-
 cat, iecur lienemque; obstructū laxat, excreationes è thora-
 ce & pulmonibus, mensisque; promouet: in cataplasmate uerò
 inductum

inductum extergit, discutitq; præcipua extersoria incisoriaq; ui præditum.

Prason, porrum.

POrrum mali succi est & acris. ut autē Dioscorides memoriae prodidit. grauiā facit insomnia, aluumq; bonam, urinā ciet, & extenuat: habet & abstergerendi uim aliquam, quā pectoris excreationes elicit pisanæ incoctum, semen uerò ipsius nephriticis temperatur medicinis: folia etiam non nihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem supprimit.

Prinos, ilex.

Ilex simileis quercui uireis habet, sed multò ea est ualidior.

Propolis.

Propolis calefacit quidē in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisq; naturæ est, & meatuū apertorię.

Ptarmicæ.

Ptarmicæ folia sternutamenta mouent, totus autem frutex uiridis sugillata, liuoresq; alios disijcit, est enim herba calida & sicca, uiridis secundi ordinis, arida tertii:

Ptelea, ulmus.

Ulmus siccare nalet & abstergere, eoq; uulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolarum modo uulneribus circumuoluatur, cum aceto lepras quoq; tollit: radices idem præstant, si ossa fracta quæ solidari topiacia cicatrice, quā poron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

Pterix, filix.

Filix uim siccandi & amaram repræsentat, eaq; foetus corrumpit, latasq; tineas enecat, instar quatuor drachmarum cum mulsâ pota: quoniam uerò modicè cōstringit, ulcera citra rosionem desiccare potest.

Pycnocomon.

Pycnocomon discutiente ui extrahēti acriq; donatum est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen præterea infixâ corpori spicula extrahit, radix flauam bilem purgat.

Pyrethron.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentiū qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febriliū rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhuc iis quorum corpora

ra stupent, & resoluta sunt, efficacissimè adhibetur.

Pyros, triticum.

Triticum in primo ordine calefacit, uerùm siccando humectandoq; medium est, nonnihil etiam glutinosum, & obstruendi efficax obtinet.

Pytia, coagulum.

Coagulum omne naturæ acris est, tenuis, discutientis, & nimium siccantis sed leporinum comitiales sanare cū acetato potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem emēdat, lac in uentre concretum soluit, similiter etiam sanguinē nonnulli uero cruentas pariter è thorace excreationes cohibere ipsum tradunt, equinum uerò coagulum coeliacis & dysentericis prodesset: phocæ autem castorii uireis præ se ferre.

Quæ ab R incipiunt.

Rhacos, attrita uestis fragmentum.

Attitarum è lana uestium fragmenta concremata, simileis eidem lanæ uireis repræsentant. Linei autem panniculi quum adhuc uruntur, tenuem ex se fumum reddunt, qui etiam destillationes in guttur liberet, & uulnæ sursum recurrenti salutaris sit: cremati iam ad lanæ uirtutem accedunt.

Rhamnus.

Rhamnus siccatur in secundo, refrigeratur in primo abscessu, quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur, sed teneris eius folijs utendum est.

Raphanus.

Raphanus in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur: syluestris efficacior est, in ambobus autem semen ualentius. itaq; sugillata, aliosq; liuores disijcit.

Rheon, rha.

Rheon, quod alij rha dicunt compositum est ex terrestri frigida & tenui substantia, aereaq; calida & leniter acris, eaq; ob causam conuulsis, ruptis, orthoputeis opitulatur: quod discutiendi uim habeat, liuores emendat: quod alstrictoriam, cruentas excreationes, coeliacos, & dysentericos sanat, utaq; uero facultate, iocinorosos iuuat.

Rhetina, resina.

Resinae omnes & calefaciunt & desiccant, uerùm terebinthina

thina principatum obtinet, discutientis naturæ, emolliētis, tenuis & absterforiæ, eoq; scabiem corrigit : & larix huiusmodi est. Quæ uerò è pinu destillau erit, atq; hac magis adhuc strobilina, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiete raditur.

Rhoda, rosæ.

Rosæ mixta constant substantia, aquosa scilicet, calida, astringenti, & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoq; desiccatur.

Rhodia radix.

Rhodia radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiente ui prædita.

Rhæa siue rhoe, malum punicum.

Malum punicum omne astringendi uireis eximias habet, quibus refrigerat siccaturq;: uerum dulce aliis: minus: austerum magis refrigerat siccaturq; est & stomacho amicum, acidum refrigerat quoq; & maiorem quandam incidendi uirtutem repræsentat, uerum acini succo magis astringunt siccantq; efficacius his adhuc malicorium quod sidion Græci uocant: huic uirtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

Rhus.

Rhu coriariæ à medicis dictæ fructus præcipuæ & succus magno in usu sunt, quum illa astringendi siccandiq; uim ex tertio ordine habeat, detergendi è secundo.

Rypos, sordes.

Sordes ex statuis æreis, aut uasis in quibus multum olei inherescit, detractæ sic ut nonnihil æruginis admixtum sit, discutendi uireis habent, siccandiq; mediocriter & emolliendi, eiusq; immatura phymata discutit. At de sordibus quæ in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos uocant, in sudore dictum est. Aurium sordecule reduuiis mederi dicuntur.

Quæ ab S incipiunt.

Sagapenum.

Sagapenum, ceu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, cui & absterforia quædam uis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

Salaman-

Salamandra.

Salamandræ uisæ cinerem nonnulli medicinis exedentibus, tum iis quæ ad lepram & scabiem componuntur, admiscet.

Sampsuchum.

Sampsuchum calefacit siccâtq; in tertio abscessu, est etiã tenuis naturæ & discussoria.

Sandaracha.

Sandaracha adurentis est facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

Sandyx, uel firicum.

Sandyx, aut firicum extenuat & siccât, non tamen calefacit.

Saprotes, caries lignorum.

Lignorum caries, præsertim ulmi, humentia purgat ulcera & explet.

Sapo.

Sapo abstergendi uim habet.

Sarcocolla.

Sarcocolla perficæ arboris lachryma est, opplendi & citra ro-
sionem siccandi uireis sortita, a tq; ideo uulneribus est glutinandis.

Saxiphages, saxifraga.

Saxifraga urinam mouet, & calculos conterit.

Satyrion, trifolium.

Satyrion, aut triphylion humidi est temperamenti & calidi, item flatuosum, unde ueneris appetentiam facit: nonnulli opisthotonis cum uino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca trifolium ait hyacintho simile esse, quum aere inturgescens, semen syluestri cnico æquale habet: decocti ipsius ius superfusum phalangii, aut uiperæ morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

Saura, lacerta.

Lacertæ iecur & capur suo loco exposita sunt: totum autẽ caput dissectum impositumq; scorpionum ictibus medetur.

Selinon, apium.

Apium tanti caloris est, ut & urinas & menses eliciat: cæterum

rum flatus discutit, præsertimq; eius semen.

Seris, intybum.

Seris subamarum olus est, admodum refrigerans humectās-
que, habet etiam nonnihil astrictionis.

Seriphum.

Seriphum calefacit quidem in secundo, siccatur autem in pri-
mo ordine, consimile absinthio, minus tñ eo astringit, magis
calefacit, aīalia uentris occidit, mediocriter stomacho aduersat

Seseli.

Seseli radix magisq; semen insigniter calefacit, tenuisq;e
substantiæ est, urinā quoq; ciet, comitialibus, & orthopnœæ
accommodatum.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa persimilis est ostreo quod ad uireis attinet, sed te-
nuior substantia & abstergens, eoq; in cinerem redacta, un-
guis cum sale fossitio extenuat: ignem non experta si infri-
cerur, ficus exterit, & cutis labe abstergit.

Sesamoides.

Sesamoidis albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

Sesamum.

Sesamum non parum lencoris, pinguisq; obtinet, idcirco op-
plere, mollire, & mediocriter calefacere idoneum est.

Seps.

Seps, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in uino
spota, propriis moribus succurrit.

Sialon, salina.

Salina hominis ieiuni maximè discutit & abstergit; eoq; in-
fantium impetigines illita exterit & furunculos cum triti-
co, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata delet, feris
hominem occidentibus maximè aduersatur.

Sideritis.

Sideritis Heraclia & helxine dicta est, Achillea autem sideri-
tis illi quidem consimilis est, sed magis astringit, eoq; fluidis
affectibus accommodata.

Sideros, ferrum.

Ferrum aqua restinctum subinde, uehementem desiccandi
uim

uim aquæ conciliat, quæ pota lienosis conducit: uinum autem in quo id restinctum est coeliacis, dysentericis, cholera infestatis stomacho resolutis, auxiliatur.

Sicyos, cucumis.

Cucumis esculentus quidem uiridis, refrigerat humectatq; in secundo ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammationes, semen abstergerendi incidendiq; uirtute præditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit, aridus ficit in primo ordine, magisq; abstergit, & semen, & radix.

Sicyos agrios, cucumis syluestris.

Cucumeris syluatici seminis succus elaterium dictus est, qui autem è radice & foliis premitur, elaterio similis est, sed imbecillior: radix detergit, dissipat, emollit: succus siccandi uiridis habet.

Silybon.

Silybon spinosus frutex est, albo chamæleoti persimilis, esui accommodatus: radicis liquor drachmæ pondere cum multa potus, uomitiones excitat.

Silurus.

Silurus sale conditus si edatur arteriam humectem expurgat, applicatus corpori spicula educit.

Silphe, blatta quæ in pistrinis inuenitur.

Blattæ quæ in pistrinis inuenitur interanea decocta contritaq; aurium dolores persanant.

Silphium, laserpitium.

Laserpitium probè calefacit, flatulentum est etiam & concoctu peruiacax: à foris corpori applicatum efficacius deprehenditur, magisq; liquor ipsius, extrahendi potens, item & superexcrementia amoliendi uim quandam obtinet.

Sison.

Sison calidus est, urinam mouet, concoctionem adiuuat, menses educit, & uiscera obstructa aperit.

Sion.

Sion calidum, urinam citat, & discutit, renum calculos frangit, menses euocat.

Sisarum, sifer.

Siferis radix cocta stomacho utilis est, & urinæ ciendæ, calida in

da in tertio ordine: semen tenue est, discussorium, ualidum
que, idcirco ijs quos singultus & torsiones circa umbilicum
malè habent, cum uino exhibetur.

Sisymbrium.

Sisymbrium sunt qui cardaminem uocant, cardamo, hoc est,
nasturtio assimilatum: aridum quidem calefacit siccaturque in
primo abscessu: humidum autem in secundo.

Scammonia.

Scammonia calfacit, discutit, & biliosa extergit, magisque
eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositum cor-
rumpit, lepras extergit, diuturno capitis dolori cum oxyrhodi-
no superfunditur: radix autem tum ipsa, tum decoctum eius po-
tum, purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, co-
xendicum doloribus applicatur.

Scandix.

Scandix syluestre olus est, calefaciens siccansque in secundo
gradu, urinam propellit, & uiscera obstructione liberat.

Scingos, terrestris crocodilus.

Scingi carnes renibus proximæ, naturalibus arrigendis bi-
buntur: rursus semen lactucæ cum aqua potum eadem con-
traria uirium lege uidetur remittere: item lentis decoctum
cum melle.

Scylla.

Scylla incidit, calefacit & deficcat in secundo ordine: præstat
autem eam assam aut elixam sumere.

Scolopendra marina.

Scolopendra marina in oleo elixa inunctuque pilos abolet,
iusta etiam prurium excitat.

Scolopendrion.

Scolopendrion asplenon est.

Scolymon, carduus.

Scarduus calfacit, siccaturque in ordine secundo, radix eius
uino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & ala-
rum toriusque corporis graueolentias corrigit.

Scordion trixago palustris.

Scordium uarijs pollet facultatibus, ut quod amarum, acer-
bū, & acre fit, purgat igitur simul & calfacit uiscera, urinas
& menstrua

& menstrua cōcitāt, refrigerata omnia excalfacit, uulnera glutinat, repurgatq; : aridum inspersum cicatricem inducit.

Scordon, allium.

Allium calefacit siccātque in quarto abscessu : at syluestre allium quod ophioscordon, quasi anguinum allium, & agrioscordon dicitur, domestico ualentius est.

Scordoprason.

Scordoprason porri & alij mixtas habet uireis, & gustatum.

Scorpioides.

Scorpioides excalfacit abscessu tertio, siccāt secundo.

Scorpius.

Scorpius terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo, proprii ictus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus utile.

Scoria, recrementum.

Recrementum omne ualidè exiccat: ferri sterminus alijs amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem detritum cum aceto auribus suppurantibus mirificè proficit, item iis qui aconitum biberunt: cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

Smilax, aut cactus arbor taxus.

Smilax uel cactus arbor est uirosæ uirtutis.

Smyrna, myrrha.

Myrtha è secundo calefacientium siccantiumq; ordine est: capitis igitur uulnera inspersa glutinat, item amarā uim obtinet, qua tineas, & foetus occidat: adhæc abstergit, eoque ocularijs medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut guttur non exasperet. Boeotica myrrha uireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

Smyrnion.

Smyrnion, quidam hipposelinon, quidam apium syluestre nomināt, calefacit & siccāt tertio ordine, apio quidem fortius, petroselino autem inualidius, urinæ & mensibus educendis accommodatum.

Sonchus.

Sonchus astringit, & manifestè refrigerat, tū corpori admotus, tū manducatus: exarefactus autē mediocriter calefacit.

Sparganium.

Sparganium.

Sparganium siccandi & hoc uireis refert.

Spartos, genista.

Sparti quo uireis ligant, & semen & flos cum mulsâ instat
 S quinque obolorum pota, per superiora purgât, ueratri albî
 modo sine periculo: semen autem per inferiora quoque pur-
 gat: uirgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

Speclarium, lapis specularis.

Speclarium, alij per ph scribunt spheclarium, quo nonnulli
 loco uitri in fenestris utuntur, eoque diaphanes à perspicui-
 tate appellatur, substantia gypseum, uireis habet concrematis
 testis aut ostreis simileis.

Spongios, spongia.

Spongia recens quæ marinû odorē adhuc reseruat, si cû aqua
 aut uino, aut posca imponatur, uulnera glutinat, cremata
 acris est uirtutis, & discussoriæ: cum bitumine autem & pice li-
 quida ulla, appositâq; ex igne, sanguinis eruptiones cōpescit.

Spodium, cinerula.

Spodium pompholygi uiribus æquale est.

Staphylinus, pastinaca.

Pastinaca urinas mouet, menseis proritat, præsertim semen
 ipsius & radix, folia autem abstergendi uiribus prædita pha-
 gedænicis affectibus congruunt, & uiridia cum melle: sylue-
 stris autem pastinaca ad omnia ualentior est domestica.

Stachis.

Stachys marrubio similis frutex tertium in calefaciendo or-
 dinem occupat, menseis itaque excitat, foetas occidit, & se-
 cundas expellit.

Steata, adipēs.

Adeps omnis humanum corpus & humectat, & calefacit,
 sed pro diuersis animalium temperamētis uirtus eius eua-
 riat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut ad olei natu-
 ram accedat, unde etiam rosiones obtundit. Caprillus, siccior
 est, & celeriter concrescit, eoque ijs qui in longanone rosio-
 nes experiuntur, ab inferiori parte inicitur. Anserinus cali-
 dior est, maioremq; tenuitatem obtinet. Inter utrunq; hunc
 gallinarum, gallorumq; adeps consistit. Leoninus calore om-
 neis,

neis, & tenuitate superat, & propterea etiā uisciflōria. **Bu-**
bulus inter suillum & leoninum medius temperamento exi-
 stit. Vrsinus alopeciiis medetur, uulpinus aurium doloribus,
 quemadmodū uiperinus pilos abolere, & oculorū suffusiones
 impedire fertur. In omni autē adipū specie calidior, sicciorque
 est mariū, atq; ex his eorū animalū quæ testes habent, magis
 quā illorū quibus hi sunt execti, & uigentiū ætate efficacior
 quā aliorū ceterū uetustate omnis adeps redditur calidior.

Stimmi.

Stimmi præter quā quod siccatur, etiam astringentem habet,
 ob quam ocularijs collyrijs miscetur.

Stæbæ.

Stæbæ semen & folia in tertio ordine desiccant, uiribus do-
 nata astringentis, eamque ob causam uulnera magna con-
 glutinant: decoctum ipsorum dysenterijs, sanguinis eruptioni-
 bus, auribus pirulentis auxiliatur: folia applicata oculis ex ictu
 suffusis conferunt,

Stæchas.

Stæchas adaperit, extenuat, detergit, & uiscera omnia, to-
 tamque corporis habitum confirmat.

Stratiotes.

Stratiotes aquaticus frigidus est natura: terrestris etiā astrin-
 gendi uim habet, qua ulcera committit: nonnulli eo & ad
 sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

Strychnon, solanum.

Solanum hortense esculentumque astringit, & in se cundō
 ordine refrigerat. Solanum halicaccabum hortensi simile,
 urinæ ciendæ idoneū semen habet acino uuæ æquale. hy pnoi-
 tici, id est, somnifici solani radice cortex, cum uino de nari pon-
 dere potus, somnum conciliat, semen habet ad urinā mouen-
 dam accommodatum, ex tertio refrigerantium ordine: unde
 corymbi eius plures duodecim epoti furorē accersunt. Quar-
 tum uerō genus solani intus assumptum, inutile est, à foris au-
 tem applicatum ulcera depascentia curat, refrigerando, siccandoque
 ad secundum ordinem relatum.

Stypteria, alumen.

Alumen omne, maximè acerbum est, substantiaq; crassum
 tenuius

tenuius autem reliquis est quod uocatur scissile, mox rotundum, & astragaliote. Crassum admodum est liquidum, & quod placites & plinthites appellatur.

Styrax.

Styrax calefacit, emollit, & concoquit: tussi, destillationi in fauces, & grauedini utilis, menseis idem & potus, & appositus extrahit.

Syca, ficus.

Ficus aridæ in secundo ferè ordine siccant: pingueis autè duos tumores magis maturant, acriores detergunt, discutiunt quæ, decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam non nulli siræon appellant, uiribus melli respondet: uirides autem ficus, imbecillioris uirtutis sunt: utræque tamen & uirides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoriæ sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

Syce, ficus arbor.

Ficus arbor calidi tenuisque temperamenti est, adeò ut liquor & foliorum succus non rodat modò, aut abstergat uehementer, sed etiam exulceret, ora uenarum aperiat, & myrmecias exterat: iam uerò & purgandi uim obtinet. At syluestris ficus, quam caprificum uocant, in omnia efficacior domestica est.

Sycomorus.

Sycomori fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris uir pollet emolliendi, glutinatoria uulnere, discussoria tumorum: bibitur inungiturque ad serpentium morsus, lienes scyrrho induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores sanat.

Symphytum petraeum.

Symphytum petraeum contrariis constat uirtutibus, habet. n. aliquid quod incidat, pus in thorace & renes expurger: habet etiam aliquam contrahendi uirtutem, qua sanguinis excretionibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluori rubro, in testinorum ramicibus. item calida quædam humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ asperitates sanat. Symphyton, alterum nempe magnum, uiscosum quippiam & quod pruritus excitet, representat, scyllæ simile. Vtuntur eo, ut superior i.

PAULI AEGIN.

M

Spon-

Spondylion.

Spondylii semina & radix uirtute acri & incisoria, suspiriosis, comitialibus, & arquatibus succurrit, radix autem circumrassa, fistulisque imposita illarum callos tollit, succus è flore ipsius expressus, uterrimis aurium ulceribus instillatur.

Schinos, lentiscus.

Lentiscus in omnibus sui partibus siccatur secundo ordine absoluto, calefacièdo autem & refrigerando medius est, a deo astringens, ut ad hypocistidis succum astrictione accedat.

Schœni anthos, iunci odorati & rotundi flos.

Iunci odorati & rotundi flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, qua urinam mouet & menses trahit, obstructaque referat in fomentis, potu & cataplasmatibus adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed ille calidior.

Schœnos elia, iuncus palustris.

Palustris iuncus duplex est, sed eius qui uocatur oxy-schœnos, semen est somnificum: holoschœni autem dicti, minus idem & capiti dolorem facit. utriusque semen frixum si cum uino bibatur, alui fluores desiccatur, & mulierum fluxiones cohibet.

Sori.

Sori uireis misy æqualeis obtinet, longè illo natura crassius. Quæ à T incipiunt.

Torichos salsamentum thynni.

Conditanei thynni caro acris est & desiccatoria: morsis igitur à uipera, quam præterem dicunt, quàm plurimum eius esui datur, uinumque superbibitur liberalius, & uomitus excitatur: eadem ad acrimonias escitatorum ualet, item rabidorum canum aliorumque serpentium moribus utiliter applicatur.

Taurocolla, glutinum bubulum.

Taurocolla aliis xylocolla dicitur, ex bouum coriis confecta, uim habet insigniter absterforiam, eoque aceto subacta, impetigines & summæ cutis lepras exterit: ambustis, si aqua calida soluatur, inflammationem oboriri non finit: eadem oxymelite soluta uulneribus accommodatur.

Tellinæ.

Tellinæ conditaneæ crematæ, adurentem cinerem reddunt, qui cedrino liquori mistus euulsio radicitus palpebrarum pilos,

pilos, si instilletur nasci iterum prohibet.

Terminthos, terebinthus.

Terebinthus calefacit in ordine secundo, siccatur autem si uiridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi inaruerit, ad tertium siccantium ordinem refertur. hac igitur ratione & urina mouet, & lienes adiuuat.

Tettiges, cicada.

Cicadae crudae siccatae ad colicum dolorem potui dantur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem numero piperis granis. quidam tostas contra uesicae dolores potui exhibent.

Teutlon, beta.

Beta nitrosam uim habet, qua abstergit, discutit, & per nares purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcenda fit idonea, & modicè discutit.

Teucrion.

Teucrion calefacit in secundo, siccatur in tertio ordine, ut incisoria tenuique, lienibus medetur.

Tephra, cinis.

Cinis non omnis idem exactè habet temperamentum, sed pro materiae combustae differentia euariat: acerbarum sanè arborum cinis, nempe quercus & ilicis, astringendi uim non modicam obtinet, qua sanguinis eruptionem compescit, quum nullius alterius datur facultas: acrium uerò, puta fici & tithymali cinis, acrior & magis deterforius efficitur.

Telephion.

Telephion in primo abscessu calefacit, secundo autem desiccatur: est itidem asterforium, quapropter ulceribus putredinem expertis conuenit, & uirilignes, tum leucas, tum alphas, cum aceto abolet.

Telis, fœnugræcum.

Fœnugræcum ex secundo ordine calidum est, è primo siccum, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autem calidas & induratas scyrro magis discutiendo persanat.

Tithymalus, herba lactaria.

Tithymali omnes è quarto calefacientium ordine sunt, acrimoniae & ualidae amaritudinis participes: sed radix quum sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentium erosorum

M 2 dolores

dolores finit: liquores uehementiore donati uirtute, dentium cauis imponuntur, reliquum corpus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modicè delitos auferunt, item myrmecias, uerrucas & huius generis alia tollunt: & cutis labes abstergunt, maligna ulcera, & phagedænica, curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero ualidissimi sunt, appellati characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui uerbasco similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremò helioscopius.

Titanus calx.

† **C**Alx uiua, quidem uehementer adeò urit, ut crustā inducat: restincta uerò crustam quidē subitò excitat, sed post diem unū non amplius, calefacit tamen & consumit carnis: si lauetur, idq; aqua marina, ualidas discutiendi uireis acquirit.

† Hæc uerba sic leguntur in uteribus libris, τίτανος ἡ μὲν ἄσβετος καὶ σφοδρῶς, ὥστε καὶ ἐσχάρειν, σβεθεῖσα δὲ παρὰ χρῆμα μὲν ἐσχάρει, μετ' ἡμέρας δὲ ἐκέρτι, θερμαίνει δ' ὁμῶς καὶ διατρίκει τὰς σάρκας, εἰ δὲ πλυθεῖν, ἀδνηκτος γίνεται, καὶ μάλιττα, εἰ τλεονάκις πλυθεῖν, διαφορητικὴ δὲ ἱκανῶς γίνεται, θαλάσση πλυθεῖσα. Id est. Calx uiua urit multum, ut crustam inducat, extrincta autem statim crustam efficit, sed post aliquot dies uis eius remittitur, calefacit tamen & tabefacit carnes: Si autē leuetur sine morsu redditur, præsertim si sæpius loca fuerit: marina uerò aqua abluta uim digerendi habet. Qua esse huius loci uerā scripturā, ex Galeno & Aetio facillè intelligi potest.

Tragacantha.

Tragacantha persimiles gummi uires repræsentat.

Tragium.

Tragium frutex est in Creta lentisco similis, uirtute calida in terrio abscessu, attractoria, discutiente, & tenui: aculeos igitur educit calculos cōminuit, menfisq; citat, instar dracmæ potum. Sed alterum tragium, hoc amarius est, scolopendrio asimile, nascitur multis in locis, tanta astringendi uirtute præditum, ut fluidis affectibus commodè faciat.

Tragoriganum.

Tragoriganum origani uirtutes habet, & nonnullā etiam attritionem.

Tribolos,

Tribolos, tribulus.

TRibulus mediocriter refrigerat : sed terrestris siccando ualentior est, aquaticus leuiter et humectat : uterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus conuenit : terrestris fructus quum tenuis existat, renum calculos conterit.

Trigositodes, tragus frumentaceus.

TRagus frumentaceus zæ respondet, sed difficilior in stomacho conficitur, & aluum emollit.

Trigle, mullus.

MVllus piscis continuè eius claritati oculorum nocet, crudus dissectus & impositus marini draconis, scorpionis, & aranearum moribus succurrit.

Tripolium.

TRipolij radix calida est in tertio abscessu & acris.

Triches, crines.

Pili combusti per similem lanis concrematis uini obtinent.

Trigon, pastinaca marina.

Marinæ pastinacæ aculeus impactus denti infirmo, ipsum conterit excutitque.

Tryx, fax.

FAex uini ignem non experta compositis uiribus constat, ut quæ abundè deficcet discutiatque, astringentia autem facultas ei ex uini unde confit specie, accedit. Utendū igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus, phygethla discutit, lac, mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata uerò quæ etiam specclen appellant, adurentem uim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurunt, ipsam miscemus, ungueis igitur scabros cum resina eijcit: pilos cum oleo lentiscino per noctem totam inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforijs temperatur. Aceti fax in omnibus ualentior est iam dicta, magisque astringit.

Troglodytes, passer.

TRoglodytes passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & crudus salsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

M 3 Tyros,

Tyros, caseus.

Caseus recens & mollis repellendi uim obtinet, leuiter refrigerans quare & uulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisq; uulnera conglutinat: uetus, isq; pinguis magis discutiendi uirtutem præ se fert, qua articulariorum quoq; tophis accommodatus est, præsertim cū suillæ carnis & salæ & pinguis decocto.

*Quæ ab Y incipiunt.**Hyacinthus.*

HYacinthi radix bulbi speciem repræsentans, primi in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaq; impuberes diu conseruare cum uino inducta creditur: semen leuiter abstergit astringitq; idcirco arquatis cum uino datur, ut qd deficet magis quam refrigeret.

Hyalos, uitrum.

Vitrum leue cum uino tenui & albo potum, uesicæ calculos comminuere dicitur.

Hydnon, tuber terræ.

Tuber terræ terrestri constat substantia cum modica quadâ uirtute tenui.

Hydrargyros, argentum uiuum.

Argentum uiuum in medicinæ usum non adeò accommodatur, quòd uenenum repræsentet: nonnulli uerò concretum ipsum in cinerem, mixtumq; alijs speciebus, colicis & iliosis potioni exhibuerunt.

Hydropeperi, aquaticum piper.

HYdropiper, herbula est calida, sed non piperis, modo, uiride cum semine suo inductū, sugillata, & tumores scyrrho induratos discutit.

Hydor, aqua.

Aqua præstantissima & alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatq; ex peculiari sua natura: ubi autem ascititium calorem assumpserit, quamdiu eum seruat, calfacit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ nonihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ uireis acquirit. Pluuialis autem nonnihil etiam astrictionis habet, ob quam ocularijs

larijs miscetur medicinis. Qualem uerò conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

Hyoscyamus, altercum, seu herba Apollinaris.

Altercum cuius semen nigrum est, item cuius flauum, uenenosum est: accommodatissimum uerò curationibus, quod & semē & florem candidū habet ex tertio refrigeratiū ordine.

Hypericum.

Hypericum duplex est, alterum quod androsæmon & ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum uerò calefacit & siccatur, tenui substantia præditū, eoq; urinas elicit & menstrua citat, totū ipsius semen, q̄ si cum folijs inducatur uiride, cicatricem uulneribus obducit, † arida uerò folia inspersa ulceribus medentur, dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.

† Hic locus ita descriptus est in ueteribus libris, ξηρά δ' ἐ ἐπιπαττόμενα τὰ πλαδ' αρά τῶν ἐλκῶν ἰώνται, id est, sicca autem inspersa, præhumida ulcera sanant.

Hypocoon.

Hypocoon refrigerat in tertio ordine, papaueri uiribus proximum.

Hypoglossum.

Hypoglosson frutex pusillus est, cuius radix & succus emolliendi uirtute pollent.

Hypocistis.

Hypocistis eorū quæ ad radices cisti & cistari appellati subnascuntur, nempe dytinorum, succus est, medicamentum ad omneis fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccet corroboretque.

Hypophæston.

Hypophæston species est spinæ fulloniæ, quemadmodum & hippophaes, ex huius capitulo, folijs, & radicibus, succus expressus siccatusq; trium obolorum pondere, cum mulsâ pituitam & aquam euacuat, maximè congruit orthopnœis, comitialibus, & neruorum affectibus.

Hyssopum.

Hyssopum in tertio ordine & calefacit & desiccatur, tenuisq; substantiæ est.

Quæ à Ph auspicantur.

Phaci, lentes.

Lentes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatæ, sed astrictiois quoq; nonnihil habent. Totum uerò lentis corpus siccatur, aluumq; sistit: decoctum ipsius prurit, ideoq; prior aqua defunditur, quum comprimendi gratia lentes assumuntur.

Phacos, lenticula, palustris.

Lenticula palustris humectat refrigeratq; in scdō abscessu.

Phalaris.

Phalaridis succus, folia, & semen pota, uesicæ doloribus auxiliantur, habet eadem herba & tenuem quandam uim, naturamq; calidam.

Phalangites.

Phalangites q; phalangiorum moribus medeatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos, qua torsionibus circa umbilicum auxiliari putatur.

Phellos, suber.

Suber præsertim ex uinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando uehementissimum, qui medicinis addysenterias inscriptis admiscetur.

Philyras, tilia.

Tiliæ arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris ulcera iuuantur, eorumq; decocto colluuntur: quod etiam potum & urinam & menses trahit.

Phlomos, uerbascum.

Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta tryalis: cæterum folia omnium siccantem & mediocriter astrictoriâ uim referunt: præcipuè eius quod aurei coloris est, & quod acerbæ sint, fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes ex eis colluunt.

Phœnix herba.

Phœnix, alijs rhu, herba est lolio confimilis, astringendi uiribus donata, in uino aultero pota, omneis fluidos affectus sistit.

Phœnix

Phœnix arbor, palma.

Palmæ fructus qui iam ematuruit, calidus mediocriter est, uisceribus roborandis & stomacho idoneus, tum intus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palmæ portio uehementer astringens est, quamobrem stomachicis, & hepaticis medicinis temperatur: longè magis, astringit quod fructus enascentis ueluti inuolucrum est.

Phermion.

Phermion tenuis, absterforiæ & attractricis facultas est: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spicula è corporibus extrahit.

Phu.

Phui radicem habet nardi persimilem, quæ tamen ad pleraque infirmior sit, sed urinas magis quam ea elicit, nardi gallicæ modo.

Phyllum folium.

Phyllion, Malabathri folium est, de quo in illius capite diximus.

Phycos, fucus.

Phycos refrigerat, siccâtq; in securneo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

Phylites.

Phylites cum acerba quadam prædita sit qualitate non immerito alui profluuijs pota auxiliatur.

*Quæ à Ch auspicantur.**Chalbane, galbanum.*

Galbanum calore tertium ferè ordinem accedit, siccitat secundum, molliendi & discussoria ui donatum.

Chalcitis.

Chalcitidis uires astrictoriæ, acres, adurentesq; sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & sori consistit, uita tenuior redditur.

Chalcanton, atramentum sutorium.

Chalcanthum aqua est in Cypri metallis coalescens, ualentissimæ astrictionis cum calore non ignauo: quod omnium efficacissimè humiditas carnis conseruat suo condimento de,
siccâtq;

siccatur; longiore temporis processu in chalcitidem mutatur.

Chalcos, es combustum.

AEs combustum acre quiddam habet & astrictionis particeps est, quapropter ad cicatricem ulceribus obducendam in siccioribus corporibus praestantissimum est: si eluatur, teneris utilius est, quam illorum.

Chalcu anthos, æris flos.

AÆris flos tenuioris naturæ est, quam æs cōcrematum, eiusque squama: mixtus itaque collyrijs palpebrarum & asperitates, & fici exherit.

Chamædrys.

Chamædrys in tertio ordine calefacit siccatur; lienes igitur consumit, urinas & menstrua elicit, viscerum obstructions expurgat.

Chamæcissus, hederæ terrestris.

Hederæ terrestris flos quum amarus insigniter existat, iecoris meatus adaperit, item contra coxendicum dolores exhibetur.

Chamæleuce.

Chamæleuce in tertio abscessu calefacit, in primo deficcatur.

Chamæleon.

Chamæleontis nigri radix calefacit siccatur; propemodum in tertio ordine, est & absterforiæ facultatis particeps, quæ cutis labe exherit, item duros tumores dissipat emollitque, & phagedenica ulcera admota in cataplasmate per sanat: si autem intra corpus sumatur, ueneni loco est. Albi radix superiori proportionem responder, sed amarior est: quæ si cum uino austero instar acetabuli bibatur, latas uentris tineas enecat: facit etiam ad aequam inter cutem.

Chamæmelon.

Chamæmelon siue anthemidis calefacit siccaturque in primo abscessu, præterea uirtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

Chamæpitys.

Chamæpitys secundo gradu calefacit, tertio deficcatur, quam ob causam & purgare & abstergere uiscera, potissimum iecur potest, item urinas mensisque trahit, magnam uulnera cōglutinat,

glutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit, decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus salutare est.

Chamædrops.

Chamædrops, quiddam & hoc chamedryn uocant, alii etiam teucrion, uiribus chamedryi respondet.

Chamæsyce, humilis ficus.

Chamæsyce absterforia & acri facultate pollet, quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, uerrucasque abolet, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

Chamelea, oleago.

Oleago absterforia facultate, sordida ulcera & crustas cum melle purgat.

Chelidonium, herba hirundinaria.

Chelidonium in tertio ordine calefacit, ualenterque abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquatos cum uino & aniso pota, obstructione liberat: māducata dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidoniū quarto calefacientium ordini ascriptū, acrius est, ut in ductum cutem exulceret: ungueis scabrosos eiicit: succus autem ipsius per nareis purgat.

Chelidones, hirundines.

Hirundinum crematarum cinis cum melle illitus, anginarum inflammationes persanat: idem oculorum claritati benefacit.

Chole, fel.

Fel omnium aliorum animantis humorum calidissimum est, colore tamen inter se differt: siquidem quod flauum, pallido calidius: & flauo, æruginosum. præterea uariat pro animantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rosionem aurium ulceribus medetur. Ouillū maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillū efficacius. caprino æqualia ursorū & boum existūt. taurinum uehementius: hoc, fel hyænæ superat, rursus hyænæ uincitur à pisce callionymo dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur: item marinæ hirundinis. at capræ syluestris fel etiam lusciosis conferre dicitur. cæterum omnium uolucrum fel, tum acrius,

acrius, tum siccando uehementius est quàm quadrupedū: inter has ipsas autem gallorum & perdicum alius est praestātius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, æruginoso colore, nonnunquam etiam nigro.

Chondrilla.

Chondrilla intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi uim quàm illa obtinet.

Chondrus.

Chondrus tritico persimilis est, nisi quod glutinosior.

Chrysocolla.

Chrysocolla altera in metallis reperitur, altera in rubri æris pyra ac tali pistillo in urina pueri uenerem non experti, sub caniculæ æstu contrita, præparatur. hæc igitur abstergit, discussoria, siccanteque ui prædita maiore, quàm ea quæ in metallis inuenitur, ut etiam carnem absumat citra rosionem: ob quod ulceribus maleficis accommodata est: concremata uero minus erodet.

Chrysocome.

Chrysocomæ, quæ etiam chrysitis dicitur, radix acris simul & astringente ui existit, quare non multi in medicina usus est, quanquam peripneumoniacis & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum menseis educit.

Quæ à Ps ordiuntur.

Pseudobunium.

Pseudobunium bunii speciem repræsentat, calefacit, discutit & abstergit: torsiones igitur circa umbilicum, stillicidia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale & uino inductum dissicit.

Pseudodictamnion.

Pseudodictamnion imbecillis dictamni uires habet.

Psimmythion, cerusa.

Cerusa refrigerat & opplet.

Psyllium, herba pulicaris.

Herbæ pulicaris semen secundi refrigerantium ordinis habetur, siccando humectandoque medium est.

Pforicon

Psoricon.

PSoricon, chalcitide duplicata, argenti spumæ mixta, efficitur, utrisque tamen aceto prius detritis, ac in recentem ollam coniectis, quæ diebus quadraginta sub fimo delitescet: sic enim maiorem siccandi uim, tenuiorem & minus rodentem quam chalcitis, acquireret.

Quæ ab O magno incipiunt.

Oon, ouum.

OVi candidum & tenue, nullius planè rosionis compos mediocriter refrigerat, utendum igitur eo in oculis, pudendorum ulceribus, alijsque omnibus malignis: miscetur etiã medicamentis emplasticis, quæ sanguinem supprimunt: luteum uerò pari facultate præditum medicamentis temperatur ad inflammationem arcendam efficacibus: rostum uerò magis siccatur, minus lenit. Porro rotum ouum aceto incoctum si assumatur, uentris fluxiones desiccatur: si acerbum aliquod adiunxeris, ut, gallam, aut rhum, aut balauftium, ac frixeris, multò redditur efficacius: ambustis autem crudum impositum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pectoris uitia concoquit lenitque, & arteriæ asperitates læuigat. Præponetur autem recens ueteri: & gallinaceum reliquorum animantium ouis.

Ocimum.

OCimum secundo calefacientium ordini ascribitur: habet & humiditatem quandam excrementitiam, propter quam neque utile est intus assumptum: extrinsecus autem inductum discutit, & concoquit.

Ocimoides.

OCimoides, nonnulli philaterion nuncupant, inutilis quidem radix est: semē uerò tenue est, & sine rosione siccatur.

De medicamentis simplicibus quæ flauæ bili purgandæ sunt. Cap. IIII.

ALoes drachma, cū aqua mulsa mane datur. qui uesperam exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentū in membra digerit, flauam bilem uacuat minus, trium obolorum instar assumpta, ut quæ crassiora tantum excrementa abundè educat. Cæterum quā omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola, aloë condu-

cit. qui uero amaritudinem eius non sustinent, in catapotia coactum assument. Sciendum uerò est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento, uerbi gratia, caliditate purgare, (omnia siquidem calida, quale piper est, uacuatione molirentur) uerum totius substantiae proprietate, quo modo lapis magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ uentrè duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur uel ad materiam deriuandam, uel ad affectum induratum agitando remouendumque, aut ad corpus reficiendum, mutandumque ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendum. Iam uerò sunt nonnulli etiam mixti ex prædictis modi, inuicem connexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit qui uiribus pollent, & mente constant, primosque ætatis limites euaserunt, nondum uerò ad extremos peruenerunt item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeò, sanguinis compotes. Tempus autè purgationis, si nulla urgeat necessitas, uerum maximè & autumnale opportunum est.

Quæ bil em uacuent.

Quæ bilem educunt, quouis anni tempore præterquam in hyeme rectè usurpantur: ætate uerò florida, & declinante: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, uel rubri: uiris magis quam mulieribus: item in quibus cibi continuè corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam urinam reddentibus, cibo usis sicco & calido. In affectibus, arquato, iecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, insania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, febris, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatis, lippientibus, siticulosi, & qui per somnum imaginibus torquentur sine febris, adhæc qui horroris discursum in corpore sentiunt, flatus acris ædunt, intestinis roduntur, quibus stomachus immodicè æstuat, aut nausea humoribus os eius rodentibus euertitur postremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyster nequit injci: abundè siquidem inanit, sic ut totum corpus non commouet, nisi copiosa admodum fuerit exhibita: bilem autem intestinis, aluo & stomacho inheurentem educat. Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus. qui medicamentum bili ducendæ idoneum requirunt, quales sunt qui insania,

nia, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommodatissimum est uisceribus, uteri & uesicæ uitius medicina in requirentibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ affectionem, arquat, eruptiones quæ exanthemata dicuntur, impetigines, uel herpetas, uel erysipelata, uel lepras. Veratrum nigrum bilem flauam potissimum è toto corpore citra molestiam educit, quam ob causam iis qui non grauitè febricitant, magisq; febris carentibus instar drachmæ exhibetur, radicibus in mulsæ & aqua maceratis, aut cū melle catapotiorum modo: uerum ita exhibetur, ut ieiunium præcesserit. Sunt qui misceant ei pulegiū, uel satureiam, uel aliquod ex iis quæ subito transeunt, stomacho non inimica. Scammonia perinde ut ueratrum purgat, magis flauam bilem: cæterū inter omnia quæ purgationem moluntur, aduersissima stomacho est. datur igitur iis, qui febris carent & stomacho sunt meliori, ad pōdus quatuor obolorum cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodā stomacho utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle: item cum gūmi quoq; fiunt catapotia. Colocynthidis, hoc est, cucurbitæ syluestris medulla bilem potissimū uacuat, & mucosa non à sanguine tantum trahit, quemadmodum ueratrum & scammonia, sed etiā à neruis & neruosis partibus instar drachmæ in aquæ mulsæ cyathis duobus, quibus & ruta in cocta sit, epota: læuiget autē accuratè, quoniam asperitates ipsius interaneis adhærentes, ulcera concitant, & neruos confortii lege afficiunt. Exhibetur rectè, capite dolentibus, nempe quū cerebri membrana, uel ea quæ caluariam cingit, uitata fuerit, ut, uertiginosis, heterocranicis, cephalæa infestatis comitialibus, apoplecticis, conuulsis, ut in utramlibet partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus dicitur, diuturno in oculos fluxu uexatis, orthopnoicis, suspirosis uetusta tussi confluctantibus, præterea iis quos articulares dolores, & renum uesicæ affectus malè habent. Elaterium scammonia modo euacuat deligēdū uerò porraceū, leue, & anno non uestustius, triobolari pondere cū lactis hemina læuigatum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter quā elaterium & scammonia dantur liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta macerata, quæ statim deglutientur. Nam in ore diu retentæ, linguā exulcerant, eiusq; uicinam. Lathyrides bilem purgant sicut ueratrum

ueratrum & scammonia : offerentur igitur septem octove , & usque ad quindecim : robustis sanè & qui liberaliore indigent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus & malo præditis stomacho, integras ipsas deuorare. Peplii turionum qui semper sicci existunt, instar octo obolorum in mulsâ datum bilem educit, ueratri modo, & flatus difficiliter. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri uireis habet, tardum ad functionem obeundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur læuigatum drachmis duabus cum mulsâ, sit autem albissimum, uehementer fragile, non adeò lignosum, neq; teredinibus obnoxium. Iris illyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulsâ assumpta. Sit autē nec uetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili & mucis purgandis aptum, coxendicū doloribus peculiariter cōuenit: ius ipsius drachmæ & semissis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semiue instar duarum drachmarum ex mulsâ datur, quibus etiam ueratrum nigrum, uerum flos ille, gravior quidem stomacho existit quàm ueratrum, minus autem purgat. Chamælææ drachmæ quatuor in mulsæ heminis duabus ad quartas decoctæ, per inde ut ueratrum, purgant. Nonnulli uero chamælææ & absinthii dupla portione catapotia fingunt, exhibentq; . Aristolochiæ clematidis, hoc est sarmētariæ seminis drachma in mulsâ pota, colocynthidis more purgat. Polypodii radix arida, si læuis mulsæ inspergatur, aut cum ea conteratur, eundem quem colocynthis effectum præstat.

Quæ bilem atram uacuent.

Medicamentis atram bilem ducentibus utemur præcipuè in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum consortia exosis, aut secessu gaudentibus, item in his qui dum à morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno feruidiore, habitu sicco & parum musculofo. Epithymū laudatissimum est remedium inter ea quæ atræ bili uacuandæ sunt. dantur ipsius drachmæ quinque læuigatæ ex lactis hemina. Epithymbrum quod thymbræ supernascitur, ut epithymum similiter euacuat, sed imbecillus est. Pulegium atram ducit bilem instar acetabuli in mulsâ potum. Tragorigani heracleotici idem modus, uti pulegium uacuat, cæterum ambo deficcant. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto dictum est, intestina uero si fidem Dioscoridi

di accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc alypias uocatur: exhiberi debet in mulsâ. Parthenium similiter siccum si poterit eadē solet extrahere. Alysson cum sale epotum non aliter quàm superiora expurgat.

Quæ pituita uacuanda sint.

Eorum quæ pituitam educunt usus est in habitu frigidiorē & senio confectis perque hyemem, in resolutis, apoplecticis, inturgescentibus tumore laxo fungosoq; quod oedema dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in uentriculo, aut pectore, aut stomacho collegerunt; & in mulierum fluore. congruunt etiam copiosa emungentibus, crassa excreantibus fastidiosis, & coxendicium cruciatu detentis, quum mucis articulis incubuerint, aut elephantiosis: maximè autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui nomen est anasarca. Styra-
cis albi drachmæ pondus cum resina terebinthina æquali modo deuoratum, pituitam euacuat. Oleæ radices cortex drachmæ instar cum uino aut aqua. Pyrethri oboli nouē ex aqua. Lychnidis seminis drachmæ duæ. Cyclamini radices drachma cum hydromelite. Scordij drachmæ duæ cum melle. Chamæpytis in pollinem detrita, exhibitaq; in catapotiiis. Squamæ Cypriæ drachma semis cum resina pari in catapotiiis ualentius purgat pituitam. Lauri foliorum uiridiū sesquidrachma. Cucumeris syluestris radices corticis oboli duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant. Apii dimidium quod ad radicem est manducatum: nonnulli id chamæraphanon appellāt, hoc est humilem raphnum. Bdellij drachmæ duæ ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

Quæ aquam educant.

Aquam elicientibus uti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab utre ascites dicta, malè habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in ijs quos ulcera fluida torquent. Squamæ Cypriæ drachma cum mulsâ pota aquam educit: aceti uerò momentum inperforbere oportet, ne par uomitum reddatur. Coccum gnidium cortice detracto, læue cum melle cocto potum ne fauces attingat, aquas trahit. dantur autem grana aut uiginti, aut uiginti quinque, aut triginta: ualentiori-

PAULI AEGIN.

N bus

bus quadraginta . Euphorbij drachma cum melle cocto pota puitam emolitur, magis autem aquas . Lonchitidis seminis oboli octo cum mulla aquas purgāt. Cneoron similiter aquas trahit cum. polenta potum. Cnici seminis drachmæ quinque læuigatæ ptisanæ incoquantur cum salis momento, sorbentur quæ . Ammoniæ suffiminis drachma in mulla pota educit . Nonnulli uerò lienosis id cum posca exhibent . Sambuci corticis radice succus instar unciarum duarum porus cum uino aquas educit .

De compositis medicamentis purgantibus. Cap. V.

Catapotia ex aloe .

COlocynthis medullæ pars una , absinthij succi pars una, aloes partes duæ, scammonia partes duæ : ex aqua granula ad erui magnitudinem finguntur . dantur undecim numero .

Oxymeli Iuliani .

RUtæ, origani, singulorum , quadrans , thymi cometriens , anethi fescuncia, iridis uncia , mandragoræ radice fescuncia, agarici sextans, tedarum pinguium uncia duodecim, cocci gnidij triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans , polypodii sextans, phylli, costi, spicæ nardi singulorū uncia, rheu pontici fescuncia, scillæ, sambuci turionū, canopi, (qui est sambuci cortex) singulorū quadrans, asari uncia, pulegii quadrans, epithymi, ueratri, acori, singulorum sextans, si, amomi, hyperici, cumini, singulæ uncia, anisi sextans, aceto sextarij decē, mellis sextarij quinque : herbæ per triduum in aceto madescunt, deinde excoctis dum amplius dimidio consumptum fuerit , mel adijcitur ubi unita fuerint, & illis abiectis admiscuntur lathyrides, costus, coccum gnidium , spica nardi læuigata, & si uoles postquam perfectè coctum fuerit oxymel, illa impones . Modus summus est uncia, aut pro uirium ratione : benefacit podagricis affectibus & comitialibus, ac in quibus uacuare simul & crassos humores educere opus est .

Purgatio ad ducendum aquas quæ constat caryophyllo.

ALoes, epithymi, caryophylli, cocci, gnidii, petroselini, rheu pontici, singulæ semuncie , euphorbii scrupuli , quatuor , mellis quod satis est. datur cochlearis mensura.

Purgatio

Purgatio ex rhodomelite confecta, Alexandri,

Rosarum succi sextarii duo, mellis sextarius, scammoniae unciae quatuor. summus modus est quinque cochlearia: leuior, duo: medius tria. *ALITER.* Mellis libra, rosarum succi libra, piperis drachmae duae, scammoniae drachmae octo, mastiches drachmae quatuor, zingiberis drachmae duae. *ALIO* modo, quo ego utor, Spicae nardi, asari, epithymi, singulorum semuncia: macerantur in aquae hemina per triduum: ubi mediocriter incoxeris, misceto aquae rosarum succi sextarii dimidiū, mellis tantundem. Postquam ad usque spissitudinem fuerint incocta, scammoniae fescuncia admiscetur.

Purgatio ex malis cotoneis.

Malorum cotoneorum tostorum unciae quatuor, piperis unciae sex, scammoniae drachma, mellis unciae quinque: trita exhibentur cochleario instar unciae, aut pro uiribus.

Compositio dia citriu, quod est, ex malo medico, Stomacho utilis.

Mali medici corticis, carnisque pondo in aquae sextario uno & dimidio ad tertias decoquitur, mellis sextarius dimidias adiicitur: ubi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur laeuigati piperis longi uncia, scammoniae tostae in fermento tantundem.

Buccellatus purgans.

Scammoniae tostae uncia, piperis, apii semini, singulorum scrupulum, foeniculi, anisi, singulae uncia mellis libra: tosta mediocriter instar unciae dantur in condito.

Oliuæ purgantes.

Scammoniae uncia, piperis tantundem, epithymi, cumini torrefacti, petroselini, rutae, foliorum menthae uiridis, singulorum drachmae quatuor, laeerpitii drachma, palmularum unliæ quinq; , mellis tantundem, aceti heminae duae, oliuarū cymbadum sextarius, scissarū uidelicet: quidam & gari momentum addunt. Modus est quinq; scrupula aut septē aut nouem.

Castillus purgant.

Scammoniae drachmae quatuor, euphorbii tantundem, phylli, piperis, singulorum drachmae duae, mellis libra. datur instar unciae.

Fusca purgans, & stomacho grata.

CVmini, foeniculi, singulorū uncia, pulegii, apii, anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammoniae, singulorum uncia, salis unciae duae. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbij scrupula quatuor adiciunt.

Vinum purgans in hydropicis.

SCillae tres unciae, apij seminis unciae sex, piperis drachma, scapparidis radicis drachmae quatuor, cocci gnidii corticē exuti drachma, folii malabathri galbuli duo, uini heminae duodecim, mellis sextarii tres: scilla contusa uino superfunditur, reliqua laeuigata miscentur.

Halatia, quasi dicas ex sale confecta, purgatio.

Salis communis torrefacti drachmae sex, api seminis, zingiberis, panis siccis, singulorum scrupula sex, anisi, piperis singulorum semuncia, scammoniae, epithymi, singulorum uncia datur circiter cochleare.

Compositio dia Hermodactyli, ad podagram.

Hermodactyli quadrans, anisi, cumini aethiopici, ameos, thymi summitatum, piperis albi, zingiberis, singulorum scrupula tria, epithymi semuncia: exhibentur scrupulis quatuor. quidam scrupula sex dant mane cum condito, aut mulsā, aut aqua calida. **A L I T E R** eadem purgatio. Hermodactyli uncia, cumini aethiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum scrupula sex, mallichae, spicae nardi, singulorum scrupula duo, musci filiqua, cnici scrupula duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelo, Scammonia, quod stomacho sit inutilis, auersamur. Si autem liberaliore uacuatione opus sit, scammoniae filiquas treis mensurae admiscebis: lotum exhibetur.

Catapotia, quae constant lapide armenico, arthriticis potissimum exhibenda.

Aloes unciae quatuor, scammoniae semuncia, agarici uncia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duodecim, cassiae uncia, spicae nardi uncia, scillae tostae sextas, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus scrupulis exhibetur.

Compositio

Compositio dia Coronopodii, ad eadem efficax, ad quæ ex Hermodactylo confecta. stomacho utilis.

Zingiberis scrupula duo, piperis scrupulum, agarici scrupula decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodij radices scrupula sex. dantur scrupula tria: quibus aliud est difficilis siliquæ uiginti tres, quæ faciunt omnino obolos septem, aut ferè octo: ubi uenter inanitus est, ad lauacrum duces inde ouis & pane enutries.

Medicamentum ex Cyrenaico liquore ad febrem quartanam.

Lactis cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ, datur ad nucis auellanæ magnitudinem.

Puls ad purgandum, tumoribus laxis, & elephanticis singulariter efficax, & in quibus humorem crassum glutinosumque emoliri uoles.

Cucurbitis duabus syluestribus circuncisis semen eximitur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & propriis operculis obiectas pernoctare sines, in sequenti die uacuato oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ temperato nigri ueratri triobolum adiunges, scammonia drachmam: ubi iam cum his pulciculam è simila, aut panem ficcum læuigatum incoxeris, inde ægroto dabis tenui pridie uiso uictu, ad nucum auellandarum, octo aut decem, aut plurimum quatuordecim magnitudinem, & portioni aquam calidam exhibebis.

Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidque faciendum ubi medicamentum purgans assumptum nihil profecerit, Cap. VI.

Simulacrum in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius uictus ratione alueris, ieiuno & coctione obita trades, ac à somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere usque ad consummatam purgationem compellet.

Ex commentarijs Philagri.

At si in ediam non tulerit, aut quod uentriculi os ad bilem contrahendam expeditum ex longa penuria præcedente

N ; habeat,

habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi panis ex uiuo aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri, idq; nõdũ incepta uacuatione, (ut ne cibus corrumpatur) sed protinus ubi medicamentum fuerit epotum, sic enim nõnunquam ad celerem medicaminis motionem pondere suo opitulatur. Si uerò quocunq; medicamento ad aluum emolliendam assumpto quis non purgetur, neque uacuetur, nullo accedente periculo nihil molliendum est. At si magnitudo morbi urgeat, aut æger uellicetur, distendatur, & lancinationem expertus fuerit, clyster statim necessariò iniicitur. Si ne sic quidem uenter respondeat, corpore rofionem & ueluti euerfionem sustinente, lauare liberaliter, inungendo oportet: ubi repletũ est grauaturq; sanguinis dimissio congruet, præsertim ubi multi compos sanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat, & emissitios, nõ ex natura, sed acquisitò ex medicaminis potione. Vbi horũ nihil infestat, sed morsus & uellicatus affligit, à balneo cibũ protinus offeres, uinũ liberalius potui dabis, atq; interea clysterem inseres, nisi subsistat cruciatus, rursusq; lauabis. Esto aut oleũ quod in aluũ dabis rutaceum, aut ex alio quopiã flatus experte præparatũ.

Si purgatio modum excedat.

Cap. VII.

Si purgatio maior sit impendio, cutis infricari debet, & lauari calida: ante balneum uinum tenue, fuluum & flauũ dari, tale siquidem celerrimè in totum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, & malum punicũ. Quòd si euacuatio perseueret, artus uinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa, constringant, & nonnihil sanguinis & spiritus excipiant: dabiturq; potui theriaces ex carnibus uiperarum momentum. deducit enim in cutem subitoq; reuellit humorum in uentriculum confluxum, obrunditq; medicine purgantis quod ceu uirosum est & medicatum: huius penuria pastillos theriacos, præterea compositionem diaspermaton, & Philonium appellatam: imò etiam cucurbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polenta & mulso uti, prodest, deinde epithematis astringentibus: maximè uerò ex totius corporis frictione, & medicaminum potu, adiuuantur. Aer ipsis uitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille siquidem materiam à foris intro compellit, fluoremq; auget: hic discutit, & uireis resoluit. At si ex intestinorum quæ medicamento irritantur

irritatur, erosione, uacuatio augeatur cataplasmatibus obducere commemorata oportet, & in aluū dare quæ acrimoniā retundūt, adipem anserinū scilicet, uinum dulce, nardum & consimilia.

De Hieris antidotis.

Cap. VIII.

Hiera Antiochi.

CHamedryos, agarici, colocynthidis medullæ, stœchados, singulorū drachmæ decē, opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ fermentaceæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinq; , cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidas, croci foliorum, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est, **ALITER.** Colocynthidis carnis drachme uiginti, scillæ tostæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, ueratri nigri corticis, scammoniæ, hyperici, singulorum drachmæ tres, epithymi, polypodii, aridi, bdellij, aloes, chamedryos, marrubij, cassiæ, singulorum drachmæ octo, myrrhæ troglodytidis, opopanacis, sagapeni, petroselini, piperis communis & longi & albi, cinnamomi, croci, castorii, aristolochiæ longæ, singulorum drachmæ quatuor mellis, quod sufficit.

Hiera Iusti.

EPithymi drachmæ duodecim, marrubii, stœchados, chamedryos, ueratri nigri, scammoniæ, agarici, piperis longi, scillæ tostæ, singulorum drachmæ sedecim, euphorbii, colocynthidis carnis, aloes, croci, gentianæ, petroselini guttæ ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmæ octo, opopanacis, pollij, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, iunci odorati floris, pulegii, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ longæ & rotundæ, utriusque drachmæ duæ, mellis quod satis est, datur scrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulsâ & sale.

Hiera Galeni.

Chamædryos, piperis longi, piperis albi, stœchados, ueratri nigri, scammoniæ, spicæ nardi, scillæ tostæ, (nonnulli etiam epithymi) singulorum drachmæ sedecim, myrrhæ, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbii, singulorum drachmæ octo: excipiuntur melle.

Hiera Ruffi.

Cucurbitæ syluestris, quæ sicyonia uel colocynthis dicitur carnis, drachmæ octo, chamædryos drachmæ decem, sagapeni drachmæ octo, petroselini, aristolochiæ rotundæ,

N 4 piperis

piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi drachmæ quatuor, uel cassiæ octo, spicæ, croci, polij, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor, mellis, quod satis est.

Hiera Archigenis.

MArrubii, agarici, chamædryos, colocynthidis carnis, stœchados, singulorum drachmæ decem, opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, singulorum drachmæ quatuor. arida tunduntur simul & incernuntur, opopanax autem, sagapenum, & myrrha contusa, mulla per noctem unam in pila macerantur, deinde læuigantur, & sicca his admiscuntur: melle optimo excepta reponuntur in uitreo uase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum communis est. Summus ipsarum modus est drachmæ duæ: assumatur & salis drachma, mellis hemina duæ, a quæ quantū satis est. Quod si uehemētiore ad purgandū uoles efficere, quibus scammonia non inest, iniicietur, & his singulis ex illa obolus.

Quæ sedi & umbilico illita purgent. Cap. IX.

Illito sedis ad flatus excutiendos.

RVta cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, ut unus succus fiat, & penitissimè intra sedē delinitur. Efficacissimū uerò est si cumini momentū & nitri assumat, uel cyclamini succum: stuppa exceptum imponitur, aut glandis forma melle apposito, flatu liquidem multi erumpunt, uentrē leuantes.

Perunctio sedis uentrem mouens, Chexanance.

ALumen cum melle læuigatum coquitur quoad fuluū reddatur, atque hoc sedes perungitur, facilè enim copiosa citra laborem subducit.

Medicamentum quod umbilico illinitur epomphalium dictum, ad aluum subducendam.

Cyclamini drachmæ quatuor, nitri drachmæ tres, ueratri nigri & albi, singulorum drachmæ duæ, colocynthidis drachmæ tres, scammonia drachmæ duæ, elaterii succi drachmæ quatuor, cocci gnidii totidem, caricarum pinguium uncia duæ, felis taurini uncia.

Aliud

Aliud laudatissimum.

Elaterij, lathyridis, galbani, cyclamini, ueratri nigri singulorum drachmæ quatuor, colocyntidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluatici recentis, scammonix, cocci gnidi, tithymali, singulorum drachmæ duæ, terebinthinæ drachmæ tres: excipito hæc felle taurino, & unguinis modo uritor. Quidam uerò ad unguentes faui uncias septem & sicyonij quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

Quæ medicamenta uomitum citent, & quomodo ueratrum exhibetur. Cap. X.

Vomitum utuntur & sani, qui ciborum humorumve copia grauantur: & acuto morbo laborantes quum à pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis uomitum facientibus neq; sani, neque acuta ægritudine occupati uti permittentur: sed in longis profunt affectibus & præsertim induratis, quæ ualidam commotionem desiderant, qualis est podagra, morbus comitialis à stomacho originem trahens, elephantia aqua subter cutem, melancholia, & per similes. Aduersatur uomitus sanguinem excreantibus, malo præditis stomacho, & ijs qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimum igitur ad uomitum ciendum est Cyprinum, digitis aut pinnis id intinctis, demissisq; in guttur. item nardi gallicæ radicum drachmæ septem ex mulsa potest sursum ualenter purgant: similiter etiam radicum betonicæ, quæ cestron dicitur, quinque aut sex drachmæ cum mulsa sumptæ & daphnoidis tria folia uiridia in læuoram coacta comestaq;. Item elaterij obolus in aqua assumptus sursum picuitam & bilem expurgat: & herbæ pediculariæ grana quindecim cum mulsa crassiore, ex bulbis autem qui manducari solent, si crudi assumantur. Narcissi autem elixi sursum per uomitum purgant. idem facit apij radices pars superior, æri proprior comesta, uocant eam nonnulli chamæraphanon, inferior autem pars per inferna purgat, tota uero sumpta ntrinque: raphani prædictis minus quidem purgant, sed utilius: cæterum conuenit ipsas acris & recentis adhuc minutim concisas, ante duas tres uel horas in oxymelite maceratas quam fieri potest multas, assumere, ter quater uel à cœna uomitu excitato: semel autem ieiuni uoment, & sæpe oxymel absorbeant: ubi duabus horis inambulauerint, egelidam bibentes

bentes aquam digitis aut pinnis in os demissis uomunt.

Quibus modis ueratrum exhibeatur.

Veratrum dari debet, ubi longi ualentesque morbi sunt & spes ex aliis praesidiis adempta est, quod aegritudo, omnibus ipsis fortior extiterit. Conueniet autem siue continuè infestauerit morbus, ut aqua inter cutem, elephantia malus corporis habitus, resolutio, & id genus alia: siue statis temporibus repetat, ut morbus comitialis podagra. Porro quum plures hellebori exhibendi modi existant, simplicior quidem & praeparatio potius ad id assumendum, talis est. Raphano arundine composito dissectoq; ueratri albi optimi radicū praesegmina inferuntur: ac ubi una nocte in eo permanserint, proiciuntur: raphanus minutim concisus, cum oxymelite in dictum modum aegro exhibetur, nimirum uomitionibus assueto, atq; is horis quot diximus interpositis ad uomitum cogendus est. At proprius ueratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquae hemina diebus quinque; maceratus, ad aquae tertias incoquitur: ubi expressum ueratrum est, aquae miscetur tantundem mellis: excoctū usq; ad spissitudinem praedicto modo, laboranti exhibetur, praeterquam uomere prius exercitato etiam ieiuno, probeq; defuncto concoctione, & cui alius responderit, uel sua sponte, uel clystere semen bisve secundū uiriū rationem sollicitata. Omnium uero efficacissimus modus talis est. Dissectis ueratri radicibus in sesamini magnitudinem (nam in tenuissimum redactae pollinem uirium efficacia strangulationes pariunt) ueratri plurimum drachmas duas, modicè unam, imbecillioribus praesanae cremori aut alicae, aut id genus alicuius incoctae, potui dabis: ualentioribus ex aqua calida aut mulsae. Incipit autem purgatio post tres quatuorue horas: quibus tardior est, si melius purgantur. Quod si uomitus lentè oboriatur mulsae potui data, uomere aeger cogendus est, pinnis oleo madidus in os demissis. si ne sic quidem proficiatur, in balneū deduci debet. Vbi iam uomere inceperit si uacuatio paulatim respondeat, nullum aegro negotium facessere oportet. sin autem uellicatum aut conuulsionem experiatur, hydrelaeum potui dabitur, simul & in aluū ab inferiore parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum assumunt, nonnunquam fieri solet, unde medicamenti coaceruationem facilius ferunt. Si anima deficiat, naribus quae odorem mouent admotis & consimilibus uireis recolligere,

recolligere, aliisq; ut uerisimile est superuenientibus casibus, eadem accommodare oportet. At multa facta inanitione, cibis dari somnusq; permitti debet, & alia sicuti in his qui nimium purgatur diximus, factitanda sunt. Si perseveret uacuatio, cucurbitulas stomacho defigere, & artus uinculis excipere conuenit: sin aut pro ratione facta sit, mulsæ iusta portio propinabitur, qua superfluitates è medicamēto reliquæ eluantur: mox cibus boni succi offeretur. Iā uerò in iis qui medicamenta per os abominantur, omnino aut hellebori potionē requirunt, Antyllus huiusmodi quodā usus est clystere: hellebori albi drachmæ duę in aquæ sextario per diē & noctem unā macerantur, sequenti die ueratrū in aqua ad dimidias coquitur, inde in aluum datur, ut uomitum concitet, superius purgat paulò imbecillius quàm ueratri portio. Vbi abundè purgatum est, glande acri imposita, aluus irritatur, ut quod injectum est reddatur, & æger nō amplius uomat. Facta excretionē, mulsæ semel bisve intestinis abluendis iniicitur. ipse uerò Antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro albo tuso cribratoq; deinde cocto melle excepto, ac clysteris modo ex helleboro præparati, superiorem uentriculum purgare, uerum hic est modus probatior. Nam purgationē partire in uices nobis licet: pondus igitur sit ueratri drachmæ duę, cæterū glans circumaptetur aut uinciatur stappa solidiore, cuius initiū extrinsecus per sedem recipiatur, quò glandem ubi satis purgando profecerit, auferre possimus. hic modus purgat, quidem absolutissimè, non autem suffocationem aut aliud quoddam periculum inducit.

De differentia antidotorum. Cap. XI.

P Ræfatio Galeni de antidotis in hunc modū habet. Medicinas quæ non extrinsecus impositæ, sed intra corpus assumptæ affectibus medentur, antidota ueteres nuncupant: cæterum triplex ipsorum est differentia, quædam enim lethaliū medicamentorū gratia offeruntur, quædam ob bestias uirus iaculanteis, quas Græci *ἰωβόλες* appellant, quædam uerò morbis ex prauo uictu cōtractis auxiliatur: nōnulla treis hos usus promittunt, quemadmodū etiā quæ theriaca dicitur.

Hedychroi quod theriacen ingreditur, confectio.

A Spalathi radicis corticis, calami aromatici, costi, asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorum drachmæ sex, carpobalsami drachmæ duę, mari drachmæ sedecim

cim iunci odorati floris drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ uigintiquatuor, amomi, cassiæ, rha, singulorum drachmæ octo, nardi Indicæ, phylli, singulorū drachmæ xij, myrrhæ drachmæ uigintiquatuor, croci drachmæ xij. uino primum meriti excepta, in pastillos coguntur, manu in opobalsamum intincta.

Quomodo pastilli scillini præparentur.

SCilla luto aut crusta ex panificio & opere pistorio oblita, modicè torretur, inde carnis ipsius partes, duæ, cum erui farinæ una capiuntur, simulque læuigantur & finguntur pastilli.

Quomodo pastilli theriaci fiant.

SVmuntur uiperæ quatuor aut quinæ, fului coloris & recens scaptæ, & quaternis digitis à capite & cauda amputatis, totaque cute detracta & interaneis exemptis, reliquum corpus in fictili nouo cum anetho & sale modico discoquitur, dū spinæ à carnibus segregentur: deinde his exceptis ablatisque accurate à spinis carnibus, & panis puri æquali modo addito, læuigantur omnia pariter, formanturque orbiculi manu in opobalsamum intincta: in umbra refrigerantur.

Quomodo paretur theriace antidotum.

PAstillorum scillinorum drachmæ quadraginta octo, pastillorum theriacorū, pastillorum hedychroi, cinnamomi, piperis, communis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmæ uigintiquatuor, rosarū siccarū drachmæ duodecim, scordii, napi buniados feminis, iridis illyricæ, agarici, dulcis radicula, opobalsami, singulorū drachmæ duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rheu pontici, quinquefolii radices, nepitæ, iunci quadrati floris, marrubii, petroselinii, stœchados, costi, piperis albi & longi, dictamni, thuris masculi, terebinthinæ, mastiches, chie, cassiæ, nigræ, nardi indicæ, singulorū drachmæ sex, polii floris, styracis, apii feminis, fœnelis, thlapsis, ameos, chamædryos, chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi gallicæ, nardi, meugentianæ, anisi, fœniculi feminis, lemnis terræ, chalcitidis tostæ, amomi, acori, carpobalsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorū drachmæ quatuor, dauci feminis galbani, sagapeni, bituminis, opopanax, castorii, centaurii tenuis, aristolochiæ sarmentitiæ, singulorū drachmæ duæ mellis atticis pondo decem, uini falerni sextarii duo: coniectis in pilam, liquore hypocistidis, myrrha, sagapeno, dulci radica styrace,

styrace, acacia, & opopanace, mellis momentū instillatur, con-
tusaque dissoluuntur, deinde uino superfuso, ut illa superet per
triduum madescunt: inde reliqua contusa in unitatem cogun-
tur, mel despumatum: cæterū in argenteo aut uitreo uase non
adeo pleno medicamentum reponitur, frequenter operculum
aufertur. Vſus eius est quum urget necessitas in iis qui à feris
commorsi sunt & uenena assumpsere, post annum ætatis septi-
mum, sic ut instar nucis auellanae, cum tribus uini cyathis, quo-
tidie bis bibatur. Similiter facit ad eos qui ex quadam laten-
te causa periclitati sunt, corruptela quæ corpus conficit, letha-
lis medicamenti qualitatem imitata, quemadmodum in pesti-
lencia correptis potissimum accidit, semel quotidie. in alijs ue-
rò affectibus à decem annis usq; ad uiginti, usus eius celebratur
in tussi, thoracis, doloribus aut laterum, si febris abest, cū mul-
so: si illa urat, cum hydromelite, sub noctem ad fabæ Aegyptiæ
magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus
omnibus, si morbus recens est, ex posca: si uetustior, ex symphy-
ti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idque manè, & ue-
speri. At quos inflationes & torsiones circa umbilicum, aut
morbus coeliacus malè habet, ex aqua calida ad fabæ Aegy-
ptiæ magnitudinem mane assument. cæterum apperentiā ue-
hementem excitat, rigores, perfrictionem, & bilis uomitum,
præsumptum ante accessiones discutit, menstrua ducit, & fœ-
tus mortuos eiicit, fabæ Aegyptiæ instar potum ex mulsâ, aut
passo in quo ruta aut dictamnium decoctum sit. Item ad uocē
abscissam ualet & per se, & cū duplicato tragacantho ex mul-
so aut passo potum, atque sub lingua retentum eliquatumq;
lienosis, iocinorosisq; ex posca, scyrrhus adest, ex oxymelite,
aut aceti scillini sesquicyatho: in nephriticis cum mulso circa
fabæ Aegyptiæ magnitudinem: dysentericis tantundem cum
decocto rhus, mane & uesperi. Ad lippitudines autem summè
etiam in hunc modum temperatum facit: antidoti & opobal-
sami uncia duæ, mellis cyathus: mixta paulatim unguuntur. Itē
denteis abstergit. pleriq; uerò ut sanitatē ab iniuriis uindicet,
noua Luna ad Græcanicæ fabæ magnitudinē ex eo sumūt, con-
coctione bene obita cū uno mellis cochleari, & duobus aqua
cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus eo utuntur,
quum prauī cuiusdam aeris aut aquarum in itinere suspitio-
nem habent.

Sales

Sales theriaci.

Svmuntur uiperæ recens captæ numero quatuor, mox salis
 ammoniaci aut communis modius Italicus, deinde cū ipso
 in pilam coniecto tunditur in crassiores partes gentianæ ses-
 quilibra, aristolochiæ rotundæ sesqui libra, centaurii tenuis co-
 mæ libræ duæ, cardamomi, marrubii, singulorū uncia sex, scor-
 dii, apii, chamædryos creticæ, singulorum libra, rutæ satiuæ semi-
 nis libra: melle attico in unitatem coguntur, & dimidia ipsorū
 pars in nouum fictile conicitur, deinde quatuor uiperæ uiuæ,
 quibus adduntur etiam scillæ teneræ recentes quinque minu-
 tum concisæ, hinc reliqua misturæ portio dimidia superiniici-
 tur: ac ubi olla cooperta diligenter fuerit, tribus quatuorve fo-
 ramini bus operculum ipsius pertundes, ut per ea uapor tostio-
 nis modum significet. Primum enim uidebitur fumus exire co-
 piofus, obscurus, admodumq; turbidus, qui ignem bestias iam
 inuasisse nuntiet, quando te animū diligenter aduertere con-
 uenit, ne tandem fumi huius aerem è uiperarum exhalatu ui-
 riatū inspires. Postea, ubi uapor cessauerit, & tenuem quādam
 flammam per foramina eiaculatam conspexeris, tunc ipsa to-
 sta esse quā optime censeo, atq; ita fictili ab igne sublato to-
 ta die noctuq; refrigerantur. Deinde ollam aperito, exem-
 ptosque inde carbones diligenter tundito, & cum hisce mistu-
 ris incernito: rutæ syluestris seminis, hyssopi cretici, singulorū
 uncis nouem, foeniculi seminis, nardi gallicæ, stachyos Scythi-
 ci, singulorum uncis sex, petroselini macedonici, malabathri
 foliorum, singulorum uncis quatuor, amomi uuæ, hormini se-
 minis torrefacti, singulorum uncis tribus, origani summitatū,
 thymi summitatum, singulorum uncis nouem, baccarum iuni-
 peri, piperis albi, piperis nigri, foeniculi, singulorum libris dua-
 bus, laserpitii radice uncis decem, coriandri seminis, zingibe-
 ris non perforati, satyrii seminis uel radice, pulegij montani,
 seselis massalioticæ, cordyli mōtani seminis, menthæ, singulorū
 uncis sex, cassiæ fistulæ uncis duabus, cinnamomi uncia. Por-
 rō ego sales ipsos præparari, nō combustis bestiis, sed ipsarum
 pastillis quemadmodum in theriaca, sic ut hos iis quæ eum be-
 stiis cremantur ad admiscerem, quò si quā in se amarulentia
 haberent, eam per adustionem deponerēt: tantumq; pastillorū
 modum inieci, quantum uiperarū quaternionem habere conii-
 ciebam,

ciebam, atque hac ratione longè præstantissimi euaserunt.

Antidotum Mithridatis, dia scincu.

MYrrhæ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, singulorum drachmæ decem, spicæ nardi, thuris, thlipsis, opobalsami, iunci odorati floris, costi, stœchados, seselis, galbani, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorei, hypocystidis succi, styracis, malabathri foliorû, singulorû drachmæ quatuor, cassiæ nigræ, polii, piperis albi, scordii, dauci seminis, carpobalsami, cyphios bdellii, nardi gallicæ, gummi, petroselini, opii, cardamomi, fœniculi seminis, gentianæ, foliorû rosæ, singulorû drachmæ octo, dictamni, anisi, acori, phu, singulorû drachmæ tres, meu athamantici, acaciæ, alui scinci, hyperici seminis, singulorû sesquidrachma, uini & mellis quod satis est Preparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc ualere, ad quæ illa, præterquam ad uiperæ morsus, in eos enim Theriace efficacior est.

Antidotum dia hæmaton, hoc est ex sanguinibus, ad omnia uenenata, & lethalia medicamenta.

Piperis albi & longi, costi, acori, phu, anisi, dictamni cretici, singulorum drachmæ duæ, amomi, opobalsami, rutæ syluestris seminis, fœniculi seminis, cumini æthyopici, anethi, anatis masculi sanguinis sicci, hœdi sanguinis, anserini sanguinis, anatis fœminæ sanguinis, napi syluestris seminis, singulorum drachmæ tres, gentianæ radices, trifolii, iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ duæ, scordii drachmæ octo, petroselini, polii, myrrhæ, nardi, singulorû drachmæ sex, cassiæ drachmæ tres, lactis cyrenaici totidem, stœchados drachmæ quinque, asari drachmæ duæ, guttæ ammoniaci drachmæ tres, meu athamantini drachmæ duæ, agarici tantundem, carpobalsami grana uiginti, mellis cocti quod satis est.

Oxymeli simplex.

ACeti quàm acerrimi albi sextarius, aquæ sextarii duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea dispumetur.

Acetum scillites.

SCillæ albi coloris in taleolas concisæ libræ sex, quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgatæ fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus sexaginta

sexaginta in sole madescere sinuntur, uase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proicitur, ipsum uerò acetum defecatum transfunditur. Nonnulli uerò scillæ libram in aceti sextarios sex coniiciunt. alii uiridem scillam in acetum pari utriusq; modo demittunt, sinum tñ; usque ad menseis sex, atq; hoc modo maiorē incidendi uim acquirit. Valet autem acetum scillarū collutū ad fluida oris uitia, & plerisque interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est item aliis compluribus efficax est.

Oxymeli Scillniæ.

S Cillæ partis internæ tenerioris libræ duæ, aceti acris albi sextarii quindecim, piperis, petroselini macedonici, singulorum uncia duæ, dauci cretici, ameos, anisi, nardi gallicæ, ligustici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheupontici, singulorum semuncia, foeniculi seminis, cumini, laseris, zingiberis, pirethri, hyssopi cretici, costi, pulegii, singulorum uncia, menthæ uiridis fasciculus, rutæ uiridis ruriones quinque, mellisatici sextarius, sapa sextarii duo, apij uiridis fasciculus: interior scillæ pars alba contusa in acetum mittitur, finiturque diebus septem sub caniculæ æstu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa: uiridia autem non contusa in acetum coniiciuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiiciuntur, excoctaue usque ad spissitudinem in uitreum uas defunduntur. Cæterum præsidio hoc & ieiunus instar potionis utere, & cum cibo instar condimenti, est enim longè utilissimum.

Medicamentum Galeni è scilla, comitialibus potissimum efficax.

S Cilla minutim manibus cōtusa in uas in quo mel solet colligi, demittitur, eoq; diligenter operculato in loco ad meridiē spectante sub æstu caniculæ reponitur, quadraginta diebus post caniculæ sidus in superficie uase soluto scillæ corpus effluxisse apprehendes, exceptus igitur ipsius succus melle optimo edulcoratur, daturq; comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnū. Ipsumque scillæ corpus tritum cum melle datur cochleari, atque hoc uirtute secundum est.

Philonis antidotum.

P Iperis albi drachmæ uiginti, alterci drachmæ uiginti, lachrymæ.

chrymæ papaueris drachmæ decem, croci drachmæ quinque, pirethri, euphorbij, spicæ nardi, singulæ drachmæ, mellis attici uel alterius generosi probè cocti quantum sufficit. datur pro- uectoribus ad nucis auellanæ magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est, quod dolorem sopit, & somnum accersit.

*Athanasia dolorem leniens pleuritidis accom-
modata, authore Oribasio.*

CAssiæ drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opij, styra- cis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis de spumati quod satis est. datur quemadmodum Philonium.

Medicamentum ex duplici pipere, eiusdem effectus.

CArdamomi, castorei, opij, singulorum drachmæ tres, myr- rhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum drach- mæ tres, croci totidem: excipiuntur melle decocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

*Medicamentum dia codion, id est, ex papaueris
capitibus, & sapa.*

CApita papaueris uiridia minimè aquosa octo decemve, die postquam decerpta sunt incoquantur cum dulcis radicu- læ uncia, madefacta in sapæ sextatio rursus incoquantur dū ta- bescant, ubi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata de- funduntur: usus medicamenti est in febribus ubi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem defertur.

Medicamentum ex capitibus papaueris & melle.

CApita papauerum, ut dictum est, & dulcis radiculæ uncia, in aquæ pluuiæ aut puteanæ sextario donec intabescant excoquantur. ubi expressa fuerint, semisextarius mellis deco- cto iniicitur: excocta usq; ad spissitudinem, dantur in quibus præterquam quod dolorem lenire, & somnum cōcialiare opor- tet, etiam purgatione opus est, & absterfione eorum quæ in pe- ctore aut pulmonibus renibusque inhærescunt.

Dia codion, compositum.

AQuæ, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictā commode rationem, sextarius, uini dulcis hemine dux, mellis libra, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ

PAULI AEGIN.

O

quatuor

quatuor, coquuntur usque ad spissitudinem, uerū stomacho utilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, fertula campana & dulcis radícula aquæ incocta fuerint.

Eclegma ex marrubio, simplex, tabidis maxime accommodatum.

MArrubii comæ libra in aquæ heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proicitur, adicitur autem aquæ mel: ea incoquuntur usque ad mellis spissitudinem. instar cochlearis exhibetur.

Ex marrubio, compositum.

MArrubii comæ, iridis illyricæ, hyssopi, pulegii, dulcis radiculae, apii, singulorum sextans, caricarum pinguinū quadrans, nuclei pini resinati tantundem: crassius contusa, arida cum caricis in aquæ sextarios tres demerguntur, coquunturque usque ad tertias, illis exemptis, aquæ, mellis libræ duæ induntur, & ad crassitudinem melleam incoquuntur.

Medicamentum ex eruiis.

AMygdalarum amararum sextans, faringæ erui triens, hyssopi tantundem, iridis semuncia, nucleorum pini torrefactorum uncia duæ, mellis sextarius, uel quod satis est.

Medicamentum dodecatheon.

IRidis Illyricæ triens, erui triens, hyssopi, urticæ seminis, dulcis radiculae, fœnugræci, singulorum sextans, bulborum, seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthii scrupula octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

Antidotum, soteria.

SPicæ nardi scrupula trigintanouem, myrrhæ scrupula uiginti septem, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula trigintanouē, opii scrupula triginta sex, petroselini scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem, innci odorati floris scrupula triginta sex, cassiæ scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styra-cis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis totidem, hedychroi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

Ex

Ex styrace bechicon, hoc est, tussi efficax.

A Momi, cassiæ, singulorum sextans, styracis, spicæ nardi, singulorum sescuncia, croci, piperis albi, singulorum uncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium.

Medicamentum Philoxeni, purulentis & longa defloxiōe infestatis idoneum.

R Esinæ terebenthinæ drachmæ uigintiocto, nardi drachmæ sedecim myrrhæ stillatitiæ drachmæ sex, cardamomi, bulborum tantundem, croci drachmæ duodecim, galbani drachmæ sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Aegyptia explet.

Esdra, multiplicis usus, uehementer enim desiccatur.

A Momi scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulum unum & dimidium, fœniculi seminis scrupula tria, cassiæ sesquiscrupulum, iunci odorati floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrupula tria, hypocistidis succi scrupula quatuor & dimidium, sulfuris uncia quinque, papaueris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis illyricæ scrupula septem & dimidiū, alterci seminis scrupula tredecim & dimidiū, spicæ nardi scrupula septem & dimidium, rutæ seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi uncia tres, rosarum siccarū scrupula quatuor & dimidium, nerii floris sesquiscrupulum, est aut ueluti fibra ex qua oritur rosa, rhododaphanes & rosæ ipsius singulorum scrupula tria, rheu scrupula sex gentianæ scrupula sex, hedychoi sesquiscrupulum, tragacanthæ scrupula quindecim: lycii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhæ, singulorum scrupula sex, bdellii scrupula sedecim, artemisiæ succi scrupula tredecim, rhu syriaci scrupula uiginti quinque & dimidium, asari, uteri mergi, lapidis iaspidi, singulorum scrupula tria, piperis scrupula quindecim, castorii sesquiscrupulum, cimoliæ scrupula sex, fisonis scrupula nouem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, seselis herbæ sesquiscrupulū, mellis, uncia uigintiocto, uini quantum satis est.

M *Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.*

Alorum cotoneorum purorum libræ tres, coquuntur in

○ 2 uini

uini peruetusti sextarijs tribus, deinde conteruntur: quibus, piperis, anisi, significi, singulorum contritorum uncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam indunt. quidam in uicem uini, aceto usi sunt.

Medicamentum ex succis malorum, ad appetentiam abolitam & agram concoctionem probatum.

MAlorum cotoneorum maturorum succi sextarij duo, mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis uncia tres piperis albi uncia duae: incoquuntur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt preparat: in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

Quomodo paretur melaplacontium.

MAlorum cotoneorum purorum librae sex in uino coquuntur quousque; intabescant, inde exemptae conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiiciunt, coquuntque; igne lento, ferula agentes. ubi tam spissum totum euaserit, ut manus quodam modo non inquinat, etiam tunc addunt contusi piperis uncias tres, anisi tantundem, petroselini unciam. Sunt qui zingiberis unciam & mastiches tantundem misceat: deinde mixta instar semunciae formant, & cum lauri foliis componunt.

Cydonatum contusum fragmentis saluis.

MAlorum cotoneorum purorum frustulatum concisorum librae octo, in uini sextariis totidem incoquuntur temperate, ut non dissoluantur, deinde mellis despumati librae octo, piperis unciae octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes. zingiberis quincunx, spicae nardi fescuncia, caryophylli uncia, ipsis admiscuntur: omnia contusa ac modice incocta usque ad iusculi spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure componuntur.

Medicamentum diatrion pipereon, ex triplici pipere.

Piperis communis, albi, & longi, singulorum drachmae septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum drachmae duae, mellis quod satis est.

Aliud, Oribasii.

Piperis albi unciae duae, piperis nigri, & longi, spicae nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, fescelis, dauci, petroselini, singulae unciae, zingiberis drach. quatuor, mellis librae tres.

Aliud.

Aliud.

Piperis communis quadrans, albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis, singulorum uncia, mellis uncia una & uiginti, uel quod satis est. ego etiam thymi comæ unciam miscui.

Diospolites.

CVmini aceto macerati torrefactique uncia piperis, zingiberis, singulorum uncia duæ, rutæ uiridis fescuncia, nitri drachmæ duæ, & semis: melle excipitur.

*Medicamentum dia Calamynthes, id est,
ex Calamintha.*

Petroselini, pulegii, seseleos, calaminthæ, singuli quadrantes, apii, seminis uncia.

Medicamentum dia citriu, hoc est, ex malo medico, tardè concoquentibus efficax.

ACeti heminæ tres, mali medici carnis libra, hyssopi, rutæ, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressaq; proiciuntur: aceto miscetur: mellis sextarius, rursusq; incoquuntur ad mellis spissitudinem: ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, meu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

Picra, hoc est amara, compositio Galeni.

ALoes drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmæ sex. Quidam addunt etiam iunci odorati floris & cassiæ utriusq; drachmas sex, exhibetur drachma ex hydromelite.

*Picra ex oxymelite, ad stomachicos, uterum,
& aquam inter cutem.*

ALoes uncia quatuor, phylli uncia duæ, costi, cassiæ, amomi, iridis singulorum drachmæ, fœniculi radice corticis libra, mastiches, nardi gallicæ, zingiberis singulorum drachma, piperis drachma, meu drachma, aceti, mellis, utriusque sesquiseptarius: fœniculum in aceto prius excoctum proicitur, deinde mel additur. Vbi usque ad melleam, spissitudinem incoxeris, reliqua detrita insperges.

O 3

Medicamentum

Medicamentum ex lupino iecore præstantissimum.

Gentianæ, chamæpityos, petroselini, marrubii, succi arcii, sinapis, scolopendrii radices, panacis, minii, erythrodani, brassicæ feminis, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costæ erucæ feminis, eryngii radices, polii, echii, eupatorii, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenii, pares modi: melle discocto excipiuntur, mulsoque probè cocto, ad nucis auellanae magnitudinem dantur.

Theodoretus dia anacardion.

Anacardiorum fescuncia, croci, crassiae, philly, spicæ, nardi, cariophylli, meu, agarici, iunci odorati floris, rheu, epithymi, singulorum drachmæ quatuor, acori, piperis, singulorū fescuncia, aloes uncia tres, sax fragæ, mastiches, iridis illyricæ, singulorum fescuncia, myrobalanorum uncia, mellis libræ sex, uel quantum sufficit.

Theodoretus altera dia anacardion.

Aloes drachmæ sexaginta, agarici drachmæ uigintiquatuor croci, cassiæ, rheupontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum drachmæ decem: costæ, rutæ feminis, piperis albi, singulorum drachmæ octo, spicæ nardi drachmæ tres, xylobalsami, asari, chamædryos, meu, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hic quoque addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulsa.

Medicamentū cyphoides, ad iecorosos & pectoris uitia.

Vuæ passæ carnis drachmæ uiginti quinque, croci drachma, calami odorati drachmæ duæ semis, bdellii drachmæ duæ & semis, cassiæ sesquidrachma, cinnamomi tres oboli, spicæ nardi totidem, iunci odorati drachmæ duæ semis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantū sufficit.

Aliud cyphoides, Alexandri.

Croci, cinnamomi, bdellii, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum, drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorum drachmæ tres, cassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ sedecim, uuæ passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, uini Chii quod sufficit.

Dia

Dia bacanu medicamentum , Hepatis accommodatum .

BAcani uncia, costi tantundem, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spicæ nardi totidem, mellis quod satis est, datur cochlearium cum temperatura conditi.

Medicamentum Zopyrios .

MYrrhæ drachmæ quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spicæ nardi drachmæ duæ, iunci odorati floris tantundem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis quod satis est.

Compositio pæonia .

STyracis calamitis drachmæ sex, thuris, amomi, croci, singulorum fescuncia, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ uncia, costi tantundem, mellis quod satis est.

Catapotia Dositei ad iecur inscripta .

ALoes uncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

Oxymeli splenicum , hoc est, lienī dicatum .

CApparis radicū corticis, scolopēdrii, spicæ nardi, asari, iridis iunci odorati floris, iunci quadrati floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorū uncia, myricæ foliorū, salicis foliorū, apii radicis, thuris arboris, scillæ, singulorum uncia duæ, aceti sextarii tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci unc. tres. præparatum modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

Oximeli, calculosis efficax .

SAxifragæ, betonica, graminis, adiathi, spicæ nardi, carpesii, asari, eryngi, singulorū unc. petroselini macedonici, rutæ seminis, singulorū semuncia, fœniculi uiridis, iridis, scillæ tostæ, chamædaphnes, singulorū unc. duæ, capparis, capparis radicū corticis unc. tres, sili unc. duæ, aq. aceti, mellis, singulorū sextarii duo.

Phusca, ad conterendum calculos .

PVlegii, mastiches, apii seminis, menthæ siccæ, singulorum uncia, salis communis torrefacti libra, coriandri seminis, spicæ nardi, anisi, ameos, singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, uel communis uncia, lithospermi uncia sex, betonica totidem, aceti generosi

O 4 sextari

sextarii quinq; omnia contusa, cribrata, & in tenuissimū polli-
nem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus qua-
draginta insoluantur: ubi usus inciderit, nigrum cicer, aspara-
gi radicem, apium, & adianthū decoquis, in huius decocti mi-
ituram heminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido bal-
neo solio propinas. Nonnulli uerò pulueris ex prædictis spe-
ciebus, scrupula duodecim cum posca dictarum herbarum iuri
temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

Conditum calculos confringens.

P Iperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicae,
singulorum uncia, petroselini, phylli, singulorū fescuncia
rutæ sylvestris seminis semuncia, mellis sextarius, uini ascalo-
nitis sextarii sedecim.

Medicamentum ex sanguine hircino.

Q Vum uua inceperit maturefcere, hirci ætate florentis
sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhi-
beto cum passo cretico. Quidā uerò amomi & phylli, utriusq;
treis uncias miscent. Alii etiam myrrhæ quatuor scrupula.

Excicadis medicamentum nephriticum.

L Ithospermi, raphidis piscis combusti, fescelis, singulorū un-
cia, ameos, cucumeris satiui, seminis, saxifragæ, uue passæ
acinis exemptis, altheæ seminis, phaseoli albi, lycurii, singulo-
rū semuncia, spicæ nardi, phu, meu, lapidū ex spongiis, singulæ
drachmæ, adianthi, paliuri seminis interioris, si sicci, rubi radi-
cis, graminis, polypodii, singulorum drachmæ tres, hircini san-
guinis desiccati ut dictum est, scrupula sex, cicadærum siccarū si
ne capite, pennis, & pedibus, triens, piperis drachmæ sex, mel-
lis probè cocti quod satis est, datur instar nucis auellanæ in con-
dito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sii, aut radicis a-
sparagi, aut rorismarini, aut quinq; folii, aut struthii radicis.

Medicamentum ex lithospermo.

L Ithospermi, betonicae, saxifragæ, petroselini, piperis albi pæ-
res portiones cum melle excipiuntur.

Medicamentum ex marrubij semine.

P Iperis albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiui, seminis,
foeniculi, seminis, marrubii seminis, petroselini macedoni-
ci, pyrethri, zingiberis, phylli, singulæ uncia, mellis qđ satis est
Medicamentum

Medicamentū ex lapide Iudaico, qui tecolithos dicitur.

Spicæ nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, singulorū scrupula octo
piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselini, costi, saxifragæ, singulorum scrupula sex, cassiæ, apij seminis, singulorū
scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

Medicamentum ex sylvestris malua semine.

Cucumberis domestici seminis drachmæ duodecim, alterci seminis drachmæ sex, cicutæ seminis drachmæ tres, (alij sex) opij, sceniculi, malua sylvestris seminis, croci, singulorum drachmæ tres, apij seminis drachmæ sex, cassiæ drachmæ quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellanae totidem, asari drachmæ quatuor: passo cretico excepta dantur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

Medicamentum ex bellarijs nephriticum, vesicae & renum exulcerationi idoneum.

Vva passæ albæ cui acini sint exempti, nucleorum pini recentium, singulorum uncia duæ, cucumeris seminis cortice exuti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, pulmarum pinguium, apij seminis, papaueris seminis: croci, singulorum drachmæ, myrrhæ uncia duæ instar drachmæ ex passo ieiuno propinatur.

Satyriacum antidotum.

Zingiberis, satyrij superioris, singulorū drachmæ octo, scinci caudæ, meu, asari, petroselini, cardamomi, seselis, singulorum drachmæ quatuor, erucæ seminis, cinnamomi, singulorum drachmæ tres, hormini, piperis albi, cnici seminis, singulorum drachmæ duæ, iunci odorati floris, spicæ nardi, singulæ drachmæ, sanguinis hircini mystrum. datur drachma imbecillioribus cum lacte.

Catapotia ex xylomacere, dysentericis utilia.

Xylomacheris, opij, rheu, singulorū scrupula sex, gallæ, myrrhæ, singulæ uncia, excipiuntur uino spathitæ.

Podagrica

Podagrica remedia.

Medicamentum ex corallio, quod diacoralliu uocatur, podagricis idoneum.

Rheu barbarici, pæoniæ, myrrhæ troglodytidis, spicæ nardi, singuli sexrantes, phylli uncia, caryo phylli grana quindecim, anagallidis phœnicei coloris quam uocant cœrallion, semuncia, aristolochiæ longæ uncia quatuor, & rotundæ totidem, datur instar scrupuli quotidie, concoctione probè defuncto. Incipiendum uerò est ab æquinoctio autumnali, quod circa uigesimumquartū mensis septembris diem accidit, capiendumque deinceps ad dies quinquaginta, deinde relinquetur quindecim dierū interuallo, atque sic facere oportet quousque dies quibus assumitur abscreuatur trecēti sexagintaquinque. Sub caniculæ ortu omnino abstinendū est, hoc est, à uigesimo quarto die Iunij usque ad Augusti finem. Vitari debet uenus, carnes præsertim suillæ, salsamentum, garum, beta, daucum, menta, & lactuca non cocta, peponesque, piscium capita, cammori, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, uinum nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianum exercitium, uel pedibus, uel equo, uel gestatione obitum. Qui uerò habitu ficiore sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

Agapeti compositio ad podagram.

Phylli, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloes hepaticæ quincunx, hyperici, pæoniæ, singuli quadrantes, aristolochiæ longæ, phu, meu, damasonij, anagallidis, singuli trientes: utendi modus idem est qui in compositione dia coralliu.

Compositio atactos ad podagram.

Phylli, meu, damasonii, anagallidis cui flos est cæruleus, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum uncia, caryophylli, asari, piperis albi & nigri, singulorum semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pæoniæ radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia due. Similis usus est.

Procli

*Procli compositio, podagra & coxendicum do-
loribus accommodata.*

CHamedryos uncia nouem, centaurij uncia octo, aristolo-
chia, uncia septem, gentianæ uncia sex, hyperici uncia quin-
que, petroselinij macedonici uncia quatuor, meu uncia tres,
agarici uncia duæ, phu uncia una, mellis attici hemina duæ.

Medicamentum ex rebus septem constans, ad eadem,

Hyperici, aristolochiæ longæ, singulorū uncia, cētaurii, cha-
mæpityos, agarici, singulorum tres uncia chamædryos un-
cia sex, gentianæ uncia quinque. Nonnulli etiā petroselinij un-
ciam addunt, mellis drachmas quinque. datur instar drachmæ.

De pastillis.

Cap. XII.

Pastilli græcè trochisci à figura rotularum nominantur.
Tres sunt eorum species, alij nanq; sunt potabiles, alij in
aluū dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui potan-
tur, alij comprimunt aluū, aut sanguinem, aut aliam quam-
piam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo,
aut desiccādo eā cohibētes: quemadmodū qui cōstat. spina ægy-
ptia, & q; seminibus, cōsimilem q;: alii dolorē sopiūt, uel q; sen-
sum obstupefaciunt, ut crocodes dictus, uel q; humores diffun-
dāt, ueluti ex aromatis cōfecti: alii lienem, aut renes, aut iecur
obstructione liberāt, ut qui ex amaris amygdalis confit. Eorū
uerò qui in aluū indūtur, nōnulli acrimoniā obtundūt, ut in dy-
senterijs, quemadmodū ex pompholyge, amylo, tetrasamia,
cū cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo iniecti, nōnulli alui
aut sanguinis profluuiū astringūt, sicuti qui alumine, acacia, &
omphacio cōstant, qualis est qui Philippo ascribitur, uel ex spi-
na Aegyptia, cū rosarū succo, aut plātaginis inditi: nōnulli adu-
rentes, disenteria quā ulcera depascētia exerce, idonei: ex san-
daracha, auripigmēto, calce: charra cōbusta, cōfecti. Inferentur
aut cū succo lēticulæ aut oryza, sic ut intestinū prius muria e-
lotū sit, ægerq; cibū & potū antea assumpserit, ne aliquid me-
dicamēti uirtutis reliquū, ad stomachū rapiatur. Ceterū utiles
sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciūtur, ad affectus
potissimū qui infra umbilicū infestant. Nā superius uis ipso-
rum peruenire nō pōt. At q; delinunt simileis illis uireis obtinēt: ue-
rū astringētes, in herpete, papulis, q; dicunt exāthemata, inter-
triginib. sāguinis eruptionib. & fluidis ulcerib. pficiunt: cuius-
modi

modi est Andronius & Polydæ. qui uero obtundūt, carbūculis
& maleficis ulceribus expediūt: utpote Leucus dictus. & dialo-
tarion. urentes, sicut iam comprehensi, cuius generis habentur,
& Faustiani, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pter
rygijs, & carnosis narium uitiiis accommodantur.

Pastillus aster dictus.

CRoci, opii, castorei, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, lemnis cre-
te, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci, apij, ani-
si, fœfelis, alterci, seminis, styracis, singulorum drachmæ octo:
uino læuigantur.

Pastillus trigonus.

APij seminis, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ, ani-
si drachmæ quatuor, opii drachmæ duæ, anisi drachmæ qua-
tuor, opii drachmæ tres: aqua teruntur.

Pastillus à seminibus diaspermaton dictus.

ANisi, ameos, fœniculi seminis, singulorum drachmæ qua-
tuor, apij seminis, opii, alterci seminis, singulorum drach-
mæ duæ: aqua læuigantur.

Pastillus crocodels hoc est croceous.

ANisi, dauci cretici seminis, singulorum drachmæ quatuor,
myrrhæ, castorei, singulorū drachmæ duæ, croci, opii, singu-
lorū drachmæ tres, apij seminis, styracis, singulorum drachmæ
quatuor, alterci seminis drachmæ sex: ex aqua deteruntur.

Pastillus diarhodon.

ACaciæ, gummi, rosarum floris, balauftiorum, hypocistidis
succis, gallarum, singulorum drachmæ tres, rosarum uiridiū
succis, plantaginis seminis singulorum drachma, lycii Indici
tantundem.

Pastillus dia coralliu.

ALterci seminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ sa-
miæ, corallii, minii Sinopici, opii, singulorū drachmæ qua-
tuor, amyli, balauftiorum, singulorum drachmæ duæ: succo po-
lygoni excipiuntur.

Pastillus dia electru, hoc est, ex succino.

HErbæ pulicaris uncia quinque, mastiches uncia quatuor,
succini scobis, iridis, croci, singulorum uncia quatuor,
opii uncia duæ.

Pastillus

Pastillus ex spina Aegyptia.

SPinæ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis scissi, hypocistidis, succi, gallæ, lenniæ cretæ, corallii, symphiti, terræ samii, aloes, ladani, pares portiones; uino subiguntur.

*Alius pastillus, quem Galenus aphrodisiasti-
con calidion scribit.*

SAtiæ punicæ floris, spinæ Aegyptiæ, balauftiorum hypocistidis succi, acaciæ, singulorū drachmæ sex, lycii, rheu pontici, opii singulorū drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, excipiuntur uino myrteo, uel rosarū baccarum uel myrti decocto.

Clidion Oribasii, ad dysentericos & cæliacos.

GAllæ omphacitidis drachmæ octo, opii drachmæ quatuor, ex aqua singuntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

*Pastillus ex cornu ceruino dysentericis & sangui-
nem excreantibus salutaris.*

COchlearū drachmæ duodecim, cornus ceruini cōbusti gallæ torrefactæ, acaciæ inarefactæ singulorum drachmæ quinque oboli duodecim, baccarum myrti nigre drachmæ quindecim, opii siccati, hypocistidis succi singulorum drachmæ quinque, labruscæ floris drachmæ sex mandragoræ radicis succi, terræ samii quæ aster dicitur, singulorū drachmæ duodecim, rhu obsoniorum drachmæ quatuordecim, malicorii torridi drachmæ septē, thuris drachmæ octo, piceæ corticis exarefacti drachmæ quatuordecim, alterci seminis siccati drachmæ decē, rhu coriarii sextarii duo, uini nigri quantum rhu incoquendo ut unum has crassissimum, satis est, atque hoc percolato reliqua excepta in pastillos coguntur.

Pastillus amazonum.

APii seminis, anisi singulorum drachmæ sex, absinthii comæ drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opii, castorei, singulorū drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex aqua subiguntur.

Pastillus ex amygdalis amaris.

ANisi, apii seminis, asari, amygdalarum amararum, absinthii comæ, paria pondera: ex aqua singuntur pastilli, qui drachmam pendeant: dantur feбри carentibus ex mulso: febricitantibus cum hydromelite.

Pastulis

Pastillus ex erica, lieni dicatus.

ERicæ fructus drachmæ quatuor, piperis albi, nardi syriacæ, suffiminis, ammoniaci, singulorum drachmæ duæ: ammoniacum aceto soluitur, aridisque admiscetur. finguntur pastilli qui singuli drachmam expleant. exhibentur singulatim cum oxymelitis cyatho.

Pastillus ex uesticarijs, diaphysalidon uocant.

CVcumeris satiui excorticati seminis uncia quatuor, alterci seminis, cicute, singulorum uncia duæ, foeniculi, rumicis seminis, croci, nucleorum pini, amygdalorum amarorum, opii, singulæ uncia, uesticariæ sextarii tres, uini quod sufficit.

Pastillus Philippi, ad dysentericos.

BAlaustiorū, acaciæ, hypocistidis succi, opii, rhu thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes, rheu pontici, malicorii, baccarum myrti, singulorum drachmæ quatuor: excipiuntur uino austero, formanturque pastilli triobolares. dantur si febris abest, cum uino: febricitantibus, cum hydromelite,

Pastillus musæ.

ALuminis, aloes, myrrhæ, atramenti sutorii, singulorum scuncia, mali corii, croci, crocomagmatis, singulorū drachmæ sex. excipiuntur uino.

Quomodo crocomagma paretur.

CRoci uncia duæ, rosarū, amyli, myrrhæ, aloes, thuris, gummi, singulorum uncia, costi, spicæ nardi, singulorum drachma: uino subiguntur. At in capite de oleo crocino alia quoque crocomagmatis confectura dicetur.

Pastillus neræ ex Heræ commentarijs.

MYrrhæ, aloes, croci, singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ centum: aqua excipiuntur.

Polyidæ sphragis.

ALuminis scissi drachmæ tres, thuris drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, floris satiæ punice drach. duodecim, fellis taurini drach. sex aliæ drachmæ sedecim, aloes uncia uino austero excipiuntur.

Passionis Pastillus.

SQuamæ æris drachmæ duodecim, æris combusti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasæ, thuris, singulorum

rum drachmę octo, uini quod sufficit.

Pastillus Andronius.

SAtiue punicę floris drachmę decem, gallę drachmę octo, myrrhę drachmę quatuor, aristolochię rotundę drach. quatuor, atramenti sutorii, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorum drachmę duę: læuigantur in uino astringenti, uel aceto.

Pastillus Faustini.

AVripigmēti drachmę duodecim, sandarachę drachmę sex calcis uiuę drachmę octo, chartę combustę drachmę: myrti baccarū succo uel decocto excepta, in pastillos redigito, & cū myrti baccarū, lenticulę, & rubi radicum decocto immittico.

Pastillus ex charta, dia chartu appellatus.

CHartę combustę triginta duę, calcis, auripigmenti, sandarachę, singulę uncia: succo plantaginis excipiuntur.

Pastillus cui nomen est thronus Marcellius.

CHartę combustę drachmę decem, sandarachę, auripigmenti, squamę æris, aluminis scissi, singulorum drachmę quatuor, balauftii drachmę tres, opii drachmę duę, calcis non restinctę drachmę tres, omphacii drachma, hypocistidis succi drachmę tres: uino myrteo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendeant: ubi decoxeris in uino malicoriū, myrti baccas, & rosas usque ad tertias, dato pastillum unum aut in totum quatuor, ex sex uini cyathis.

Pastillus à subere, dia phellon dictus.

GAllę, chartę, fæculę uini, panis, singulorum concrematorum drachmę quindecim, in alio habetur etiam cornu ceruini cōbusti drachmę quindecim, auripigmenti drachmę duę, sandarachę, calcis, utriusque drachmę quindecim, acacię, cerusę, singulorum drachmę quique, argenti spumę drachmę tres: uino læuigantur.

Bithynus.

MAlicorii drachmę decem, cadmię uncia tres, aristolochię gallę, panacis radicis, iridis, atramenti sutorii, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamę æris, manę thuris (nonnulli etiam costi) singulorum fescuncia: aceto subiguntur.

Pastillus

*Pastillus dia castorin, ad ulcera, nomas
& defluxiones.*

CRoci aloes, thuris, singulorū uncia, florū mali punicæ, aluminis scissi, castorii, mannæ thuris, æruginis rasæ, singulorum uncia, minii sinopici libra: excipiuntur uino ueteri.

Pastillus dia castorin, colicis efficax.

MYrrhæ, castorii, singulorū scrupula sex, croci, opii, singulorum scrupula nouem, anisi, api, seminis, dauci seminis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

Pastillus dia œnelau, hoc est, ex uino & oleo mixtis, sedis & naturalium uitijis utilis.

Ceruse uncia decem, argenti spumæ uncie quinque, thuris, recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum uncia duæ uino marinæ experte læuigantur. in usu uino & rosaceo aut uino & myrteo soluntur.

Pastillus ex lapide phrygio, naturalium uitijis accommodatus.

Lapidis phrygii combusti restinctique ter primum butiro uel rosaceo, deinde uino, postea melle, uncie duæ, rosarum floris uncia quatuor, malicorii uncia.

Pastillus dialotarion, quod est ex loto syluestri, ad sedis & naturalium uitia.

Ceruse, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portiones: teruntur succo loti syluestris, aut uino.

Pastillus leucas.

Terræ samie triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singuli sextantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

Pastillus dia alicacabu, hoc est, ex uesticaria.

Spumæ argenti drachmæ uiginti quatuor, cerusæ drachmæ duodecim, aut una & uiginti, uesticariæ drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ quatuor, aluminis scissi tantundem, minii quod ad colorem satis est: aqua excipiuntur.

Pastillus ex duplici ueratro, idem uerò ex duabus acacijs.

ACacie nigræ & fuluæ, glutini fabrilis (in alio piscium glutinis) singulorum uncia quatuor, guttæ ammoniaci, glaucii, aloes,

aloes, singulorum uncia: duæ, thuris masculi, ueratri nigri & albi, singulorum uncia: aceto scillino excipiuntur, quum usus incidit eodem uel communi soluta, ante balneum, & rursus post id inunguntur.

Pastillus Criogenes.

MYrrhæ, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, æruginis rasæ, squamæ stomomatis, uerbenacæ rectæ, aluminis rotundi, singulorum uncia, aceti quantum satis est. decerpi autē debet uerbenaca, quum Sol est in ariete. Fit etiam emplastrum in hunc modum: pastilli, ceræ, colophonix, olei, par mensura, aceti quod ad læuigandum pastillum sufficit.

*Pastillus à nigro uiridique colore dictus
melanchlorus.*

MYrrhæ, aloes, squamæ æris combusti, auripigmenti, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossilitii, atramenti sutorii, cerusæ, nitri, argenti spumæ, panacis radicis, cadmiæ, malicorii, gallæ, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, singulorū uncia, aceti quod satis est. Fit etiā hoc modo emplastrum: pastilli uncia: duæ, colophonix, ceræ, olei, singulorū unc. sex, aceti qđ pastillo subigendo satis est.

*Pantolmius ad chironia malignaque ulcera,
& defluxiones.*

CAssiæ, æris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis rasæ, aluminis scissi, rotundi, liquidi, & lateritii quod plinthitis dicitur, panacis radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, malicorii, atramenti sutorii, portulacæ, iridis astragalitidis, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci, æruginis ferri, squamæ æris, aloes, diphrygis, thuris gallæ, sarcocollæ, plumbi cremati, foliorum oleæ, sorios, myrrhæ, cretæ sutorix liquidæ, balaustiorum, spinæ Agyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu syriaci, chryfocollæ, rhus coriarii, acaciæ, salis spumæ, omphacii, auripigmenti, singulorum pares modi: cum aceto diebus triginta, sub caniculæ tidere læuigantur.

Pastillus Nymphodoti.

APhronitri uncia, nitri Alexandrini, saponis gallici, singulæ uncia, salis cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum drachmę quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, singulorum uncia,

P A V L I A E G I N.

P phylli

phylli drachma, aluminis scissilis, costi, singulorum drach. duæ,
uini myrtei quod satis.

Pastillus ex thapsia, hemicranico dolori efficax.

SVcci thapsiæ drach. sedecim, myrrhæ drach. octo, opopana-
cis, euphorbii, singulorum drach. sex, nitri, liquoris patheni-
ci, singulorum drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum
drach. duæ, aceri quantū sufficit. Vbi utendum est, aceto inun-
ctum post horas sex abluito: at si uoles remissiore uti, cerato pa-
ri exceptum illinito noctemque finito.

*Pastillus qui ano subiicitur, hypotheton dictus, ad
dysenteriam, & ani dolores.*

Terræ samiæ, amyli, singulorum quadrans, croci sextans, aca-
ciæ, tragacanthæ, singulæ unc. castorii, thuris, lycii, siagulæ
semunciæ: in calidioribus, etiam opii semuncia adicitur: her-
bæ pulicaris succo excipiuntur, singunturque pastilli.

*De medicamentis quibus aridis utimur, & smeg-
matis. Cap. XIII.*

ARidorum medicamentorū quæ sanè & cataplasmata
ab inspergendo uocantur, alia ulceribus congruunt,
alia cuti applicantur: ex iis quæ ulceribus faciunt, quæ
dam cauis carnem inducunt, quædam excrecentia reprimunt,
quædā cicatricem generant, quædā urunt exeduntq; nonnul-
la sanguinem coercent. Quæ igitur carni generandæ sunt, uel
repurgando sordida, carnem creant, ut quæ constant ex eruo,
aristolochia, iride, panace, myrrha, thure, aloe: uel humiditatē
circunfluum desiccando, ueluti quæ fiunt ex ære, diphryge, squa-
ma, charta combusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatri-
cem obducunt: uel acrimoniam rosionemq; obtundendo, qua-
lia sunt ex pompholyge, amylo, cerusa, fece combusta, ostreis
crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorū ex
his uireis habent. Ex reprimentibus lenia quidē sunt, quæ con-
stant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: ua-
lentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærugiue, misy, chalciti-
de, ignem non expertis. Vrentia uerò excedentiaque fiunt ex
calce, auripigmento, sandaracha, & face uini combusta, quam
uocant speclen, hoc est sæculam: atque hæc omnia compo-
nuntur, cæterum in tenuissimū redacta pollinem, si ulceribus
inspergantur

inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis, idque urendo faciendūq; crustā. Sanguinē reprimētia aut astringendo, aut refrigerādo, aut siccando, aut opplēdo illum coercent, quorū materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quę cuti admouentur, alia abstergunt exteruntq;, ut ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponū carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutunt, qualia sunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, semine roris-marini, terra lemnia, sepię testa: atq; hęc, assumpta calce & auri pigmēto cū liquore aliquo, pilis abolēdis idonea, & smegmata fiūt. Quædā capiti admouētur, ut fluxū ex eo ruētē desiccēt, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis præparata. oīa uerò smegmata cuti nō inūctæ accōmodari debēt.

Cephalicus paluis, capiti conueniens.

ERuorum quincunx, iridis fescuncia, manne thuris fescuncia, aristolochiæ, squamę æris, singulorum fescuncia.

Alius.

PIcæ corticis drach. sex, thuris drach. quatuor, pumicis tantundem, iridis drach. duæ, resinæ siccæ drach. sex, aristolochię drach. duæ.

Ex aloë, dia aloes, dicitur.

ALoes drach. sex, erui drach. octo, mannæ thuris drach. quatuor, gallæ drach. tres, aluminis scissi drach. duæ.

Diaspecies, hoc est, ex fæce uini combusta, Mannethonis.

CAdmiæ combustæ & illotæ nncia, terræ samiæ uncia, fæcis uini combustæ unc. quatuor, lapidis specularis unc. quatuor, thuris unc. quatuor, quidā & amyli uncias quatuor addūt.

Melitera Oribasii.

CHalcitidis, squamæ æris, gallæ, balauftiorum, aristolochiæ longæ singulorum uncia, malicorii, aluminis scissi singulorum semuncia.

Medicamentum ex ostreis, dia ostreon dicitur.

CAdmiæ, thuris, singulæ uncia ostreorum combustorum uncia tres:

Medicamentum ex thure, dia Libani.

ARgenti spumæ, thuris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, pares modi.

Aphroditarium.

T Huris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerulæ, paria pondera.

Rhodia, ad suppressendum sanguinem, ulcera depascentia, & excrescientia.

G Allæ crudæ drachmæ sex, gallæ cōbustæ restinctæq; uino aride drachmæ duodecim, squamæ æris nigri, si non sit, rubri, drachmæ octo, atramenti sutorii, drachmæ uigintiquatuor, aluminis scissi drachmæ uigintiseptem: teruntur diebus sat multis.

Medicamentum xanthon, hoc est, flauum.

C Halcitidis combustæ drachmæ quadraginta, atramenti sutorii usti drachmæ uiginti, mifyos cremati drachmæ decem, æris usti drachmæ quinque.

Medicamentum à murino colore psaron dictum.

M Ifyos quincunx, gallarū triens, chalcitidis sextās, squamæ æris tantundē, atramenti sutorii uncia, æruginis rasæ sextās.

Medicamentum heliocæ, adurens.

A Vripigmenti libra, calcis uiuæ libræ duæ: aqua læuigato per dies caniculæ, deinde siccatis utitor.

Antheron.

C Yperi drachmæ octo, myrrhæ drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ tres, rosarum floris drachmæ duæ, croci drachma, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ. singulorum drachmæ duæ.

Medicamentum ex charta, quod Græci dicunt dia chartu ad nomas oris potissimum & naturalium ulcera.

A Eris squamæ, chartæ combustæ, singulorū drachmæ octo, auripigmenti, sulfuris uiui, singulorū drach. duodecim, plumbi cremati drach. sex. Ad humidiores quidē sepedonas, sicco utitor: ad siccas, rosaceo macerabis, nonnūquā & melle cū rosaceo.

Medicamentum ex myrto syluestri, dia oxymyr-sines appellatum, ad eadem.

R Hus coriarii uncia duodecim, myrti syluestris foliorum, sandaraches, singulorum drachmæ octo, salicis foliorum siccorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chrysocollæ, aloes, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, salicis

lis communis, singulorum drachmę quatuor.

Medicamentum Massalioti.

Nitri, opii, chrysocolle, lapidis asii, sandarachę, misyos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera: sicco utitor.

Smegma aridum, quod asclepios dicitur.

Baccarum lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cappadocici, stillę ammoniacę, aphronitri, pumicis, singulorū libra, ueratri nigri, herbę lanarię, pyrethri, fęculę quę est uini fęx cōbusta, herbę pedicularię, sinapi, iunci rotundi, aluminis scissi, iunci quadrati floris, iridis, gallę, singulorum uncia sex, sampsuchi libra, uiticis seminis, pulegii, farinę fabarum, & lupini, singulorum ncia sex, chamęleuntis nigri, sulfuris, gummi, thuris, piperis, cucumeris syluestris radicis, marrubii, cimolię, pęonię, sepia testę, fęnugręci, phylli, costi, cumini, euphorbii, spicę nardi, singulorum uncia tres. Alexander autę pręter hęc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragasęi, singulorum libram, adarces uncia, aluminis liquidi nardi gallici, cnici, cocci gnidii, graminis aridi, brionię siccę, singulorum treis uncias.

Smegma peponatum.

Thuris, mastiches, stillę ammoniacę, singulę uncie, tragacanthi fęscucia, succi uuę acerbę dodrans, peponis seminis recenti, quadrās, similę sextarii quinq;, ouorū unius & uiginti albumina, iridis triens quidā & ueratri nigri sextantę miscent.

Aliter Critonis.

Lomenti modius, similę sextarii quatuor, trifolii, glandis unguentarię, iridis illyricę, singulorū librę quatuor, guttę ammoniaci, costi, singulorum libra, ouorum tenuia aquata, peponū carnis sextarii duo, uuę acerbę succi tantundē: macerantur: redactęq; in pastillos siccantur, deinde contusa in cretaq; in usum adhibētur. **ALITER.** Tragacanthę, thuris, mastichę, guttę ammoniaci, singulorū drachmę decę ompahcii drach. quinque, similaginis sextarii quinque, candidi ouorum liquoris uncia, peponū carnis uncia decem: pręparatur ut suprà dictū est.

Smegma quod capitis defluxiones exiccet.

Nitri Alexandrini rufi uncia quinq;, salis communis torrefacti fęscuncia, salis cappadocii uncia: hęc aceto quām acer

rimo macerata in patinam fictilem coniiciuntur, atq; in furno uruntur, dum redigantur in carbones: inde refrigeratis læuigatisque ad abstergendum utitor, uinum in balneo instillans.

Sapo Constantini.

Rosarum siccarum, aloes, gallæ, malicorii, malabathri, sarco collæ, singulorum tres unc. balauftiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum unc. duæ, costi uncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

Puluis pilos abolens, unde psilotrum dicitur, ad podagram.

Mastiches, thuris masculi, herbæ pediculariæ, ueratri albi spumæ argenti, singulorum unc. tres, phylli, amyli, ueratri nigri, lapidis asii floris, singulorum uncia, alcyonii, pumicis costi, cimoliæ, sampfuchi, singulorum unc. tres spicæ nardi uncia. Nonnulli etiam aloes, unciam addunt. contusum in uase puluerem reseruato: ubi necessitas inciderit, oryzæ cremor & ptisanæ in ollam coniicitur: postquam inferbuerit, pulueris, saponis, gallici, auripigmentis, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum, sescuncia additur, calcis uiuæ recentis libra. Utitor unguento mense ter. nono uidelicet lunæ die, decimonono, & uigesimalono, idq; usque ad annum: post hunc, semel mense, quum uigesimalonum luna diem agit.

De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad oris uitia unde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis. Cap. XIII.

Qvanto rarior molliorque est summa oris tunica, cutē quæ corpus totū obtegit, tanto ē magis stomaticorū medicaminū usus euariat. Quū igitur inflāmatio incipit, ea requiruntur medicamēta quæ humoris influxū repellāt, cuiusmodi sunt, arida quidē, omphaciū galla omphacitis, succus rhu, hypocistidis, aluminis, cortex piceæ, & thuris, balauftia, & generatim oīa quæ astringūt, ita ut insuauē ingratamq; & lethalē uim non repræsentent: liquida uerò, succus mororū tum quæ batina, tū quæ sycamina dicuntur, itē nucū uiridium corticis, & mali punici, præsertim acidj, & malorū cotoneorū, mustū aminæūq; mel aut per initia solū ut medicamenta adhæreant temperatur. at quū humor substitierit, misceri debēt quæ concoquant

coquant & mediocriter dissipet, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radiculae succus at per totum id temporis quod statum & declinationem intercedit, recte usurpatur mixtum aliquod ambobus, repellente puta & discussorio: & per initia quidem superbunt repellentia, deinde discutientia: in morbi declinatione solis uti discutientibus absque attritione oportet, qualia sunt nitrum aphronitrum, organum, hyssopum, thymus, nepeta, iris, belfasa, consimiliaque. liquor tunc sapa esto, tum quae ex mulso decocto, tum quae ex caricis & palmulis conficitur, ipsumque dulce mustum cum melle ubi uero ueluti reliquiae quaedam inflammationis remanserint, etiam sulfur igne non expertum miscebimus: succum autem primum cum melle incoquemus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, postea modice coquemus, quoad omnia, exacte in unitatem cogantur, quo facto in uitreum uas medicamentum transfundemus.

Dia moron simplex.

Mororum succi sextarii tres, prius excoquantur dum tertia portio fuerit absumpta, adiectoque mellis sextario, rursus incoquantur ad melleam spissitudinem.

Dia moron compositum.

Mororum succi heminae sex, usque ad strigmenti crassitudinem coquantur, deinde admixto laevis croci drachma, myrrhae duabus, succi uuae acerbae una, aluminis scissi ternis obolis, mellis hemina, quousque spissescant incoquantur.

De moris batinis, quae rubi fructus sunt.

Item quod ex moris batinis constat, eodem modo praeparatur maiore uel attritoria praeditum.

Dia caryon, quod est ex nucibus, simplex.

Viridium nucum corticis contusi succi heminae quinque, mellis hemina, coquantur ad dimidias.

Dia caryon compositum.

Per initia quidem & in uigore oris inflammationum, misceri debet croci, & aluminis, singulae drach. myrrhae duo, in declinatione uero ad discutiendum, nitri drachma, sulfuris tantundem, cum praedicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

Medicamentum ex succo mali punici.

Mali punici cui nuclei sunt adepti dulcis succi sextarii qua-

P 4 tuor,

tuor, mali punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ amineæ drachmæ octo, crocomagmatis, gallæ singulorum drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illyricæ drachmæ octo, omphacij drachmæ octo: conficitur quemadmodum quod moris constat.

Aliter idem,

M Ali punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarij sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi uncia, myrrhæ semuncia.

Medicamentum è musto, dia gleucous dicunt.

M Vti sextarii sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorū drachmæ duæ, croci, myrrhæ, singulæ drachmæ. Si lenire uoles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc uim obtinet.

Aegyptia stomatica.

M Ellis pondo, olei bes, resinæ terebinthinæ sextans, croci drachmæ quatuor: in cacabo liquefiunt.

Medicamentum dia besasa, ex ruta syluestri.

A Nisi seminis, apii seminis, iunci odorati floris, ameos seminis, aluminis scissi, iridis illyricæ, besasa, quod nonnulli harmala uocant (est autem ruta syluestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorū uncia, aristolochiæ longæ cassiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum, singulorum uncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum unciæ tres, nardi Indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.

Dulces utilesque potiones.

D Ulcium simul & utilium potionū aliæ ex uino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisq; compluribus, unde etiā appellationem nonnunquā sortiuntur, aliquando melle admixto, interim nō: aliæ ex aqua in qua decoquantur mala, uel rosæ, uel similia quædam, nempe uua acerba, mala punica, myrti baccæ, eoq; mel optimū despumatum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam utile: si illud excipias quod à cibyra in paruis uasculis asportatur, asterum: item hydromalum uinosum, quod etiā sine melle fieri nouimus. quemadmodum apomeli ex melle solo & aqua, citra alterius cuiusdā substantiæ

stantiæ misturam. Imo etiam ex uino confectæ potiones, quas & propomata Græci nominant, mellis despamati sextarium unum, ad uini quaternos recipiunt, componunturq; citra coctionem. At quæ ex aqua & liquore fiunt, siquidem coquantur unū mellis ad treis liquoris, cuius duæ fere partes inter coquē dum sint absumptæ, sextarios assument: sin minus, unum mellis ad binos liquoris, cæterū quæ non coquantur, diu satis infolare prorsus oportet, & præsertim omphacomeli. Ex aqua uerò temperatus potiones coquere conuenit, quod propter imbecillitatē facillimē mutantur. omnes autē in fictilia uasa exigua oblita transfundendæ sunt, iisq; turō operculatis in apricis locis usq; dum excoquantur reponendæ. attenuantibus aut & probè aqua temperatis uti conuenit. Omphacomeli postquā musti modo inferbuerit crassūq; euaserit, tunc operiri uas debet. his igitur quæ uino constant, quū febris abest, potissimū utimur uel solius uoluptatis gratia, præter eas quæ scāmonia aut grano gaidio aut eiusmodi purgātibus medicamētis componuntur, uel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis in illas coniectis, per os uti licet. Ex aqua aut aut succo aliquorū confecturæ febricitantibus cōueniunt, inter dum ceu hedysmata hoc est dulciaria, quū morbus uino uti nō permittit: interdū ceu affectui cōmodæ, quēadmodū apomeli ad saluam educendā, aut urinas citandas, aut aluū emolliendā, aut extenuandū humorē: hydromalū autem & hydrososatum fisticulosi, febre ardēti pressis, resolutis, & stomacho uitiosis. Omphacomeli, myrtites, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rhoetes, coeliaco affectui, dysenteriiis, uomitionibus, alijsq; fluidis uitijs congruunt. Iam uero his collutionibus subinde in stomaticis affectibus utimur.

Hydromalum ex malorum cotoneorum succo.

MAlorum cotoneorū nucleis exemptis cōtusorū succi sextarij duo, mellis sextarij tres, aquæ sextarij sex, incoquantur despumando ad tertias. **ALIUD.** Malorū cotoneorū frustulatim concisorū nucleis ablatis pondo quinq; in aquæ fontanæ sextarijs decē incoquuntur dū intabescant: ablata ab igne, refrigeratq; eximuntur, expressoq; succo proiciuntur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumq; incoquitur despumando, quoad octaua portio absumpta fuerit. Nōnulli uerò

Si uerò ex dulcibus etiā malis similiter hydromalū cōponunt.

Hydrososatum.

Rosarum unguibus exemptis lib. quatuor, aquæ sextarii quinque mellis sextarii duo.

Rhodomalum.

Succi malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum quoniā rosæ non eodem tempore cum malis inueniuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositionem moliri.

Omphacomelitis præparatio.

Vvæ acerbæ succi sextarii, tres mellis sextariis: mixta diebus quadraginta insolantur, uel discoquuntur.

Quomodo myrtites fiat.

Myrti baccarum succi sextarii tres mellis sextarius, ad tertias decoquuntur.

Apomeli ex commentarijs Philagrii.

Fauorum melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium. contractis fauis unitisq; aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod ueluti cerosum supernatat, particulatim relinquatur, atque tunc refrigerata diligenter transfunduntur.

Rhodostacti compositio.

Rosarum quibus ungues sint exempti succi sextarios duos mellis sextarium incoquito desputans quoad quarta pars fuerit absorpta.

Rhætis confectio.

Mali punici succi sextarij tres, mellis unus, ad tertias decoquuntur,

De collyrijs & ad glutinamentis. Cap. XVI.

Varia oculariū medicamentorū materias existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particulæ stirpium, & metallica his inferuntur. ex quibus alia acrimoniā leniunt, & ueluti oppolent ostruuntq; utpote pompholyx, spodium, amyli, plumbū, terra samia, quæ aster dicitur, cadmia, ea quæ omnia lora, & cādidus oui liquor. Quibus ita utendū est, ut caput prius uacuationem experiatur: nam si repletū fuerit, metus

metus est ne oculorū tunicæ humoribus distentæ perrumpantur. Alia contraria his natura obtinent, nempe aerē, recludendis uacuandisq; iis quæ diu impacta fuerūt accommodata, quæ admodū liquores Cyrenæicus, Medicus, sagapenus, euphorbiū, & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama grisea, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stimmi, concremata omnia. Quædā his uicina sunt, smectica ab exterēdis sordibus appellata, cuiusmodi est auripigmentū, sandarachā, & lapidis asij flos. Sunt & astringētia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt uehementē lippitudini, ulceribus, & defluxionibus eōducunt, nēpe rosarū folia, flores, fructus, spicæ nardi phyllū, crocus, glauciū, & hypocistis. Quæ uementiorē astringēdi uim repræsentāt, oculorū claritati conductibus potissimū medicinis miscētur, cuius generis est omphacium acacia, balauistiū, satiuæ punicæ flos & galla. Alia concoquūt discutiuntq; ut myrrha, crocus, castoriū, lachryma thuris, fœnugræci succus. Porro ex compositis oculorū remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationē habēt, alia hygrocollyria, alia hygrocollyria uocantur. Quæ igitur delinuntur, omnem cōprehensam materiā recipiunt, omnibusq; conferūt affectibus: cæterū uere præsertim præparari debent, æstate siquidem uirtus ipsorū perspirat euanescitq; hyeme species gelu rigidæ temperari nequeunt. Conterere autē ea oportet liquore non copiosē affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, uerū modicē, ut sordiū modo cōterantur. Aqua uero pluuialis erit, tum quò tenuis sit, tū quòd modicē astringat. Si quidē uino aut succo aliquo læuigare oportet, ipsa quoq; terenda sunt, metallica sanē longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo demū nbi satis læuia euaserint, gummi adiicietur in formam redacta, uasis maximē æris aut uitreis reponentur. Cæterum iis quæ ē succo conficiuntur, protinus ut ilicet: metallica uetustate reddūtur meliora. Porro inter collyria arida quædam cōsumunt exteruntq; callos, ficos, ungueis, scabiosaq; uitia, ē chalcitide, ærugine & misy composita: quædā lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præseruent, tueanturq; oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimū pollinem coacta oculis applicātur.

At

At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo ob
uetustatem tenui, fœniculi succo, diuersorum animalium fel-
le, liquore cyrenaico, alijsque compluribus. Conferunt heberu-
dini, suffusionique incipienti, medicamenta quæ extenuent, ca-
lesfaciant, purgentque. Utendum his est, & omnibus acribus,
ubi caput repletionem caret, sub dio, aere, puro, austrino, non ni-
mis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta
quæ anacolemata græcè dicuntur, ex medicamentis præparan-
tur quæ obstruunt, opplentque, glutinant, stringunt, aut refrige-
rant, aut astringunt, siccantve, qualis est farinæ pollen, manna,
terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido oni
liquore. glutinantur fronti in quibus humor non intra calua-
riam delitescit, sed extrinsecus affligit.

*Collyrium, quod protinus dolorem sedet monohemeron
appellatū, ad incipientē uetustamque lippitudinē.*

A Caciæ drach. triginta sex, gummi drach. triginta duæ, cad-
miæ drach. nigtintiquatuor, æris cremati & eloti drachmæ
octo, opii, drachma: uino austero læuigantur. Medicamen-
tum discutit & siccatur.

Chiacum collyrium.

M Inii suopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium
unguibus exemptis floris quem thylaca uocamus, gūmi,
singulorum unciæ quatuor, opii, uncia: uino aminæo, aut faler-
no, aut chio austero teruntur. Sit autē uinum marinæ expers.

Cygnarium.

C Admiæ ustæ elotæque unc. sex, cerusæ lotæ unc. quatuor,
pompholygis tantundem, amyli unc. duæ, tragacanthæ,
opii torrefacti, gummi, singulorum unc. duæ: aqua pluui-
ali læuigantur.

Rubens cygnus.

C Admiæ crematæ elotæ sextans, terræ samiæ quæ aster di-
citur tantundem, ce usæ rriens, pompholygis bes, amyli
sextans, opii sextans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ unc. gum-
mi triens: aqua cœlesti subiguntur.

Albus cygnus.

C Admiæ unc. quindecim, cerusæ unc. septemdecim, opii
drach. octo, thuris dra ch. septem, amyli unc. septem, gum-
mi

mi drachmæ tredecim : aqua cœlesti teruntur .

Pelaron ad ulcera .

CAdmiæ, cerusæ, singulorum drach. uigintiquatuor, acaciæ, opii, singulorum drach. octodecim, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drach. nouem, myrrhæ drach. tres, æris, croci singulorum sesquidenarius: aqua conteruntur .

Phæon ad oculos sanguine suffusos, & magnos affectus.

CAdmiæ teneræ drach. uigintiquatuor, cerusæ drach. sedecim æruginis rasæ drach. duodecim, stimmi drach. octo, aluminis scissi drach. tres chalcitidis ustæ drach. tres, nardi Indicæ drach. quatuor, omphacii drach. duæ, æris drachma, squamæ æris drach. octo, ericæ fructus drach. tredecim, lachymæ papaueris drach. uigintiquatuor, croci drach. quatuor, castorii drach. tres, myrrhæ drach. sex, lycii Indici, acaciæ, gummi, singulorum drach. quatuor, rosarum recentium drach. duæ & semissis: uino falerno aut surrentino, aut aminæo, aut chio austero perteruntur. inungitur per triduum, aquæ instar dilutum ex fœnugræci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postremo aqua crassius .

Collyrium ex decoctis, dia zematou dicitur .

CAdmiæ unc. sedecem, cerusæ unc. octo, amyli, opii, tragacanthæ, acaciæ, singulorum unc. duæ, gummi unc. sex: læuigantur decocto rosarum siccarum, meliloti, capitum papaueris dulcis radiculæ, pari singulorum modo .

Collyrium dia hydrias, repellens.

Iliquoris qui in uasis cerealibus tophi modo concretus reperitur, libr. tres, cadmiæ ustæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terræ samiæ, qui aster dicitur, singulorum elotorum unc. sex, thuris uncia, myrrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnugræci, singulorum libra tragacanthæ unc. sex, gummi libra.

Collyrium Ilambonis .

CAdmiæ unc. octo, pompholygis unc. quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opii, singulorum unc. quatuor: aqua pluuiatili teruntur .

Cinereum,

Cinereum, quod spodiakon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.

T Huris, stimmi, singulorum drach. centum, cadmiæ, cerusæ, utriusque drach. uigintiquatuor, terræ samiæ, papaueris la chrymæ, singulorum drach. tres, gummi drach. quindecim: læ uigantur oleæ coliculi succo. fit autem is in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario, paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

Collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias uocatur.

T Huris drach. quatuor, stimmi drach. quindecim, cadmiæ drach. uigintiocto, cerusæ drach. quadragintanouem, terræ samiæ drach. octodecim, opii drach. sex, gummi drachma, plumbi usti eloti; drach. octo: excipiuntur oleæ turionū succo.

Dia thalias, ruffum.

A Eris cremati drac. duodecim, sandycis unc. uigintiquatuor, foliorum oleæ unc. duæ, opii tantundem, gummi unc. decem, uino spathite uel aminæo excipiuntur.

Dia smyrnon claudiacum.

G Laucii, sarcocollæ, singulorum drach. quadraginta octo, croci drach. uigintiquatuor, opii, myrrhæ, lapidis hæmatitis, singulorum drach. sex, tragacanthæ drach. quadraginta octo, gummi drach. sedecim: uino Italico subiguntur usus est ex ouo.

Aliud dia smyrnon ad rhyadas & ægylopas.

C Admiæ lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorum drach. uigintiocto, myrrhæ, spodij Cypriæ, singulorum denarii uigintiquatuor, opii drach. octo, croci drachmæ quatuor (alij octo) piperis albi grana triginta: gummi drach. sedecim: uino Italico teruntur, ex ouo adhibetur collyrium: si uitium sit recens, aquatum.

Stacticum Prosechij.

C Admiæ, gummi, singulorum drach. uiginri, stimmi, atramenti sutorij, singulorum drach. octo, opii drach. quatuordecim, æruginis rææ drach. decem, piperis albi drach. sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drach. quatuor: aqua conteruntur.

Hygidion

Hygidion Ammonij.

CAdmix, æris, singulorum drach. sedecim, cerusæ, castorii, aloes, croci, singulorum drach. quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbi usti, singulorum drach. octo, lycii drach. tres, lapidis schisti drach. quatuor, opii drachmæ decem, acaciæ drach. quadraginta, gummi drach. quadraginta octo: aqua excipiuntur.

Olympos seu olympiacum.

ACaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorum drach. octo, æris cremati elotiq, stimmeos usti & loti, cerusæ concremata lotique, cadmiæ, singulorum drach. duodecim, myrrhæ, opii arefacti, singulorum drach. quatuor, croci drach. quinque, æruginis rasæ drach. tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycii Indici, omphacii, singulorum drachmæ, castorii, rosarum floris, singulorum drach. duæ, phœnicobalanorum drach. quatuor, similiter offea palmularum ustarum ligna numero quinque, gummi unc. quinque aqua pluuiali superfunduntur, in aqua commadescent tres dies totidemque noctis, calami odorati, alterci feminis, rosarum siccarum, singulorum drach. quatuor, phylli drachma.

Nardinum.

CAdmix, croci, gummi, singulorum drach. triginta sex, æris usti drach. octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drach. triginta, nardi syriacæ drach. duodecim, opii, singulorum drach. sedecim: aqua subiguntur.

Theodotium minus.

Stimmi, acaciæ, singulorum drach. uiginti, æris usti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drach. duæ, aloes, succi papaueris, lyci, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

Rhinarium.

Lapidis hæmatitis, lapidis schisti, singulorum drach. sedecim, æris combusti, cadmiæ, æruginis, singulorum drach. octo, opii drach. quinque, chalcitidis drach. duæ, gummi drach. octo, uino excipiuntur.

Xyster.

Xyster.

PVmicis, misyos, ostreorum, singulorum crematorum unc. sex, cadmiæ, opii, chalcitidis ustæ, croci, aloes hepaticæ, castorii, phylli, singulorum drach. duæ, stimmios, acaciæ, singulæ unc. æris combusti unc. quatuor, myrrhæ troglodytidis drach. quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drac. octo, gummi drach. quatuor: aqua cœlesti superfunditur. Nonnulli etiam uinum miscent.

Hecatombe, ad cicatrices crassas.

CAdmiæ ustæ lotæque, æris cremati & eloti, uniuscuiusque drach. octo, stimmios combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drach. quindecim, aloes, gallæ, æruginis uermicularis, castorii, lycii, spicæ nardi, croci, opii, myrrhæ, cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarū drach. sexaginta: aque pluuiali teruntur.

Collyrium ex cornu, dia ceratos dicitur, Galeni.

PLumbi combusti, cornus ceruini cremati, singulorum unc. duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ combustiæ, æruginis, myrrhæ, gummi, singulorum uncia: aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium è thure, dia Libanu nuncupatur.

Thuris uncie sex, cadmiæ, pompholyg s, terræ samie quæ aster dicitur, amyli, gummi, singulorum unc. tres, cerusæ unc. sex, squamæ æris unc. quatuor, tragacanthæ unc. tres, opii unc. sex: aqua cœlestis adiicitur.

Libanium.

CAdmiæ elotæ, amyli, singul. denarii duodecim, cerusæ tantundē, spodii, pompholygis, terræ samie quæ aster dicitur, plumbi usti & loti, tragacanthæ, singul. denarii octo, opii denarii duodecim, gummi denarii quatuor: aqua pluuialis additur, & ouorum uiginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios.

Aster magni.

Pompholygis, cadmiæ, cerusæ, singulorum drach. sedecim, plumbi drach. octo, amyli drach. octodecim, thuris drach. decem, terræ samie quæ aster dicitur drach. duodecim, myrrhæ drach. duæ, tragacanthæ gummi, singulorum drach. octo: aqua additur.

Vranium.

Vranium,

TErræ samie piperis singulorum unc. tres, spodi eloti uncia, gummi unc. quatuor, stimmios cremati elotique unc. duæ, squamæ lotæ uncia, opij drach. sex, cadmiæ combustæ & elotæ drach. duæ: aqua pluuiatilis admiscetur. Carnem inducit, repellitque.

Collyrium ex succo fœnugræci.

CAdmiæ, tragacanthæ, singulorum unc. octo, cerusæ unc. triginta, amyli tantundem, opij uncia: leuigantur succo fœnugræci.

Collyrium Cleonis.

POmpholygis, plumbi, singulorum unc. quinque, croci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur uncia, gummi unc. duæ: aqua pluuialis additur, aquatum illinitur.

*Dia rhodon, hoc est, ex rosis, quæ septuaginta
duas uncias pendunt.*

Rosarum uiridium unc. septuaginta duæ, cadmiæ & ustæ & elotæ drach. uigintiquatuor, æruginis rasæ drach. duæ, spicæ nardi drachma, squamæ æris elotæ drach. duæ, stimmios combusti elotique, opij, myrrhæ, singulorum drach. tres, croci drach. octo, amyli drach. duæ, gummi drach. uigintiquatuor: aqua pluuialis admiscetur.

Album dia Rhodon.

CAdmiæ crematæ & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum libra, amyli, opii, tragacanthæ, singulorum unc. tres, aloes fescuncia, gummi unc. tres, croci fescuncia, rosarum unguibus detraetis unc. sex: aqua miscetur.

Callyrium ex aloe, dia aloes nuncupatur.

CAdmiæ, cerusæ, aloes, singulorum unc. decem, rosarum uiridium unc. sex, amyli unc. tres, opii uncia, tragacanthæ unc. duæ, gummi unc. tres: aqua pluuiatilis adijcitur.

Crocinum dia rhodon.

Spicæ nardi, rosarum siccarum, aloes, singulorum drach. duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drach. quatuor & semissis, glaucii sex, sarcocollæ tantundem, opij drach. duæ, tragacanthæ uncia: aqua pluuialis additur.

PAULI AEGIN.

Q Nili

Nili dia Rhodon.

Rosarum tenerarum drach quatuor, croci drach. duæ, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

Lynceus ad claritatem oculorum.

CAdmiæ, æris, cōbusti, guttæ ammoniacæ, singulorū drach. duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitis, opii thebani, singulorum drach. sex, aloes hepaticæ, fellis raurini, galbani, sagapeni, singulorum drach quatuor, æruginis rasæ, opopanacis, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drach. sex: aqua pluuiali teruntur.

Proteus ad idem, cicatricesque extenuat.

CAdmiæ, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarii quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenaici drach. octo, croci denarij duodecim, opij thebani denarij decem, sagapeni denarii duodecim, oliuæ æthiopicæ denarii duodecim, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, suffiminis ammoniaci denarii xx. opopanacis denarii sedecim, opobalsami denarii decem gummi denarii uiginti: aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium ex succo fœniculi.

CAdmiæ drach. septemdecim, atramenti Indici drach. sedecim, piperis longi drach. tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenaici drach. octo, opobalsami drach. sex, spice nardi drach. sex, sagapeni, opopanacis, singulorum drach. quinque, opii drach. quatuor, euphorbii drachma, gummi drachma: succo fœniculi læuigantur.

Collyrium ex opobalsamo.

CAdmiæ, cerusæ, singulorum drach. octo, omphacii drach. quatuor, piperis albi unc. sedecim, opii drach. quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

Thalasseros.

CAdmiæ unc. octo, æruginis unc. duæ, atramenti Indici unc. octo, piperis albi unc. quatuor, liquoris medici uncia, opobalsami unc. duæ gummi unc. sex: aqua adiicitur.

Harmation.

Harmation.

Gutta ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorū drach. quatuor, æruginis drachma, gummi drach. quatuor aqua cœlesti excipiuntur.

Collyrium malabathrinum, quod & Isotheon dicitur.

Cadmia drach. sedecim, æris usti & eloti drach. quatuordecim, opri, lycii Indici, malabathri, nardi Indici, croci, aloes, singulorum drach. duæ, cerusæ drach. octo, castorei drach. duæ myrrhæ drach. quatuor, acaciæ, stimmi, singulorum drach. quaginta: aqua teruntur usus ex ovo.

Crassus ex uino.

Cadmia, lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drach. quaginta, æris usti drach. triginta, chalcitidis drach. trigintaduæ, papaueris seminis drach. tredecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adiicitur, quæ læuigan-
tur uino spathite uel amineo.

Aliud ex uino.

Aëris combusti, cadmiæ placitidis, singulorum unc. nouem, lapidis hæmatitis eloti unc. sex, croci, myrrhæ, aloes, suffi-
minis ammoniaci, singulorum unc. tres, lycii Indici, spicæ nar-
di, singulorum fescuncia, piperis albi grana centum quinquaginta, acaciæ rubentis unc. nouem gummi unc. tres: uino faler-
no aut amineo teruntur.

Collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem.

Lapidis hæmatitis, schisti que, cassiæ, singulorum drach. octo-
decim, æris, cadmiæ, opii, æruginis rase, singulorum drach.
nouem, gummi tantundem, chalcitidis ustæ drach. sex: aqua
reruntur.

Aridum collyrium Galeni, quod oculos tuetur.

Lapidis phrygii minutim contusi usti que in ollula quous-
que incandescat, & restincti butyro non ueteri, deinde
iterum similiter cremati, extincti que uino falerno, ac tertium
usti & extincti que melle siccati que libra, æris cremati, piperis
albi, phylli, singulæ uncia, stimmi fescuncia: omnibus in læ-
uorem detritis quum medicamentum ab igne auferetur, li-
quoris balsami non crassi (id enim arefcere medicamentum

Q 2 prohibet)

prohibet) sed lucidissimi unclam iniicies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic ut specillo illato tunicae non attinguntur, sed ut solum medicamentum palpebris apertis illinatur. Inungi autem debet non semel, uerum saepius, tum ante cibum, tum secundum ipsum, magisque ubi iam lippitudo sentitur. Mirum enim est, quam omni alio medicamento securius ab iniuria uindictet.

Aridum dia croci.

S Arcocollae drach. octo, croci drach. quatuor, glaucij tantundem inungitur frequenter die. Nonnulli uero aloen quoque scint.

Aliud aridum ad siccam lippitudinem quae xerophthalmia dicitur, sycosin sepedonas, carnis excrescentias.

C Admiae drach. decem, chalcitidis drach. uiginti, piperis grana quindecim, nardi gallicae drachma: teritur cadmia & chalcitis cum uino: ubi inaruerint, reliqua adiciuntur, cogunturque in tenuissimum puluerem.

Hygra, hoc est, liquidum collyrium, ex Caucalide.

C aucalidis succi, chamædryos, coronopodis, interdum & othonnae succi par mensura. Est autem othonna magnum chelidonium.

Aliud ad syconsin, quae est ueterrima palpebrarum asperitudo encanthidas, & excrescentiam carnis.

M isyos tosti drach. sex, atramenti sutorii drach. quatuor, mellis attici sextarius.

Erasistrati panchrestos hygra, mirifica est in ocularijs uitijs, tonsillis pudendis & auribus suppurantibus.

A eris drach. sex, misyos tosti, myrrhae, singulorum drach. tres, croci sesqui drachma, piperis drachma, uini chii & passi cretici, utriusque sesquihemina: omnibus in uino laeuigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, & usque ad melleam spissitudinem incoquantur.

Agglutinamenta oculorum qui defluxionibus infestantur.

T errae samiae, mannae thuris, myrrhae, pares modi, oui aquaeto excepti, in lintheumque illiti fronti imponuntur. **A L I V D:**
Alterci

Alterci seminis drachma, opii tantundem, myrrhæ drach. duæ
croci drachma, farinæ pollinis drach. quatuor, ouorum tosto-
rum lutea duo, albumine oui excipiuntur.

*De emplastris, & medicamentorum quæ in illa mittun-
tur coctione, tum qui ceræ modus cū oleo esse debeat,
ex commentarijs Antylli. Cap. XVII.*

Medicamentum quæ emplastra ingrediuntur, alia sunt
terrestria, utpote metallica, lapidumq; terræ species,
flores, cinis, & conchylia, alia sunt oleamenta, alia la-
chrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi
sunt: semina uerò, herbas, & radices pauca recipiunt. Cæterū
ex ipsis emplastris nonnulla sunt uulneraria, quæ enæma græ-
cis quod cruentis iniiciantur: colletica, quæ glutinent: & catag-
matica, quod fracturis accommodentur, appellamus. Constare
autem ex siccantibus non summè, uerum secundi ordinis absō-
luti, & tertiū incipientis, oportet cuiusmodi sunt salix, quercus,
cupressus, piceæ & pini cortices, myrrha, thuris lachryma, bitu-
men, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, cerusa, spuma argen-
ti, & pleraque ex metallicis. Coqui debent quousq; manus nō
amplius inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra
& ipsa ex siccantibus componuntur, uerū efficacioribus quàm
glutinaria, quod genua est, æs combustum, squama tū æris
tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla,
plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Discutientia uerò & ca-
lescentibus & siccantibus modicè fiunt, nempe aristolochia,
thapsia, oleo ueteri, & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resi-
na terebinthina, galbano, sale cōbusto, salis flore. Quæ emol-
liunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo ueteri, propo-
li, ammoniaco, styrace galbano, bdellio, mastiche, resina tere-
binthina, uel radice althææ & cucumeris syluestris, præparan-
tur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad ex-
trahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, ærugi-
ne, fermento, stercore, sulfure, terebinthina. Quæ concoquunt
ex cera, ladanu, uua passa, amomo, croco, thure, pice, mastiche,
Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, œsypo, adipe, æru-
gine. Pus mouentia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chon-
dro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina. Quæ ue-
rò leniunt, argenti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, cha-
memelo,

mæmelo, amylo, cera alba. Iam uerò enæma dicta, recentibus adhuc uulneribus & fracturis iniici debent, adiutariq; è summa spleniorum parte spongiis posca madentibus simul illigatis; solui tertio quoq; die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, discutiunt, concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumque usum adhibentur. Quæ leniunt etiam per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps exequemur.

Basilicum tetrapharmacum.

CEræ, resinæ colophonix, picis, seu taurini, pares portiones. *Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergensq;.*

Olei ueteris depondo, ceræ unc. uiginti, resinæ colophonix, adipis suilli, singulorum pondo & dimidium, argenti spumæ pondo, cerusæ unc. sex, succi lini seminis tantundem, farinæ pollinis uncia, thuris uncix quatuor.

Emplastrum ex melle, dia melitos dicitur.

Argenti spumæ, ceræ, olei, singulorum lib. quatuor, terebinthinæ resinæ lib. duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libra. **A L I V D.** Argentæ spumæ lib. sex, olei lib. quinque & semissis, resinæ colophonix lib. septem & semissis, ceræ lib. tres & semissis, mellis lib. tres.

Emplastrum à succo dia chylon dictum.

Argentæ spumæ pondo sex, olei, æstare quidem pondo septem, hyeme uerò pondo nouem, fœnugræci semisextarius, lini seminis tantundem, althææ teepondo: althæa, seminaque in uiginti aquæ sextariis discoquuntur, quousque paululū ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquuntur dum ebullire desierint, post hæc argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne non acri excoquuntur usque dum digitos intinctos non inquinent.

Emplastrum ex polline farinaceo, dia gyreos appellatū.

Farinacei pollinis, guttæ ammoniaci, singule lib. resinæ è picea derafæ, ceræ, adipis suilli, singulorum lib. duæ, succi lini seminis quod satis est.

Emplastrum

Emplastrum ab herbis botanicum dictum.

LApathi rhepelæi, anchusæ chærospelethi, hoc est, onocleæ, heptanueri, plantaginis, singulorum unc. tres, olei lib. sex, adipis suilli tantundem: herbæ oleo excoctæ proiiciuntur, reliqua cum oleo eliquantur.

Emplastrum ex hastula regia, dia asphodelu dicitur.

HAstulæ regiæ radicis succi libra; rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum unc. duæ, adipis suilli unc. tres, ceræ unc. quatuor.

Emplastrum è fermento abscessus rumpens.

Fermenti, axungiae, singulorum unc. sex, salis unc. quatuor, piceæ resinæ unc. tres, ceræ unc. quatuor, aphronitri uncia, guttæ ammoniaci unc. duæ, mellis unc. sex, saponis unc. duæ.

Emplastrum dothiene.

Suffiminis ammoniaci pondo, nitri Alexandrini unc. sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, ceræ totidem resinæ terebenthinæ pondo, olei ueteris uncia aceti quod satis est.

Emplastrum ex radice lanaria, dia struthiu dicitur, strumas discutiens.

Argenti spumæ, radicis lanariæ, aristolochiæ singulorum triens, galbani, squamæ æris, aloes, singulæ unc. mannæ thuris sextans, stillæ ammoniacæ selibra, resinæ è picea unc. sex, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorū læuigationē.

Smilion ad abscessus.

Olei ueteris sesquilibra, argenti spumæ, nitri rubri, salis ammoniaci, lixiuij è ficu cui calx sit admista: aprotostactos dicitur, resinæ, singulorum libra, galbani, guttæ ammoniaci, singulorum unc. tres, atramenti sutorij unc. quatuor, ceræ unc. sex, æruginis, opopanacis, singulorum uncia, aceti quod satis est: argenti spuma & ærugo in oleo coquantur dum manus non inquinant, deinde reliqua admiscuntur.

Emplastrū dia scorodon, hoc est, ex alijs ad rumpendum.

Ceræ uncia sex, resinæ colophonæ unc. quatuor, resinæ pityinæ

pityinæ hoc est ex picea arbore unc. tres, seui taurini unc. quatuor, nitri rufi fescunica, allia pura uiginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta proiciuntur, reliqua miscentur.

Emplastrum dia apyrani ad discutiendum.

A Dipis anserini, & fabanorum, singulorum uncia tres, olei ueteris uncia uigintifex, herbe pulicaris uncia tres, urticae feminis radicis apyrani uiridis, singulorum libra, cerae albæ uncia decem, emplastri quod dia chylon inscribitur uncia duæ, resinae terebenthinæ uncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, semenque urticae per noctem & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluuntur.

Emplastrum pyrine, & ad duritias & scirrhus.

A Lthææ, palmularum, aut dactylorum qui nicolai dicuntur, singulorum libræ duæ, fœnugræci, lini seminis, singulorū sextarii dimidium, chamæmeli, meliloti, palmularum corticis singulorū unc. sex, uini aminæi sextarii dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinae colophonix, singulorum libræ duæ, cerae resinae, terebinthinæ, singulorum libra, olei ueteris libræ quinque, aquæ libræ duæ, panis aridi contusi cribratiq; lib. quinque: herbae in uino decoctæ exprimuntur, succo, panis immadescit, sequent die læuigatur, argenti spuma, cerusaq; in aqua, deinde oleo iniecto incoquantur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sublatis ab igne panis inditur, ualideque rudicula agitur. adiunguntur etiā æruginis rasæ, & salis floris, singulorū unc. sex, iridis, aristolochiæ, singulorum unc. sex, terebinthinæ resinae libra.

Pelarion ex scoria argenti, dia elcysmatos dicitur, ad similia abrasis.

C Eræ, seui taurini, singulorum unc. quinque, scorix argenti unc. sex, resinae colophonix unc. quatuor, picis, olei, singulorum unc. duæ, scoria argenti arida læuigatur uino uel succo fœnugræci: quod si scoria desideretur, plumbagine utimur.

Emplastrum ex althæa, podagricis alijsque duritijs accommodatum.

Succi fœnugræci, & lini seminis, & althææ, singulorū trepondo, olei dupondo: incoctis usq; dum succus absumatur, colophonix

phonix resinæ pondo adiiçitur, item terebenthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadrans: ubi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pondo iniiçitur, galbani triens: utraq; simul confusa soluraque rudicula agitantur.

Cissinum ad neruorum uulnera, punctus, & maximè diuturna.

Squamæ rubræ unc. quatuor & semissis, thuris uncia, misyos sescuncia, chalcitidis drach. quatuor, aceti sex: læuigantur æstiuo sole usq; dum acetū fuerit consumptum, deinde solutis ceræ uncias octo, olei octodecim misceto. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in uicem galbani, resinæ terebenthinæ unc. duæ, induntur.

Melanchlorum ad eadem, & cruentis aptum.

Malicii, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & liquidi, (alii uice liquidi rotundum ponunt) iridis, misyos, attramenti sutorii, chalcitidis, eruginis rasæ, cadmiæ, aloet, myrrhæ, thuris, panacis radicis, argenti spumæ, cerusæ, pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum acato diebus pluribus, fingunturq; pastilli. Emplastrum uerò fit hunc in modum: medicamento uuc. duæ, ceræ unc. sex, olei unc. octo, in neruorum uulneribus ueteris, in aliis communis, remuerantur.

Emplastrum ex senetione, quod dia erigerontos dicitur.

Senetionis succi lib. duæ, olei ueteris sesquilibra, cyprini olei unc. quatuor, axungie ueteris libra, resinæ terebenthinæ uncia, galbani semuncia, resinæ piceæ sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorum uncia, squamæ æris scrupula octo, ceræ unc. decem, apochymatis unc. quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino læuigantur, galbanum cū cera contunditur & cacabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, læue incretum ponderato inspergitoq; qd si in læuorē deteri nequeat, portione olei solutum excipiat, atq; tūc omnia misceantur.

Emplastrum Mnasei discutiens.

Ceræ, axungie porcine, singulorum libra, resinæ colophonix unc. sex, argenti spumæ lib. duæ: uini generosi lib. quatuor adiiçuntur.

Ariobarzanion,

Ariobarzation, ad eosdem affectus.

ARgenti spumæ fescuncia, cerusæ libra quincunx, aquæ marinæ unc. uiginti quinque, olei ueteris sesquilibra, buccinorum concrematorum unc. septem & semis, ceræ rufæ unc. nouem, resinæ terebentinæ unc. sex, thuris unc. tres, scrupulalia & dimidium.

Emplastrum ex dracunculo.

CEræ, resinæ colophonix, picis aridæ, axungix, resinæ, singulorum lib. quatuor, guttæ ammoniacæ lib. duæ, dracunculi radices lib. quinque; radix arida læuis aliis solutis inspergitur.

Psitacium.

CEræ, resinæ colophonix, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, uel succi eorum, æqualis modus. In Alexandria autem ceræ lib. duæ semis, alterci lib. duæ, axungix lib. duæ semis, colophonix resinæ lib. decem miscentur, magisq; discutit medicamentum.

Myrsinatum.

ARgēti spumæ, cerusæ, sandicis, plūbi cōbusti & eloti, singulæ nnc: ceræ unc. sex, olei myrtei libra, uini quod satis est.

Emplastrum ex cerusa, uel ouis.

CEræ tractæ unc. sex, rosacei sesquilibra, argenti spumæ unc. duæ; cerusæ tantundem, amyli unc. tres, ouorum quinque aquata.

Emplastrum, quod liquidum sit parygrum uocatum, Oribasii.

ARgentæ spumæ fescuncia, cerusæ tantundem, ceræ triēs, pinguis suilli septunx, resinæ colophonix dodrans, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirificè facit ad calcanei rimas, in ulceribus aut (inquit) uitant, nā ea tetri odoris reddit.

Emplastrum dia Cadmias, cicatricem inducent.

Chalcitidis ustæ unc. duæ, cadmiæ, mannæ thuris, singulorum uncia, ceræ, resinæ colophonix, olei myrtei, singulorum libra, uini quod satis est.

Palmulatum, phœnicine dicitur.

AXungix ueteris lib. duæ, olei ueteris lib. tres, argenti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ unc. sex: primum chalcitis cum oleo in pila cōmodiore læuigantur, uel in sole: ubi for
dium

dium spissitudo facta fuerit, etiam spuma argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: postquam probe in polliuem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum radícula agitans.

Emplastrum ex Anchusa, ambustis efficax.

Ceræ albæ unc. nouem, rosacei unc. octodecim: his liquatis porphyridos anchusæ radicis siccæ læuissimæ uncias quatuor inspergito. ALIVD. Anchusæ radicis uiridis, marrubii, gūmi, singulorum unc. tres, decoctæ in olei uncis nouem proiciuntur, oleo ceræ albæ unc. quindecim superiniiciuntur, omniaque soluantur.

Emplastrum ex Pompholyge, pompholygeron appellatū.

Pompholygis unc. duæ, argenti spumæ unc. tres, læuigantur cum lini seminis succo, adiiciuntur ipsis liquatæ refrigeratæque ceræ unc. sex, adipis anserini uel gallinacei unc. duæ, chamæmelini unc. sex.

Phylocotiche, dolorem leniens, ad sedem utilis.

Thuris unc. septemdecim, myrrhæ unc. septem, opii drach. quatuor, aluminis scissilis drach. quatuor, aluminis scissilis drach. duæ, butyri drach. quatuor, ouorum tenuium lucea quatuor, cadmiæ crematæ & elotæ drach. quatuor, pompholygis drach. sex, ceræ tyrrhenicæ drach. octo, adipis anserini drach. sedecim, medullæ ceruinæ drach. undecim, plumbi cremati eloti; drach. nouem, lapidis hæmatitis drach. hyssopi liquidi drach. quatuor: arida læuigantur cum uino Italico quæ liquari possunt, admiscuntur.

Emplastrum Amithaonis, ad articulos recenti cicatrice contractos, conuulsoque, est etiam ad extrahendum efficax.

Ammoniaci, ceræ, bdellii, singulorum drach. octo, resinæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum drach. uiginti:

Emplastrum Aristophanium emolliens.

Picis lib. quatuor, apochymatis lib. duæ, ceræ libra, opopanaxaeis uncia, aceti hemina.

Emplastrum ex plumbagine ad calidas affectiones.

Plumbaginis unc. quatuor, spumæ argenti unc. duæ, cerusæ tantundem,

tantundē, ceræ unc. octo, myrtei lib. duæ, uino læuigātur arida.

Coracon ex oxymelite, ad naturalium uitia & nomas accommodatum.

GAllæ unc. duæ, squamæ fescuncia, chalcitidis, thuris, singulorum uncia: teruntur aceto diebus cōpluscis, deinde mellis unc. quinque; miscentur, ubi uerò seorsim ceratum feceris, ex myrtei uel rosacei uncis duabus, seu taurini uncis octo, ceræ uncis quatuor: resinæ terebenthinæ uncia, mixta simul læuigato & utitor, quemadmodum medicamēto quod charta constat, tum ex penicillo, tum ex linamento.

Emplastrum ex oxeleo.

ARgenti spumæ pars una, olei, aceti, singulorū partes duæ, nonnulli treis ponunt.

Emplastrum ex achathe, discutiens emolliensque.

LApidis achatis semiusti fescuncia, ceræ unc. quinque, resinæ frictæ unc. tres, olei uncia.

Isis, cruentis, accommodata, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum.

Squamæ æris, æris combusti, aristolochiæ rotundæ singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drach. sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ singulorum drach. octo, myrrhæ, aloes galbani, singulorum drach. duodecim, dracunculi radicis succi drach. octo, ceræ libra, resinæ colophonix lib. duæ, olei ueteris unc. tres, aceti quod satis est.

Athena, ad ulcera sordida, impacta, neruorum uulnera.

MAlicorii, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & longæ, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ squamæ æris, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloes, myrrhæ, propolis, galbani, singulorum uncia, ceræ drach. ducentæ, picis tantundē, resinæ colophonix drach. centum, olei unc. sex, aceti quod satis est.

Emplastrum dia dictamnu, glutinans, ad canum morsus, & omnigena ulcera.

ARgenti spumæ pondo duo, squamæ æris uncias sex, æris cremati uncias octo, aloes uncias octo, galbani uncias duodecim, olei ueteris sextarii duo, diphrygis unc. tres, gentianæ fescuncia,

fescuncia, aristolochiæ, æruginis rasæ, singulorum unc. duæ & semis, dictamni tantundem, colophonæ pondo, mannæ thuris unc. tres, guttæ ammoniaci unc. sex, propolis unc. duæ, ceræ unc. sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrassescat, nec digitos inquinet, deinde lebe de posito æruginem & squamam iniicies, rursus incoques, dum manum non inficiant, iterumq; cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum incretum adicies mouens, donec ferue re definant, mox in ignem repones, ac ubi modicè inferbue rint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques usq; dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discocta ut digitos non coinquinet, propolin immittes, his abundè refrigeratis, mox aloen, mannæ thuris, dictamnium, aristolochiam, gentianā, singula læuissima insperges.

Barbara, emplastrum quod cruentis protinus uulneribus inijcitur, & fracturarum callos firmat.

Bituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, singulorum libra terebentinæ unc. duæ, argenti spumæ, uncia, cerusæ fescuncia, mannæ thuris unc. duæ, opopanacis unc. duæ, zingiberis unc. duæ olei unc. tres, aceti quantum sufficit.

Emplastrum ex salicibus, dia iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentis efficax: thoracis impositum.

Misyos, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum unc. sex, ceræ lib. duæ, resinæ piceæ lib. duæ, picis tantundem, malicorii unc. sex, bituminis, lib. duæ, salicis foliorum totidem, olei rosacei unc. quatuor, atramenti sutorii unc. sex, aceti quod satis est. sunt qui terebentinæ uncias nouem addant.

Emplastrum Nicolai ad recentia uulnera, & sinus glutinandos aptum.

Squamæ æris unc. quatuor, æruginis rasæ fescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum uncia, atramenti sutorii uncia, sulfuris uiui uncia, gallæ omphacitidis unc. quatuor, salis ammoniaci uncia, misyos uncia, origani unc. chamæleontis uncia, cadmiæ botrytidis uncia, ueratri albi uncia, peucedani

peucedani unc. tres, apii seminis unc. duæ, symphyti radicis fescuncia, cerusæ fescuncia mandragoræ succi semuncia, chalcitidis fescuncia, terræ samiae, quæ alter dicitur uncia, thuris masculi uncia, aloes uncia, bdellii unc. duæ, opii thebani tantundem, zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammoniacæ uncia, fœnugræci unc. sex, perdicii herbæ succi unc. sex, ceræ flauæ unc. tres, resinæ colophonæ lib. duæ, resinæ pityinæ hoc est è picea libra polentæ tantundem, mastiches unc. sex, picis nigræ lib. duæ, olei ueteris libra styracis unc. opopanacis fescuncia, aceti quod satis est.

*Icesios ad strumas, abscessus, lienem, articulos,
& coxendicum dolores.*

ARgenti spumæ denarii ceneum uiginti, olei ueteris sextarii duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarius, piceæ corticis denarii octo, chamæleontis radicis, euphorbii, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, heleni, pyrethri, singulorum denarii sedecim, ceræ lib. tres.

Emplastrum Neronis, ad ictus, omnemque particularum carnosarum dolorem.

Olei ueteris sesquilibra, argenteæ spumæ libra, ceræ resinæ piceæ, singulorum unc. septem & semissis, guttæ ammoniaci unc. quatuor, cerusæ tantundem, galbani, mannæ thuris, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

Oxera, multiplici usus.

Picis aridæ lib. duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ uncia, resinæ terebinthinæ selibra, galbani unc. duæ, mannæ thuris uncia duæ, aceti sesquiseptarius.

Aceratos, hoc est ceræ expers, emplastrum Galeni, glutinat, concoquit, ulcera ad suppurationem perducit, ex ricinino aut ueteri oleo, medicaminis in linteolos illiti modo, solutum.

ARgenti spumæ trepondo, olei ricinini, aut ueteris pondo quatuor, aceti quàm acerrimi dupondo, æris squamæ nigræ chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spuma cū oleo incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo deinde metallica compluribus diebus ex aceto læuigata adiciuntur.

Emplastrum

Emplastrum ex metallicis .

Chalcitidis uncia , misyos unc. duæ, squamæ æris unc. tres, thuris tantundem, colophonix unc. duæ, galbani sescuncia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

Armenia , fracturis accommodata .

Chalcitidis unc. quatuor, squamæ æris un. duæ semis, æris cremati uncia, thuris unc. duæ, olei lib. aceti rātundē: coquuntur metallica in oxelæo, dū manū nō inquinēt, inde thus adicitur.

Melæne Serapionis .

Spumæ argenti libra, ceræ unc. septem, guttæ ammoniaci unc. tria & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii novem, resinæ colophonix unc. septem, myrrhæ drach. olei sesqui hemina: argenti spuma cum oleo incoquitur quousq; digiti intincti non inquinentur, deinde adiciuntur reliqua.

Anicetos , ab insuperabili vi appollatum emplastrum , glutinat, discutit, squamas separat, & ad articulos recenti cicatrice contractos valet .

Baccarū lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū drach. sexaginta, æris cōbusti drach. uiginti, nitri, salis, ammoniaci, singulorū drach. uiginti, pyrethri, herbæ pediculariæ, seminis roris marini, grani gnidii, sinapis, columbarū stercoris, aristolochiæ, cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ seminis, singulorū drach. octo, aceti hemina duodecim: læuigātur sub æstu caniculæ, quousq; acetū cōsumatur, deinde decocti caricarū crassissimi unc. novē adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccantq; ubi utendum est, pastillorum ipsorum unc. duæ læuigatæ aceto miscentur, resinæ unc. tres, ceræ tyrrhenicæ unc. duæ, olei tantundem.

Emplastrum ex lolio, dia arcu dicitur.

Picis lib. duæ, resinæ piceæ unc. novem, ceræ tyrrhenicæ unc. quinque, olei uncia tres, bituminis increti unc. duæ, lolii farinæ sextarius, aceti quantum sufficit.

Emplastrum ex liquore sycamino .

Argenti spumæ, picis aridæ, seu taurini, singulorum unc. octo, terebinthinæ unc. tres, ceræ unc. quinque, æruginis rasæ, opopanacis, galbani, singulorum uncia, olei ricinini, aut sussi, aut admodum ueteris hemina, picis liquidæ tantundem, liquoris sycamini cuius fructus sycomora dicuntur, hemina.

Emplastrum

Emplastrum à duplici colore dichromon appellatum.

Aeris combusti, aluminis scissilia guttæ ammoniacæ, singulorum uncia, ceræ libra, resinæ colophonix libra, seui suilli libra, aceti, quod satis est.

Inde conglutinans ad ulcera quæ serpendo depascunt, & sanguinis sputum.

Ceræ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum libra, cerulæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriæ, aluminis scissilis & rotundi, gallæ omphacitidis, singulorum unc. sex, aceti quod satis est.

Emplastrum ex cinere aspidum, discutit strumas & podagras.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum drach. trecentæ sexaginta, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammonicæ, aphronitri, seui uitulini, singulorū drach. trecentæ quadraginta, lapidis pyritis, calcis uiuæ, singulorum drach. centum quadraginta, cineris aspidum rotidem, olei ueteris heminæ duæ: refrigerato medicamento cinis inspergitur. fit etiam sine cinere, quod nonnulli eum auersentur, & nihilominus etiam efficit.

Leæna, siccatur discutiturque.

Suffiminis ammoniaci, plumbaginis, singulorum drach. centum, sinapis drach. octo, chamæleontis radices drach. sedecim, resinæ colophonix drach. centum, squamæ æris, lanariæ radices, singulorum drach. quinq;, euphorbii, æruginis, singulorū drach. octo, aristolochiæ drach. sedecim, pyrethri drach. octo, olei ueteris hemina, raphanini quantum sufficit.

Aliter leæna, noxia educit in superficiem, humorisque euacuat.

Atramenti sutori unc. duæ, auripigmenti uncia, ueratri nigri, thoracum cantharidum, singulorum, sesquidrachma, sandarachæ unc. tres, ceræ sesquilibra, resinæ frictæ libra, olei heminæ duæ.

Macedonium.

Ceræ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, lachrimæ thuris, pares portiones: eliquatis, ac sublatis ab igne lachrima thuris inspergitur.

Sphæron

Spherion ad ardores.

Ceruse, argenti spumæ, calcis niue, singulorum unc. tres, ceræ fescuncia, aluminis berenicarij, rosacei, singulorum uncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur, quum usus incidit, olei uncias sex liquato cum duabus ceræ, adiucitoq; medicamento uncia & agitato: refrigeratū ex aqua uncis nouem contundito, ego etiā ternas rosacei uncias addo.

Emplastrum ex ochra, inflammationem arcet, tum sponte, tum in iudicio tortis idoneum.

Ochræ atticæ lib. duæ, cretæ libra, argenti spumæ unc. octo, uino læuigatæ ceræ, resinæ colophonix, picis, resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebenthinæ unc. octo, olei lib. duæ, hunc in modum soluntur: ceræ libra, olei ueteris lib. tres, medicamento libra uino contunduntur.

Emplastrum ex cedria glutinat, discutit, abstergitque.

Ceræ, picis aridæ, singulorum libra, resinæ colophonix unc. octo, cedrini liquoris unc. sex: liquata simul incoquantur, dum digitos non coinquinent.

Aliud emolliens.

Ceræ, picis, singulorum unc. octo, resinæ colophonix drach. uiginti quinque, propoleos drach. septemdecim, cedrini liquoris drach. uiginti.

Emplastrum ex punice. ad cicatricem ducendam.

Myrtei, lib. duæ, ceræ libra, pumicis cremati uinoq; restincti drach. sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drach. sex, eris usti, cimoliæ, singulorum drach. quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.

Emplastrum paula, strumis & bubonibus efficax.
Ceræ, resinæ colophonix, nitri, singulorum libra.

Emplastrum ex nitro ad carbunculos.

Nitri tosti unc. tres, ceræ, olei, resinæ colophonix, singulorū sesquidrachma, liquoris cyrenaici aut medici drach. decem: imponitur in linteolis, solutum.

Emplastrum ex anemone.

Anemone unguibus detractis uncia duæ, ceræ unc. quinque, olei uncie quatuor, resinæ uncie quinque & semis,
PAULI AEGIN. R colopho-

colophonix resinæ libræ duæ & semis .

Emplastrum Macherionis uiride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus .

O Popanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, singulorum uncia, resinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum unc. sep tem .

Viride aliud simplex .

R Esinæ lib. tres, ceræ libra, æruginis rasæ selibra, thuris drac. uiginti quinque, aceti quod satis est .

Aliud uiride, ad humida uitia, & carnis excrescentias .

R Esinæ colophonix unciæ sex, æruginis rasæ sescuncia, ceræ unciæ duæ, salis cappadocii uncia, rosacei unciæ duæ, aceti quantum sufficit .

Pegamera ad pleuriticos .

R Vtæ uiridis pondus, butyri sesquipondo, resinæ terebinthinæ pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantundem, opopanacis quadrans, galbani tantundem, anethi pondo .

Emplastrum dia stactes, hoc est, ex lixiuio, coxendicum doloribus, articularijs, & tumoribus

œdema referentibus utile i

C Eræ, olei ueteris, lixiui quod habet calcem admistam, singulorum libra, resinæ frictæ, nitri alexandrini, nitri albi, resinæ terebinthinæ, singulorum unc. sex: utrumque nitrum lixiuio teritur .

Emplastrum è nitro ad abscessus, scyrrhos, & tumores .

O Lei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiui, singulorū lib. resinæ, terebinthinæ unc. sex, galbani, propolis, guttæ ammoniaci, singulorū unc. præparatur quemadmodū superius .

Emplastrum ex sale, dia halon dicitur .

C Eræ unciæ quatuor, olei libra, salis communis unciæ quatuor, aphronitri tantundem, cerusæ unc. octo, aceti unc. duæ, ad arida conterenda. **ALITER.** Salis communis, nitri, singulorum unc. quatuor, ceræ, olei ueteris, singulorum unciæ sex, aquæ marinæ quod satis est .

Emplastrum dia pternes, ex perna, topophos soluit .

P Eræ suillæ ueteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei ueteris uaccini

uaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ est nauiis ratura, singulorum libra, medullæ ceruinæ uncia octo, hyssopi cerati unc tres, cyprini olei unc. sex, uini Aegyptii quod satis est.

Emplastrum dia cinnabareos, hoc est, ex cinnabari adtophos aliosque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes.

Argenti spumæ libra, olei ueteris sextarius, squamæ eris uncia, æris usti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis uiui uncia, lapidis phrygij drach. sex, lapidis pyritidis, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singulorum uncia, diphrygis unc. duæ, aloes fescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis uncia, propolis libra scrupula uintiocto, ceræ unc. septendecim, lapidis perdiciatis uncia, (in alio perdiciati habet) betonicæ uncia scrupula octo, gentianæ uncia, aristolochiæ longæ & rotundæ drach. quatuor, chamæleontis nigri uncia, dictamni scrupula quadragintaduobus, resinæ aridæ libra, seui struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duobus, donec totum absumatur.

Emplastrum ex auellanis, dia leptocaryon dicitur, ad articulorum tophos probatum.

Lixiuii quod calcem habet adiectam unc. sex, auellandarum partis interioris unc. duæ, aphronitri unc. sex, olei ueteris libra, saponis gallici unc. quatuor, mellis unc. octo, ouorum sex aquata, ceræ unc. decem, resinæ terebinthinæ unc. duæ: læuigantur ex lixiuio.

Dia turpenes ceratum ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.

Qvinto Martii mensis, die, olei cōmunis sextarios, duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoque lignis e uite: ubi inferbuerit, turpenæ marini piscis libram adiecto, asphalacis animantis, quod nonnulli madamudam uocāt, sanguinis uncias quatuor, incoquitoque dum carnes piscis dissoluantur aut torrescant, deinde exemptis illis, olei & ceræ momentum adiecto in spissitudinem, ut mollissimum fiat ceratū, quod lindeolo illitum impones.

R 2 Emplastrum

Emplastrum ex urina muli, podagricis utile.

VRinae muli sextarii quatuor, argenti spumae lib. duae, olei ueteris mystrum, trita diu omnia ut strigmenti spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquinent.

Emplastrum ex lapidis asii flore philagrij ad scyrrhos.

PEucedani radice, asij lapidis floris, si non adsit, salis, guttae ammoniacae, lanarum succidarum crematarum, singulorum uncia, aristolochiae rotundae, pumicis, canini stercoreis, aërginis rasae, squamæ æris, misyos, singulorum scrupula octodecim, castorij tantundem, myrrhae unc. tres, acetum quàm acerri mi tantundem, ceræ unc. duodecim, & semis, resinae e picea, picis brutiae, singulorum unc. octodecim, semis scrupula sex, olei ueteris quod sufficit.

Ex eodem Galeni.

Ceræ, resinae terebenthinae, singulorum libra, lapidis asij, mannae thuris, singulorum tres unc. cyprini unc. duae, aquae lixiuiae quantum satis est.

Emplastrum ex salis flore, articularijs in declinatione accommodatum.

Resinae terebenthinae, resinae frictae, resinae e picea, ceræ, singulorum libra, picis aridae, aluminis scitilis, salis floris, singulorum selibra: coquantur in lebece.

Emplastrum quod nutriendæ ulcerum carni est.

Rosacei, resinae terebenthinae, mellis, singulorum unc. duae, cerulae, butyri, singulorum uncia, alij etiam thuris unciam addunt.

Emplastrum Italicum ad purgandum sordida, inducendumque carnem.

ERinaei (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem oleo excoctum proiicito, ceræ rufae quantum satis est. in oleo liquefacito, in linamenta illito utitor.

Entaticon, quasi dicas intensorium.

Satyrii, pudendi ceruini, scinisci caudae, singulorum drach. duae, ærucæ seminis, pyrethri, seminis rorismarini, ceræ, singulorum drach. quatuor, resinae terebenthinae drachma, oua passerum troglodytarum tria, stelliones transmarini tres, olei laurini uel irini quod satis est: macerantur uini in aceto stelliones ad dies

ad dies triginta, uase cui insunt in fimo defosso.

Cbryse, cruentis uulneribus accommodata.

T Huris, aluminis scissilis singuli sextantes, colophonix resinæ libra, olei quadrans auripigmenti sextans, aceti cum oleo mixti, quod satis est.

Catagmatice quod est fracturis idoneum medicamentum, Oribasii.

P Icis brutiæ libra, unc. quatuor, argenti spumæ tantundem, thuris unc. octo, resinæ terebinthinæ unc. quinque, seui taurini libra, unc. quatuor, galbani, opopanacis, singulorum uncia, ceræ unc. quatuor, olei ueteris libra, aceti unc. quinque.

Catagmatice ad fracturas cum uulnere citraque id factas, ex commentarijs Heracleti.

P Icis aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ thuris minæ dimidium, seui uiculinæ mina, ceræ tyrrhenicæ uigintisex, opopanacis unc. octo, æruginis rasæ, æris cyprii, singulorum minæ quinque & decima eius portio, resinæ terebinthinæ sesquimina & quinta portio, æris uncia, recinini, aut olei ueteris hemina, aceti hemina semissis.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

S Ertulæ campanæ nnc. quatuor, cardamomi unc. duæ, lanarū bene sordidarum unc. sex: macerata in uini duobus sexrariis ad triduum incoquito, dum paululū fuerit reliquum. his ablatis miscentur uino olei unc. tres, coquanturq; dum exiguum superfit, atq; uino etiam tunc adiciuntur resinæ colophonix unc. decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli uerò & ceræ dextrantem miscent, hyssopi herbæ unciam, aliisq; incoquant: alii lanas uino eluunt: ubi deficcarint, uinū cum sordibus lanarum addunt, quas pinon etiam appellant quum usus incidit, treis ex eo uncias mittunt, tum reliqua ut comprehensum est.

De Malagmatis & epithematis. Cap. XVIII.

I Nter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione conflantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut perfrictionem fluxionemve expertis: alia articulis quibus humores sint impacti uel neruis refrigeratis, uel etiam aliis particulis scirrho obsessis

R 3 congruunt.

cōgruunt de his igitur tum in capite de emplastris tractatū est tum ubi ad acopa uentum erit differetur. Porro inter malagmata mediis corporis regionibus accommodata,) epithemata propriè nuncupantur) quæ quidem stomacho, & iocinori ad mouentur, qualiacunq; illa fuerint roborantem ex astringentibus uim postulant. Sine his etenim uitæ aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarum partium alimenti, sint officinæ. Quamobrè eiusmodi medicamenta ex aromatis potissimum conficiuntur. Stomacho igitur iniici debent, si non concoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloe, absinthio, sampsocho, nardo, & mastiche. Iecori autem ex myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & chamæmelino. At lie ni applicantur, quæ constant calce uiua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine, ammoniaco, & aceto: iis autem qui alui fluore laborant, ex cœnanthe, alumine, melino, & aliis astringentibus præparata. atq; hæc etiam per abusum communiter malagmata nominant, & si diuersam à molliendo uim repræsentet. Si uerò ardor uiscera urgeat, in febris ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut herbæ seminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, casamum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur, profunt astringentia siccantiaque, ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

Malagma ex fertula campana, dia meliloton dicitur.

CRoci, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myrrhæ, singulorum unc. duæ, fertulæ campanæ libra, stillæ ammoniacæ tantundem, ceræ lib. tres, resinæ terebinthinæ libra, olei cyprini lib. tres, gleucini lib. duæ, bdellii unc. sex, nonnulli etiam cyphi uncias duas addunt, uini quod satis est.

Polyarchion ex commentario Galeni de compositione medicamentorum secundum locos.

CEræ, resinæ terebinthinæ, bdellii suffiminis ammoniaci, cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, fertulæ campanæ, amomi, nardi Indice, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorum drach. uiginti quinque, olei cyprini hemina, uini

uini Italici quod satis est: præparato ac utitor, interim mero, interim cerato quod ex cyprino fit, soluto.

Aliter polyarchion.

XYlobalsami, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, masticæ, styracis, bdellii, amomi, phylli, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, guttæ ammoniacæ fescuncia, resinæ frictæ tres unc. resinæ terebinthinæ libra medullæ ceruinæ uncia duæ, ceræ lib. duæ, opobalsami unc. sex, uini uncia octo.

Philagrianum.

CRoci fescuncia, aloes, ammoniaci thymiamatis, bdellii, styracis, singulæ unc. adipis anserini sextans, hyssopi medicamenti triens, palmularum sextans, ceræ libra, nardi selibra, melini unc. sex, uini quod sufficit ad sicca læuiganda: per triduum macerantur mouenturque rudicula ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus, uino. Nonnulli cum croco etiam alias quinque myrrhæ uncias adiiciunt: illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni uero specierum facie in pastillos coacta siccataque id habent quod crocomagma, dicitur.

Mendesium.

Dictum est Mendesium quod in Aegypto reperiatur, ubi & Mendes, hoc est, caper colitur. Recipit autem olei balani libram, alias sextarios decem, myrrhæ, cassiæ fistulæ, singulorum uncias treis, resinæ terebinthinæ libram, in alio, sextarios decem, cinnamomi uncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitatur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atque sic reconditur.

Marciatum.

Masticæ, ceræ, styracis, singulorum unc. tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, olei omphacini, singulorum unc. tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ uncia.

Iniectio prima dia omphacos.

Aspalathi, rudicula palmarum, fertulæ campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum uncia tres, olei omphacini

R 4 lib.

lib: decem, uuæ immaturæ succi tantundem .

Iniectio secunda, ex caryophyllo .

Ammoniaci, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, casami, singulorum nñc. tres, in alio etiam habetur arnabo unc. tres uini quod sufficit.

Iniectio tertia .

Thuris, guttæ ammoniaci, styracis, bdellii, myrrhæ, mastiches, singulorū unc. tres, uini quod satis est, ceræ albæ unc. quinque, opobalsami unc. sex, nonnulli uncias octo . Primæ iniectionis medicamenta, pridie in uuæ acerbæ succo oleoque macerantur, secundæ seorsim in uino aminæo aut alio ueteri, ac odorato, mouenturq; quotidie rudicula palmea : tertiæ ad triduum, post quod in cacabo nitente primum in ectonis primæ medicamenta incoquantur, quousq; paulillum succi uuæ acerbæ relictum fuerit : mox secundæ iniectionis species cum uino immittuntur, rectius aurem fiet si prius aliis exemptis, puro deinde oleo ipsæ adiciantur, coquanturq; donec paululum uini super sit, ne aduratur oleum: sublata ab igne eximito, superque adiecito rursus oleo puro tertiæ iniectionis medicamenta, prius ex uino in pila soluta præter styracem quemadmodum prædixi, hic enim cum aliis inditus promptè soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi uideantur: sublata ab igne refrigerari finito, insequentē die exceptis diligenter ex oleo calfactisq; abundè super ignem ceram adiecito, inde sublata rudicula agitato, ubi refrixerinto, pobalsamum admisceto, & uitreis uasis reponito.

Glencinum, iniectio prima .

Olei sextarii decē, musti aminæi sextarii sex, aspalathi unc. quatuor, palmæ fructus operimenti quod spathe dicitur unc. sex, iunci rotundi floris tantundem, sertulæ campanæ unc. quatuor, rosarum uncia, myrrhæ unc. tres, foliorum lauri unc. duæ, arboris thuris uncia sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ unc. sex, aristolochiæ longæ unc. tres, iridis tantundem: hæc macerantur in musto.

Altera iniectio .

Nardi gallicæ unc. quatuor, casami, qui est balsami fructus unc. duæ, cyperi, cassiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum unc. tres, calami aromatici, caryophylli, phylli,

phylli, singulorum uncia, cardamomi unc. quatuor, balsamum uino odorato madescit.

Iniectio tertia.

Mastiches triens, myrrhæ troglodyticæ, bdellij, singuli sextantes, ladani quadrans styracis liquidi, thuris masculi, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantē addunt, præparatur quemadmodum medicamentum ex uua acerba, nisi quod ceram non recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum iniectionum macerari.

Nardus cizicine, iniectionis prima.

Olei primi meriti sextarij decem, aspalathi, cypiarum inulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorum unc. sex, sampsuchi unc. quatuor, herbæ sabine unc. duæ, nonnulli & calami odorati uncias duas immittunt: hæc in uini odorati sextarijs quaternis commadescunt.

Alter a iniectionis.

Cassia, casami, arnabo, singulorum unc. duæ, spicæ nardi unc. tres, caryophylli uncia, costi, amomi, singulorum unc. duæ nonnulli etiam nardi gallicæ uncias duas addunt, atq; hæc in uino macerantur.

Tertia iniectionis.

Myrhæ troglodyticæ, aloes, thuris, singulorum unc. duæ, styracis unc. tres, mastiches unc. quatuor, opobalsami unc. sex, quidam & croci uino læuigati unciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

Decamyron.

Spice nardi, phylli, euphorbij, piperis, costi, adarces, singulorum uncia, mastiches sescuncia, opobalsami unc. sex, nardini libra, ceræ lib. tres.

Pentamyron.

Styracis uncia, mastiches unc. duæ, ceræ albæ unc. tres, opopanacis unc. quatuor, nardini unc. quinque.

Euodes, à grato odore dictum.

Croci, aloes, mastiches, absinthii, styracis, œnant hæ, casami, caryophylli, singulorum unc. tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini unc. sex, palmulæ, duodecim, uini quod satis est.

Baion.

Baion.

Cardamomi, cassiæ, œnanthæ, nardi gallicæ, balauſtiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ sabinae, casami, amomi singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiscrupulū, suffiminis Crinati unc. duæ, thuris, myrrhæ, singulorū uncia, ladanii unc. sex, bdellii, mastiches, aloes, nardi, olei lentiscini, singulorum semuncia, resinæ acernæ quæ zygia dicitur, resinæ picæ, resinæ terebinthinæ, singulorum unc. tres, opobalsami uncia, guttæ ammoniaci scrupula sex, ceræ unc. sex: œnanthino liquida læuigantur, aridaque tontula in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum unum addunt.

Galenium.

CRoci semuncia, aloes uncia, mastiches tres unc. absinthii seminis scrupula octo, œnanthes tantundem, palmulæ maiores tres, ceræ unc. tres olei melini unc. sex.

Erythrium.

STyracis unc. quinque, malorum cotoneorum unc. viginti, masuchæ uel masuphii, croci, singulorum drach. decem, psichæ, cyphios, singulorum drach. quinque, œnanthæ unc. duæ semis, casami, absinthii, singulorum drach. decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi unc. quinque, resinæ colophonæ, gleucini, melini, singulorum unc. decem, rosacei drachmæ decem, propolis unc. quinque, resinæ terebinthinæ unc. decem, mellis cochlearia decem, phylli drach. decem, spicæ nardi tantundem, ceræ unc. septem & semis: uino falerno aut amaro conteruntur.

Malagma Nili ad lienem, omnemque duritiem.

Ceræ pondo, guttæ ammoniaci pondo, olei cyprini pondo, croci semuncia, secundum alios unc. aceti quantū satis est.

Citrinum.

Ceræ resinæ, colophonæ, singulorum libra, suffiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathi octo, læuigantur arida in aceto.

Malagma

Malagma quod ad Cureum autorem refertur.

Picis aridæ libra, ceræ, resinæ piceæ, guttæ ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seui taurini, singulorum lib. duæ farinæ fœnugræci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamæleontis nigri radices siccæ libra.

Malagma ex stercore caprillo Oribasii, ad lienosos, hydropicos, & iecur in duratum.

Cyprini, aut uetustissimi olei lib. tres, ceræ lib. duæ semis, fimi caprarum, baccarum lauri cortice detracto, iridis illyricæ, singulorum sextarii decem, resinæ terebinthinæ libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radices corticis, singulorum unc. tres, cucurbitæ sylvestris carnis unc. duæ, fœnugræci uncia: inrerim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si alius profluat, cucurbita iniici non debet.

Ex fimo caprillo sphongion, hydropicis efficax.

Picis brutiæ lib. duæ semis, nitri libra una, cucurbitæ sylvestris carnis, pyrethri, opopanacis, cocci gnidii, singulorum unc. tres, capparis radices corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterii, squamæ æris, apii seminis, lathyridum, singulorum unc. sex, baccarum lauri sextarii dimidium fœnugræci farinæ semuncia, fellis taurini unc. duæ, olei cyprini sextarii dimidium, ceræ libra, resinæ frictæ lib. tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cyper, cardamomi, singulorum unc. sex.

Ex baccis lauri.

Ceræ, resinæ, picis, baccarum lauri, seui taurini, singulorum libra, nitri, guttæ ammoniacæ singulorum unc. sex, aceti quantum sufficit.

Medicamentum dia spermaton, hoc est, ex seminibus.

Cardamomi, cyperi, herbæ sabinæ, nitri, baccarum lauri, cassiæ, sertulæ campanæ, fœnugræci, nardi gallicæ; apii seminis, sampsuchi, anisi, panacis radices, thuris, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, singulorum unc. tres, mellis, ceræ, nardi, singulorum libra, seui taurini tantundem.

Malagma à fædo odore dysodes dictum, ad pleuriticos.

Resinæ piceæ libra ceræ, rutæ uiridis cyprini, singulorum unc. sex, sulfuris uiui, opopanacis, sagapeni, singulorum drach.

drach. quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

Malagma dia sampsychu.

CEræ pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsuchi, bacarum lauri, foenugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

Malagma apollophanis ad iecorosos.

CEræ drach. octoginta, resinæ terebinthinæ, mannæ thuris, singulorum drach. quadraginta, mortario irini sedimento uncto contunditur.

Copton ad duritiem stomachi & iocinoris.

PRopolis unc. sex, styracis unc. duæ, mastiches uncia, resinæ terebinthinæ semuncia, fecis nardini quantum satis est.

Malagma ex ænanthe.

OEnanthæ, aloes, croci, acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absinthii succi, gallæ, omphacii, rhus syriaci, mannæ thuris, singulorum drachma olei myrtei, ceræ, utriusque libra, palmulæ magnæ quinque, uini quod sufficit.

Antylium.

ALuminis scissilis semuncia, aloes uncia, mastiches scrupulum, ænanthes scrupula, sex, omphacii scrupula octo rosarum siccarum tantundem, rhus syriaci scrupula decem, spinæ Aegyptiæ totidem, balaustiorum scrupula uiginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ unc. quinque, olei melini quod sufficit.

Malagma ex uinaceis, dia gigarton dicitur.

CRoci, sandycis, labruscæ, singulorum uncia, aluminis sicci unc. quatuor, balaustiorum, omphacii, rosarum floris, myrtorum siccorum, singulorum unc. duæ, ceræ albæ libra, olei melini lib. duæ, malorum cotoneornum unc. quatuor, dactyli qui nycolai dicuntur decem, uini aminæi quod satis est, uinaceorum aridorum unc. octo in usu, medicamento unciis tribus ceræ unam misces.

Anethine.

ANethi uiridis unc. sex, sertulæ campanæ unc. duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem excoctorum iuris lib. tres, & olei quod sufficit: ubi uerò consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis lib. duæ adduntur, tritisque priuatim scillæ tostæ interioris unciis duabus & medullæ

læ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

Ambrosia ad febreis arcendas apta.

ARgenti spumæ libra, adipis suilli recentis unc. sex, lini seminis succi tantundem, ceræ albæ uncia nouem, rosacei libra, mellis unc. tres, croci uncia, nonnulli etiam ouorum decem lutea cruda addunt.

De acopis, inunctionibus, dropacibus, & sinapismis. Cap. XIX.

ACopa inde nouem sortiuntur, quod præcipuè ad lassitudinis, quæ copos græcè dicitur, nempe tensuæ ulcerosæ & eius quæ ossa defatigat, sensum cōueniāt, quam aliis quoq; morbis compluribus sint ex usu. † Alia liqui dem ipsorum calefaciendi uim habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, semine rorismarini, & consimilibus constant neruorum uitiiis, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo calore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliūt, durities, scirrhus, & infarctos articulorum sinus discutiunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At emollientibus quæ adarce, semine rorismarini euphorbio, cocco guidio, & id genus aliis componuntur, in diu turnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, quibus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudinem uniuersa acopa inter cerata, & emplastra mediam habere conuenit. Vnguina uero acopis similia, liquidiorē propemodum substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illi nunt: materiam uerò acopis & emplastris confinem. Ceterum usum cataplasmati exhibet, diuturnus affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumitur, quo corpus sinapi reddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, ut affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem uariam non habet, uerum diuturnis potissimum affectibus post deprehensam probatamq; aliorum præsidiorum uim, efficacissimus est, utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore, quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur. Græci heterocraniam uocant, in morbo comitiali, uertiginibus, & insania: pectori autem in suspirio, orthopnoea, hoc est, quū non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi lōga. At in diuturna

diuturna humorum è capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter, in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est praelidum sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omni-que parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictionem expertæ, ut difficulter exalheri possit. At tunc profecisse satis id putato, ubi dolor subsequutus fuerit ualidus & caro liuidior altiorque, euaserit, & postquam ablotum fuerit, mitius pustulæ eruperint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere negotio conuenit, parte quam oblineris sæpius detecta: nam si uel immodicè adurantur ita affecti non persentiscunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatione (cataphora dicitur) & catocho, sinapi inducitur, per initia quidem, cruribus, ubi uerò materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt ut uix ullo modo queant incallescere, iis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua febre laborant, ulcusque habent, tum in cartilaginosis, tum locis excarnibus, uitari debet sinapismus: nam partes carnibus uacuas si obducantur sinapi, uruntur, interim etiam nigrescunt.

† Hæc uerba ita leguntur in nostris codicib. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ δερματικά τὰ δὲ μαλακτικά τὰ δὲ ἀμυκτικά. Orosius tamen legendum putat ἀμυκτικά.

Bromion acopon.

CEræ, resinæ colophonix, singulorum libra, adipis suilli unc. quatuor, butyri unc. sex, althææ, fœnugræci, seminis lini, singulorum lib. duæ, olei libra, galbani unc. duæ & semissis, ex cocto succo cum oleo, quousque magna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & galbano adiiciuntur.

Acopon à uarietate pæcilon dictum.

SVcci althææ, fœnugræci, seminis lini, rutæ, cumini, singulorum lib. duæ, medullæ ceruinæ, olei ueteris, adipis anserini, opobalsami, nardi, singulorum libra, ceræ, colophonix & resinæ, singulorum sesquilibra, euphorbii, resina terebinthinæ, opopanax, singulorum unc. sex, castorii unc. tres, herbarum unde succus exprimitur, singulorum libra iniicietur: coques ut superius

Acopon Azanite.

Adipis suilli lib. duæ, seui taurini, resinæ colophonix, hyssopi medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani unc. tres.

Acopon

Acopon Basilij.

Altheæ, chamæmeli, fertulæ campanæ, lini seminis fœnu-
græci, singulorum fescuncia, amomi unc. tres, hæc maceran-
tur in uini Ascalonii aut Cilicii sextariis octo, per triduum,
coquunturq; ad melleam spissitudinem, deinde succi lib. quin-
que cum olei ueteris libris quatuor & semisse decoquuntur,
quousque modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri
unc. sex, resinæ terebinthinæ unc. quatuor adipis anserini unc.
quindecim, medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ
unc. quinque, ceræ albæ lib. tres.

Lysiponium.

Piperis, castorii, styracis, mastiches, aloes, inulæ campanæ, iri-
dis, singulorum unc. quatuor, euphorbii, costi, guttæ ammo-
niaci, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, cassiæ fistulæ, semen ro-
rismarini, singulorum nnc. tres, adarcæ, amomi, bdellii, xylo-
balsami, singulorum unc. duæ, malabathri, spicæ nardi, pyre-
thri, croci, singulorum uncia, opobalsami, libra, nardini, cypri-
ni, gleucini, singulorum lib. duæ, ceræ libra.

*Acopon à fædo odore dysodes appellatum, ex opere de
compositione medicamentorum secundum genera.*

Ceræ, resinæ, terebinthinæ, singulorum drach. uiginti qua-
tuor, galbani, suffiminis ammoniaci singulorum drach.
sex, olei ueteris heminæ duæ, medullæ ceruinæ drach. octo: uti-
tor mero & diluto.

Aliud dysodes.

Resinæ terebinthinæ drach. sedecim, ceræ drach. uiginti o-
cto, œsyp, mellis, singulorum drach. sex, medullæ ceruinæ
unc. sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphronitri, baccarum lau-
ri, singulorum unc. sex, olei ueteris sextarius, uini cyathi duo,
quidam etiam castorii drachmas treis admiscunt.

*Barbaricum, dia euphorbii, ad coxendicum dolo-
res, & alia pleraque.*

Opopanacis uncia, ceræ tyrrhenicæ libra, resinæ terebin-
thino libræ duæ & semis, galbani uncia, stillæ ammoniacæ
unc. duæ, euphorbii, castorii, piperis albi, singulorum unc. duæ,
medullæ ceruinæ unc. quatuor, œsypi tantundem, lemnæ-
stidis (est autem adarcæ) semuncia, olei styracini, laurini, irini,
amaricini,

amaricini, singulorum unc. sex, olei ueteris lib. duæ, hedicroi uncia sex.

Acopon cui nomen est pycis.

Resina colophonice sesquilibra, resina terebinthina uncia, octo, gutta ammoniaci unc. tres, thuris unc. nouem, olei ueteris lib. duæ, succi lini seminis libra, lactis uaccini tantundem, adipis anserini unc. sex, butyri unc. octo, ouorum uiginti quatuor albumina, præparatum buxæ uase reponitur.

Acopon ex abiete Galeni.

Abietis seminis cocti modius Italicus, hoc est, sextarii duodecim, olei lib. quindecim, ceræ lib. quatuor, resina strobilina aut terebinthina unc. quatuor. Contusum abietis semen, oleo iniicitur. Vbi quadraginta diebus in eo siueris, expressum proiicito, mixtis reliquis utitor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorum perfrictiones. At si necessitas urgeat, coquere oportet semen abietis cum oleo mixtum ne nimium aduratur, & aquæ sexrariis quatuor, idque in podagricis & articulariis affectibus.

Aliud ad idem.

Olei hemina uigintiquinque, id est, sextarii duodecim & semis. fructus abietis modius, hoc est, libra semis, resina abiegnæ lib. tres, strobilina uel terebinthina lib. tres, ceræ libra.

Acopon ex nigra populo, dia ægyptos dicitur, ad eadem.

Loco fructus abietis, nigræ populi fructus æqua portio additur, & reliqua similiter illi præparantur.

Vnguentum zosimi ad tremulos celebratum.

Resina piceæ unc. sedecim, ceræ unc. quatuor, olei ueteris libra, opopanax unc. duæ, adarcæ uncia, euphorbii tantundem, nitri unc. quatuor, aphronitri teneri totidem: nitrum, euphorbium, adarcæ cum uino læuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulque in læuorem teritur, seorsim autem quæ liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

Dropax Gallus, Oribasii.

Resina colophonice quæ thus redolet, piceæ & lignosæ dictæ quæ sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridæ, ceræ, singulorum lib. quatuor, resina frictæ unc. quindecim, pi

cis

sis brutiæ lib. duæ, nitri libra, bituminis, galbani, adarcæ, pyrethri, singulorum unc. sex, opopanacis, euphorbii, ueratri albi, piperis, singulorum unc. quatuor, sulfuris uiui unc. tres, castorii, ammoniaci, uuæ passæ syluestris staphis agria dicitur, singulorum unc. duæ, olei sicyonii libra opobalsami, unc. sex.

Aliter simplex.

CEræ pondo, picis siccæ pondo, picis brutiæ pondo, resinæ picæ sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

Quomodo sinapismus fiat.

FIcus siccatæ pridie in aqua tepida macerari debent, die insequenti probè expressæ ualenter læuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumque priuatim conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri, & siquidem uehementem sinapismum uoluerimus inducere, parteis duas sinapis cum una ficuum temperabimus: sin imbecillem, e contrario: si mediocrem, æqualeis. Cæterum sinapi antequàm deteratur, aceto commadescens, ut nonnulli faciunt, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum utile est. Si dolor uehemens ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ aut foenugræci cum rosaceo madefactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum cerusâ utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibetur, ut sæpius partem retegamus, inspiciamusq;. Quum enim adnota non percipiant, sæpe immodicè exusti sunt. Item caprarum finus cum aceto illitus sinapi est efficacior, & præsertim in coxædicū doloribus.

Acopon ex atramento librario, cutis ruborem peculiariter inducens, idque potissimum in ijs, quibus altera capitis pars dolet, ex commentarijs Alexandri.

EVphorbij, atramenti librarij, singulorum drach. quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi, singulorum unc. tres, croci drach. duæ, aceti quod satis est ad hæc probè læuiganda, utque spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superciliorum parte incipiens, adusq; tempora tota, præsertim si æger pilis careat: ubi refrigerata fuerint rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

PAULI AEGIN.

S

Quomodo

*Quomodo diuersa olei & unguentorum genera
conficiuntur. Cap. XX.*

Inunctionum unguentorumq; uel olei generum quæ unguenta repræsentet, alia sunt simplicia, una olei specie iniecta, alia composita ex pluribus conflata. Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, uerbi causa, rosaceû, chamæmelinum, sulinû. Quædam ex fructibus, & seminibus conficiuntur: quædã ex surculis quibusdã nempe rutæ, qui etiã simul cum oleo coquuntur. At cū nullus florum coctione recipiat, insolantur potius. uerû si ualidam odoris gratiã repræsentent, & pluribus diebus constantē, ex insolatu tenuius ipsorum oleû magisq; utile redditur, quemadmodû rosaceû & chamæmelinum. Qui inualidiores sunt faciliusq; diffilari possunt, minus insolatum tolerant, ut quorum uirtus promptē euanescat, utpote lilium & uiola. Ex iis quæ fructibus & seminibus constant nōnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, ueluti melinû, nonnulla contusis uel læuigatis, oleamine ipsorû sequestrato, uel expressis ipsis in cōchulas: uel ex aqua calida, sic ut ipsa discernantur, exempli causa, caryinon, sesaminû, amygdalinum, lentiscinum, laurinû, ricininum, raphaninû, atq; eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissimum solent, illis, oleo incoctis cū uino uel misto, uel aqua, atq; eisdem deinde exemptis. Liquoribus autē quibusdam oleo contemperatis, interim & adipibus uel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinē sortita, simplici sermone unguenta uel inunctiones nominantur, ut gleucinum, nardinû, sicyonium & cyprinû. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, ceram aut resinã aut eiusmodi quippiã recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, amaracinû, atq; his similia. Iam uerò aliqua una uice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiã, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium: aliqua duabus tribusue, & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, spatha, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. Si autē eueniat, cera quoq; & resinis inditis. At balsami liquor neutiquã coquitur, sed post absolutam coctionē unguento mediocriter refrigerato instillatur. imò ex ipsis unguentis sunt quæ nullã coctionem

coctionem recipiant, sed tantū misceantur, quale est mende-
 sium. Nonnulli uerò uiride unguentum reddere cogitantes,
 ubi ab igne sustulerint, in olei sextariū intingunt, æruginis ra-
 sã in exactum detritã læuorẽ sescunciam, immiscentes, quem-
 admodum in cyprino & amaracino. Caterum simplicia qui-
 dem unguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam uel
 eorum ex quibus contusis facta sunt, obtinent, ut oleum uelu-
 ti materiæ rationem obtineat. At quæ uariam magis cõposi-
 tionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata
 est, sed quædã ualide calefaciunt emolliuntq; ut etiam articu-
 lis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum infarctis conue-
 niant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius
 autem est pentamyron, quemadmodum decamyron ualētius
 ut etiam summa rodant: mediocriter autem calida tenuiaq; di-
 co. At uerò modicè calida extenuant leniunt & concoquunt,
 quale est susinum, amaracinum, irinū, crocinum, foliatinum.
 Alia præterquàm quòd calefaciunt, abundè siccant inciduntq;
 ueluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidem insi-
 gniter, sed uires magis confirmant, unde stomacho potissimū
 & uisceribus resolutis competunt, qualia habentur mastichi-
 num, nardinum, & gleucinū. Valētius adhuc corroborat, quod
 ex uua acerba conficitur. Iã nonnullis unguentis ob gratum
 duntaxat odorẽ utuntur, ut foliato, spicato, cõmogeno & quæ
 moschelæa, quasi dicas, ex musco & oleo cõfecta nuncupantur.

Rosacei confecto.

Rosarum rubrarum detractis unguibus marcescentium die
 nocteque una, uncia tres, olei omphacini sextarius, urna
 diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub dio diebus
 quadraginta, atque sic repones non in pauimento, sed assere.
 Aliqui uero uice insolatus in puteum urnam diebus quadra-
 ginta mittunt, ut ex frigiditate odoris gratia conseruatur.
 Alii uero ipsam sub terra defodiunt.

Chamæmolion.

Chamæmeli floris sine albis foliis marcescentis, per diem
 noctemque unam olei sextarius Italicus. uase lintheo sim-
 plici confecto ut perspiret, insolatur, idque diebus, quadragin-
 ta, inde securè hoc percolatum repones.

S 2 Anethinum

Anethinum.

A Nethi uiridis comæ arefactæ uncia, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur, sicci enim anethi comam decoquentes cum oleo in catabo utuntur, & chamæmelino similiter: uerum hæc imbecilliora sunt iis quæ ex uiridibus fiunt & præsertim insolatis.

*Liliaceum alij susinum dicunt, quod in Susis
forsan reperiatur.*

F Olorum alborum liliorum similiter marcescentium unc. duæ in olei sextarium Italicum, coniectæ exactè circumstringuntur, ne euaporent, & per triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisque, aliæ duæ unc. iniiciuntur per triduum subsequens, atque sic reponuntur.

Susinum compositum.

O Lei sextarii tres, calamj odorati lib. quinq; myrrhæ unc. quinque, cardamomi lib. tres, lilij foliorum unguibus ablatis arefactorum libra, cinnamomi unc. tres, croci cilicij unc. quinque: tota confectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, uino ad dies quinq; macerata ter die mouentur, inde oleo modicè incoquantur, deinde cardamomum aqua maceratum triduo mouetur similiterq; rursus cum oleo ad horam unam incoquitur, inde exemptis illis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus, diebus post his quoq; exemptis reliqua liliorum tertia portio immitteretur, iterumque post triduum exemptis proiectisque primis, postremo tertia pars cum croco læuigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomum contusum indetur. Huius in uicem, Arnabo, aut carpesum, aut cassiæ duplicatum, atque reponetur.

Violaceum.

V iolaceum præparant, modò purpurearum, modò crocearum, modo candidarū uiolarū foliis ungue defecto, trium unciarum pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circumstricta exacte, ne perspirent, ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pauca iniiciunt exactè arida.

Melinum.

Melinum.

HOc efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo involutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde unciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atque quadraginta dies insolatis.

Sesaminum.

Sesaminum oleum fit, contusis uel laeuigatis sesamis, expressisque per fiscellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida segregato, uasisque uitreis reposito.

Raphaninum.

Eodem modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat contuso segregatoque.

Ricinium siue cicinum.

Hoc quoque similiter in Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut laeuigato.

Aegirinum.

Verno tempore oleum fit Aegirinum, hoc est, ex nigra populo, quum resina circa semen copiosa existit: etenim grana populi contusa unciis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusque quadraginta insolant, uel horis tribus in lebetes decoquunt, atque sic exempta reponunt.

Amygdalinum.

Conficitur hoc quoque sicut praedictum, amygdalis amaris iisque puris, contusis, aqua modica irroratis separatisque, ut comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala unciis duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquunt.

Amygdalinum, quod & metopion dicitur.

AEgyptii huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem unde galbanum nascitur, metopion appellatur. Haec recipit, olei omphacini sextarios uiginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhe, galbani, singulorum uncias sex, resinae terebinthinae, libras duas, uini odorati ad arida imbueda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: resina & galbanum in laeuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis incoctis adiiciemus, necnon ipsum mel: Mixta uero accuratè omnia

S 3 ab igne

ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

Balaninon.

BAlaninum oleum perinde ut simplex amygdalinum præparatur, ex querneis glandibus.

Caryinum.

Hoc quoq; ut supra dictum ex uetustis nucibus conficitur.

Laurinum.

Prum quidem laurinum simili ratione & lauri fructu confit, mixtum uero hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cum duobus baccarum lauri miscemus: teruntur omnia exprimenturq; . Nonnulli æqualẽ amborum portionem miscent.

Lentiscinum.

Lentiscinum oleum laurini modo ex lentisci semine conficitur, idq; bifariam & per se, & cum oliuis immaturis.

Mastichinum.

Mastichinum simplicissimum quidẽ sit, chiæ mastiches uncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excocta que in cacabo. Nonnulli uero absinthii & styracis, singulorum unciam adiungunt.

Mastichinum magis uarium.

Olei sextarii quinquaginta, inulæ cāpanæ libræ quinq;, xylobalfami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinq;, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthii comæ libræ, uini odorati sextarii quinque, aquæ sextarii decem, arida uino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquuntur, ac mastiche & terebinthina iniicitur: accuratè mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

Sicyonium simplex.

Radix cucumeris syluestris marcida duarum unciarum, pun-dere in olei sextarium Italicum mittitur, atque in lebetes coquitur, sitq; ne sicyonium.

Sicyonium compositum.

Olei sextarii decem, cucumis syluestris radice derafæ pondod, serpylli, fertulæ campanæ singulorum uncia sex, tedarum piceæ pinguium, althææ singulorum uncia quinq;, scolopendriæ

lopendriæ uncia sex, fœnugræci sextarii duo. Fœnugræcum aqua primum die uno prius commadescet, deinde exemptum inditur commemoratis unâ cum oleo, & uini sextariis duobus omnibusque incœctis adiiciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ uncia quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud uas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

Aliud sicyonium efficacius.

E Laterii succi sextarii tres, aristolochiæ rotundæ & longæ, styracis, inulæ cāpanæ, hyssopi, iridis, cucurbitæ syluestris, pulegii, origani, cyperi, thuris arboris, centaurii, foliorum lauri, singulorum uncia duæ, olei sextarii quinque. Mistâ incoquit dum parum succi relictum fuerit.

Cyprinum ex commentarijs Posidonij.

O Lei sextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, sampsuchi, hyssopi, uiticis seminis elelisphaci, singulorum uncia tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in uino macerata coquuntur cū oleo horis sex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus inicitur. Siquidem adsit uiridis cum teneris uirgultis non concisis, sin minus, certè aridus contusus cum aquæ momento coquetur sesquihora. At si uoles ipsum tingere postquā ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ sesquilibram. Posidonius autem acrimoniam æruginis uitans, à coctione (inquit) triduū dimittes oleū in cacaobo bene humido, & tingetur ita ut uirtus ipsius nō offendatur.

Alia scriptura cyprini.

Cyperii foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, elelisphaci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ longæ, uiticis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ, aspalathi, singulorum uncia sex, rutæ uncia duæ, cupressi uncia duæ, olei sextarii decem. Hæc prius uino madefacta, incoques oleo. ubi exemeris iniice, rursus xylobalsami, xylocassiae singulorum uncias quatuor, sampsuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum uncias tres, opopanacis uncias duas, iunci quadrati floris uucias sex, æruginis unciam.

Amaracinum.

I Nulæ campanæ pondo, xylobalsami libræ uiginti, cyperi libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sabinæ
S 4 singulorum

singulorum libræ octo, opopanacis, amaraci seminis singulorum libræ duæ, olei primi meriti sextarii duo, uini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta primum iniectionem habent uino prius macerata, secundam herba sabina, atque illa quidem horis sex incoquantur. hoc autem tribus nonnulli etiam hoc tingentes æruginis uncias tres iniiciunt.

Irinum.

IRidis, aspalathi, cyperi singulorum libræ quinque, opopancis uncia tres, anchusæ unc. duæ, olei sextarii triginta, aquæ sextarii quindecim. Sunt qui adiciant iunci rotundi floris uncias sex, cassiæ uncias tres, xylobalsami uncias sex, nardi gallicæ, tantundem, omnia contusa aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque incoquantur in lebetes ad sex horas: reponiturque unguentum.

Crocinum, in quo & alterius crocomagmatis confectura explicatur.

OLei omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ troglodyticæ singulorum uncia quinque, cardamomi uncia septem, croci cilicii uncia sex primum iniiciatur calamus & myrrha uino læuigata, & ante unc. modo reposita, piperis albi grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunsa, cribrataque teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini libra. ut autem medicamentum reddatur nigrius, nucum cortices combustos detritosq; in mortario adiecito: inde opobalsami cochlearia tria, ceræ sesquilibram admisceto.

Ee ænantharijs.

Cap. XXI.

Non quod ænanthen, hoc est, labruscam habeant hæc, (nonnulli enim ne ænanthen quidem recipiunt) sed ex uino & flore liliorum nomen hoc sortita sunt. Vñs ænanthariorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & delictiarum adhibetur, sic ut qui eis utuntur, à lauacro perfundantur: & mensæ ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui rectè utuntur, etiam sunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatibus admisceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febrili recolligunt, ubi lauacro egrediantur per totum corpus diffundentur: naribusq; admouebuntur, adhuc spirantibus. Trahitur enim in altum, & spiritum animale, uitalemque confirmat;

Adhæc

Adhæc utilia sunt ad morbum pestiferum uitandum, cum eius modi mutationem aer sustinet. Refertur autē huiusmodi unguentū ad Posidoniū authorē, à quo uocat mesopotamenon.

Oenanthini confectio.

Cassia, myrrha, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, carpobalsami, opobalsami, singulorum unc. tres, styracis pinguis unc. quatuor, uini odorati aminæi, Italici sextarij decem contusa omnia, cribrataque, styracem uero minutim concisum composito in urnam oris ampli, cum folijs liliorum pridie refrigeratorum, è domo una in alteram & unguibus detrahis, sint autem lilia numero trecenta. deinde uinum adiicitur, & opobalsamum, mista, commotaq; ante iniectionem, & constricto urnæ ostio quadraginta diebus insolantur. Balnei usus est in uirium ex morbo recreatione. Domus irrorabitur unguento, uasa que, & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

Alia confectio, nostra.

Costi unc. tres, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singulorū uncia, amomi unc. tres, cassia, oenanthos, calami, singulorum unc. nouem, styracis, opobalsami, singulorū unc. quatuor, lilia trecenta, uini falerni sextarii decē. Simili modo pparatur.

De suffimentis & cyphi.

Cap. XXII.

Cyphis materia inter medicamenta quæ potuit dantur & antidota existit, usus est eius incensi ad odorem gratum conciliandum, quemadmodum & suffiminum. Interim naribus admouetur, ut destillationes ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq; & obstructione liberet, purgetq; cerebri uentriculos, item pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoq; assumitur, tum ad hæc, tum ac ea quæ pectori inhærescunt, concoquenda: necnon ad frigidiores iecoris affectus, unde & Cyphoide appellata Antidota ueteres inuenerunt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipue epithematis & antidotis.

Rosatum suffimen.

Costi, amomi, myrrha, cassia, singulorum uncia, styracis, chia, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorum drach. duæ, rosarum purarum uncæ uigintinouem, opobalsami modicum, uini quod sufficit.

Suffimen

Suffimen lirinum, quod crinaton dicunt.

Liliorum ungue defecto libra, styracis primæ notæ, unc. novem, spicæ nardi, uncia tres, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchulæ Indicæ combustæ, mellis, singulorum fescun-
cia, opobalsami uncia quinque, uini quantum satis est, laui-
gata coguntur in pastillos.

*Cyphi magnum quod uocant solare, ex rebus
triginta sex confectum.*

Styracis, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singulo-
rum uncia sex, nardi gallici, phylli, cupressi seminis, guttæ
ammoniaci, strobili, splanchni aut loco ipsius conchularum In-
dicarum maiorum, carpobalsami, singulorum uncia tres, cas-
siæ, iridis, seselis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, sin-
gulorum uncia quinque, rosarum siccarum, croci, spicæ nardi,
herbæ sabinæ, hastulæ regiae radicis (alii succi) singulorum un-
ciæ quatuor, lacaphthi, hoc est, piceæ corticis uel alterius cu-
iusdam arboris uncie novem, costi, iunci rotundi floris, singu-
lorum unc. duæ, iuniperi maiores quadraginta, minores quin-
quaginta, amomi, resinæ terebinthinæ, palmularum purarum
singulorum libra, ficuū, siccatarū granis exemptis, uuarum passa-
rum acinis ablati, singulorum lib. duæ, mellis despumati lib.
quinque. Posidonius etiam uini odorati sextarios treis adiicit.

*Aliud cyphi, quod rebus uigintiocto constat
lunare appellatum.*

Bdellij, inulæ campanæ, singulorum uncie septem, innci ro-
tundi uncie duæ, sphagni uncia quinque, iuniperi minores
quinquaginta, cardamomi, uncia quinque, aspalathi uncia se-
ptem, cassiæ fistulæ uncia quinque, spicæ nardi uncia duæ, cype-
ri uncia quinque, hastulæ regiae radicis, herbæ sabinæ, singulo-
rum uncia quatuor, cupressi seminis, nardi gallicæ, malabathri
cum foliis, rosarum siccarum singulorum uncia tres, costi, cro-
ci, singulorum uncia duæ, ladani, myrrhæ, singulorum uncia se-
ptem, caricarum pinguium, uuarum passarum, aciuis exemptis
singulorum lib. duæ, strobilorum uncia octo, resinæ terebin-
thinæ libra, styracis uncia septem, palmularum pinguium li-
bra, mellis lib. quinque, uini odorati quantum satis est.

Confectio

*Confectio masuchæ, quod nonnullis masuaphion
uocatur. Cap. XXIII.*

MEliloti sextans, xylobalsami, aspalathi, herbæ sabinæ, myrrhæ, amomi, iunci rotundi floris, foliorum lauri, myrrhæ stillatitiæ, styracis, calami odorati, sampsu-
chi, singulorum uncia duæ, iridis uncia quinque, phylli, croci, singulorum uncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosarum siccarum uncia sex, uini quantum sufficit.

Ex commentarijs Antylli, de pessis. Cap. XXIIII.

Pessi mulierum locis admouentur, cæterum generales ipsorum differentiæ tres existunt, alii siquidem emolliunt, alii astringunt, alii aperiunt. Emollientes inflammationibus uteri, exulcerationi, perfrictioni, strangulatiui, auersioni & inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrrenica, cyprino, susino, pinguedine anseris aut gallinæ, butyro infuso, resina deusta, medulla ceruina, fœnugræco & quæ sunt eius generis. Aperientibus utimur, quum purgationem suppressam irritate statuimus, aut uulvam conuenienter compressamve emendare. Præparantur hi ex melle, artemisia, dictamno, brassica, succo dulcis radicula, porro, succo rutæ, scammonia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus usum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, & adpertum contrahunt uterum, prolapsumq; reprimunt. Materia uerò astringentium prius in capite de collyriorum etiam modo comprehensa est. Cæterum conuenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulò spissiore facere, deinde lanam linamento tortilli similem, duplicatam in medicamentum tinctam ori uulvæ condere, sic ut stuppam prælongam habeat alligatâ, quo pessus facilè possit extrahi, quando usum fuerit.

*Pessus crocoides, ad inflammationes, auersiones,
duritias & inflationes.*

Ceræ albæ, medullæ uitulinæ, singulorum drach. sedecim, medullæ ceruinæ drach. undecim, adipis anserini drachmæ octo, adipis gallinæ drach. octo, mastiches drachmæ quatuor, hyssopi medicamenti drach. tres, mellis drach. duæ, croci drachmæ octo, rosacei qd̄ satis est, crocus lacte muliebri læuigatur.

Pessus

*Pessus ab aureo colore dictus chrysos emolliens
laudatissimus.*

CRoci drachma, æsypi tantundem, medullæ ceruinæ drach. duæ, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorū drach. tres, quorum costorum lutea sedecim, irini & rosacei quod satis est ex æquo.

Passus libanius, menseis euocans & uulua uitij singulariter accommodus.

NArdini unguenti unc. sex, ceræ tyrrhenicæ unc. quinque, fusini unguenti unc. quatuor, adipis sui illi recentis uncia tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini unguenti, singulorum unc. duæ, seni taurini, resinæ terebinthinæ, æsypi, singulorū uncia: lebetē eliquant, omnesq; reliqui pessi.

Enneapharmacus.

Rosacei unguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri partes portiones.

Titianus emolliens.

Ceræ unc. sex, resinæ colophonix unc. quatuor & semis, seu taurini unc. quatuor, guttæ ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

Pessus Aegyptia.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei uel fusini, croci, singulæ partes: in quibus autem inflammatio abest, & sordidis, æruginis dimidiam addunt.

Gonē ad concipiendum.

Butyri unc. sex, hyssopi medicamenti, medullæ ceruinæ, adiectis anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloes singulorum unc. tres, ceræ tyrrhenicæ unc. sex, rosacei lib. duæ, myrrhæ, cassiæ, singulorū unc. duæ, spicæ nardi uncia, mellis quod satis est.

Quomodo medicamenta quæ emplastra ingrediuntur coqui debeant.

Argenti spuma.

IN medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquetur. Conuenit autem læuigatam rursus ex oleo conterere, ut sordidum fiat spissitudo, inde leni igne continenter excoquere,

coquere, mouendo, initio igitur intumescit & in bullas attol-
litur: ubi uero iam serè satis incocta fuerit, colorem faci simi-
liorem recipit. modus coctionis est, quum à tumore subfider,
& manus non inquinat.

Plumbago.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eo usq;
dum non modo digitos nō inquinat, uerū etiam ex igneo
colore in rufum & uehementer floridum elanguescat.

Aes crematum.

Aes crematum non protinus ab initio ad coquendum inii-
citur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquen-
di est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, su-
peret, & emplastrum rufum efficiat.

Sori & diphryges.

Sori & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum le-
beris: diphryges autem sicut & squama, eousq; coquitur dum
colore reliqua uincat. sori peculiarem coctionis finem non ha-
bet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum red-
datur, digitosque non inquinat.

Chalcitis.

Chalcitis incoquit æris modo, coctionemq; ipsius metitur
inde si emplastrum fuluum magis & phœniceum euaserit.

Flos æris.

Aëris flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui commu-
nis esse coctionis solet.

Atramentum sutorium.

Atramentum sutorium in media coctione emplastro indi-
tur, coctum uerò uehementiorem eius colorem efficit, & si
alia ei non resistent, nigrum.

Misy.

Misy postremò adiicitur, quamdiu autem coqui debeat,
propriè definitum non est.

Auripigmentum & sandaracha.

Auripigmentum & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

Plumbum ustum.

Plumbum ustum in media coctione adiungitur.

Cerusa.

Cerusa.

Cerusa in alba emplastra postremò mittitur, sic enim colorem conseruat, magisque albescit: iu nigra autem, principio: cocta enim largius, nigrescit.

Aerugo.

Aerugo uiridibus emplastris post coctionem iniicitur. In quibus neutiquam ollæ inditur, sed cum aceto detritæ ipsi manentiq; in pila reliqua superfunduntur. In melinis emplastris, quum semicocta est confectio immittitur: nam moderatam consequuta coctionem, melinum quasi mali co tonei colorem efficit. at in his quæ diprosopa, & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus. in quibusdam enim per coctionem primum melinum colorem inducit, qui duplicem repræsentat, postremò fuluum.

Alumen.

Alumen plerunqne secundum coctionem additur, peculiarem uerò coctionis modum nullum habet.

Minium, cadmia & pompholyx.

Minium in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per initia immittuntur.

Sal nitrum, sulfur.

Sal & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adiicitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

Terra & lapides, pumex, conchyliæ.

Terram omnem & lapides plerunqne ad coctionis finem iniicimus, item punicem & conchyliæ combusta.

Oleum & reliqua pingua.

Oleum si quidem per initia fuerit iniectum, resine aut pici liquidæ emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, rectè indetur, reliqua uerò pingua salis expertia, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

Vnguenta.

Vnguentum irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum minus: reliqua neutiquam. quare ad finem coctionis immittenda sunt.

Cera.

Ceræ priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neque cum

cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturq; ,
uerum superiniicitur, uel oleo puro, uel oleo socum quodam
metallico incocto, aut resinæ, aut pici prius incoctæ, ac prius
quàm reliqua quæ possunt iniici spissescet.

Resina.

Resina arida, cum cera immittitur: liquida ante oīa alia ipsa
priuatim decoquitur, nisi admodū paululū eius assumatur.

Pix.

Pix ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, li-
quidæ, dum inspissatur: aridæ, maximè dum amplius non
amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

Apochyma pix nauibus derafa.

Apochyma læuigatum cribroq; ab excrementis suis secre-
tum, emplastro posteaquàm coctū fuerit, insuper igitur. Si
autē molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendī
exactor est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

Bitumen.

Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in læ-
uorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici oliua-
rumque granis interioribus simileis, obtinet. Quapropter in
crassiores particulas confringendum est, coquendumq; in ace-
to, sic ut non agitetur usque dum ebullire desinat. Ego uero
(inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

Propolis.

Propolin emollire & discoquere oportet. siquidem à coctio-
ne neutiquā diffunditur. At si & cerā emplastrum recipiat,
propolin cū illa quēadmodū & galbanū, contusam iniiciemus.

Ammoniacum.

Ammoniacum circiter mediam coctionem iniicitur. detritū
uerò si potest fieri & in tenuem redactum puluerem insper-
gere conuenit: sin minus, cum liquore quodam leuigatum inii-
ceres: si emplastrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum ace-
to aut uino: si fistulis aut strumis omnino cum aceto: at si mol-
le futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cū aqua,
inde in sordium spissitudinem coactum aliis refrigeratis insua-
dere, ne efferuescat.

Opopanax.

Opopanax.

Opopanax multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino, aceto prius læuigandus est.

Galbanum.

Galbanum neutiquam coctionem tolerat, uerum emplastro ab igne sublato, quo spiffescat, sic ut digitos non inquiet, emollitum inditur.

Sagapenum.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublato fuerit, emollitur.

Aloe.

Aloe secundum coctionem inspergitur.

Lachryma papaueris.

Lachryma papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila læuigatur, mox etiã emplastrum ei superfunditur.

Thapsia.

Thapsia inspergitur postrema, uel liquore quodã læuigatur.

Bdellium.

Bdellium in læuorẽ pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & læuigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

Thuris lachryma, & manna.

Lachryma thuris & manna coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spiffitudinem coacta ex melle modico, aut aceto, aut aqua aut uino, si emplastrum liquorem recipiat.

Myrrha.

Myrtha ubi iam coctio finita est, inditur.

Semina, radices, & herbæ.

Semina, radices, & herbæ nullã coctionẽ sustinent? læuigatis igitur & in pila etiamnũ subsistẽtibus liquida superfunduntur.

Qui ceræ modus cum oleo esse debeat.

Quod si unguina quæ Græci à leuãda lassitudine acopa appellant, conficere constitueris, oleũ ceræ quadruplũ immittes:

inmittes : at si liquidum ceratum, ut in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus; portionem olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambie ns moderatus extiterit : at si cera uetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleum paulò copiosius quàm cera erit : quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit, paulum autem hoc, medij in utramlibet partem excessus duodecima erit portio, etenim undecim & tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscebis.

De medicamentis inuicem succidaneis ex commentarijs Galeni. Cap. XXV.

IN Alexandria (inquit) muliere quadam morbo periclitante cum quæsissem lichnidem, nec eius fuisset data copia, nisi protinus uice lichnidis usus fuisset acanthij semine, perijisset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc succedentiũ inuicẽ medicaminum expositionem ueni, secundum literarum seriem exorsus.

VICE Abrotani, origanum.

Abfinthij, abrotanum.

Acanthæ, Cerasiorũ acanthus.

Acanthij seminis, lychnis.

Aconiti, radix iridis syluestris.

Acori, asari radix.

Actes, hoc est, sambuci, acantha.

Adianthij, aphroselinum.

Adipis uulpini, adeps ursina.

Adipis ceruini, adeps anserina.

Adipis siulli, adeps uulpinus.

Aeruginis ferri, excrementum ferri.

Aethiopicae oliuæ, lachrymæ acaciæ partes duæ.

Agarici, euphorbium.

Agriostaphidis, hoc est, syluestris uuæ passæ, dactyli Syriaci.

Alicacabi, semen Solani.

Aloes. Galenus Agalochi, centaureum, & impressus Pauli

codex, aloes Indicae. aloes uiridis folia uel glaucium, uel lycium, uel centaureum.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinum.

Ammoniaci thymiamatis, propolis.

Ammoniaci salis, sal Cappadocum.

Amyli, aridus pollen.

Amygdalarum amararum, absinthium.

Anacardij, psylla herba.

Anchusæ, hyacinthus.

Aracis, hoc est Cicerculæ, sesamum.

Aristolochiæ rotundæ, aristolochia longa.

Argemones, seriphion.

Armeni lapidis, atramentũ Indicum.

Asbesti, hoc est calcis uiuæ, adarce

PAULI AEGIN.

T. Afij

Asij lapidis, Gagates lapis, uel
sal ammoniacus crematus.

Aspalathi, hoc est bituminis, pix
liquida brutia.

Aspal. hiericæ semen.

Asphodeli radice, betæ succus.

Auripigmenti sandaracha.

B

Balsami liquoris, myrrha stacte.

Bdellii, spagnus aromaticus.

Buccinorum, ostrea.

Buprestis, blattæ pedentes.

Butyri, lac bubulum concretum.

C

Cadmia, leucographis Aegy-
ptia.

Calamintha, menta sylvestris.

Calami odorati, sphagnus.

Cantharidum, phalangia.

Capparis radice, radix ericæ, uel
myrica.

Cardamomi, cyperis ammo-
niaca.

Cassia, cinnamomum.

Castorei, blattarum pedentium
intestina.

Cedri baccarum, ladanum.

Ceraunii, leucographis.

Cera lomentum cum propoli
coquitur, & contunditur.

Ceruini cornu, caprillum cornu.

Cerussa, recrementum plumbi.

Chamaedryos, rumicis sylvestris
radix.

Chamaemeli, Anthenis.

Ciclos, hoc est, ricini sordes pa-
larum.

Cicutæ, semen coriandri.

Cinnabaris, rhodoeides.

Cinnamomi, cassia duplum.

Clinopodii, heliotropium.

Cnidii seminis, semen uiticis.

Colocynthidis, semen ricini quod
est crotonis.

Colophonie, apochyma, seu pix
derasa nauibus.

Comareæ, ammoniacum rhy-
miama.

Coralli, moly.

Costi, cedrinae baccæ. Galeus,
costi, ammoniacum, baccarum
cedri, baccæ lauri.

Cotyledonis, anacardium.

Crinanthemi, aphrodisium.

Croci, crocomagma.

Crocodyli adipis, adeps canis
marini.

Crocomagmatis, aloë Indica.

Cymini, semen brassicæ.

Cymini Aethiopici, melanthium.

Cynosbati, halicacabi semen.

Cyperus, Iuniperus maior.

Cypheos, carica cremata.

Cyrenaici liquoris, syriacus li-
quor.

Cucumeris, anchusa.

D

Dauci seminis, semen sij.

Dictamni, salvia.

Diphrygis, lapis phrygius.

Dorycnii, semen alterci.

Dracunculi, apobrotinum. Ga-
lenus addit Damasonii, eryn-
gium.

E

Ebeni, lotinum aridum.

Ebisci radice, folia moti.

Elaterii succi, eiusdem herbæ
succus.

succus.

Eleliphaci, hoc est, saluix, nepita.

Hellebori nigri, radix papyri.

Eneaphylli, potamogiton.

Ericæ seminis, gallæ omphacitis.

Erini foliorum, finus ciconiæ.

Erysimi foliorum, herba lanaria.

Eruca seminis, erysimi semen.

F

Feculæ uini combustæ, sandarachæ.

Fellis cameli, fel ascalabotæ.

Fellis muris aranei, fel cameli.

Fellis hyenæ, fel perdicis.

Fellis uiperæ, fel ichneumonis.

Fici liquoris, liquor mori.

Fimi palumbini, finus colubæ.

Fimi Aluri, finus ichneumonis.

G

Galbani sagapenum.

Gentianæ radices, apii odorati radix.

Glycyrrhizæ succi, sycamini succus.

Gongilidis, hoc est rapæ, heliotropium.

H

Hederæ succi, perficis liquor.

Hippuris, chamæpytis.

Hormini, lini semen.

Humidæ picis, succus panacis.

Hyacinthi, flos Isateos.

Hyenæ adipis, uulpis adeps.

Hyenæ fellis, fel perdicis.

Hyoscyami, quod est alterci, rubi cani semen.

Hyperici, anethi semen.

Hypocystidis succi, acaciæ spinæ succus.

I

Iridis Illyricæ, helenium odoratum.

Innci odorati, cardamomum.

L

Lachrymæ papaueris, succus mādragoræ.

Ladani, sampsuchum.

Lanariæ radices ueratri nigri radices.

Lapathi radices, pyrethri radix.

Lapidis pyritæ, lapis pyrebolus.

Lapidis phrygii, lapis argyrites.

Lapidis magnetis, lapis phrygius.

Lapidis asii, lapis gagates.

Lathyrîdum, granum cnidium.

Lauri baccarum, serpillum aridum.

Lentisci, polygoni radix.

Lepidii, erythrodanum.

Lepidi radices, folia capparis.

Leporis marini, cancer fluuialis.

Leucini floris, struthion, seu lanaria.

Ligni balsami, radix uiolæ candidæ.

Lini seminis, fabæ succus.

Loti seminis, Betæ semen.

Lybistici, semen staphylini.

M

Malabathri, cassia uel nardus Indica.

Magnysinæ uitreæ, labrū Italicū.

Malorum cotoneorū, melilotū.

Maluæ, fœnugræcum.

T 2

Mandra-

Mandragoræ, oleæ lachryma.
 Mandragoræ succi, dorycnium.
 Mannæ thuris, cortex thuris.
 Mastichæ, lentisci medulla seu
 cor.
 Medullæ ceruinæ, adeps cerui,
 uel medulla uituli.
 Mellis sapa.
 Mellis Artici crudi, mel aliud de
 spumatum.
 Meu, myrobalanus.
 Myrtinities uinum, succus mori.
 Misyos Cyprii, ochracigna.
 Muscerdæ, muscæ tantundem.
 Mororum succi, ruborum folia.
 Myrobalani, peucinum.
 Myrrhæ trogloditidis, calamus
 odoratus.
 Myrtei olei, lentiscinum.
 Myrti, succus mori.
 Misy torrefactum, diphryges.

N

Nardi Syriacæ, iuncus odoratus.
 Nepitæ, menta syluestris.
 Napi, gongilidis semen,

O

Ocymi, sisymbrium.
 Ocymoides, syluatica menta.
 Oenantes succi, ampelini arbo-
 ris succus.
 Olei ricinini, oleum laurinum.
 Olei ueteris, duplū olei coqui-
 tur cum adipe suillo ueteri.
 Oleæ lachrymæ, hypocistidis suc-
 cus. Galenus oleæ Aethyopi-
 cæ lachrymæ.
 Opocarpasi, liquor myrti.
 Opopanacis, lac sycamini.
 Orizæ, hordeacea farina.

Oenitho gallorum, anthani.

P

Papaueris liquoris, mandragoræ
 succus.
 Peristereonis, chamæleuce.
 Peucedani liquoris, succus gly-
 cyrrhizæ.
 Picis liquidæ, opopanax.
 Pityocampæ, uespæ, in Cedriā.
 Piperis, zingiber.
 Polypodii, radix Chameleæ, uel
 chamæleontis.
 Polytrichi, absinthium.
 Propolis, ladanum.
 Populi nigræ surculorum, sam-
 psuchus.
 Psilii, lenticula palustris.
 Pterei, cncori semen.
 Pulegii, hyssopus.
 Pyrethri, zingiber.
 Pumicis, terra Cretica,
 Phu, sphagnus.
 Phyci, anchusa.

Q

Quercus, chamæleon.

R

Rapæ, heliotropium.
 Radicis rumicis, Cinira.
 Raphanini olei, rhicininum.
 Recrementi plumbi, helcysina.
 Recrementi æris Cyprii, melin-
 teria Aegyptia.
 Resinæ piceæ, resina tetebinthi-
 na.
 Resinæ colophonie, apochyma.
 Rhodoidis, sinopis.
 Rhododaphnæ liquoris, uiscus
 quercinus.
 Rosarum siccarum, Perseæ fo-
 lia sic-

lia sicca.

Rhu, centaureum.

Rubi canini, uescariæ semen.

Rumicis, pyrethri radix.

S

Sabini olei, oleum recininum.

Sagapeni, piceæ resina arida:

Salamandræ, lacerta uiridis.

Salis ammoniaci, sal Cappado-
cicum.

Salicis liquoris, nigræ hederæ li-
quor.

Saluæ, nepita.

Sampsuchi, rhus calinarius sic-
cus.

Santonici, abrotanum.

Satyrii, semeu erucæ.

Scammonii, ricini.

Scillæ, bulbus.

Scinci, satyrium.

Scordii, albi papaueris caput.

Semperuiui, lactuca serapiadis,
radix pœoniæ.

Semperuiui succi, lactucæ suc-
cus, aut folia.

Sepiæ testæ, pumex.

Serpylli, potamogiton.

Sesami, semen lini.

Sesamoides, expressum amara-
cinum.

Sinapis, cardamomum.

Sisonis, anisi.

Sisymbrii, ocymum.

Sphagni odorati, iuncus cul-
tus.

Spheclæ, hoc est fœcis uini com-

bustæ, sandaracha.

Strymmeos tufi, squama æris.

Styracis, castoreum.

Strobilorum, semen cucumeris,

Suruthii radices, radix ueratri ni-
gri.

Sulphuris uiui, sandaracha.

Syrici, spuma argenti.

T

Terræ Samiæ, leucographis Ae-
gyptia.

Terræ erythriadis, calx Thebai-
ca. Galenus addit terræ tene-
ræ, plumbago.

Thapsiæ, Elydrion.

Thapsiæ succi, chamæleontis ni-
gri succus.

Thermuntiadis, lycopsolos.

Troximi maiounium, aut ma-
ioulum.

Thuris, ampelites.

V

Vini Italici, uinum mendesium.

Vuæ acerbæ, galla omphaci-
tis.

Vuæ passæ fatiue, palmule.

Visci quercini, chamæleon ni-
ger.

Vulpini adipis, urfinus adeps.

Vulturis fœces, columbinus fi-
mus.

X

Xylobalsami, uiolarum albarum
radix.

Z

Zingiberis, pyrethrum.

*De ponderibus & mensuris.**Cap. XXVI.*

Pondus, grauitate dimensum iudicatur, mensura autem uasis capacitate: uas autem, siccae quantitatis aut humide mensura est, ut tres quantitatis quae mensuratur, sint differentiae, una quidem ponderis, altera uero aridae substantiae qualis ea quae in cumulum cogi potest, porro tertia humidae est substantiae. Cum autem multa propeq; infinita sint pondera & mensurae, pro regionum diuersitate, & uerentiu consuetudine, de ijs quae omnibus in usu communi sunt, nobis sermo erit praecipuus.

De notis ponderum & mensurarum.

Quoniam uero nonnulli literis non integris, sed notis, signisque pondera & mensuras demonstrant, satius fuerit, ueteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur χ litera, cum superscriptum habet α , chalcum hoc est aereolum signat, exempli gratia. Si \circ habeat, choa, quod est congiuum. Si ν , chœnicem. Si κ , chemam. At κ si ϵ habet suprapositum, & lineam rectam, quae per obliquum inferius cornu ipsius secet, ceratium, hoc est siliquam notat, ut Si ν superiectum est, cyathum. Si α , cotylam, hoc est heminam. At linea circumflexa quam nihil aliud circumstat, & quae per obliquum ponitur obolum notat, Si duae huiusmodi lineae sint, quas nihil circumstat, duos signant obolos: qui obuli grammata, hoc est scrupulum faciunt. is notatur litera r , quae ς literam habent annexam, recta quadam linea diuisam. Duae autem coniunctae atq; altera parte in angulum coactae, duobus κ literae cornibus similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachnam, quae alio nomine uocatur olca, proprie uero olca per λ scribitur, cui in medio litera \circ sit addita. Verum si λ adiectum habet, libram signat. Nonnulli uero alteram λ literae lineam oblique secantes libram ostendunt. At cum r litera, in ipso sui angulo \circ habeat, unciam denotat. Quod si μ in summo uertice habeat oppositum ν , minam refert. Si ν , notat mystrium, Si ϵ , medimnum, Si α , modium. Porro τ post se habens ς , & ν , signat tryglion, $\tau\varsigma\nu$. At ξ cui iuxta sit positum ϵ , xessen, qui sextarius, ostendit, $\xi\epsilon$. Si \circ apponitur, oxybaphum, id est acetabulum $\xi\alpha$. Aliqui uero sextarium linea recta ξ secantes conficiunt. Sed κ adiectum literae μ , heminam κ addito ς , incumbente ipsis μ , ceramium ualeat.

De pon-

De ponderibus.

Mina Attica & Aegyptia habet uncias sedecim. Romana uiginti. Libra uncias duodecim Vncia drachmas octo. Drachma habet scrupula tria. Scrupulum, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, æreolos duos, & duas tertij partes.

De mensuris liquidis.

ITalicum ceramium habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula autem quatuor. Nam magnum mystrum habet acetabulum, Acetabulum sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si uoles & ponderum liquidorum mensuram scire, permultæ liquidarum rerum secundum lancis momentum differentia habentur, ut in olei, uini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur uino ponderosius quarta parte, itemq, decima est: quo fit ut ferè tertia ponderis pars mellis accedat: capit enim integrā huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: continet enim totum olei modum, & ultra semissem. Vinum oleo nona parte supereminet, totum enim ipsius pondus continet, & nonam eius partem. Quò autem res fiat dilucidior, omnium mensurarum pondus sigillatim ueluti in tabula depictum subiecimus. ex qua liquido constat, per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, oleum, uinum, & mel, ex ordine demonstrari.

	Olei	Vini	Mellis
Ceramiū Italicū habet	lib. 72	lib 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib 10	lib. 13 S.
Sextarius	lib. 1. unc. 6	lib. 1. unc. 3	unc. 13 & S.
Hemina	unc. 9	unc. 10	unc. 13. & S.
Mystrum magnum	unc. 3	unc. 3. scrup. 8	unc. 4 & S.
Acetabulum	drac. 18	unc. 2. scrup. 12. drach. 27	
Cyathus	drac. 12	drac. 12. scrup. 4. unc. 2. dr. 2	
Mystrum paruum	drac. 16	scrup. 20	drach. 9

ORibasius secundum adamantium author est sextarium Italicum uini mensura quidem unciarum uiginti quatuor esse, pondere uero unciarum uiginti, sextarium pondere mellis duas libras, & dimidiam habere.



De aridis.

AEgyptia artaba habet modios quinque. Modius ægyptius & Italicus Chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semifextarios duos quos & heminas uocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimus habet semifextaria, quæ hemiecta uocant duodecim. Hamiectum chœnices quatuor. Ita medimnus habebit minas quadragintanouem, sextarios nonagintafex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quòd aridarum rerum infinitæ iuxta momenti lancis rationem differentia existant.

FINIS LIBRI SEPTIMI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDI-

CO INTERPRETE.



LECTORI.



Ntequàm te ad lectionem Pauli conferas, scito aliquando uerbum digerere positum esse pro discutere. Item mannam pro tenuiore parte thuris. Cachry pro flore ro-
ris marini.



IOANNIS

ANDERNACI

IN LIBRVM PRIMVM

PAULI ÆGINETAE

COMMENTARIVS.



CAPVT I.



VANDO QVIDEM grauidis.] Primum hoc caput Pauli ad uerbū ex quinto Oribasij sumptū est: in quo grauidis multa superuenire legimus inter cætera stomachi redūdationē. ut Pliniano more loquar, quam Paulus uerbo τῷ περισσάλειν significat. Id si Hesychio & Suidæ credimus, à canibus caudam mouētibus: aut po-

Stomachi
redunda-
tio.
περισσάλειν
σις,

tius, quod hic etiam magis cōgruit, à fluctuum agitatione tralatū est. In grauida enim sanguis menstruus, qui ante cōceptum statō tēpore, expurgari solebat, copiosior in utero collectus quā pro fœtu adhuc exiguo ad stomachum regurgitat, ibiq; exundans, nauseam excitat. In prima nostra uersione erat, Nausea, sicuti etiam Aristoteles lib. 7. de historia animalium ponit. ἔτι δὲ ναυτίαι, inquiēs, καὶ ἐμετοὶ λαμβάνουσι τὰς πλείους. id est, præterea nausæ & uomitus plurimas infestant. Aetius πλάσος τομάχου ait, quod est nimia humiditas stomachum debilitans, non ut Orosius putabat, sola imbecillitas. Nā Galenus Commentario secundo in primum de morbis

ναυτία.

πλάδους. de morbis uulgaribus, αἶτ τὴν περιττὴν ἐγρότητα πλάδον εἶω-
θεν ὀνομαζειν, hoc est superfluam humiditatem, pladon appel-
lare consuevit, de Hippocrate dicens. Idem Commentario
secundo de ratione uictus in morbis acutis, ἐφ' ὧν καὶ προσέ-
θηκεν, ὥς ὁ μὲν ὑδαρὴς οἶνος πλάδους ἐν τῇ ἀνω κοιλίᾳ τοῦτέστιν
ἡγρότητα, καὶ ἀτονίαν ἐμποίησει. hoc est, in quibus etiam adie-
cit, uinum aquosum, Pladon, id est, humiditatem & imbecil-
litate in superiore uentre excitaturum.

πτυελί-
ζειν. Sputa crebra.] Quia stomachus ex humiditate lāguet, eo-
que os ipsum tenui sputo assidue plenum existit: Græca di-
ctio est πτυελίζειν: quam Galenus in priore prædictionū in-
terpretatur, πτύνειν πολλάκις, hoc est spuere frequenter.

καρδιωγ-
μός. Stomachi erosio.] Quando ab acrioribus humoribus irrita-
tur, mordeturq; uomitui futuri signum non exiguum habe-
tur. Græce dicitur καρδιωγμός, quasi dicas cordis morsus. Ve-
teres autem olim os uentriculi cor appellauerunt, nimirum
ex situs uicinitate: quia cor prope os uentriculi situm est, ut
ait Galenus, & ipsa rei euidentia docet eundem affectum Ga-
lenus etiam καρδιαλγίαν uocat libro secundo de placitis Hip-
pocratis & Platonis.

καρδιαλ-
γία.
Cibi fasti-
dium.
ἀσιτεῖν.
Cibi fastidium.] Nimirū ex uitiis humoribus stomachū
infestantibus, si Galeno credimus græca dictio est ἀσιτεῖν, quæ
signat cibo abstinere, & inedia uti, sicut Grammatici nobiles
interpretantur. Galenus etiam libro primo περὶ ἐπιδημιῶν
differentiam inter ἀσίτες & ἀποσίτες ponit hisce uerbis. ὅτι
τῆς ἀνορέκτης ἀσίτης ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες τῆς μὴ προσενεγ-
καμένους σιτία, τῆς δὲ ἀπετραμμένους προσιέσθαι, ἀποσίτες
καλεῖσιν. hoc est, quod Græci appetentia carentes uocāt, Asi-
tos, eos sanè qui cibos non assumunt: illos autem, qui assu-
mere oblatos auersantur, abhorrentq; appositos, omnibus est
manifestum. Ibidem ἀπόσιτοι πάντων γούματων διετέλεον,

ἀσιτία,
ἀποσιτία
Fastidium
abstinentia.
quasi dicat, omnium ciborum fastidio laborabant. Erit itaque
ἀσιτία abstinentia à cibo in totum: ἀποσιτία, fastidium qui-
dem, sed ut aliquid tamen assumatur, quod Galenus ostendit
libro primo de causis symptomatum, grauidarum accidentia
enumerans in hac uerba, βραχέα σιτουμένης τῆς ἀνθρώπου διὰ
τὴν ἀποσιτίαν. Hoc est q̃ mulier pauca comederet ob fasti-
dium. Hippocrates in Aphorismorum commentario quarto:
ἀπυρέτως εἶναι ἀποσιτία, Galenus interpretatur ἢ μὲν ἀποσι-
τία τὰ

τὰ αὐτὸ δὴλοῖ τῇ ἀνορεξίᾳ. Rursus in libello de uictu priuatorum: δόσοισι δὲ ὀδύναί γίνονται ἐκ τῶν σπλάγχνων, ἢ ἐκ γυμνασίας, ἢ ἐξ ἄλλης τινος ὀδοπορίας τουτέοισι συμφέρει ἀναπνεύσαι ὁσίτῃς. Hoc est: quibus dolores uiscerum oboriūtur, aut ab exercitio, aut alia quadam obambulatione, his conuenit in abstinentia conquiescere. His omnibus animaduersis, legendum uidetur ἀποσιτεῖν pro ἀσιτεῖν, id quod ex sequenti oratione cuius mediocriter sagaci licet deprehendere. Nam Paulus singulorum accidentium remedia tradens, ἀποσίτῃς δὲ, inquit, non ἀσίτῃς: quanquam nō ignarus sim aliquando authores, alterum pro altero usurpare: ut ἐ capit. 35. Verum cū utraq; hic ponatur, ἀποσιτοί, & ἀσιτοί exacte intelligenda sunt. Miror hoc Orosium qui in aliis corrigendis nihil facit reliqui, non aduertisse: Castigatorem uero Basiliensem, qui Paulum Græcum germanicis typis excusum adidit: tum hoc, tum alia pleraq; præterijisse, notatu alioqui dignissima.

ἀσιτός.

Corrigitur
locus Pau
li impressiOrosius.
Castigator
Basiliensis.

Vina fulua.] Vt pote frigidioribus naturis accommodata tū ad concoctionem, tum ad succi bonitatem procreādam, ut ex Galeno didicimus. Ait enim libro duodecimo Methodi οὗτοι πάντες οἱ οἶνοι κίρῆοι, καὶ θερμοί, καὶ εὐώδεις εἰσὶ, καὶ τῇ συντάσει μέσσοι τῶν τεύχων καὶ τῶν παχέων. Hoc est, omnia hæc uiua fulua, tum calida, tum odorata sunt, & substantiam habent inter aquosa & crassa mediam.

Vina fulua.
κίρῆοι.

Color hic fuluus, qui Græcis κίρῆος dicitur, proximus est flauo, quasi dicas in pellucido flauum: hinc etiam flauus color & fuluus eidem sæpe rei accommodatur. Id quod ex Galeno licet condiscere, libro quinto de Sanitate tuenda, ubi habet, σκόπον ἔχων οἶνον κατὰ μὲν τὴν σύστασιν αὐτὸν λεπτότατον αἰρεῖσθαι, κατὰ δὲ τὴν χροῖαν, ὅν ὁ ἵπποκράτης εἶωθε κίρῆον καλεῖν, δύναιτο δ' αὖ καὶ ξανθὸν ὀνόμαζεν αὐτόν. Id ferè sonat, huc consilium dirigens, ut uinum substantia quidem tenuissimum semper: colore autem, quæ Hippocrates κίρῆον id est, fuluum nominare consuevit: possis etiam eundem flauū appellare. Galenus alibi τὸ κίρῆον χροῖμα δὴναίαι αὖ λέγειν πυρρὸν ὡχροῖον. Hoc est, fuluum colorem possis rufum pallens dicere. Sunt qui hunc colorem latine Giluum nuncupent: ego malim ex Galeni interpretatione, fuluum conuertere, Pliniū secutus: qui hunc colorem inter alios uino attribuit, non giluum.

Color fuluus,
κίρῆος.Flauus,
πυρρὸς.
ὡχρός.

luum. Siue autē dicas gilua flaua, aut fulua, nihil interest, modo obserues plerunq; uina ex uetustate hunc colorē induere.

At medicamenti nomine.] Superius commemorata ad cibum referuntur: sequentia ceu medicamenta adhibentur, quæ stomachum ex nimia humiditate imbecillem corroborant, exciccentq; ὡς φάρμακον δὲ. id est, ut medicamentū uero habet textus, ego nomine medicamenti uerti.

Radix Pontica.] Hoc est, rhaponticum, uim habet corroborandi stomachum imbecillem: uide Dioscoridem.

περικάρδιον.

præcordia.

Præcordia apud Plin.

ὑποχόνδριον.

Subcartilagineum.

Medicamenta in

affectu stomachi ubi

applicanda.

Recētiore quidam apud Lug-

dunū Medici.

Linacri uersio.

Galenus. 13. Methodi.

Extrinsæcus præcordia.] Hoc est, qua parte uentriculi os habetur. Abusus est Paulus dictione περικάρδιον, quæ apud Galenum propriè significat membranam, seu tuniculam, cor ambiens, aut si mauis, cordis inuolucrum. Quia uero os uentriculi olim cor appellabatur, excusari potest, ut Pericardion pro regione externa, sub qua illud delitescit, accipiatur. Plinius libro naturalis historiæ I. I. membranas septi trāuersi, præcordia appellauit, q; cordi prætendantur. Galenus autem, & Hippocrates ὑποχόνδριον totam illam regionē appellant, quæ à mucronata cartilagine, utraq; in parte ad umbilicum usq; porrigitur. Celsus autē latinæ linguæ in Medicina princeps, præcordia nominat. Cæterum ex hoc Pauli loco cōstat, ubi os uentriculi affectum est, ante non ad dorsum applicanda remedia. Nonnulli autem Medici apud, Lugdunum dorso ad moueri præsidia, ut in inflammatione gulæ uolunt, erroris occasione sumpta ex loco quodam Galeni in 13 Methodi perperam à Linacro Anglo conuerso. Habet autem in hunc modum tralatio. Verum gulæ, quæ propriè uocatur stomachus, cataplasinata super spinam dorsi imponimus, non autem ad pectus: idem facimus, & cum phlegmone os uentris laborat. Multo melius sonant græca. ἀλλ' ἐπίγει τῷ κυρίως ὀνομαζομένῳ στομάχῳ καὶ τὰ καταπλάσματα καὶ τῆς ῥάχεως ἐπιτίθεμεν ἐκ ἐμπροσθεν, ὥσπερ ὅταν τὸ στήθος τῆς γαστρὸς φλεγμῶν, id est: Sed gulæ quæ propriè nominatur stomachus, et cataplasmata super spinam dorsi applicamus, non antè, quemadmodum (intellige) facimus in anteriore parte, cum os uentriculi inflammatur. Huic sententiæ ipsa rei euidentia, quæ ex Anatome apparet, adstipulatur.

Præcordia cōtegere.] Hoc loco usus ē dictione, ὑποχόνδριον: cū hic eundē locū quē superius in uomitu uoluerit, intelligat.

At eas

At eas quæ cibum fastidiunt. [Græce est τὰς δὲ ἀποσί-
της. Remedium fastidientium ponit, quāquam superius ἀσι-
τον scriptum erat.

Oenanthe.] Hoc est, uua syluestris uitis, ut ait Dioscorides:
ad uerbum hæc ex Oribasij quinto transcripta sunt. Auicen-
næ interpretes eundem locum turpiter corruerunt

Citta.] Oroscius Cittam male interpretatur picam: non
enim pica morbus est apud latinos, sed malacia: à græco au-
tem uerbo κίττα possis dicere picā, sed apud idoneos autho-
res usurpatū non est. Galenus originē huius mali tradit libro
primo de Symptomatum causis in istum modum. μοχθηρῶν
δὲ ποιότητων ἐπιβιμῶσιν. ἂν οἷς αὐ εἰς τὰς τῆς κοιλίας χιτῶ-
νας ἀναποθῇ περιττωμα μοχθηρὸν, εἴωθε δὲ τὸτο γίνεσθαι
μάλιστα ταῖς κακοχύμοις γυναιξίν, ἐπειδὴ ἀν κινήσωσι, καὶ καλεῖ-
ται κίττα τὸ παθὸς. Hoc est: Prauas autem qualitates appe-
tunt ij quibus uitiosum aliquod recrementum in uentriculi
tunicas est insinuatū, id quod mulieribus, præsertim succis
prauis obnoxiiis, ubi in utero habere cœperint, accidere cōsue-
uit, ac uitium appellatur κίττα & Plinius lib. 28. cap. 7. mala-
ciam stomachi appellat.

Error Oro-
scij.
κίττα.
Malacia.

Id tertio à conceptu mense.] Galenus libro citato, καὶ τὸ-
το πάσχειν αἰπλῶς αὐτῶν ἀχρεῖ τῇ δυνάτει, καὶ τρίτου μῆ-
νος ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ παύονται, id est, ac complures ipsarum
hoc affectu usq; ad secundum & tertium mensem laborant:
quarto autem infestari desinunt.

Malacia
stomachi.
Aduerte lo-
cos Pauli
& Galeni.

Id quod utero est.] Sic interpretatus sum κύμα, quasi di-
cas conceptum: nondum enim foetus dici potest, si Galenū,
ex quo ferè omnia hæc sunt deriuata, his uerbis loquentem
intelligamus. κατὰ μὲν τὰς πρώτας δύο μῆνας, ὀλίγον ἐπισπᾶ-
ται. τῇ αἵματος εἰς αὐτὸ τὸ ἔμχρυν, ὥς αὐ ἐτι μικρότατον
ἐπάρχον ὅταν μὴ δ' ἐμβρυον ἡδὴ κω καλοῖται, κατ' ἐκείνον τὸν
καιρὸν, ἀλλ' ἐτι κύμα, id est, in primis sanè duobus mensibus
foetus paucillum sanguinis ad se attrahit, ut qui minimus ad-
huc existat, quando ne foetus quidem tunc appellari debet,
sed potius conceptum. Et reliqua uerba Pauli in Galeno or-
dine inuenies.

κύμα.
Conceptū.

Iam labor & longior.] Remedium est fastidij, & malaciæ
stomachi, quæ prauos cibos & alienos à natura appetit, uerum
malaciæ magis. Græce est in omnibus exēplaribus cum im-
pressis,

Remedia
malaciæ
stomachi.

ἔυσιτοι.

pressis, tum manu scriptis quorquot mihi uidere contigit, ἔυσιτοι δὲ καὶ οἱ πόνοι, &c. Hoc est ad uerbum, bene cōmēsse faciunt & labores, quod perinde est, ac si dicas bonorū ciborū appetentiā faciūt: ut qui superfluitatē, ac redundantīā humorū discutiant, unde prauorum excitatur appetitus. Clamat hic Orosius Copum & me errasse qui ἔυσιτοι pro ἔυθετοι legimus. Quando quidem uero superius fecit mentionem ἀποσιτῶν & ἀλλοκότων ὀρεγνυσῶν, non absurdē ἔυσιτοι in remedio ponitur. Præterea si remedium est malaciæ potius quàm fastidij, labor, certē ἔσιτοι rectē dicuntur πόνοι. q̄ bonorū ciborum, malaciæ autem malarum rerum appetentiam facit. Sed parum refert, an ἔυθετοι legas.

ἔυθετοι.

ἀταλαι-
πῶρος.
ταλαι-
πωρία.

Quæ uero mulier citra labores.] Græcē est ἀταλαιπῶρος, id est, sine exercitio aut labore. Nam ταλαιπωρία laborem & negocia uitæ apud Hippocratem significat cum alibi, tum in libello de uictu priuatorum, τῆς δὲ παχέας χρηῖς οἱ βολονταί λεπτοὶ γενέσθαι τὰς ταλαιπωρίας νήσιας ἔδοντας ποίεσθαι ἀπάσας. Hoc est, crassi qui tenues uolunt fieri, omnes labores ieiunij subibunt.

Acria.

Verum acria] Vt piper, gingiber, nasturcium, aliâq; id genus quæ calore suo stomachi superflua consumant.

Oedemata.] Tumore sunt ex pituitoso humore collecti, qui digitis prementibus cedunt: uariis etiam morbis superueniunt. Vide Galenum de Tumoribus præter naturam.

κατανί-
ζειν.

Lauantur.] Græcus codex impressus κατανίζειν pro κατανίζειν habet. Superfundere etiam significat.

IN II. CAPVT.

Mulier
adole-
scens.

Etate nec nimium.] Ex hac clausula Græca μήτε δὲ νέω. Ἀτέρα, reddidi: nec nimium adolescens, hoc est, quæ sit in ipso uigore ætatis: quo nimirum corpus absolutum iam est, & copioso abundat sanguine. Sin infra uiginti quinq; sit annos, nempe adolescens, corpus adhuc increfcit, & alimentum minus habet perfectum. Eoq; νεωτέρα uerti adolescens. Nam ab anno quartodecimo usq; uigesimum quintum, ætas uocatur adolescentia. Ab anno trigesimo quinto, multis solent menses cessare, aut omnino pauci fluere, eoq; alimento minus ad fœtum alendum abundant.

Nutrix nō multo ante.] Quia sanguis tunc ubertim ad mammas confluit unde lac copiosius etiam suppeditatur.

Masculum.

Masculū.] Hippocraticū est propterea q̄ laborato magis, proboq; nutrimēto ex sanguine pollet, & minus excremēto.

Condimenta.] Sic dicuntur quæ liquoribus quibusdam ut aceto & sapæ, aliisq; condiendis induntur aromata, siue semina odorata quod genus sunt cuminum, anisum, fœniculum, græcis dicuntur ἀρτίσεις & ἀρτίματα. Lege in textu τὰς ἐπι σήμης ἐνωδίας καὶ ἀρτίσεις, pro τὰς ἐπισίμης.

ἀρτύ-
ματα.

Venere nutritrix.] Galeni præceptum ex primo de sanitate tuenda: quia ex hac menses prouocātur, & lac odoris gratiam in deterius mutat.

ἀρτίσεις.
Condimenta.

Manus humerosq;.] Exercitationem nutritrici idoneā præscribit: qua uidelicet partes superiores agitatz sanguinē copiosum lacti generando suggerant. Dicit enim Galenus sanguinem optimum gigni exercitatione moderata, cibis tū boni succi, tum iusto tempore, modoq; assumptis. Præterea portione tēpestiua modicēq; sumpta. Græce est, ἀλέτω, i. molat:

IN III. CAPVT.

Laudatissimum.] Galenus libro primo de sanitate tuenda ad uerbum omnia comprehendit. De ungui autē, ex Dioscoride libro secundo sumptum est, quod autem ad lucem debeat inclinari, de suo Paulus adiecit: quemadmodum etiam de probatione.

IN IIII. CAPVT.

Lacuiatum.] Ex quinto Oribasij conscripta sunt remedia nimirum lactis uiciati: quæ tum corporis totius purificatione, tum uictus ratione constant.

Oxymelite.] Hic uomitus facillimus est, aliquando additur radícula quæ raphanus dicitur, minutim cōcisa horis duabus in oxymelite madescit. Deinde ea proiecta, oxymeli assumitur. Vel radiculam esse oportet, deinde aquam tepidā bibere. Valentiores uomitus ciendi modi septimo lib. tradunt.

Vomitūs.

Labotibus.] Nam exercitatio calorem prouocat: qui frigidum, uiscosumq; humorem calefacit, extenuatq;.

Cibum præcedentibus.] Alioqui plus noxæ quàm cōmodi afferent: imo plus pituitæ generarent; dum uidelicet cibū prius quàm esset concoctus, in membra digereret.

Salsamentum,] Græce τάρυχος est, quod conditā thynni carnem significat. Cuius generis & Cybia sunt, quo nomine Priuius Pelamidem concisam appellat. Pelamidem uero Thynnum,

τάρυχος.

Thymum, qui nondum attigerit annum. Idem à recenti partu Corpyla dicitur.

His por-
culorū pro-
sumētis æ-
tate uaria-
tur.

Carnibus suillis.] Ad obtundendam nimirum humoris biliosi acrimoniam. Nam humida & crassi succi: ijs qui con-
coquere possunt, utilissima. Habet autem uiscosi aliquid, quo
iecur & renes obstruat: cætera ex omnium animantium ge-
nere quæ pedibus fidunt, ut ait Galenus, saluberrima. Porro
indistinctè dixit Paulus carnibus suillis, cuius puta ætatis esse
uelit omittens. Nam floridæ ætatis hominibus ac sese exerci-
tantibus iusta magnitudine adulti: inclinantibus, qui adhuc
increscunt, porculi conueniunt, Minimorum caro excremen-
tis generandis est: uetulorum siccitate, & duritia displicet.

Collatio
locorum
Pauli &
Galenii.

Sæpeq; & uini dulcis.] Galenus libro περὶ εὐχυμίας καὶ κα-
νοχυμίας, contrarium ferè scribit, docens biliosis, quibus lac
acrius tenuiusq; esse solet uinum dulce nequaquam conueni-
re. His uerbis: τοῖς χολώδεσσι σώμασιν, εἴτε διὰ φυσικὴν δύ-
σκρασίαν, εἴτε δι' ἐπίκτητον ὁπώσῃ γεγόναι, ἢ τε φαλερίνος,
ἢ τε τρωλῆτης κίρρῳς γλυκύς, ἢ τ' ἄρουσιος ἢ δ' ὁ λέσβιος δ' εὐώ-
δης τε καὶ κίρρῳς ὁμοῖος τοῖς προειρημένοις ὧν ἐπιτήδειος πίνε-
σθαι. Σερμοὶ γὰρ ἅπαντες οἱ τοῦτοι. Μήτ' ἔν χολώδεσι, μήτε
τοῖς ἐξ ἐγκαύσεως ἢ καυμάτων πολλῶν, ἢ ἐνδείας, ἢ λύπης, ἢ ὥρα, ἢ
χώρα καὶ καταστάσει θερμῇ, διδόναι τοῦτον οἶνον. ἐξ ὑπεραντί-
σας ἔν ἀγαθὸς ἅπασιν τοῖς θερμανέσθαι θεομένοις, φλεγματώδε-
σι καὶ ψυχραῖς κρᾶσεσι, καὶ χυμῶν πλῆθος ὡμῶν ἢ θρωκόσιν, ἀργῶς
βιῆσιν, ἐν χωρίῳ ψυχρῷ, καὶ χειμῶνι, καὶ καταστάσει ψυχρᾷ καὶ
ὕγρα. τέτοις μὲν ἅπασιν ἀγαθὸς ὁ κίρρῳς οἶνος καὶ γλυκύς. ἐναν-
τίως δὲ τοῖς ἐναντίως ἔχουσιν, id est, Biliosiori corpori, siue ex
temperamento naturali, siue qualicunq; ascititio, nec faler-
num, nec dulce molites fuluum, nec Aruifium, nec Lesbium
odorum & fuluum prædictis simile potui est idoneum. Quip-
pe omnia id genus uina calida sunt, eoq; nec biliosis natura,
nec ex insolatu, aut aliis ardoribus, uel inedia, uel tristitia, uel
anni tempore, uel regione, & calido aeris statu huiusmodi ui-
num exhibendum est. E contrario salutare est omnibus qui
calefieri desiderant, pituitosis, frigidis réperatura, ijs qui cru-
dorum humorum copiam coaceruarunt, in ocio uiuentibus:
in loco frigido, hyeme, & statu aeris frigido, humidoque. His
inquam uniuersis fuluum ac dulce uinum salutiferum est, cō-
trarium ijs qui secus habent, &c. Quid igitur hic dicemus?

ratione

latione alimenti exhiberi. Nam antea dixerat ἡ τροφή δ' ἐξ
ἀπάντων ἐστὶν αὐτῶν ἀνάλογος τῷ πάχει. Hoc est: Alimentum
uero ex omnibus ipsis crassitie respondet: puta qualem sub-
stantiæ crassitiem obtinent, tale etiam nutrimentum, nempe
crassi succi producant. Sic igitur ijs quibus lac tenue est, con-
uenit. Quamquam muliebris etiam sexus, respectu masculi-
ni, frigidior existat: deinde sanguis tenuis, & serosus esse po-
test, acris, non etiam statim biliosus, ac calidus.

Cucurbitula etiam.] Vt uidelicet sanguinē ad partes eas
ex aliis attrahat. Caute uerò ad māmillas defigenda est. Caro
enim mollis cum sit, facilē intumescit, cucurbitulaq; repleta
difficile auellitur. Quod si hoc acciderit, sponsia calida illi su-
perponi debet: sic enim laxatur. Sin minus, pertundetur.

Melanthium.] Dioscorides hoc docet lac extrahere: in
qua re miror castigatorem Orosiū, papauer nigrum uertere:
quod contra omnem medicinam est, ne dicam piaculum, pre-
bere ad lactis generationem uehementer refrigerantia adeo
ut suporem inducant, & quidem uiolenter, nec sine incom-
modo natura. In Græce exemplari legēdum quidem ei assen-
tior pro γλυκύ, γλυκῆ, quod præterijt Gemusæus. Melanthiū
uero apud nullos autores papauer nigrum signat, etiam si cō-
ueniret instituto. Ita sunt quidam ad uituperandū alios pro-
cliues, ut sæpe ipsi in multo grauiores errores incidunt.

Error Oro-
scij,

Textus
Græcus
corrigit.
Melanthiū
quod gith
dicitur.

Calida prius.] Græce est θερμῶ προσαιονήσαντες legen-
dum: non προσεωνήσαντες, ut habent codice impressi, quod
neuter Aristarchus, uel Orosius uel castigator Basiliensis ad-
uertit. Dicitur etiā καταιονήσαντες à uerbo καταιονεῖν, quod
significat καταυτλεῖν, & καταχεύειν. Galenus i primo ad Glau-
conem. τῶν δὲ σπλάγχνων προνοεῖται καταιονεῖν ἅτε καὶ κα-
ταπλάττονται τοῖς μαλάττειν καὶ χαλαρὴν δυναμένοις: hoc est ui-
sceribus autem prospicere oportet, superfundendo, obducen-
doq; ea quæ emollire possunt, & laxare. Leoniceus ungen-
do uerterat.

προσαι-
νεῖν.
καταιο-
νεῖν.

Prius emulcto.] προαμέλξασαν passiuè positum est: cum
medium alioqui sit.

Ieiuno.] Hic propriè positum est ἀσίτω, ut facilē intelli-
gas in initio primi capitis pro ἀσίτης legendum ἀποσίτης.

Cibus solidior.] Galenus primo de sanitate tuenda puerū
uult nutrirī lacte, quoad primores dentes emisert. Deinde

PAVLII AEGIN,

V cibo

σιτίον.

cibo solidiore, utpote pane, leguminibus, carne, similibusque, sed omnibus prius commansis. Græcè tātum est σιτίον, quod per se cibum simpliciter signat, uerum lactis ratione solidior intelligendus uenit.

Si autem imprudentibus.] Græce est, αὐτὰρ λαθόντα πληρωθῆναι, id est: Si autem latentes repleti fuerint. Sed uerbum λαθάνω in eiusmodi locutione uertitur, recte cōuertitur, imprudentibus nobis, aut nescijs, id quod ē Budæus, annotauit.

IN VI. CAPVT.

Exanthe-
mata.

ἐπανθεῖν.

PVstulis quæ quod puero.] Post educationem infantuli morbos enumerat, quibus in ea ætatula cōflicari solet: uocatq; Græce ἐξανθήματα à uerbo ἐξανθεῖν, qđ est efflorescere.

Ad summa eruperint.] ὁρᾶν δὲ ἐπανθίσκειν, qđ est ī extrema eruperint. Vt ἐξανθεῖν sit simpliciter se in altum promere: ἐπανθεῖν uerò iusta magnitudine & figura per summa apparere.

IN VII. CAPVT.

κόρυζα.

GRauedo.] Græce est κόρυζα. Sic enim Celsus lib 4 interpretatur: qua nimirum pituita ex capite defluens, nares claudit, uocem obtundit, tussim mouet.

μελιτισ-
μός.Textus
Græcus
mutulus.
ἀπιφθον.

Melitisimi.] Ita dicuntur, sicut sinapismi, cum melle pars obliuatur, melitismus, cum sinapi, sinapismi.

Copioso calido.] In Græco deerat θερμῶν quod est calido. Sic enim magis aperit & discutit si quæ sunt superflua.

IN VIII. CAPVT.

DISCOCTO.] Hoc est, probe coctio: quod Græci dicunt ἀπέφθον.

IN IX. CAPVT.

Tendines.

TENDinum.] Quos hic uocat tendines, considerato, an musculorum buccam mouentium, an nervos à cerebro dentium radicibus adhærentes, unde sensus ipsis communicatur. An tendines alios malis.

Exoriba-
lio.

Anisum.] Inpressi codices habent ἀνηθον, hoc est anethū, quod ipsum quoq; aluum sistit. Sed Oribasius habet anisum.

Calide.] Non calidis potentia, sed calide actu aluus sisti debet. Græce θερμῶς non θερμῶς legendum.

IN X. CAPVT.

ἀφθαι.

APHthæ.] Celsus libro secundo capite primo: Proximum est ut infantes adhuc pueros serpentina ulcera oris quæ Græci ἀφθας nominant, exerceant. Variis interim coloribus apparent,

apparent, pro humorum ea gignentium natura.

IN XIII. CAPVT.

TOmenti modo.] Græce est ἐν τρέπῳ πτύγματος. Signifi- πτύγμα.
cat autem idem πτύγμα quod πύλημα, τρέφειν εἶναι, σὺ-
τρεμμα εἶναι, hoc est, hapsus lanæ ut Celsus ait, uel circulus.

Heliotropion.] Celso herba solaris dicitur. Ab herbariis
uulgaribus nouo indito nomine, uocatur herba cancri, cum
scorpioides potius appellaretur. Sed quia scorpio incognitus
magis est à cancro appellationem traxerunt.

Cucumeris.] Cucumis statim in Pepones, & Melopepo-
nes degenerat, figura tantum & quantitate inter se dissiden-
tes: cum magnitudine excessere, pepones uocantur, cum ue-
ro rotundi, formam & effigiem mali referunt, facta ex pepo-
ne, & malo appellatione.

Pepones,
Melope-
pones.

IN XIII. CAPVT.

IAm uictus rationem præscribit ab infantia usq; ad ætatem
declinantem, quæ nõ tam ex Medicina, quàm Philosophia
petita est: quæ mos est etiam Galeno, ut non solum corpus,
sed animum quoq; curet.

Liberiore.] Græce est ἐν ἀνέσει, hoc est, cū animi remissio-
ne, à uerbo ἀνίημι, qđ est, licetia permitto, aut solute idulget.

ἐλαφρῶς.

Leuiora.] Græce quidem τροφὰς ὠντοῖς προσφέρειν ἐλα-
φρῶς, hoc est, alimēta ipsis leniter præbere, reddidi ego leui-
ora: utrum malis accipe. Hæc dixi, ne uilitigatores ullā ca-
lumniandi occasionem habeant, si uel tantillū immutauerim.

IN XVI. CAPVT.

EXercitatio.] Totum hoc caput ex secundo Galeni de sa-
nitate tuenda Galeni tuenda transcriptum est: ex quinto
uero Oribasii. in eodem uero hæc clausula aliter legitur. Græ-
cus codex Pauli impressus habet: δὲ μήτε πλῆθος ὤμων, καὶ
ἀπεπτῶν, μήτε σιτίων, μήτε χυμῶν, ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν ἢ ἐν τοῖς
ἐντέροις, hoc est: Non debet erudi, incoctiq; siue cibi, siue hu-
moris copia, aut in uentre, aut in intestinis contineri: pro-
hibetis ἐντέροις. Galenus habet ἐν τοῖς ἀγγείοις, quod est in ua-
sis: cui lectioni ego assentior. Intestina siquidem concoctio-
ni proprie dicata non sunt: deinde uentris dictione etiam ip-
sa comprehenduntur. Verum ut concoctio altera in uentre,
altera in uasis administratur: ita distributio ex intestinis pri-
ma: altera ex uasis obitur. Hæc non aduerterunt Orosius, &

Locus Pau-
li castiga-
tus.

Erratum
Orosij.

Basilienſis caſtigator. Omitto quod etiam ἐκ τῆς γαστρὸς in eodem ferè Galeni loco, Oroſcius ex ſtomacho diſtribuitur, ueteris, cū dicendum ſit ex uentre. Nam inde ſit diſtributio.

Exerci-
tatio.

Vnde manifeſto liquet.] Galenus cū libro de ſanitate tuè da, iam citato, tum maximè in commētario: περὶ εὐχυμίας, καὶ κακοχυμίας ſimillimam habet ſentētiam: ὥς περ γὰρ ἀγαθὸν μέγιστον ἐπὶ τῆς υγείας τὸ πρὸ τῶν σιτίων γυμναſιον, οὕτω βλαβερώτατον ἀπάσαι κίνησις ἐπὶ σιτίοις, ἀναδίδοται γὰρ ἐκ τῆς κοιλίας ἡ τροφή, πρὶν πεφθῆναι, καὶ κτῆδε πλῆθος ὥμων χυμῶν ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας, ἐξ ὧν εἴωθε νοσήματα παντοῖα γίνονται. μὴ φθασάντων αὐτῶν ἢ τοὶ διαφορηθῆναι πόνοις πλέουσιν, ἢ πεφθῆναι, καὶ μεταβαλεῖν εἰς αἷμα ὑπὸ τῆς κατ' ἥπαρτε καὶ φλέβας δυνάμεως. Hoc eſt, ut Græcæ linguæ ignare intelli- gant: Sicut enim exercitatio cibum præcedens plurimū con- ſeruandæ ſanitati conducit: ſic quælibet à cibo cōmotio, no- centiſſima eſt. Nam alimentum antequam ſit cōcoctum, ex uentre diſtribuitur. Vnde crudorū humorū copia in uenis col- lecta, omnigenas morborū ſpecies procreare ſolet, niſi proxi- mus labore multo fuerint diſcuſſi, uel concocti, ac in ſanguinē facultatis beneficio quæ iocinori, uenisq; inſita eſt, trāſierint.

Compen-
diū Pauli.
Caſtigatur
Paulus.

Modo factam.] Galenus addit, ſecundam, ut ſit mediocri- ter pallida concoctionem ſecundam (nempe quæ in uenis ſit) modo factam ſignificat. Omisit Paulus ſecundam, quia ex urī na iudiciū n non niſi de ſecunda concoctione ſumitur.

Accliuſ deambulatio.] Codex impreſſus uiciatus eſt, ha- bet enim καὶ οἶον ἀντις, δύναιτο pro καὶ οἱ ἀναιτες περίπατοι ex Galeno inſtauratum, unde hæc omnia tranſcripſit. Eſt au- tem accliuſ ambulation, cum quis contra montem, aut loca æditiora inambulac. Non aduertit Baſilienſis caſtigator.

Exercita-
tiones ſin-
gularum
partium.

Præterea per alias ex.] Quippe itatio, curſusq; crurū exer- citationes ſunt: acrochiri ſint, & ſciomachix, brachiorum, ac manuum propria. Lumborum autem, aſſiduè ſe inclinare, & rurfus reuocare. alteres, ſpinæ thoracis autē & pulmonis, ma- ximæ reſpirationes propriæ exercitationes ſunt.

ἐναυθές.
Caſtigatur
codex Gre-
cus impreſ-
ſus.

Donec rubefcat.] Hoc eſt dum ſanguis in extimam cutē fuerit euocatur. Id ſignar ὅθαι ἐναυθές ὑπάρχει. Hoc eſt cum floridus, uiuidusq; & rubet apparuerit.

Concinna.] Malè in Græco ῥαθυμοί, pro ἔυρωθμοι legitur. Vide Oribasium & Galenum Non aduertit Gemuſæus.

Calido

Calido uapore.] In codice Græco impresso θερμόν ad sudorem uidetur referri. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda legit θερμῶ, ut referatur ad uaporē, sicut nos conuertimus. Vterq; Aristarchus, & Orosius, & Basiliensis hæc præterierunt.

Viciatus
codex.
Orosius.

Apothepia.] Exercitationis omnis pars ultima est apothepia, ceu dicas recreatoria: nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

IN XVIII. CAPVT.

Inter frictiones.] Paulus hoc ex secundo Galeni iam dicto libro ad uerbum mutuatus est Galenus autem ex commẽtario Hippocratis, qui inscribitur κατ' ἰατρῆον, in hunc modum: ἀνάτριψις δύναται λύσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι μινυθῆσαι, ἢ σκληρῇ δῆσαι, ἢ μαλακῇ λύσαι ἢ πολλῇ μινυθῆσαι, ἢ μετρίῃ παχύναι. Hoc est, frictio potest soluere, ligare, replere, minuire. Dura ligare, mollis soluere, multa minuire.

ἀνάτριψις

IN XIX. CAPVT.

Inter uocis exer.] Hoc est ex quinto Oribasij transcriptū. Galenus huius exercitationis ferè non meminit. Est autem dictio Græca ἀναφώνησις: quæ signat exclamationem uociferationemq;: qualis in cātu editur, & lectione clara, orationeq;. Verbū ἀναφώνειν pro uoce cōtēdere interpretari potes.

ἀναφώνησις.

IN XX. CAPVT.

Ulcerosa.] Exercitationum genera persecutus, nunc ea quæ illis superuenire solent, enumerat. Sunt itaq; lassitudinis tres numero differentia, ulcerosa, tensoria, & inflammatoria, seu ut Græce dicam, φλεγμονώδης, in tertio Galeni de sanitate tuenda ad uerbum explicat.

Lassitudines.

Quo tendi uidentur.] Græce impressi codices, τήκεται, quod est liquari, consumi; habent, pro τένεσαι non tamen hoc aduerterunt Orosius & Gemusæus. In eodem capite χαλᾷται δὲ συντεταγμένον, pro χαλᾷται δὲ συντεταγμένον, quod est, sane laxatur, quod distentum est.

Negligentia Oroscij.

Oleo dulci atq; egelido,] Hoc est: Ex maturis oliuis quarum baccæ iam nigrescere inceperint, dropas appellant, confecto. Egelido, hoc est tepido, ut soli expositum fieri solet. Id Græca dictio uidetur innuere εἰληθέρης si Grammaticis credimus, qui exponunt ὑπ' ἡλίου θερμαίνεντος. id est à sole excofacto. Quid si hyems, aut frigidum alioqui tempus sit: quo sol non solet, aut certe parum nō excofacere, tūc ne etiam soli

εἰληθέρης.

Egelidum

Tepidum. erit exponendum ut incalescat. Sane friuolū esse puto quod Orosius adfert, & pro tepido tantū, & poni, ut postea in lassitudine inflammatoria legitur, ἐλαϊον τε ἐν πολὺ χλιαρόν, quod est: Oleum igitur copiosum tepidum addibendum. Verū ideo me reprehendere uidetur Orosius, q̄ egelido dixerim, putans hoc frigidum significari: male mehercules in authoribus latinis uersatus. Celsus egelidum in eodem sensu quo ego multis in locis usurpat: ut lib. 4. cap. 11. Neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Quomodo etiam Lina cer eundem locum in Galenum ante me uerit, qui antea corrigendus erat. Scio quidē apud ueteres in usu fuisse post lassitudinem uunctionem, uel in sole, uel ad ignē, si hoc pacto uolet intelligere εὐχρηστους, uerū hoc oī tēpore nō est perpetuū.

Instaura-
tur lectio
Pauli,

Vnctio.] Non est in græcis codicibus impressis: aliquot autem scripti manu habēt, & sensus exigit. Quid enim est, si referatur hæc dictio, continua, ad quietem. Multa quidem esse debet: non tamen perpetua, quod συνεχής significat. Iam Galenus ipse & Oribasius habent, ἀλειφὴ συνεχής, hoc est, unctio continua. Legendū itaq; in Paulo pro μάλιτα συνεχής, quod est maximē continua, ἀλέμματα συνεχῆ, unctiones assidua. Hoc omiseras Gemuseus, qui mauis curta omnia & mutila aliquādo in Paulo legi, quā dictione una, aut altera ex Galeno, unde hæc transcripsit, sententiæ autoris adiuncta: utrum maius sit peccatum, alij iudicent.

Gemu-
seus.

Apothepiæ exercitationem. Quæ tum ip̄ motu, tum frictione, & pauca, & mollis, & tarda sit: præterea solum similiter calidum. Protinus autem in lauacra frigida exiliant, ut nimirum ipsis robur, in cute una cum calore constet, quē admodum ait Galenus lib. 3. de sanitate tuenda. Lege in codice græco, ἐν τοῖς λέτροις ἐκ τῆς, &c.

Corrigitur
textus.

Boni succi.] In codicibus impressis perperā habetur εὐαὺς pro εὐχυμῆ. Gemuseus omisit & hoc & superius.

IN XXI. CAPVT.

Strictio.] Galenus lib. 3. de sanitate uenda inquit: Voco ita meatuum cutis uitium, quo superuacua transmittere prohibetur. ἀέγνωσις græcis appellatur.

ἀέγνωσις
quid.
Acopum
ex popu-
lo nigra.

Oleumq; ex.] Hoc Oribasius debet Is enim lib. 5. ad uerbum ex Galeno prius mutuatus erat. Verum in hoc dissentit, Paulus habet αἰγέρινον ἐλαϊον, hoc est, oleum ex populo nigra

nigra cōfectum, Oribasius ἀκοπον ἀγέρινον. Galenus acopon ex abietis semine, τὸ διὰ τῆ σπέρματος τῆς ἐλάτης ἀκοπον. Habes apud Paulum lib. 7. acopon ex abiete, acopon ex populo nigra, & oleum ex eadem populo, omnia eiusdem facultatis Nam loco fructus abietis, nigrae populi fructus æqua portio, apud eundem autorem ponitur.

IN XXII. CAPVT.

Hoc capite de lassitudinibus agit, quæ citra exercitationē aut motum corporis sua sponte, nempe ex humorum superfluorū copia accedunt. Galenus eas lib. 4. de sanitate tuenda persequitur amplissime,

Si his peractis.] Hoc est : Si omnibus commemoratis præsidis malum cesserit, ad consueta munia paulatim transcundum est. In Paulo deprauata est lectio græca, habetur. n. πρὸς τὰ συνήθη κατὰ λόγον, pro πρὸς τὰ συνήθη κατ' ὀλίγον, quod corrector Basiliensis omisit. Linacer rursus, conuertit.

Corrigitur
textus.

Si enim vires cōstent.] Quod est, cum sanguinis plus, succi uero mali minus in corpore redūdat. nam in sanguine vires naturales deprehenduntur. Si igitur paululum uel citra sanguinem restitutum uel ultra, processum est, audacter mittendus est. Si plurimum nequaquam.

Quando
mittendus
sanguis.

At si crudi humores.] Hi enim in iecore, & uentre manētes, temporis spacio paulatim cōcoquantur, efficiunturq; benigni. eoq; seruari debent, qui tales humores collegerunt, in omni quiete, præcordiis probe fomētorum præsidio munitis, non aut sanguis debet eis detrahi, qm̄ uiriū robur his non adest ut Galenus ait in θεραπευτικῶν περὶ φλεβοτομίας in hanc sententiam ἡ δὲ γὰρ ὅποτε πλῆθος ὁμῶν χυμῶν ἡθροισαὶ τοιᾶτον, ὥς κελεύεται φλεβοτομεῖν ὁ λόγος ἐλέγχεται. ὁ ὥμῃ γὰρ τῆτοις & δυνάμεις ἐπάγει. Præterea purgatio his dari non debet, quia concocta. non cruda medicamentis sollicitare oportet.

Galenī sen-
tentia,

Oxymel.] Intellige simplex. Id enim cum ætatibus, tum naturis uniuersis, ut ait Galenus, & præcipue pituitosis ad sanitatis securitatē seruit utilissime, dum omnes meatus artios aperit, ut nusquā crassus, uel glutinosus humor adhærescat.

Crudis ul-
riū robur
deest.

Oximell-
tis facul-
tas.

Apomeli.] Fit hoc melle à fauis expressio, & aqua fontana. Verum non simpliciter ex melle & aqua, ut putat Orosius. uide Galenū lib. 4 de sanitate tuenda, & Paulum lib. 7.

Erratum
Orosij.

Seneſtus.] Ex quinto Oribasij. quintoq; Galeni de ſanita-
te tuenda. In Paulo autem Græcus codex impreſſus depra-
uatus eſt habet enim ἐπαιρόθωσις δ' αὐτῆ δια τῶν θερμαίνον-
των τε καὶ ὑγρυνόντων ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι, hoc eſt: Corrigi-
tur autem ea calefacientibus, & humectantibus una cum ca-
lefacientibus Superfluum eſt ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι. Oroſcius
& Gemuſæus non aduerterunt.

Erratum
Oroſcij.

Fricſio.] Cū oleo ſcilicet adhibita, quæ uitale robur exci-
tat, & modice calefacit, unde & diſtributio nutrimenti facili-
& nutritio promptior conſequitur.

ωμογέ-
ροντες.
Viridis ſe-
neſtus.

Imbecilliores.] Vt qui decrepita potiffimum ætate ſunt:
etſi alij alijs celerius ſeneſtutis incōmoda experiantur Qui-
cunq; igitur uel crudi adhuc ſenes, quos græci ωμογέροντας
appellant, uel decrepiti, imbecilliores uiribus exiſtunt natu-
ralibus, ter die cibum aſſument, idq; hanc ob cauſam potiffi-
mum: nempe q̃ una uice multum aſſumere nequeunt. Dein-
de, etiam ſi ſumant, concoquere nequeunt, quare melius eſt
cibum partiri in tres uices.

Ficum.

Ac fici maturæ.] Hæ paulo inno centiores, immaturis: me-
diocriter tamen in uſum adhibita. Ante cibum alium aſſumi
debent, eo quod ſi non citò per aluum deſcendāt, corruptio-
nem in uētriculo ſubeunt, & alios ſecum cibos corrumpunt,
id quod de omnibus fructibus fugacibus intelligendum eſt.

Per hyemem uero carica.] Hæ incidendi, extenuandique
uim habent, quo nomine aluum citant, reneſq; expurgant.
Cum nucibus uerò ſimul cōmeſtæ ad omnia præſtātiores exi-
ſtunt, atq; hinc nonnulli qui medicamentorū aduerſus leth-
alia cōfecturas perſcripſerunt, ficus aridas cum nucibus, & ru-
ta præſumptas omniū illorū præſens eſſe remediū tradunt.

Si nullū in dextra.] Galenus libello περὶ εὐχυμίας καὶ κα-
κοχυμίας inquit: περὶ ἰσχυάδων δὲ δόξειεν ἄν τις ἐναντία λέγων
ἀληθεύειν, εἰ κακοχύμους γε ἀμὰ καὶ εὐχύμους αὐτὰς ἐπὶ νροσῶδες
τε καὶ ὑγιεινὸν ἐχούσας. εἰ μὴ γὰρ αὐταὶ διεξέρχονται κατὰ τὴν
κατ' ἐξά, καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν ἀναδοθεῖσα τροφή, διὰ τὴν δέξμα-
τος, καὶ τῶν νεφρῶν ὑγιειναί τε εἰσὶ καὶ εὐχυμαι, βραδύνουσαι δὲ
κακοχυμότεραι πῶς γίνονται. Id eſt: De caricis autem, ſi quis
contraria pronunciet, uere dicere cenſeri queat, nempe bono
maloq; eſſe præditas: morbidī cuiuſdam & ſalubris particeps.
Si nanq;

Si nanq; per alium descendant, ac alimentū quod ab eis pro-
uenit, in corpus distributum, iecur renesq; transierit, salubres
sunt, & succi benignioris: sin remorentur, prauioris quodam-
modo fiunt: In textu hoc Galeni habes *διάτετ' δ' ἐξ ἡπατος*,
quod est, per cutem, male pro *διάτετ' ἡπατος*. Hoc in codi-
ce nuper impresso Gemusæus castigator præterijt.

Ante cibum.] Alus subducendæ gratia: quæ etiam oliuis,
ut Galenus in commentario de alimentis docet, & damasce-
nis sollicitatur.

IN XXVI. CAPVT.

Q Vandoquidem uero.] Ex quinto Oribasij sumptum
est Græcus textus deprauatus in Paulo est, pro *ἐπει-
δὴ δ' ἐδεικται* legi debet *ἐπειδὴ δ' ἐδ' ἡ π' ἐξ*, &c. quod anno-
tauit Orosius. Verum in hoc grauissimè peccat, dum alios
reprehendit quod *τρίμματα* uerterit frictione, cum Galenus,
Paulus & Oribasius semper dictionem *τρίψιν* & *ἀνάτρίψιν*,
pro frictione usurparint *τρίμματα* uero apud grāmaticos, Sui-
dam, Hesichium, Budæumq; nostrum pro detrimento accipi-
tur, ueluti cum lapides atteruntur, aliàs aliæ res minutissime
deteruntur. Quid hic commodius erit quàm puluis? qui ex
medicamentis contritis effectus sit, & corpori admotus in bal-
neo. Addidi hic, aquæ indito, ad sensum explendum Præterea
errat Orosius, qui *λουόμενος*, id est, dū lauatur, uerterit, post
balneum, cum eiusmodi smegmata in balneo soleant adhi-
beri. Sed frictionem intelligit: quanquam ipse textus sequēs
eum admoueat. Nam à balneo acopi usum præstabit: in bal-
neo, aliorū erit. Reliquit textū uitiosum corrector Basilien-
sis.

Summatq; propoma.] Vfus sum dictione græca quod ferè
nulla apud latinos extet, quæ ad unguem eam referre possit.
Græci autem uocant *προπόματα* quæ ex uino fiunt, & melle
dispumato. Nā Paul. lib. 7. inqt: *ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν ἐξ οἴνου συντε-
θέντα, & δὴ καὶ προπόματα καλεῖται, τὸ μέλιτος ἀπαφρισθέντος
ἐξ ἀλαμβάνει πρὸς τέσσαρας τὸ οἶνον, καὶ συντίθεται μὴ ἐφόμενα*

IN XXVII. CAPVT.

C Orpus decoloratum.] Vita letior, citra curas, & melācho-
liam actiones naturales non habet impeditas, unde san-
guis primū coqui, deinde toti corpori distribui potest. Græce
est *βίος εὐφροσύνης*, hoc est, uita læta, & iucūda: *προσκυνή βρω-
σις* est *προσφιλής*, quod signat chara, grataq; commestio.

Pastillos.

Textus
Galenii
uiciatus.

Corrigitur
Pauli le-
ctio.
Erratum
Orosij.
τρίμματα.

Erratum
Orosij.

Propo-
mata.

*βίος εὐ-
φροσύνης.
προσκυνή
βρωσις.*

κόλλικες.

Pastillos.] Græca dictio est κόλλικας, à nullo ferè grammatico exposita. Galenus autem ex Hippocrate interpretatus est τροχίσκος, quod hic optimè quadrat. Magni alioqui uiri in hac uoce decepti sunt, qui pro glutinâtibus quibusdam rebus usurparint.

Corrigitur
codex.

IN XXIX. CAPVT.

Mel coctum.] Exemplaria græca deprauata sunt, habent enim καὶ μέλι ἐφθόν τὸ σκληρὸν ἄγαν, pro τὸ σκληρὸν ἄγαν εἶναι, hoc est, quod durū nimis sit: causam addit, cur mel coctum dentibus noceat.

IN XXXI. CAPVT.

In superiore uentre.] Ex quinto Oribasij transcriptum est, ἂν ω uerti in superiore uentre, in quo fit concoctio. In eo si diutius immorentur, perficacia sunt & dura.

Germani
ca impres-
sio.

Ventos contrarios.] Nihil oculis magis incōmodat quàm uentus contrarius, eoq; miror, cur Germanicus corrector mutauerit ἐναντίους, hoc est contrarios in ἐναιτίες, quasi dicas causæ authores.

IN XXXII. CAPVT.

Purimum noxæ ciborum.] Similem habet sententiā Galenus in commentario Aphorismorum primo: ὅταν γὰρ ἐπεπληρώθῃ τὰ ἀγγεία ποτῶν ἢ σιτίων τῇ διαρρέαγῃ κίνδυνος αὐτοῖς, ἢ καταπνεγῇ ἢ καὶ σβεσθῇ τὸ ἐμφυτον αὐτῷ θερμὸν καὶ ἀπώλλοντότινες. Hoc est. Cum enim uasa potu, aut cibo repleta supra modum fuerint, periculum ne ea rumpuntur, aut ipsi suffocantur aut etiam calidum natuum ipsum extinguant.

Vomitu igitur.] Post uomitum autem os colluendū, dentes, oculosq; & totam faciem postea præcepit Oribasius. Id nisi fiat, dentes eis qui uomunt, computrescere. Sollicitari autem uomitus debet aqua tepida statim assumpta.

πληώρα.
πλήθος.
πλησμονή.
νή.

At si neq; descenderit.] Signa repletionis uenarum commemorat. At sanguinis redundantia proprie πληώρα græcis dicitur. πλήτος pro omnium humorum separatim plenitudine accipitur. πλησμονή pro repletionem tum potus, tum cibi, & uentris & uenarum usurpatur.

IN XXXIII. CAPVT.

Cibus in uentre. Hoc sumptum est ex sexto Galeni de sanitate tuenda. Fit autem sæpe, ut cibi corrumpantur, aut
nimia

nimia copia ingesti, aut qualitate praua donati, aut tempore in commodo assumpti, aut ipsius uentriculi affecti uitio. Quo autem corrupta educantur, Galenus ample docet. Inter cætera uomitum cõmendat ex uini dulcis potu. Sed Pauli textus impressus in omnibus exemplaribus deprauatus est, habet. n. *δι' οίνου πόσεως καὶ γλυκέως, pro δι' οἴνου πόσεως γλυκέως.*

Corrigitur
textus
Pauli.

Quæ mediocriter purgant.] Sunt enim quædam medicamenta, quæ admodum grauitè, & magno cum naturæ detrimento purgant. Itaq; mediocria hic præcipit, quæ sæpius per interualla sumi possint: qualis est picra dia aloes, cuius compositionem habes in septimo descriptam.

IN XXXV. CAPVT.

Veneris hæc sunt commoda. Ex Oribasij lib. i. hæc sunt transcripta. Ante commoda autè docet, quibus uenus noceat: tum partibus corporis, tum temperaturis. Noxia itaq; uenus est inquit, pectori, pulmonibus, capiti, & neruis: itè siccis natura, & frigidis. Caueri etiã debet post repletionem, cū cibi, tum uini, item post euacuationem ex uomitu factā: purgationem, & si uenter sua sponte fuerit solutus. Præterea si cibus nondum sit concoctus, aut si ægritudo quædam infestat.

Eoq; melancholicis.] Vide Aristotelem in problematum sectione 4. ad finem, nimirum q̃ statu redundant. Semen autem decessio flatus existit. Sed quid de insanientibus dicemus, an & illi flatus habent? Ego sane opinor uenerem insanientibus conuenire, quod seminis qualitas quæ uirilitatem & ut dicā græce θυμὸν homini cõciliat, si in corporibus aliqui temperamento calidis, copiosior impertiatur, ex θυμῷ solet μανία fieri. Semine autem excreto, animus ille remittitur & qualitas imminuitur. Galen. optimè de ueneris usu scribit in cõmentario qui inscribitur, ἱατρικὴ τέχνη, uerba ipsius in hunc modum habet: ἀφροδισίων δὲ κατὰ μὲν ἐπίκουρον ἔδε-
μία χρῆσις ὑγιεινὴ κατὰ δὲ τὸ ἀληθές, ἐκ διαλειμμάτων τηλικύτων ὥς ἐπὶ ταῖς χρήσεσι, μήτε ἐκ λήσεως αἰσθάνεσθαι, καὶ κηφότερον αὐτὸν ἑαυτῷ δοκεῖν γεγονέναι, καὶ εὐπνότερον. ὃ δὲ καιρὸς τῆς χρήσεως, ὅταν ἀκριβῶς μέσον ἢ τῶν ἐξωθεν περιστάσεων ἀπα-
σῶν τὸ σῶμα μὴ ὑπερπεληρώμενον, μὴ ἐνδύς, μὴ ὑπερφυμένον, μὴ ὑπερθερμασμένον, ἢ ἐξηρασμένον, ἢ ὑγρασμένον ἀμέ-
τρως. i. Rei ueneris Æm Epicurū sane nullus ad sanitatē usus est. Sin aut̃ uerū fateri uelim⁹, cõducit, si tāto t̃pis interuallo

Venus cor-
pus inte-
grum re-
quirit,

excr-

exerceatur, ut ex ipsius usu nec resolutionem corpus sentiat, & leuius quàm fuit euasissè, perspiratiusq; uideatur. Tempus autem coeundi est, cum ex omnibus quæ foris accidunt medium exacte corpus obtinuerit, neq; uidelicet repletum nimis sit, neq; inane, neq; refrigeratum impendio, neq; excalfactum: neq; siccatum, neq; humectatum immodicè.

Cæterum alij etiam.] Duæ dictiones contrariæ in græco ponuntur, nempe *δυσιτότεροι*, & *ἄσιτοι*, quanquam improprie si Galeno credimus, *ἄσιτοι* ponitur pro ijs qui fastidio laborant. Nam id *ἄπύσιτοι* significat, ut superius annotatum est. Sed positum est opinor, ut *ἄσπλάγνος*, hoc est, sine uisceribus, pro eo qui parua uiscera habet, *ἔυσιτος*, hoc est, uoce carens, pro illo, qui paruam uocem edit, *ἔυσιτος* cibi appetens. Superius nempe capite primo positum uidetur pro *ἔυσίτης ποιῶν*, hoc est, cibi cupidos faciens. Nam *ἔυσιτοι δὲ καὶ οἱ πόνοι. καὶ αἱ μακροτέραι ἀποδημίαι*. Id est: Iam uero & labores, & longiores profectioes cibi appetentiam faciunt. Verum alius *ἔυσιτοι* legendum putat.

ἔυσιτοι.
ἄσιτοι.

Celsus.

At uehemens.] Celsus eleganter libro primo hanc sententiam ex græcis confirmat his uerbis. Concubitus uero, neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis scire licet, eum nō inutile esse, quæ corporis neq; languor, neq; dolor sequitur.

Contrario
sententiæ.

Antequam somnus inuadat.] Ex Oribasio hæc particula sumpta est: & uideri possit Galeno contraria. Is enim libro primo de sanitate tuenda ex Hippocratis sententia hunc ordinē obseruat. Labor, cibus, potus, somnus, uenus, & hæc omnia mediocria. Paulus ante somnum uenerem ineundam censeat, redditq; rationem non certè inualidam. Sed intelligendū est, secundum cibum, non statim, sed concoctione obita: nihil etiam refert, si somnus aliquis breuior præcesserit: sequatur prolixior: ex quo uires recolligentur.

Varia le-
ctio.
Gemuseus

Frigus superueniens.] Bifariam legitur in græcis exemplaribus, Germanicum habet *καὶ ψύξις αἰ ἐπεγόμεναι*, hoc est, frigus urgens, aut ualens. Alia habent *ἐπιγιγνόμεναι*, quasi dica superueniens. Ita quoque Oribasius habet. Nescio cur Gemuseus mutauerit.

In

IN XXVIII. CAPVT.

CApite grauantur & anxij fiunt.] Hoc caput ex Oribasij libro primo transcriptum est. Vbi etiam græce habetur, καὶ ἀσώδεις γίνονται, quod est, & anxij fiunt, conflictanturq;. Oroscius alios reprehendens ex Marcelli Florentini Dioscoridis interpretis sententia uertendum censet ἀσώδεις ex repletione cibum fastidientes. At Galenus in commentario libri secundi προρρητικῶν Hippocratis hoc modo interpretatur, διττῶς γὰρ γινόμενων ἀσώδων τῶν καμόντων, ἓνα μὲν τρόπον, ὅταν ἡ δύναμις ὑπὸ σώματος βαρύνεται καὶ μηδὲν φέρειν σχῆμα ξάδως. ἕτερον δὲ ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ μοχθηρῶν δάκνεται χυμῶν. οἱ πρότεροι μὲν ὀλεθρίως διάκεινται, ναυτιώδεις δ' εἰσὶν οἱ δεύτεροι. Id est: Cum bifariam ægtotantes fiât ἀσώδεις, uno quidem modo, quum uirtus à corpore grauat, nullamq; eius figuram ex facili tolerat, altero autem cum os uentriculi à uitiosis humoribus mordetur, priores quidē affecti sunt perniciosè: alteri uerò nauseabundi existūt, &c. Hoc itaq; Pauli contextu prior significatio accipienda est: nō secunda, quādoquidem uirtus seminis copia multum grauat, Deductum autem ἀσώδεις est ab ἀσχη: quæ dictio frequens est apud Galenum & Hippocratem, primum δυσφορίαν, signans: deinde fastidium acribus humoribus stomachum rodētibus excitatum, unde & uomitus ἀσώδεις dicitur. Nolo hic cōmemorare, quā multi etiā celebres uiri in eius interpretatione sint decepti. Legendum est ἀσώδης, non ὡσώδης, quod etiam ἀσόμενος dicitur.

ἀσώδης.
Mippocrates.

Duplex significatus
dictionis.
ἀσώδης.

ἀσχη quid

Aliorum.] In codicibus græcis impressis habetur ἀλῶν, hoc est, sale, pro ἄλλων, quod est, aliorum, quam lectionem & sensus, & Galenus in sexto de sanitate tuenda approbat. Nos antea quoq; aduertimus.

ἀσόμενος.
Lectio castigata.

Semen uiticis.] Græcus codex habet καὶ σπέρμα τῆς λίνης: hoc est & semen lini, pro σπέρμα τῆς ἄγνης, quod est semen uiticis. Sic etiam habet Oribasius. Irem superius iam fecerat Paulus mentionem seminis lini. Hoc non aduerterūt Oroscius & Gemusæus.

Lectio deprauata.
Erratum
Oroscij & Gemusæi.

IN XXXIX. CAPVT.

Piper myrrham cum dulci.] Calida perfrictionem expertis præscribit: quæ nimirum habitum ipsorum restituât. Nescio autem cur Oroscius legendum hic censeat cum uino albo,

Oroscius
falso emendat.

albo, cum nullum eius generis calidum sit, nec odorum, quale Paulus requirit. Melior itaq; lectio cum uino dulci, quale est fuluum, frigidis aut temperamento, aut ex accidenti accommodatissimum, si Galeno credimus, & ipsi euidentiæ.

IN XL CAPVT.

ἔγκυσες.
quid.
Celsus.

Lectio e-
mendata.
ἀθρόως.

SI qui uero.] Græce est ἔγκυσες, quod ad uerbum sonat adustio uel exustio. Galenus lib secundo κατὰ τόπους: propriè dici affirmat, de ijs qui exuruntur in sole. Celsus: Si quis in sole exustus est, huic corpus & caput oleo perfundendum. Paulatim.] In impresso est κατὰ λόγον, quod est secundum rationem, pro κατ' ὀλίγον, id est palatim, cuius cōtrarium sequitur ἀθρόως, quod idem significat quod uniuersim, subito ac una uice.

IN XLI. CAPVT.

Celsus.
Cibi ualen-
tis materia
τρέφιμα.
Celsus.
Instantata
lectio.

Cibos ualentis materiæ.] Ex quinto Oribasij traducta sunt: uoco autem cibos ualentis materiæ, quæ probe & multum nutriunt: ut Celsus alia ualentis, alia inediæ, alia imbecillæ materiæ, libro secundo commemorat: uocatq; ualentissimū, in quo plurimū alimenti est. Græci uocant τρέφιμα.

Et ijs quidem obl.] Græcus codex deprauatus est, habet enim καίροντι μὴδ' ἐπὶ τῇτοις. Id est, oblectetur, neq; ob hæc pro καίροντι δ' ἐπὶ τούτοις omiſſa negatione μὴ. Sic legit Oribasius, quod etiā Oroscius annotauit: s: d Gemuseus omisit.

IN XLII. CAPVT.

Vomitus
quot mo-
dis excite-
tur.

Empirici
nostræ æta-
tis.

Quoniam laboriosè uomentibus.] Hoc caput ex primo Oribasij sumptum est. Vomitum primum uicius ratione excitatur: deinde medicamentis, &c. Victus ratione excitato utuntur etiam in secunda quoq; ualitudine: præterea in acutis fere morbis, quum bilis, aut pituita in stomacho superat. Medicamentis uomitum facientibus, neq; sani, neq; acuta egritudine occupati utuntur. Nam ea longis tantum affectibus, & induratis conueniunt. Hinc etiam ueteres cū nihil in medicina spei deprehendissent, ad uomitum solebant confugere. Id quod hodie etiam empirici quidam sine ulla ratione faciunt, optimis quibusq; medicis laudem præripiunt. Nam ea medicamenta propinant, quæ suprà & infrà ualentissimè purgent: quæ si æger ferre possit, sanitati plurimum restituitur: sin autem moritur, audaciæ suæ & temeritatis patrociniū habent, q̄ scilicet morbus fuerit desperatus, tot me-

tot medicis antea curationem frustra molitis. Ceterū quando potissimum uomitus sollicitari debeat, Polybus in libello de uictu priuatorum docet. Sex mensibus hybernis inquies, uomitu, æstate clysteriis utendum est. Quia enim per hyemē pituita in uentre generatur, uomitu eam euacuari præcipit: æstate uero bilem supernatantē, deorsum reuellere. Quæ sententia Hippocrati contraria in Aphorismis uideri queat: ubi haber: Aestate superiora magis, hyeme inferiora medicamentis sollicitare oportet. Hic dicemus ex sententia Galeni, totū corpus si purgare uolueris, æstate per superiorem uentrē, hyeme per inferiorem medicandum est. Sicut in Aphorismis dictum inuenimus. Etenim redundantibus, purgatio medetur, illuc quod uergunt adhibita. At si ab incremento humores in parte aliqua prohibere uolueris, per opposita reuellere conducit. Melancholicus autem humor quocunq; in loco fuerit, per inferiora educi debet. Ceterum alii singulis mensibus bis uomunt: alii per longiora interualla: alii nullo tēpore præscripto, sed quoties aut uino, aut cibo pleniore se ingurgitarint. Qui aut uomere bis in mēse uult, inquit Polybus, & post eū Celsus, melius cōsulet, si biduo continuerit, q̄ si post quintumdecimum diem uomuerit. Galenus aut nihil referre dicit, si ex interuallo nō cōtinuatis diebus uomas. Porro uomitus, quō medicamenti excite, septimo libro est cōprehensum.

Ferculum ex fabis,] Græce hoc uocatur ἑτνος. Galenus interpretatur libello de euchymia his uerbis. ἑτνος οἶνομάζου τὸ ἐκ τῶν ἐρεχθέντων ὀσπρίων καὶ χειρόπων σκδαζόμενον, &c. Verū quod sequitur in codice καὶ τὰ πλείονα τῶν κρεῶν, hoc est, & pinguiore carnes, ubi legendum εἶσο καὶ τὰ πλείονα τῶν κρεῶν, quod est, & copiosiores carnes, scilicet fabarum. Nam ex leguminibus hæc commemorat Paulus. Non sum autem ignarus, pinguiore carnes, ut est suilla aliorumq; animalium uomitum posse excitare. Verū Oribasius nobiscum sentit & contextus requirit.

Verū non solum.] Hoc quoq; superiorem lectionē confirmat. Nam χύλοι hoc est, succi seu cremores non de carnibus animalium dicitur, si quid iudico, sed de leguminibus aqua maceratis: aut de herbis, si mentio earum fuisset facta. Dixi autem cremores. secutus Varronem & Celsū, qui uocant cremorem ptisanæ, aliorumq; granorum, ac leguminum.

Irrites.

Polybus: Quando uomitu utendum.

Collatio sententiarum.

Quomodo totum corpus purgari debet, & quō pars corporis, Humores ne crescāt per opposita reuelli di.

Quando uomendum.

ἑτνος.

Neglexis Oroscius.

Chyli leguminum.

Irrites.] Parum absolute dixit irrites, digitis eo perunctis: intellige & in os demissis.

Instanta
lectio.

Ne cesset uel intermittat.] Manca uidetur sententia græca: ἐμετικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ἀνέναι καὶ διαλάπειν ἐπὶ τοῖς ἐμέτοις, quod est: Eum qui uomere debet, non oportet cessare, nec intermittere. Quid hoc est, nisi ponatur aliquid, quod terminum eius signet? Nam hoc pacto perpetuus, uomitus, aut simile quippiam intelligi possit, quod quàm sit absurdum, omnes eruditi norunt, addendum ergo in codice græco ἀχρεὶς ἀν᾽ ἅπαντα λαπεῖντα ἐκβαλεῖ. Donec oīa quæ infestāt, eiecerit. Ut est in Oribasio, quod Orosius & Gemusæus præterierūt.

Orosius

& Gemu-

seus nimis

in aliorum

erratis oc-

cupati.

Epithymi-

dosis: non

animaduer-

sa ab Oro-

scio.

Varietates

clysterum.

IN XLIII. CAPVT.

MAne epithymi drachmam.] Nusquam inuenio minus epithymi pondus ad aluum ducendā. Alii drachmas tres propinant, alii quatuor, alii quinque. Nec opinor drachmam unam quippiam proficere, eoq; mendum forte est. Item Paulus in septimo drachmas quinque præbet. Auicenna usque ad quatuor.

IN XLIII. CAPVT.

Clysteribus utendum.] Quemadmodum balneorum præfecti, lapidum sordes, lutumq; abluunt, ita clysteres uentriculi & intestinorum pituitam & bilem detergent, qui humoris diuersitate etiam uariari solent: alii præterea lenes, alii acres habentur. Item triplici liquoris mensura constant. Sūma est, tres hemine, media, due, minima, una. Si Oribasio credimus, eoq; miror Paulum hic semiheminā ponere, quod ferè apud nos dimidia libra est: quæ parum adeo euacuabit.

IN XLV. CAPVT.

VTimur etiam gland.] Et hoc & superius caput ex primo Oribasii transcriptum est. In calce habetur græce παρῆσεις αὐτῶν quasi remissionibus, aut relaxationibus, uel resolutionibus. Sed παρῆσεις & παράλυσες, ita differunt, q̃ illa partem aliquam corporis obsidet: hæc uero totum corpus. Dicuntur etiam παρῆστοι resoluti in aliquo membro.

παρῆσεις.

παράλυ-

σεις.

παρῆστοι.

IN XLVI. CAPVT.

Hvmores in capite.] De medicamentis agit quæ materiā ex capite tum per os, tum per nares detrahunt, ac potius detrahendi modum præscribit. Ac primum Græco uocabulo ἀποφλέγματισμός appellat. Scribonius compositione nona

ἀποφλεγ-

ματισ-

μός.

exponit

exponit his uerbis: Si per os magis detrudere materiã uisum fuerit, suadebimus pyrethri radiculam commanducare: atque subinde hiantem pati fluere saliuam, Celsus etiam lib. 4. cap. 2. explicat: Gargarizare his, quæ saliuam mouent, inquit: Nam aut manduntur ea medicamenta, aut in gargarismata adhibentur. Rectè igitur interpretabimur, & Latine ἀποφλεγματίζειν, saliuam mouere. Alterum medicamentum quod per nares caput purgat, ἐξέριον uocatur. Solet enim hoc per cornu, quod ξινερχύτης dicitur, naribus infundi. Ibi paulisper commoratur, materiam è capite detrahit. Tertium ab illitu διαχειριστὸν nuncupatur, quod palato, collumellæ, & narium foraminibus applicatur. Verùm hoc in uniuersum intelligi debet, nullum ex comprehensis modo medicamentis esse adhibendum, nisi toto prius corpore purgato.

Materiam
per os de-
trahere.

Saliuam
mouere.

ἐξέριον.

διαχει-
ριστὸν.

Sapa.] Græci hoc uocant σίραιον, & ἔφημα. Galenus lib. 3. κατὰ γίνη. cap. 11. οὐκ εἶναι τῶν τροχίσκων ἢ κυκλίσκων, ἢ ὅπως ἀνὸνμάζειν ἐθέλοι τις, ὧν εἰς ἐπὶ καὶ ὁ πολυέστερος δὲ ἔφηματος ἢ σιράϊος. καὶ γὰρ καὶ τὸ το καλεῖν ὡς αὐτὸς βαλνῆς ἐξέ-
τασσοι, &c. Solutio igitur uno pastillotum aut orbiculorū, aut quomodocūq; uocare libet, è quorum numero etiam est qui Polyidæ ascribitur, ex sapa, quā Græci ἔφημα uel σίραιον, uel Sapa. quomodocūq; hanc quoq; uelis, appellant Est autem seræū uel hepsēma, uel sapa, ingenij non naturæ opus, musto ad tertiam usq; partem mensuræ decocto. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutū uocamus. Hæc Plinius lib. 14. cap. 9. Idē Defrutum. lib. 23. cap. 2. Vino cognata res sapa est: musto decocto, donec tertia pars superlit. His consentit Leontinus agriculturæ Leontinus. scriptor Græcus, in hunc modum inquit: τλεύκας καλλι-
τουξέτας ἢ, οἶνον καλλιτουξέτας ῥ. ἐπὶ τρίτης ἐφῶν καὶ ἀπαφρί-
ζων, ἐξαίρετον ποιήσεις, Hoc est: musti optimi sextarios octo, uini nobilissimi sextarios centum, ad tertiam coquens, despu-
mansq; eximiam sapam conficies. Columella refert quosdam partem quartam eius musti quod in uasa plumbea coniecerunt, nonnullos tertiam decoquere. Verum id ex aliorum sen-
tentia recenset. His accidit aliud sapa nomen Latinum, Ca- Calenum. lenum scilicet, quod deprauatum est in Palladio, mutatumq; in Caroenum, quod uir quidā non mediocriter in literis uersatus putat ex Palladij seculo manasse. apud ueteres tū Græcos, tum Latinos in usu nō fuisse. Verum rem penitus intro-
P A V L I Æ G I N. X spicienti

Voces con-
funduntur.

spicienti Calenum apud Strabonem urbs est Cāpaniæ, in cuius agro uinum optimū & dulce nascitur. Plin. lib. 14. cap. 16. ijs præponi solebāt Calena, Legendū itaq; cēseo apud Palladium: Modus his & uirtutē mutabit, & nomina. Nam defrutum à deferuendo dictū, ubi ad spissitudinem ualde despumauerit, effectum est: Calenum, cum tertia perditā, duæ partes remāscrint: sapa, ubi ad tertias redacta descenderit &c. Quē admodū igitur σίσαλον ἔφημα, & ἔφητον apud Hippocratē inter se cōfundūtur, ita apud Latinos sapa, & defrutū Cū ipse Columella lib. 12. scribat, mustū quādo dulcissimi saporis decoquit ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, defrutū uocāt.

Quod autem ori illinitur tale est: sapo.] Hoc sumptum est ex lib. 2. de Cōpositione medicamentorum secundum locos ad calcē: uerba ita sonant: ἄλλο διαχριστόν τόματος, σάπωνα διές τεύτλου χυλῶ χρίσων, τὰ κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸν κίονα τῆς τόματος, τὸ δ' αὐτό τῆτο καὶ ἔρξινον ἔτιν. i. aliud qđ ori illinitur. Saponem betæ succo dilutum palati regionibus & columellæ illinito. Idem uero hoc etiam per nares infunditur, &c. Deinde sequitur paulo post, εὐπορίτω δὲ πολλάκις ἐχρησάμεν φαρμάκῳ ἐγχεομένῳ τῇ ρινὶ μελαιδίῳ, ποτὲ μὲν ὀξεί θριμῇ διαβρέχων πρὸ μιᾶς ἡμέρας, ἄτὰ τῇ ὑπεραιῳ σὺν ὀξεί πάλιν λείων, καὶ ἐγχεῶν εἰς τὴν ρίνα διὰ τῶν μυκτῆρων. Hoc est, facili autem paratu subinde usus sum medicamento melanthio, quod naribus infunditur, interim sane aceto acri pridie macerans, deinde postero die ex aceto rursus læuigans, infundensq; narium foraminibus, &c. Ex priore igitur cōtextu Galeni, Pauli lectio corrigenda uenit, legendumq; pro σίμητι, qđ est sinapi, σάπων, hoc est sapo. Cui lectioni alipulatur etiam Oribasius lib. 1. Est autem teste Plinio Sapo gallorum inuentum rutilandis capillis, ex seuo & cinere, liquidus & spissus. Hoc non aduertit Orosius, iam seuerus aliorum castigator.

Lectio cor-
rigitur.

Hoc non
aduertit
Orosius.

IN XLVII. CAPVT.

Q Væcunq; urinæ ciendæ sunt.] Omnia ex Oribasio pene descripta sunt, nisi quod post rutam, addit Oribasius, aut anethi radices ustæ, aut cinis earum cum melle. Cæterum quibus de causis menses retineantur interim, tertio libro abunde condiscas.

Vulvæ subijciuntur.] Græci uocant medicamenta propriè, quæ lana excepta naturalibus cōdūtur, πρόσδετα, quales sunt

sunt possi dicti, aut penicilla, collyriaq., ut apud Aristotelem in 2. de generatione: τὰς δὲ γυναῖκας βασανίζουσι τοῖς τε προ-
 δέτοις, εἰ δὲ δύνανται αἰδομαι πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ διέρχεται κα-
 τ' αὐτὴν: καὶ τοῖς ἐγγύστοις. Hoc est, mulieres autem ijs quæ
 uulvæ insinuantur, explorant, num odores ad spiritum qui fo-
 ris aduenit, ab infernis partibus sursum perueniant: item ijs
 quæ illinuntur, &c. quod Hippocrates ex suffitu aromatum
 ad nares & os delato cognosci tradit. Cæterum προδέτα ue-
 niunt à uerbo προτίθεσθαι, quod priuatim signat, subiici natu-
 ralibus mulierum. Dioscorides lib. 1. cap. 1. προτιθέσθαι δὲ ὡς
 κολλύριον μετὰ μέλιτος, ἔμβρυα κατασπῶσι. Hoc est radices
 iridis collyrij modo cum melle naturalibus fœminarum su-
 biectæ fœtus excutiunt. Hinc etiam προδέματα deriuantur,
 idē quod προδέτα, significātiā. Dioscorides de costa loquens,
 δύναμιν δὲ ἔχει ἐμμήνων ἀγωγὴν, καὶ τῶν περὶ τὴν ὑτέραν πα-
 τῶν, ἀγωγὴν ἐν προδέμασι, κατατλήμασι καὶ περιάσει, quod
 Latine sonat: Menstrua uero educit, & uulvæ affectibus me-
 detur, in pessis subiecta, superfusionibus & fomentis. Quæ ad-
 modum igitur προτίθεσθαι apud Græcos usurpatur, ita subii-
 cere, apud idoneos Latinæ scripturæ scriptores. Id quod ex
 Celso licet deprehendere, lib. 5. c. 21 ubi habet: Sed alia quoq;
 utilia sunt, ut ea quæ fœminis subiiciunt: πέσους Græci uocāt.
 Aut allium. Lege in codice Græco ἡ σκόρδον λείον προτι-
 θέμενον, non habetur impressum ἡ σκόρδον λείον προτιθέμενον.
 Id nec Orosius, nec Gemusæus aduertit.

προδέτα.
 προτίθε-
 σθαι.

Subiicere

Orosius
 hoc negle-
 xit.

IN XLVIII. CAPVT.

SVdorem eliciunt.] Quemadmodum alius quotidie respō-
 dens, & urina, aliaq; recrementa reddita sanitati faciūt, ita
 sudor etiam cum opus est, effusus, non mediocriter corpus cō-
 seruat. Ex cibo igitur dum concoquitur, duo recrementa ge-
 nerantur, alterū, quod crassius est, crassioribus intestinis trās-
 mittitur, alterum quod tenuius, cū chylo adhuc fertur. In
 iocinore chylus in sanguinem conuersus, ad cauam uenam
 transit. Quem ubi serosi illi humores, quod excrementum te-
 nue appellauī, eò traduxerint, non conuenit, ut diutius in cor-
 pore maneat, ideoq; renes cauæ uenæ non procul à iocino-
 re adhærent, qui illos recipiant, pauco sane adhuc aquoso hu-
 more sanguini permixto, uehiculo causa, qui & ipse purgari
 per cutis meatus debet, uocaturq; sudor. Si itaque copiosior

Recremen-
 ta.

Sudor quo
 modo gene-
 rerur.

X 2 successu

successu temporis collectus fuerit, ut iam onus uenis existat, artificio elici debet, natura uidelicet cessante, uel ob meatuum densitatem, uel ob aliam causam. Scribit itaq; remedia quaedam Aegineta, quæ ex Oribasio omnia mutuatus est.

Similiter inspersa.] Codex impressus uterque habet ἐμπλασσομένη, quod est emplastri modo adhibita pro ἐμπασσομένη, id est, inspersa. Non enim simplicia euumerata, materiam habent, quæ illini possit. Oroscius & Gemusæus præterierunt, in aliorum erratis castigandis occupati.

Oroscius
non aduer-
tit.

IN XLIX. CAPVT.

L Audatissimus.] Quemadmodum uino, escis exercitatione, uigilijs, somno ac uenere, alijs alias uti pro ratione ætatis expedit, ita de aere, quoq; iudicandum, quem optimum in pulmones trahere, omnibus iuxta salubre est. Transcriptum est hoc caput pene ad uerbum ex Gal. 1. de sanitate tuenda, & Oribasio.

Pestilentem auram exhalante.] In codice impresso habet δειλητήριον αἶρα ἀναπέμποντος, hoc est exitialem perflatum sursum mittente. Galenus unde hæc mutuatus est, ἀποπνέοντος habet. quod est, respirante, exhalante: quanquam parum refert, hoc, uel illo modo legas.

Galenus.

Nota mor-
borum pu-
plice graf-
fantium.

Hoc igitur modo.] Hippocrates iudicium hoc maximum in morborum causis cognoscendis tradit: nempe si oēs, cuiuscunq; ætatis, ac temperaturæ fuerint, morbis cōflicterentur, aerem autorem esse intelligemus ut postea in secundo uolumine discas.

IN L. CAPVT.

In lib. de
euchymia,
& cachy-
mia.

A Quarum,] Ex eodem Galeni loco hæc transcripta sunt. Autor autem hic noster ad sanitatem tuendam etiā aquæ bonæ usum facere testatur. Si quidem sit interim, ut alibi Galenus memoriæ prodit, ut totus exercitus prauæ aquæ usu de uita pericliteretur.

ἀτέρα-
μα.

Aegre concoctionis.] In Græco ἀτέραμα male pro ἀτέραμα legitur. Quæ de dictio proprie de leguminibus dicitur: nempe concoctu difficilibus ob duritiem. Galenus in libello quomodo boni maliq; succi generantur, in hunc modum ait: ἐνία δὲ τῶν δμητρίων σπερμάτων, ἐδ' ὅλως ὀγκῶσαι πέφυ-
κεν ἐφ' ὅμα κεκλήκασι δ' ἀτέραματα τοιαῦτα τῶν παλαιῶν ἑλλήνων τινές, id est: Nonnulla uero cerealia semina nequaquam solent intumescere, cum coquuntur, uocarunt autem eiusmodi ex ueteribus Græcis nonnulli οὐτέραμα, quasi di-
cas re-

cas rebellia, peruicaciāq; Aristotele, ἀτέραμον ὕδωρ pro cru ἀτέραμ-
da aqua dixit in quarto de generatione animalium διὸ καὶ νον ὕδωρ.
ἀτέραμνα ὕδατα, καὶ ψυχρά, τὰ μὲν ἀτεκνία ποιῇ, τὰ δὲ δη-
λυγόνια. Hoc est: Quare etiam cruda aqua, & frigida partim
sterilitatem, partim foemellarum procreationem efficit. Cæ-
terum ἀτέραμον habet cōtrarium, τέραμον Theophrastus in
octauo: τὸ δὲ τέραμον, καὶ ἀτέραμον λέγεται ἐπὶ ὀπρίων μό- τέραμον.
νον Qd est: Teramū & ateramū de leguminibus tm̄ dicitur.

Aut terram colatur puram.] Paulus habet, puram, sed Ga-
lenus unde hæc transcripsit. integra sententia sic habet: ὡς Inſtaurata
ὅσων γε πρότε τὰς ἀνατολὰς ἐξῆλθαςιν αἱ πηγαι, καὶ διὰ πόρε- leſio,
τινος ἢ γῆς διηθεῖται καθαρὰς, &c. Hoc est: Vt quarū ad Orien Nō aduer-
tem ſolem ſons erumpit, & per meatuum quendam aut ter- tit Oro-
ram puram colatur. ſcius,

IN LI. CAPVT.

FRigidam lauationem.] Hoc est in aqua frigida lauationem, quam Græci ψυχρολουσίαν uocant. Celsus libro primo frigida etiam lauationis meminit, Aestate aptissima sunt Frigida la-
& caro, & olus, potioq; dilutissima, frigida lautio. Hæc non uatio,
omni conuenit ætati, sed ubi iam corpus iustā impleuerit ma-
gnitudinem. Nam in adolescente, incrementum eius remo-
rator. Hoc quoq; ex Oribasij libro citato transcriptum est.

Iis, qui nullo uictus.] Qui enim cibus crassi succi, maliq; Exacte ui-
uſi sunt, iis statim ex frigida meatus occluduntur, per quos di- uētes qui,
ſcuti, euocariq; debebant Græce est προσυχόν quod ſignat, ut
cōtigerit, nulla rātionē habita, quēadmodū faciūt, qui nec de-
bito tēpore, nec pro naturæ modo, aut exercētur, aut cibū ſu-
mūt. Exacte aut uiuūt, qui exercitationes ante cibū modera-
tas ſubeunt, & quādiu liber, ut ait Galenus dormiunt, ad con-
coctione ſcilicet obeundā, nec balneis à cibo utūtur, poſtre-
mo qui cibos medi tenuiū, craſſorumq; ordinis aſſumūt, qua-
les ſunt exquiliſſimi, maximeq; inculpati, tāquā in ſymme-
tria exceſſuū cōſtituti. Huius generis ſunt panes optime ela-
borati, carnes gallinarū, gallorū, auiū, phasianorū, perdicū, co-
lumarū, attagenarū, turturū, turdorū, merularū, omniumq;
paſſerculorum, præterea piſcium ſaxatiliū. Quanquam qui
plurimis exercitationibus utuntur agricolæ, nautæ, aliq;
id genus tā exacto uictu opus nō habēt, quippe caloris benefi-
cio qui laboribus excitatur, et craſſi ſucci cibos tuto aſſumūt.

Porro multis.] Qui nimirum sole feruente iter fecerunt, aut laboris quid subierunt, totum corpus stipulae modo aridum habentes, ij ubi in aquam frigidam se proiecerint, iuuantur: potissimum qui ualentibus sunt uiribus, & frigido soli affueti.

IN LII. CAPVT.

Balinea
naturales.

Differētię.

Vfus.

Naturalium balneorum.] Vocantur balnea naturalia, quæ sua sponte talia proueniunt: alia calida per se, alia calefiunt. Galenus libro de simplici medicina illorum mentionem facit Plinius lib. 31. cap. 6. ubi in hunc modum habet: Est autem utilis sulphurata neruis, aluminata paralyticis, aut simili morbo solutis. Bituminata, aut nitrosa utilis est bibendo atque purgationibus. Plerique in gloria ducunt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimicissimum: namque paulo diucius quam balneis uti oportet. Haecenus Plinius. In Germania certe plurimis horis quotidie utuntur, nec à cibo potuque interim abstinere, corpore etiam nullam antea euacuationem per medicamenta experto, quod contra omnem rationem est, praeterea uno balneo & paralytici, & sanguinem spuētes & lienosi, aliisque affectibus obnoxii utuntur.

Aquarum naturalium.] Sola aqua potabilis teste Galeno humida est. Cæterarum nulla humectare potest, quod uidelicet non sint exacte aqua, sed mista & adulterata, accepto nimirum, aut alumine, aut chalcitro, aut sale, aut id genus aliquo.

IN LIII. CAPVT.

Sic etiā Po-
lybus de
ratione pri-
uatorum.
Questio
cur hyeme
laborandū
magis.

Solutio.

Non alienum est.] Celsus ex Hippocrate eleganter transtulit eandem fere sententiam. Eo tempore anni inquit, calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouentibus.

Pluribus uti laboribus.] Quærere aliquis possit, cur pluribus utendum laboribus per hyemem, cum calor ipse genuinus sit amplior tunc quam alio tempore, testimonio etiam Hippocratis, qui ait uentres hyeme & uere calidissimi sunt. Ex calore autem concoctio optima, inde probus sanguis, ex hoc autem omnes corporis partes aluntur. Quare paucioribus laboribus hoc tempore quam alio utendum est. Siquidem calor naturalis per se copiosus, & efficax, non opus habet ut plus nunc excitetur quam in ipsa æstate, aut alia anni parte. Huic quaestioni sic respondere non dubitem. Calidissimi quidem uentres hyeme existunt, naturali calore, hoc est, temperatissimi. Particulæ autem corporis magis refrigerantur hyeme, ac

me, ac nonnullis ad uentris usq; regiones penetrat. Quapropter etiam si probe concocti sint in uentriculo cibi, non tamen exactam in iecinore mutationem recipiunt, sed aliquatenus ea frustrantur. Præterea totius corporis uenæ ab aere circumfluo refrigeratæ haud similiter ipsos transmutant. Accedit ciborum copia, quam tunc una cum pituitosioribus qualitatibus assumunt: unde etiam humor crudus colligitur, qui laboribus & exterioribus particulis recalefacientibus concoqui, digeriq; debet.

Plus esse] Hippocrates, aut Polybus eius discipulus ait: Polybus.
τὸ μὲν χειμῶνος ἐστὶν ὡς πλῆτα, πίνειν δὲ ὡς ἐλάχιστα. εἶναι
δὲ χρὴ τὸ πόμα οἶνον ὡς ἀκρητέστατον. quod Celsus in hunc Celsus.
modum interpretatur. Hyeme plus esse: minus, sed meracius
bibere conuenit.

Vere autem ineunte.] Vide libellum Galeni, cui titulus est, quos & quando purgate oportet.

A laboribus conquiescendum.] Intellige iis quibus per hyemem usus fueris. [Sæper enim exercitatio corporis necessaria, uerum minor nunc, & faciliior, ne calor naturalis, qui à sole tunc euocatur, etiam per hanc magis dissipetur.

At in autumnno.] Celsus eadem fere habet: per autumnū, inquit, propter cibi uarietatem, periculum maximum est. Itaq; neq; sine ueste, neq; sine calciamentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigidioribus, neq; sub diuo nocte dormire, aut certe bene operiri.

Poma.] Græce est ὀπώρας. Nam pomum generale uocabulum est, & quicquid apud Græcos opera continet, complectitur. Discrimē ponit Democritus inter oporas & acrodrya. ὀπώρας.
Quicquid herbaceo fructu uiret lignosi nihil exterius habēs, ἀκρόδρυα.
ut duracina, pyra, mala damascena, pruna, opora, apud Græcos dicitur. Acrodrya uerò contra nominātur, quæ putamen exterius, lignosumq; fructum cōtinent, ut malum punicum, castanæ, pistacea, nuces, utrunq; genus Salgami nomine complectuntur latini, à quo Salgamarius originem duxit. Celsus Celsus.
eodem loco iam citato: poma inquit, nocere quidam putāt: Poma.
quæ immodicè toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur, ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Galenus optimè utriusq; uocis significatū exprimit Cōmentario περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας, in hunc mo- Galenus.

dum: τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὠρεῖσι καλοῦμενοι κάρποι, κακὸν χυμὸν πάντες. εἰ δὲ διαφθαρῶσιν ἐν τῇ γαστρὶ φαρμάκου δηλητηρίῳ πλησίον ἤκωσιν, ὥσπερ καὶ τὰ μῶρα ἢν δ' ὀνομάζουσιν ἰδίως οἱ Ἕλληες ὁπώραν ἐν σπύκοις καὶ ταφυλαῖς οὔσαν, ἀμείνων μὲν ἐστὶ τῶν εἰρημένων. & τὰ δ' ἄλλα τῶν ἀκροδρύων εἶδη κακόχυμα ἐστὶ, &c. Hoc est, aliarum uero arborum fructus fugaces, omnes, maligni sunt. Sin autem in uentre computruerint, medicamenti uenenosi naturam induunt, sicut & mora, &c. Quam autem Græci propriè nominant oporam, ficubus & uuis cōprehensam, prædictis est potior. Plinius compositionem quādam Oporinen appellat ex fructibus generatam, ut confundat differentiam, quæ inter oporam & acrodrya existit. Tu igitur si uoles oporam fructus omnes appellabis ὠρεῖς καὶ κάρποι, horarios fructus.

Quando
purgandū.

Post æquinoctium.] Intellige autumnale, quod ad octauū calendas Octobres, uel ad sextum incipit, ut Florétinus Agri culturæ scriptor memoriæ prodidit. Consulit itaq; Paulus, ut si fortè humores uel melancholici, uel adusti in corpore redūdent, ante hyemem in autumno purgentur. Siquidem bis corpus in anno recte euacuatur, si plethoricum, sanguinis dimissione: si malis scatet succis, purgatione. Vere, humorum qui ex hyeme sunt contracti: autūno, qui ex æstate reliqui uisione sunt experti. Quare in duobus æquinoctiis fere, sani corporis euacuationē moliemur, ad futurorū accidentiū præcautionē.

IN LIIII, CAPVT.

Omnis mu-
tatio subi-
ta noxia
est.

Consuetis
aliquid tri-
buendum.
Densi,
Rari.

Facili præditus.] Hoc caput ex libro primo Oribasii sumptum est. Vult autem Paulus in omni uitæ genere, ut semper consuetis utamur. Quod enim contra cōsuetudinem est, nocet. Neq; enim ex nimio labore, subitum ocium, neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Qui igitur in laboribus uitam agunt, si facile ferunt, mutationem non consulit. Qui in otio degunt, sani neq; hi ad labores sunt cogendi. Siquidem natura consuetis gaudet. Verū ut mediocris exercitatio summum corpori præsidium cōciliat, ita ocium, extremum adfert malum, ut albi Galenus ait, præsertim si corpus densum, quod non ex facili diffletur, contigerit: sin autē natura est rarum, perspiratu non impedito, aptisq; nutritur humoribus, etiam si non exerciteur, uix morbis est opportunū: Siquidem per meatus, quicquid fuliginosum uiscosumq; fuerit,

rit, diffatur, expelliturq; , ac qui talem corporis constitutionem, fabricationemq; habent, à græcis uocantur *εὐδιαπνεῦστοι*. Exercitiū hoc loco intelliges, ex præscripto institutū, qđ multi ante cibū, uti expedit, subire nequeunt civilibus negotiis, aut aliis ēē districti. iis igitur si meatuū cutis raritas & amplitudo fauet, etiā sine exercitio, sanitate aliquādiu frui licet.

Imo nec eos.] Hippocrates hanc sententiam in aphorismorum secundo confirmat: τὰ δὲ ἐκ πολλῆς χρεῖνου συνήθεια, καὶ ἡ χεῖρω τῶν ἀσυνήτων, ἥσσον ἐνοχλεῖν εἶωθε. Hoc est: Quæ longo tempore consuecta sunt, etiam si insuetis sint deteriora, minus molestare solent. Nec ea de exercitiis tantum, sed omnibus quæ ad corpus attinent, accipienda ueniunt.

In omnibus autem his.] Galenus in libello περὶ ἐνχυμίας, καὶ κακοχυμίας probat in hunc modum: Multi eiusmodi uitæ institutum sequuntur, ut ipsis non liceat, uel ante cibum probè exercitari, uel satis opportune cibum sumere, uel alimenta feliciter concoquere: qui sane à morbis immunes permanere nō possunt, nisi ex interuallo alui subductione sibi prospiciant: interim purgatione, cum tempestiua sanguinis detractione, &c. Quanquam Paulus etiam intelligit ut quoti die aluus bis, aut certe semel respondeat inculpate pro assumptorum ratione. Id nisi fiat, certe sollicitandā esse docuimus.

Necessitas purgationum cōtra eos q nūquā medicina utendū docent.

IN LVI. CAPVT.

Vomitionibus.] Quandoquidem plerisq; necessitas incidit, nauigio per mare proficiscendi, Paulus ēē hic remedia malis obuenientibus enumerare uoluit, Oribasium secutus libro quinto: facit igitur uini mentionē, quod maximè stomacho uomitionibus turbata cōuenit. Vocat aut græcè οἰνάριον quasi dicas uillū, sicut ēē ὀξείον τὸ ἀπὸ μέλιτος, p oxymelite.

Polentæ polline.] Hoc est tenuiore parte farinæ ordeaceæ tostæ. Voco autem pollinem cuiuscunq; partem subtiliorem, non tantum farinæ triticeæ, ut putat Orosius. Nam Celsus, Scriboniusq; thuris pollinis meminit. Plinius præparationem eius lib. 18. cap. 7. docet: Polentam quoq; græci nō aliunde præferunt. Pluribus fit hæc modis. Græci perfusum aqua ordeum siccant nocte una, ac postremo die frigunt: deinde molis frangunt. Galenus lib. 1. de alimentis, de nouello ordeo tosto intelligit. Græci polentam ἀλφίτον nominant: tenuiorem eius partem, ἀλφίτον παιπάλιν.

οἰνάριον.
ὀξείδιον.
Pollen polentæ.
Errat Orosius.

ἀλφίτον
ἀλφίτου
παιπάλιν

IN

Q Vum immodice corpus.] Ex Oribasii quinto, metho-
di uero Galeni decimoquarto hæc ferè transcripsit.
Cæterum medici officium est, ut intemperies corrigere, con-
tinui diuorrium, committere, ita quoq; amputare, & præscin-
dere, quod magnitudine, uel numero redundat, reficere autē,
& fingere quod desit. Verbi causa, cum corpus ex corpulentia
eò deuenit, ut nec ingredi sine molestia, nec sedem propter
uentris molem contingere, nec respirare libere possit, hanc
sedem propter uentris molem contingere, nec respirare libe-
re possit, hanc liquare & tollere, æque nimirum, ut quando
corpus ali definit, huic quoq; reficiendo prospicere. Paul. græ-
ce dixit ὅταν εἰς πολυσαρκίαν ἃ μετρον ἐκτραπῇ τὸ σῶμα. Hoc
est: Cum corpus in corpulentiam immodicā deuenierit. Cel-
sus plenum corpus dicit & obesum.

πολυσαρ-
κία.

Lectio ca-
stigata.

ὀξεῖα.

ταχεία.

κατασάρ-
κους.

πολυσάρ-
κους.

παχέας.

ἡλίωσης.
Fallitur.
Oroscius.

Calidior & ficiior.] Græcus codex non habet καὶ ξηροτέ-
ρα, id est & ficiior. Ex Galeno autem addendum uenit, quod
Gemufæus præterit.

Citas exercitationes.] Græce dixit Paulus ὀξεῖα γυμνάσια,
quod ad uerbum sonat, acuta exercitia Galenus in commen-
tario libelli de ratione uictus priuatorum interpretatur fere
quod decimoquarto docuit: ἡ ταχεία κίνησις τὴν θερμασίαν
ἐπιπλεῖον ἀνξάνουσα τὴν κατὰ τὸ σῶμα. Quod est: Velox motus
calorem amplius augens, corpus liquat. Idem igitur est ὀξεῖα,
& ταχεία. Celsus cursum, multam obambulationem, omnem-
que uehementem exercitationem ponit.

Iuuat itidē crassos insolatus.] Crassos hic intelligo, quos
græci κατασάρκους, πολυσάρκους, παχέας νοῖαντ. His opponuntur
λέπτοι, ἰσχυνοί, κατισχυθέντες, & καταλελεπτυσμένοι. Celsus
cōtrarios inter se uocat, plenū, & tenuē, gracilem & obesum.
Insolatus autem græce dicitur ὑλίωσις, quod Celsus interpre-
tatur est sol inurens: & omnis calor, quanquam Oroscio id
non placeat, homini in bonis authoribus parum uersato.

Præbibere autem non debent.] Hoc intelligendum est nī
mirum, ne cibus statim in corpore distribuatur. Contrariam
plane sententiam habes apud Polybum: quam Celsus dein-
de interpretatus est: sed nonnihil euariat. Græce primū sic
habetur: καὶ τοῖς σιτίοισιν ἐπιχειρεῖν, προπεπωκότας οἶνον κε-
κραμένον, καὶ μὴ παρὰ σφόδρα ψυχρόν, hoc est: Et cibos aggre-
di, uino

di, uino prius temperato, & non admodum frigido assumpto. Celsus inquit, semel die assumptæ epulæ, & uini non perfrigidipotio ieiuno in consuetudinem adducta. Galenus autem, sententiam corrigens, dicit legēdum μήτ' ὀλωσθαι θερμόν, quod est, neq; omnino calidi.

Semel tantum die.] Græci hoc uocant μονοσιτεῖν. Galenus autem in commentario nuper citato locum hunc quasi corrigit, κάλλιον inquiens ἀντὶν εἰρησθαι πρὸς αὐτῶν μὴ μονοσιτεῖν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτεῖν, hoc est: Præstaret dictum ab eo fuisse, non semel epulas assumere, sed modicas. Quidam enim ex iis qui semel tantum cibum sumunt, multo plius ingerunt, quàm qui bis capiunt.

μονοσι-
τεῖν.
ὀλιγοσι-
τεῖν.
Galenus
non semel
modice,

IN LVIII. CAPVT.

QUum extenuatos.] Hoc caput ex decimoquarto Methodi Galeni sumptum est. Commemorat autem uictus rationem extenuatis accommodam, primum quidem uinum crassum, cuiusmodi sunt nigra & fulua Italica uel Asiana, aut etiam Hispana. Linacer autem methodi interpretes uertit οἶνον παχὺν, uinum pingue, qua ratione, uel quem securus autorem nescio. Dicuntur autem uina crassa, quæ succū crassum habent, multumq; alunt. Cibus autem crassi succi, qualis est, alica, porcina caro, panes furnacei, & textuacei, tragus, oua, lac, caseus, magnaq; piscium pars. Qui cibi crassi, omnes ad nutriendum sunt ualentissimi: & si probe in uentriculo, ac iocinore concocti fuerint, sanguinē benignū generare solent.

Vina cras-
sa.
Linacri
locus.

Crassi suc-
cibus.

Exercitatio modica.] Omnia exemplaria Pauli impressa habent γυμνάσια δὲ βραδέα. Hoc est, exercitia autem lena: & optime quadrat lectio superiori sententiæ, quæ de crassis extenuandis habetur, nempe huic, Citas exercitationes. Galenus autem in Methodo, omnibus codicibus attestantibus, legit βραχέα, hoc est, modica. Celsus in simili sententia de replendis tenuibus dicit conuenire, modicam exercitationē. Rursus Galenus in commentario superius citato dicit extenuatis eadē fere ex usu esse: οὕτω δὲ, inquiens, καὶ τὰ γυμνάσια, βραχέα τε γυμνάζεται, καὶ βραδέα, καὶ μετὰ τροφήν. Quid est: Ita uero etiam exercitia, & pauca, & lena, & post cibum habebit. Sume igitur utramuis lectionem. Ego secutus sum Galenum in methodo, unde hæc sunt descripta.

Contrarij
loci.

Apud Po-
lybum.

Lectio
emendata.

Deinde frictione dura.] Hæc sententia & mutila, & deprauata

uata

uata existit in Paulo. Quid enim per hæc uerba intelligas: κα-
πειτα σκληρὰ μὴ πολλὰ πέλυντες τὸ δέρμα, &c. Corrigenda in-
staurandaq; est ex Galeni lib. 6. de sanitate tuenda, in hūc mo-
dum: καπειτα τρίψαι σκληρὰ μὴ πολλὰ πιλύντας τὸ δέρμα.

Oroscius.
Castigator
Basilienfis.

Hoc est: Et postea frictione dura non multa cogentes cutē,
quo densa, duraq; euadat. Hæc Oroscius & castigator Basi-
liensis non aduerterunt.

Ijs qui pallido.] Iram, motusq; animi præcipit decolora-
tis, ut uidelicet inde sanguis in exteriores partes trahatur: si-
cut alii quibusdam medicamentis eò alliciunt.

IN LIX. CAPVT.

πίττωσις

Extenuantur plerunq;.] Vide Galenum in decimoquarto
Methodi medendi, ubi etiam horum curationem plenius
persequitur. Picationis mentionem facit, quæ πίττωσις dici-
tur græcis, hoc est, pix mēbris oblita: hyeme bis æstate semel,
idq; frigidis & humidis, aut utroq; tēperamēto simul donatis.
Nā siccis & calidis eiusmodi medicamēta adhiberi nō debēt.

IN LXI. CAPVT.

Instaurata
lectio.

Consuetu-
do acqui-
ta natura.

Deest autem in codicibus Pauli impressis dictio καὶ, in capitis
principio. Lege igitur τούτοις ὁδόντας φύσει θάττον, καὶ αὐξη-
θήσεται. Hoc est: Dentes citius producent, & augebuntur.

Is ob consuetudinem.] Puta liberaliorem cibum sumptū
cōtinue, ocium, totamq; deniq; uictus rationem: quod apud
Galenum κατὰ συμβεβηκός, hoc est, secundum accidens, con-
trarium huic uocat κατὰ φύσιν, ex natura. Veluti alii nati grā-
dioribus uenis, corpore ad gracilitatem idoneo ex ocio diu-
turno, cibisq; tum ualidis tum copiosis crassescunt, alii exili-
bus uenis præditi ex labore assiduo, curis, uigiliisque & cibis
extenuantibus usi in obesitatem prolabuntur.

Instaurata
lectio.

Hoc etiam
aduertit
Oroscius.

Nigri ipsis pili existunt.] In codicibus Pauli impressis hac
tota sententia desideratur: planeq; ut adsit, necessaria ad di-
sputationē de tēperaturis vī. Nā altera diuisionis pars existit.
Repone igitur ex Galeno in arte medicinali in hūc modum
post ἐκ ὀλίγου θερμότερον. μέλαινα δ' αὐτοῖς αἱ τρίχες, καὶ ἡ
σὰρξ ἀπὸ μέλος εἰ δ' ὀλίγω μὲν ἢ θερμότερα, παμπόλλω δὲ ὑ-
γρότερα, μαλακὰ τούτοις εἶσιν ἡ σὰρξ καὶ πολλὰ, καὶ τὸ χρῶμα
συμμιγρὲς ἐξ ἐρυθροῦ καὶ λευκοῦ καὶ φανώντων ὀλίγω θερμότερα.

Color

Color autem & capilli.] Hic quoq; mutilus est codex græcus, habetur enim: τὰ δὲ τῶν τριχῶν τῆς χροιάς, pro τὰ δὲ τῶν τριχῶν, καὶ τῆς χροιάς. Nec aduertit hoc Gemusæus. Color itaq; totius corporis, hoc est albus, maxime erit, si illud uehementer fuerit frigidum, capilli quoq; rarissimi enascentur, si illud tale fuerit: sin minus, minus illa quoq; erunt intensa. Hoc itaq; est pro proportionē.

Restitutus
locus.

IN LXII. CAPVT.

EXiguū sane caput.] Hæc quoq; ex arte medica Galeni transcripta sunt. Præuam, inquit, cerebri structuram indicat. Nam quod in tentorijs præstant pali quos græci κάμακας appellāt, & in ædibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia. Quippe ad huius imitationem cætera omnia in animatē solent effingi, mutariq; ut si caluaria sit rotūda, necessario cerebrū tale fuerit: quemadmodum etiam si oblonga sit, talem quoq; figuram cerebrum induet. Si itaq; paruū est caput, ea q̄ ossibus adhærēt, exigua, aut mutila esse cōiicimus.

κάμακας.

Figura.] Nempe quæ ad oblongæ spheræ potissimum similitudinem structa est. Alia uero capitis figura uertice acuminato, qualem Therfites habebat apud Homerum, deprauata est. Naturalis itaq; priorem ac posteriorem partem prominentiorem habet. Deprauata, altera eminentiarum caret. Interim utraq; : quare etiam futuras præter naturam habet.

Figura per
fecta.

Si optimè sit disposita.] Galenus dicit: Si ualidam habet ceruicem, aliisq; ossibus optimè sit constituta.

Plerunq; igitur.] Retuli ad eminentias. Nam figuram nō pōt. Vult itaq; Paulus nōnunquam etiam fieri, ut capita etiā bona existant, quāuis eminentiæ à naturæ modo recesserint.

IN LXIII. CAPVT.

Minimeq; ab omnibus exteris.] Ex eodem Galeni commentario sumptum est: dicit autem exteris, quod idem sibi uult, ac si dicas, extrinsecus accidentibus quæ calefaciūt, refrigerant, siccant, & humectant. De pilis etiam in libris de facultatibus naturalibus comprehensa à Galeno reperias.

Summatim circa.] In fine capitis hæc clausula habetur. Sonat autem græcè ταχύγηροι τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἅπαντα εἶσιν. Hoc est ad uerbum: Cito senescunt in iis omnibus quæ circa caput sunt. Quasi dicas: Omnes capitis partes potissimū, mature senium testantur.

IN

κλύδω-
νες.

FLUctuationes] Sic interpretatus sum græcam dictionem κλύδωνας. Ventriculi est parum ea quæ ingesta sunt, comprehendentis, concoquentisq; fluctuationes experiri. Male impressum est in Galeno græco nuper ædito Basileæ, κώδωνας pro κλύδωνας.

Castigatus
locus.

Calidis cibis.] In impresso codice erat, πολλοῖς pro θερμοῖς. Nec aduertit Gemusæus, tot manu scripta exemplaria iactans. Galenum uide in arte medicinali.

IN LXV. CAPVT.

Lectio in-
staurata.Præterijt
Orosius.

Gemusæus

ἐντρέχει.

NON modo uenterculus.] Ex eodē Galeni libro, eodemq; ferè loco transcripta sunt. Post hæc autem uerba: Cor, pulmo, & iecur, sententia Pauli manca uidetur, quicquid Gemusæus dixerit de epitome. Quid enim est, quin etiam bibentes, non cessant, uel ut græce dicam, καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες οὐ πάνονται, nisi alia præcesserint? Integra igitur sententia apud Galenum sic habet: ἔ μόνον ἡ κοιλία διψῶν τις τε καὶ ἀδίψος ἐργάζεται, καὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ πόματος ὀρεκτικὰς, ἀλλὰ καὶ τὰ κωτὰ δώρα καὶ σπλάγχνα καρδία, καὶ πνεύμων: ἀλλ' οἷγε διὰ τὴν τοῦτων θερμότητα διψῶντες, εἰσπνέουσι τε πλέον, ἐκφυσῶσι τε μακρόν, αἰσθάνονται τε κατὰ τὸν δώρα καὶ τὸ κάυματος, ἔχῳσπερ οἱ διὰ τὴν γαστέρα κατὰ ὑποχόνδρια, καὶ μὲν δὴ πίνοντες, ἐκ εὐθέος ἢ συχάσσοι. Hoc est ut interpretatus sum, restitue igitur si uidetur codicem: Prius tantum erat: Non solū, uenterculus sitim uel adfert, uel arcet, ac frigida calidæq; potionis appetentiam facit, sed etiam quæ in thorace continetur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, &c Quam integra hæc sit oratio, doctis iudicandum relinquo, meo certe iudicio apponenda uidetur, quæ ego textui inserui ex Galeno Miror Orosium hunc locum præteruisse: Gemusæum autem non castigasse ex ueteribus exemplaribus quibus se abundare sæpius triumphat.

Recrementa ipsis interueniunt.] Hoc est, crassæ humiditates & pituitosæ arteriam asperā, per quam uox editur, intercipiunt. Græcum uerbum est ἐντρέχει αὐτοῖς. Alias signat, insident, inhærescunt, si Græcorum grammaticis fidem accommodamus.

IN

IN LXVI. CAPVT.

C præcordiorū regio.] Hoc est qua præcordia incipiunt. **A** Græcus codex habet : καὶ τῶν καθ' ὑποχόνδριον ὅσα τοῖς πλεσίον, quasi dicas ad uerbum: Et præcordiorum quæ his propinqua sunt Hoc est, & partes præcordiorum his pectoribus uicinæ his sunt. Mox sequitur: Magna uero ex parte quod textus græcus in impresso tantum his uerbis continet: ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ τὸ, pro ὡς ἐπιτοπολὺ δὲ καὶ, atq; sic corrigito. Paulo post; Quinetiam, in græco impresso est καὶ μὲν γὰρ ἡ, &c. tu corrige ex Galeno καὶ μὲν τοὶ καὶ ἡ, requirere id sensu. Rursus pusillanimes, negligentes, pectore glabro, codex græcus plane deprauatus est Habet enim ἀτολμοὶ, καὶ μάλιστα ἡ φιλὼν αὐτοῖς τὸ τέρον, pro ἀτολμοὶ καὶ ἀμέλῃται, καὶ φίλον. Hæc Gemusæus castigator non aduertit, sic nec superiora Oroscius.

Omisit
Oroscius.Lectioes
castigatæ

IN LXVII. CAPVT.

Hoc caput etiam ex eodem Galeni commentario, ut superiora quæ de temperaturis agunt, quasi transcriptū est. Ceterum in clausula uenæ duriores, græcus codex deprauatus est. Habet enim αἱ φλέβες ξηραὶ, quod est uenæ sicce, pro αἱ φλέβες σκληρότεραι. Hoc est uenæ duriores.

Locus ca-
stigatus.

IN LXVIII. CAPVT.

Porro si humiditas calori fuerit cōiuncta, hispidos quidem minus, tales.] Vtrunq; exemplar impressum mutilū est, desideratur enim ἡ ττον. Nam legendum est, συνελθούσης δὲ υγρότητος τῇ θερμότητι, λάσιον μὲν ἡ ττον οἱ τοῖετοι. Hoc Gemusæus præterit.

Lectio ca-
stigata.

IN LXX. CAPVT.

Qum itaq; calida] Totum hoc caput ex sexto Galeni de sanitate tuenda iuxta principium, & Oribasii quinto sumptum est: cōuenit aut recte ut postquam tēperaturarū notas descripserit, intemperierū remedia subiungat.

Sollicitudo & uigiliæ.] Post has dictiones, καὶ κινήσεων ἀπασῶν ὀξεῶν. Hoc est, & omnes celeres motus. Sic enim uerto ὀξύ, quod est acutum, Recte autem dixit celeres motus: ut qui corpus calefaciant impensius.

Motus ce-
leres.

Humide & calide natura] In græcis codicibus impressis, tantum humide, habetur. Legendum autem ex Galeno, seu id requirente: αἱ δὲ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τῇ φύσει, &c. Quod est: Hu-

Instaurata
lectio.

Calida &
humida.

est: Humidæ uerò & calidæ natura. Nam ubiq; apud Galenū habes, humidæ & calidæ naturæ, putredini sunt obnox æ, qđ lib. I. de febrium differentiis hisce uerbis confirmat: ετοιμότητα γὰρ σήπεται πάνθ' ὅσα θερμά, καὶ ὑγρὰ. Hoc est: Nā omnia quæ calida & humida sunt, facillime computrescunt.

Rheumaticis, plethoricisq; . Vñ sum græcis dictionibus opera dedita, quòd medicis admodum sint familiares. Poterā autem dixisse, fluxionum & redundantie morbis, quemadmodū Linacrus. Sed nescio quid energiæ habēt uoces græcanicæ.

ἀπορροιαί

Porro defluxionibus] Recte quadrat. Nam superius dixit, rheumaticis patent morbis . Vocantur autem græcis ἀπορροιαί corporis defluxus, nunc in hanc nunc in illam partem: quales experiri sæpe solent humidi temperamento & calidi.

Lectio nota
tatu digna
Instaurata.

Lauacris, multa exerc.] Trifariam hæc lectio apud auctores uariat: apud Paulum habetur: ἀπορροιαὶ δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λούτρων καὶ γυμνασίων πολλῶν καὶ πρὸ τροφῆς . Hoc est: Defluxionibus prospiciendum est, lauacris, exercitiis multis, & ante cibum, &c. Oribasius legit καὶ τῶν ἀπορροιαῶν δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λούτρων καὶ γυμνασίων πολλῶν, &c. consen-

Omisit
Orosius .

tit fere cum Paulo . Galenus autem in hunc modum: ὥς τε καὶ τὸν ἐπιτατῆντα τῷ τοιούτῳ σώματι τῶν ἀπορροιαῶν προνοεῖται χρὴ διὰ τε γυμνασίων ὥς ἔφην, καὶ λούτρων καὶ τροφῶν πλείονων, ἐκκρίσεως ὥς τε τῶν δι' ἔξον, καὶ γαστρος γινόμεων, &c. Hoc est, Quare qui huiusmodi corpori tuendo præficitur, prospicere iis debet quæ ab ipso defluunt tum exercitiis ut dixi, tum balneis, & cibis pluribus, tum uero iis quæ per uentrē & urinas redduntur, excernendis, &c. In hac oratione mendū plane est: quod enim sibi uult, cibis pluribus? cū corpus defluxionibus opportunum, sobriam potius uiuendi rationem requirat, quàm multorum cibo tum ingestionem qui ipsi sæpius fluxiones solent excitare . Legendum itaq; existimo in codice græco λούτρων πρὸ τροφῶν πλείονων, quod est: Lauacris ante cibum pluribus . Nam ut exercitatio cibum præcedēs, ita balneum quoq;, superflua corporis discutit, subsequēs autem cibos, cruditatem, eoq; prædicta symptomata procreat. Sed cui auctori assentiemur, alius habet pluribus balneis, alius, pluribus, exercitiis. Superius semel dixerat, multa exercitatione, eoq; hic etiam referendam puto dictionē pluribus, uel exercitiis. Hæc nō aduertit Gemusæus nec Orosius.

IN

IN LXXI. CAPVT.

INter frigidas.] Hoc totum caput ex sexto libro Galeni de sanitate tuenda sumptū est: ex Oribasij autem quinto. Enumerat autem tres frigidae intemperies differentias, frigida & siccam, frigidam & humidam, frigidam & mediocrem in siccitate & humiditate. Harum singularum remedia ordine enumerat. Inter quae Paul. recēset αλυσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ λεπτότερα, quod est balnei abstinentia, exercitia plura, & tenuiora. Vbi legendū existimo ex Galeno, sensu id exigente. αλυσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ διαίτα λεπτόρα, hoc est: Balnei abstinentia, exercitia plura, & uictus ratio tenuior. Hoc praeterierunt Orosius & Gemusaeus.

Locus re-
stitutus.

IN LXXII. CAPVT.

INtemperies sicca.] Hoc autem caput ex septimo methodi ad uerbum transcriptum est: ubi docet, quae potissimū intemperies, seu alterationes facilius reparari queant. Enumerat autē siccitatis differentias tres: quas etiam alibi cōprehendit: Verum Pauli codex graecus statim in principio capitis deprauatus est. Habet enim ἡ δὲ τῆς ὑγροπαγῆς οὐσίας πρὸς ταύταις. Quod nihil fere significat. Corrigito igitur in hunc modum: ἡ δὲ τῶν ἐκ τῆς ὑγροπαγῆς οὐσίας συνεστώτων, ἐκτακέντων, καὶ τρίτη πρὸς ταύταις. In textu latino sum interpretatus graeca, quae desiderabantur. Castigator Basiliensis hoc quoq; praeteriit.

Castigator
Basiliensis.

Ex bumore concreto.] Galenus addit, sicut caro & adeps, Paulus compendij causa omisit. Ceterum caro & adeps nihil aliud sunt, quam humor concretus: caro quidem, sanguis ui assimilattice in carnem redactus: adeps autem humor extra uasa elapsus, ex frigiditate congelascit, concrescitq;.

Chondrum ptisanæ modo.] Chondrus omnino fit ex zea, ut in sequentibus docebitur.

Ptisana, ἀπίσσην duxit originem, quod ordeū unde praeparatur, tundendo deglubatur, ac suo cortice castratum, usui seruetur. Hordeum mundatum officinae uocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

Quo picatores utuntur.] Vnguentum hoc alias dropax uocatur, quod picem recipit. Vide Paulum, in septimo ad calcem. Solet partibus emacratīs adhiberi. Administratio graecis πίττωσις, quasi picatio: qui adhibent πίττωται dicuntur.

πίττωσις
πίττω-
ται:

PAVLI AEGIN.

Y

Iam

Codex
Græcus re-
stitutus.
Omiserunt
aristarchi.

Iam uero multæ.] Græcus codex non habet δαφιλεῖ, hoc est, multæ: uerum sensus exigit, ut contraria opponantur sibi δαφιλεῖς, καὶ μέτριον. Sic etiā Galenus habet: μὴ γὰρ δὲ ἐφε-
ξῆς δαφιλεῖ ξηρότητι καθάπερ ὑπόκειται, μὴ παντὶ πολλὴ θερμό-
της. Hoc est: Ab hinc uero iuncta sit multæ siccitati ut dictū
est, non admodum multa caliditas. In sequenti sententia, re-
stitue græcum codicem, ac lege: πὶ μὲν τῆς τοιαύτης ὑπαλ-
λάξεως τὴν πρότην ἀγογὴν φυλάξομεν. Quæ Orosius, & casti-
gatores Basilienſes omiserunt.

Quæ sint
galactode.

Tepidos lactis modo.] In Græco codice est, χλιαρὰ δὲ τὰ
ἐδέσματα καὶ γαλακτώδη. Hoc est, Tepidos autem cibos &
lacteos offeremus. Galenus lib. 7. Methodi dictionem γαλα-
κτώδη interpretatur, χλιαρὰ δὲ, inquit, τὰ ἐδέσματα προ-
σίσκομεν ἀκαλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς γαλακτώδη, quod est: Te-
pidos autē cibos offeremus, quos medicis uocare lacteos con-
suetudo est. Idem lib. 11. Aetij. τὰ ἀλβυλά καὶ πῆ κράσει γα-
λακτώδη. Hoc est albulæ, & tēperamēto lacteæ balineæ, quod
est, tepidæ lactis iam emulcti modo. Celsus tales cibos, lib. 4.
cap. 11 in hunc modū inquit. Aqua neq; ea ipsa frigida, sed
potius egelida dāda est. Ibidē: Si uero tormina sunt, oportet
frigidis & humidis fomētis stomachū fouere: uel si uēter do-
let, iisdē egelids, sic ut uēter ipse mediocriter calētibus iuuēt.

Egelida.

Restitutus
locus.

Quod si ad uomitū sint idonei.] In Græco codice muti-
latus locus est, in hunc modum: εἰ δ' ἐπιτηδείως ἔχει. διὰ δ' ἀ-
φανίδων ἐμέτω, adde post ἔχει dictiones duas πρὸς ἐμετόν,
quod Gemusæus castigato non aduertit, uolens in compen-
dio eiusmodi intelligi.

IN LXXIII. CAPVT.

QUum igitur attenuandi.] Olim ueteres maiorē uim
in uictus ratione ponebant, quā in medicamentis:
ubi uel humor uiciosus emendandus, uel morbo ueniēti erat
prospiciendum: alia nimirū ratione, quā huius seculi Me-
dici facitantes: qui statim cum quis de particula aliqua cō-
coqueritur, ad ualentissima etiam medicamenta confugiunt:
Cæterum Paulus noster hæc ex commentario Galeni cui
titulus est, de ijs quæ bonum malumue humorem gignunt
sumpsisse uidetur. Habet ille in hunc modum: καὶ διὰ τὸ το-
τοῖς ἰατροῖς εὐρέθη τὰ κληθέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιεινὰ φάρμακα
τῆς λεπτονοῦσης ἀπαντα δυνάμει δύντα. τοῦτοις γὰρ ἔργον
ἐστίν,

ἔστιν, ἐκφράττειν μὲν τὰς τοιαύτας διεξόδους, ἀπορροῦν δὲ τὸ
προπλαττόμενον γλίσχρον ἐκ τῶν χυμῶν τοῖς ἀγγείοις, τέμνειν
δὲ καὶ λεπτύνειν τὰ παχέα τῶν υγρῶν, ἀλλ' ἂν πλεονάσῃ τε ἐν
αὐτῷ, ὁρροῦσθαι, ἢ πικρόχολον ἐν τῷ χρόνῳ, ἢ μελαγχολικὸν ἐρ-
γάζεται τὸ αἷμα. Hoc est: Quamobrem medici salubria ab
ipsis uocata medicamenta inuenerunt, omnia facultatis atte-
nuatoria: siquidē munus ipsorū est arctos trāitus parētiores
reddere, succorū lentore uasis adhærescentē abstergere: humo-
rū crassitiē incidere atq; extenuare. Sin autē serosum quippiā
in eis redūdet, uel sanguinē biliosum temporis interuallo, uel
melancholicū efficiūt, &c. Sunt autē medicamenta salubria, ci-
bi loco medicamentorū sumpti, quibus per sanitatē utimur.

Salubria
medica-
mēta quæ.

Porrò quæ increaslandi.] Ex eodem commentario transcri-
pta sunt, ubi in istum modū habet: τὰ δὲ τὰς παχέας καὶ γλίσ-
χρους γεννῶντά τε χυμοὺς ἐδεσμάτα τροφίμωτά τε πάντ' ἐστὶ,
καὶ πεφτῆ καλῶς ἔντε τῇ γαστρὶ, καὶ τῷ ἥπατι, χρηστὸν αἷμα γεν-
νᾶν πέφυκεν, ἀμεμπτότατα δὲ τῶν ἐδεσμάτων ὑπάρχει τὰ με-
ταξὺ τῶν λεπτυνόντων τε καὶ παχυνόντων. Quod est: Cibi ue-
ro crassius, uiscosusq; humores generātes, oēs & ualentissimæ
sunt materiæ, & si probe in uētriculo, & hepate fuerint conco-
cti, benignū generare sanguinē assolēt: uerum inculpatissimi
inter cibos sunt, qui tenuium, crassorumq; mediū habentur.

Qui sese exercent, & quantum libet.] Galenus hæc ita ha-
bet: ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις οἶοντ' ἐστὶ γυμνασίαις τε πλείοσι
χρῆσθαι, καὶ νομάσθαι μέχρις περ' ἂν ἐθέλωσι, καὶ βίον ἔξω τῶν
πολιτικῶν ἀσχολιῶν ἡρῆναι τούτοις ἐγχερεῖ, καὶ τὰ παχύχυ-
μα καὶ γλίσχρά τῶν ἐδεσμάτων ἐδίειν. Hoc est. Quibus itaq;
exercitiis pluribus uri licet, & quā diu libet dormire: ad hæc
qui uitam ciuilibus negotiis uacantē degunt, ii & cibos crassi
succī, & uiscosos tuto assument.

Porrò quemadmodum.] Ad uerbum ex eodem loco tran-
scripta sunt Galenus autem addit rationem: neutiquā enim,
inquiens, aliquis ægrotabit, si opportune prospiciat, ne conco-
ctione unquam frustretur, item ne à cibo ualidam quandam
ambulationem subeat. Quippe sicut exercitatio cibos præce-
dens, plurimū cōseruandæ sanitati conducit: sic quælibet ἐν
cibos cōmotio, nocētissima est. Nam alimentū antequā sit cō-
coctione elaboratū, ex uentriculo distribuitur. Vnde crudorū
humorū copia in uenis collecta, oīgenas morborū spēs pro-

Exercitia
tio.

Y 2 creare

creare solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, uel concocti, ac in sanguinem commutati.

Varia ciborum genera.] Plinius lib. 11. cap. 52. Homini cibum utilissimus simplex, Aceruatio saporum pestifera, & condimenta perniciosiora.

IN LXXIIII. CAPVT.

Lactuca.] Ex libris de alimentorum facultatibus fore mutatus est omnia Paulus. Itaque cum dicit, eoq; somnū accersit, intellige, uesperī commanducata, ut Galenus uti solebat. Valenter nutrit, græca dictio est τροφίμος, quasi dicas, nutriendus ualde, sic enim docti interpretantur uocem istam.

Ita boni succi. Galenus, cum alia omnia olera paucissimū sanguinem generent, sola lactuca non multum quidem nec uitiosum gignit, non tamen absolute εὐχρυστον, hoc est boni succi, laudabilem & benignum.

Intybum.] Alias græcis στείς dicitur, in satium & agrestem diuiditur. Quanquam græci per cichoreum tam domesticum quā agrestem intelligant. Satiuus intybus duplex, unus latioribus foliis, lactucæ similia, quem nos endiuia, corrupto nimirum uocabulo appellamus. Alter, foliis strictioribus, multis capillamentis per radicem transeuntibus. Hoc loco intybum, intellige potissimum, quam uulgo Endiuia nominamus, in acetariis usitatam.

Braffica marina.] Forte ea est herba, quam officinæ soldanellam uocant circa maritima nascētem, nisi Dioscorides folia longa brassicæ huic attribuisse, quæ in Soldanella non sunt, aut longitudo de foliorum ordine uenit intelligenda.

Blitum & atriplex.] Blitum olus rubrum quod in cultis se attollit, cuius folia iuribus incocta sic ea inficiunt rubore, ut nigelli uini dilutum colorem repræsentet: à quo rubrum olus etiam ab olitoribus uulgo uocari. Radice non una nititur, sed contra cæterorum fere olerum morē multiplici, prolixa, non in rectum tendente, betaceis frondibus, sine acrimonia fatuis, semen corticeum profert racematim singulis ramis infidēs, Atriplex flore aureo prodit, caule interdū purpureo, interdum candicante, ramoso, folio bliti. cū pubescit herbaceo, cum senescit, flammeo nonnunquam in luteum languescēte, semine foliaceo, simplici radice in altū ascendente, ex quo multæ se promūt. Dicitur et Dioscoridi Chrysolacanū.

Scolymos

Scolymos.] Paulus & Aetius scolymon à cinara diremerunt hanc officere stomacho, illum prodesse iudicantes. Idem etiam Galenus, ex quo sua mutuati sunt illi in 2. de alimentorum facultatibus testatur. Alii tamen Græci nullum aliud inter hæc discrimen ponunt, quàm quod scolymos feras sit, & syluester: cinara uero, domita cultu, feritate exuta, mitior & altilis: cuius cibus, licet stomacho sit grauis, non protinus à scolymis natura, uiribusq; degenerauit. Verum ex coctura noxam, quam prius referebat, amolitur: ijs additis quæ etiã Galenus enumerat.

Attractylis.] Hæc duas habet species, una mitior est cnicosatiuo similior, caule rectiore ac rigido, exili. Itaq; pro collo antiquæ mulieres utebantur, atq; hanc proprie attractylida nominabant, semine cãdido, grandi amaro. Ab officinis dicitur hodie syluestris cartamus. Quibusdam sanguinea uirga nominatur quod uulso ramulo cruorem modicũ profundat. Altera species hirsuta, caulibus sonchi, torosis, humi reptatibus, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbato, flore luthæo, ut prior. Cruor etiam ex uulnere secti exit: hæc officinis uocatur, cardus benedictus.

Syluestris
cartamus.

Cardus be
neditus.

Apium hipposelinum, sion, smyrnion. Quum apium absolute apud autores ponitur, hortense uenit intelligendũ, quod uulgo Petroselinum dicitur. Semina quæ à pharmacopolis passim uenduntur, eleoselini sunt, id est, palustris apii. Hipposelinum à Romanis olus atrum dicitur, non autem ab equis nomen sumpsit, ut quidam uoluere, sed à magnitudine sua. Nam apud Græcos ἵππος in compositione solam magnitudinẽ signat, in ijs maxime rebus, quibus nihil peculiare habet. Id quibusdam putatur apium, quod Galli, Ache, Germani eppich nominant, Ferrariæ uulgo appellant apium Macedonicum. Dissentiunt autores in Hipposelino & Smyrnio. Alii Hipposelinum, olus atrum nominant, alii smyrnion, quidam diuersa olera hæc iudicant, quidam eadem. Nam Plinius ait: Olus atrum hipposelinum Græci uocant, alii smyrnion. Theophrastus idem uidetur cum Plinio dixisse. Galenus smyrnion olus atrum uocat, Romanorum secutus nomenclaturã. Dioscorides & Plinius de iis priuatim ut genere diuersis egerunt. Forte ea herba est, quam Galli leuechrã nominant. Sion, Latinis dicitur Lauer, frutice pusillo, in profluentibus aquis emicante,

habitu subrecto, pinguiq; latis ac luxuriatibus foliis, olus atro-
similibus, minoribus tñ, odoratisq; Officinæ berulā uocant.

Berula.

Eruca.] Notissima herba est, in acetariis utimur, ob gustus
acrimoniam. Græci ἐρύωμον, Galli Raquetam appellant.

Ocymum.] Recentiores Græci, qui de re herbaria scripse-
runt, basilicum, hoc est, regium appellant: quod nomen apud
omnes fere nationes hodie usurpatum uidemus.

Gingidiū.
Chærefo-
lium.

Gingidium simile est scandici.] Gingidium forte est herba
ea quam uulgo Chærefolium appellant: non autem quam
Plinius Chærepyllon nominat. Olus fuit Pauli & Galeni tē-
poribus tritissimum in usu. Scandix syluestre olus est, ac ui-
lissimum si Plauto credimus.

IN LXXV. CAPVT.

Aspara-
gus.

A Sparagus.] Per hanc dictionem intelligi uolo, quæ pri-
mum in lucem prodeunt olerum germina, priusq; in fo-
lia explicentur, recentissimosq; turiones qui edendo sunt. In
summa, primos cauliculorum partus comprehendo.

IN LXXVI. CAPVT.

Bulbi.

Bulbi.] Bulborum facies, ut olim ueteribus fuit cognita,
ita nunc maxime cum officinis, tum medicis, pace erudi-
torum dixerim, incognita est. Sunt autem cepæ modo tunica-
ti, & fronde cepiria, tereti, angusta, in mucronē desinente, cau-
liculo dodrantali, in cuius fastigio flos emicat purpureus, ut
in scilla circumactus. Agri Gallici appetitus appellationē in-
diderunt, q̃ meram excitent cibi auiditatem. Verum genus
hoc q̃ in hortis copiosiore coma uiret, nucleis gracilioribus
nunc porretā, nunc unionetam à porri, uel unionis, tū sapore,
tū forma uocant. At nō solū propriæ cuidā plāta bulbi nomē
inditum est, uerum etiam rotundæ radices suis membranis tu-
nicatæ Bulbi nominantur, siue pluribus capitulis coagmen-
tentur, uno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus di-
stinctæ separētur, quales sunt croci, liliorū, narcissi, scyllæ, &c.

Pastinacæ uero, dauci & cari.] Ad uerbum ex Galeni libro
citato transcripta sunt. Pastinacæ species satis sunt cognitæ.

Officinariū
daucus.

Dauci uero & cari non item Sunt porrò tres Dauci species à
Dioscoride descriptæ: quam hodie in officinis habemus, sylue-
stris pastinaca est, ut sapor, odor & tota deliniatio ostendūt.

Verus Dau-
cus.

Nulla autem dauci species apud Dioscoridē pastinaca sylue-
stris est, sed tertia tantum huic comparatur muscario. Verus

Daucus

Daucus ex Creta exportari debet. Huius semina & radices in
ulum modicum ueniunt: aliarum specierum semina tantū.
Quia uero Dauci & syluestris pastinacæ eadem propemodū
uires existunt, ea pro dauco uti licebit.

Cari.] Officinæ carui dicunt Serapionem suum, aliosque Cari.
Barbariæ scriptores secutæ. Non tamē semen hoc carui quod
Pharmacopolæ uendunt, respondent Serapionis descriptio-
ni quippe crassius hoc esse dicit quam cyminum, officinarum
autem multo minus cymino est. Caros igitur forte una ex
nostratibus dauci speciebus erit, si semen etiam à Dioscoride
exiguum descriptum, respiciamus.

Ameloprasum.] Caule profilit bicubitali, foliis porraceis,
sed angustioribus, flore cādido, radice bulbosa. Prouenit in ui-
netis, unde à natalibus ampeloprasen quasi uitigineū porrum
Græcis noīatur. Nostrates officinæ uineate porrū appellant. Portum
vineæ,

IN LXXVII. CAPVT.

TVbera.] Hæc ex terræ sagina conglobantur, sine medul-
la, uina, cortice, solo undiq; circumdata, nullis fibris, nul-
lisq; capilamentis nixa, nec extuberante loco in quo gignun-
tur, aut rimam agente, nec ipsa terræ coherent Galli hæc tru-
fla nominant. Itali zunesta tarensole. Vere effodiuntur, nec
ultra annum durant.

Fungi.] Istorum origo prima è limo & acescente succo ma-
dentis terræ, aut radice ferme glandifere. Initio spuma len-
tior, dein corpus membranæ simile, mox partus. Cortice, me-
dulla, neruo, uena carent.

IN LXXVIII. CAPVT.

Chondrus.] Magna scriptorum recentiorum dissensio est, Chondrus.
Halica,
& adhuc sub iudice lis est Nam scilicet chondrus & hali-
ca diuersa inter se sint, cum apud Paulum distinctim scriban-
tur, an idem, cum apud autores Græcos chondrus, pro halica
Romana sæpius ponatur. Apud recentiores autem Græcos
ambæ dictiones coniungantur: Vt in Aetii sermone 9. cap.
10. in hunc modum: τροφὴν δὲ δίδόναι χόνδρον ἁλίκος μετ'
οἶνῳ λευκῷ. Quibus uerbis præcipit cibum dari chondrū ali-
cæ cū uino albo. Item discipatur, an hæc semina sint natura-
lia per se, an potius res factitiæ. Certe quantum ad primā cō-
trouerſiam attinet, collatis multorū autorū scriptis, chondrus
uidetur antiquorum in usu fuisse, si Galeno de uictus rōne in

morbis acutis credimus, quanquam lib. 1. de alimentis nomē eius apud antiquos perrarum fuisse prodat, ut fere sibi ipse cōtrarius uideatur. Alica uero teste Plinio, res Romana est, neque Pompeij magni ætate in usu fuisse traditur, nec pridem excogitata. Paulus noster ambo quasi consimilis usus ac facultatis, frequenter coniungit, ut lib. 3. cap. 31. ἔγω δ' ἐσοι ἀρτος πλατὸς ἐκ ψυχρῆς, ἢ ἀλῆς, ἢ χόνδρος. Id est: Panis tibi esto lotus ē frigida, uel alica, uel chondrus. Sic itaq; colligo, ut secunda quoq; discordia dirimatur, chondrum & alicam eisdem fere modis fieri, non autem semina, aut fruges esse per se. Paulus autem dicit alicam chondro in omnibus respondere, nisi quod uētre magis astringat. Nimirū propterea quod chondrus fiat ex zea, quæ Italis & quibusdam Germanis spelta nominatur hodie. Frumēti genus inter triticum & hordeū mediū. Alica uero ex tritico fiat, quicquid dicat Palladius de hordeo semimaturō. Ea hodie nobis puls frumentacea uocatur: ptisanæ cremori colatitio similis. Errant qui alicam ex zea, chondrum ex tritico fieri autumant. De chondro consulant Dioscoridem & Constantinū lib. 3. de re rustica. Interim uideas apud ueteres hæc duo confundi, ut quod alicæ tribuendum sit, chondro tribuant. Inueniasq; uarias uel chondri, uel alicæ conficiendæ rationes. Non etiam audiendi sunt, qui far apud Romanos dictum, chondrum esse arbitrantur: cum & ipsum far testimonio Archigenis frumenti quædam sit præparatio, ex zea nimirum & frumēto. Plinius testatur populū Romanum farre tantū ex frumento tercentū annis usum fuisse.

Panes.

Inter panes firmissimus.] Vfus sum dictione Celsiana, firmissimus, pro eo quod est alimenti plurimum præstans, quam in comparandi gradu τροφιμώτερος habeatur.

Syncomistus.

Syncomiston.] Hunc alio nomine Galenus autopyron appellat, quod ex omnibus suæ farinæ partibus citra ullā deductionem cōstet, inter furfuraceum & simillageum medius, syncomistos quasi confusaneus dictus, quoniam castratus nō sit, sed omnia simul tulerit, furfures, utriculos & similem.

Maza.

Polenta] Vide Galenū lib. 1. de alimētis, ubi polentam q̄ Græci ἀλφιτα νοίαν, recenset, ex hordeo nouello mediocriter tosto fieri, eamq; ueteres militib⁹ panis loco dare solebāt.

Maza.] Cū polēta liquore cōspergitur, atq; subigitur, mazæ appellationē assumit. Hinc quidā eruditus offam appellat.

Oryza.

IN PAVLVM AEGIN.

713

Oryza.] Hoc frumenti genus Gallicum, Germanicumq; Oryza.
uulgus detracta priore litera Rizon appellant.

IN LXXIX. CAPVT.

EX leguminibus.] Legumina, inquit Galenus ea ex cerea- Legumina
libus seminibus appellant, quæ panificio non accommo-
dantur, ut puta fabæ, ipsa, cicera olentes lupinum, oryza, eruū,
&c. Galenus uocat ὀσπερια & χεδρόπα.

IN LXXX. CAPVT.

DE temporariis.] Sic interpretatus sum ὥραις: quasi di- ὥραι.
ὥραις.
Fructus.
cas horarios. Nam Galenus cæteri q; græci id anni tem-
pus, horam appellant: in quo medio canicula sidus oritur, ad
quadraginta usq; dies perdurās, quo tempore omnes tempo-
rarij fructus, aut tempestiui, ut Plinius ait, proueniunt. At Ga-
lenus non solum horarios dici censet, q; eo tempore nascan-
tur, sed ut à cōditaneis discernantur. Sic ēt Plinius apposite di-
xit, de persico, q; a nō aliud fugacius. Hoc est qd̄ minus duret.

Omnia poma.] Græce est ὅλη ὁ πῶρα. Sic antea interpre-
tatus sum quicquid herbaceo fructu uiret, lignosi nihil exte-
rius habens. Proprie uero Galenus operam nominat libello
περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας, ficus & uuas: ut Paulus sequen-
ti capite etiam indicat.

IN LXXXI. CAPVT.

EX cerasijs.] Galenus commentario iam citato in hunc
modum de tempestiuis illis fructibus præcepit. Sunt autē
arborei prope dixerim uniuerſi fructus, uitiosis succis donati,
præter quas uocāt castaneas. Hæ si quidē exactā in uētriculo
concoctionē adeptæ, nutriunt, uerū succis crassioribus: malis
nequaquā. Aliarū arborū fructus temperarij omnes maligni
sunt, nā si in uentricula cōputrescant, medicamenti deleteri
naturā fere induūt, sicut & mora, licet ea persicis dictis & pru-
nis moderatiora sunt. Tamen corruptelam nihilominus illic
prauā sustinent, &c. De usu horum paulo post ait: A uitiosis
semper abstinendum, nisi cū ægroti æstate totius corporis
siccitatem caloremq; emendare conantur. Cōueniunt enim
tunc poma, pira mora, cerasia adsumpta. Cucumer uero, pe-
po, & melopepo, item præcocia dicta, uel persica modice tunc
manducari debent.

Aliquādo
uitiosis
utendum.

In uniuerſum, astringentia.] Vide Galenum lib. 2. de ali-
mentis: ubi rationem tradit, cur rethori cuidam astringen-
tibus

tibus sumptis post alios cibos laxantes uenter fuerit solutus. Ibiq; hæc Pauli sententia copiosius explicatur.

Primæ mē-
sæ qui cibi
cōueniunt.

Eoq; primum exhiberi debent.] Idem Galenus libro supra nominato confirmat in hunc modum. Omnes cibi qui prauum succum cum humiditate, & lubricitate obtinent, ex facili descendunt, eoq; prima mensa sumi debent.

Duracina.

Constanti-
nus.

Duracina.] Sunt qui lectionem hanc deprauatā putant, uelintq; legi pro duracina, rhodacina nulla plane ratione ualida nitentes. Galen. quidem & alii uetustiores hoc uocabuli non usurpant, uerum recentiores græci, uti Paulus, hoc cum Rhomanis commune habent. Vocantur autem duracina, q̃ corpus ipforum pertinacius ossi hæreat, quā ut auelli queat.

Græci δωρακινά, uel δερρακινά dicunt, latinos fere imitati. Cōstantinus lib. 10. de agricultura. ἐπειδὴ δὲ ἴσμεν τὸ δωρακινὸν ταχέως γηγράσκον. Paulo post, ἐστὶ δὲ πρὸς τὰ δωρακινά, ὅσα φυτεῶν ἐπὶ τὰ φυτὰ.

Druppæ.

Druppæ.] Plinius lib. 13. cap. 26. Oleum & Omphacium est. Fit duobus generibus, & totidem modis ex olea & uite: olea adhuc alba expressa, deterius ex druppa. ita enim uocatur, priusquam cibo matura sit, iam tum colorem mutans, &c. Græci δρυπετάς appellant.

Pistacea.

Pistacea.] Vide Plinium. Fructus est ex nucum genere, qui è Syria apportatur: Crescit arbore omnino nuda, præterquam ramorum cacuminibus. Hæc enim conantur densiore folio, angusto, maiore tamen quā lentisci subruffo, surculis dependētibus pineæ nucis similitudine. Lutetiæ in quibusdam hortis est uidere nunc. Officinæ pharmacopolarū uocant fistica, aut fisticorum grana.

Phistica of-
ficinar.

Sirica.

Vide an re-
centiores cū
ueteribus
cōueniant.

Sirica.] Galenus ita uocat zizipha à recentioribus græcis appellata: quæ officinæ sephisiariorum iuiubas nuncupant. Recentiores maxime commendant hunc fructum, ut boni succi. Galenus ut prauo donatum reiiciendum putat, illi præterea stomachum gratum, hic cōcoctioni rebellem prædicat. item illi aluo subducendæ conuenire, hic astringere aluum. Aetius recentior, calore & humore temperata tradit, eoq; sanguinis acrimoniam edomant. probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciūt. Decoctum eorum tussim & difficultatē spirandi lenit, pectori, renibus, uesicæ, prodest.

IN

IN XCII. CAPVT.

Molles.] Addidi cute, & paulo post, dura carne, dixi, ne ex simplici uocum interpretationem cōtraria inter sese posita uideri possint Sūt itaq; pisces hi molles cute si attingas, duri autem carne, ut Galenus habet lib. 3. de alimentis. Nihil in capita præcedentia sum commentatus q̄ & facilia, & ex Galeni libro iam citato sint omnia fere decerpta.

IN XCIII. CAPVT.

Cartilaginea.] Hi pisces superioribus sunt contrarii, nam duram habent cutem: mollem autem carnem. Cæterum Galenus selache dictos affirmat, ἀπὸ τῆς σέλας ἔχειν, hoc est, quia splendorem habeat eorum cutis.

Selache
Pisces.

IN XCVII. CAPVT.

ITaq; somnus.] Galeno lib. 3 de causis pulsuum in hūc modum somni generationem describit: ὁ μὲν γὰρ ὑπνὸς γίνε-
ται τῆς ἐμφύτης δερμασίης ἢ τοι δια κάματος τινα, καὶ ξηρό-
τητα πλέοντα πρὸς τὴν τροφήν ἐπιτραφέως, ἢ διὰ ἀμετρίαν
υγρότητος ἀδυνατίσεως ἐκτὸς ἀποτένεσθαι ἐπὶ δ' ὁ μὲν πρότε-
ρος υγιεινὸς τε καὶ κατὰ φύσιν, ὁ δὲ δεύτερος ξηρὸς, οἷος ὁ ἐν κώ-
μασι τε καὶ ληθάργοις. Hoc est: Etenim somnus fit, cū natu-
ralis caliditas, uel ob defatigationem quandam & maiorem
ficcitatem ad alimentum conuersa est, uel ubi propter nimiam
humiditatem foras nequit extendit. Prior sane est salubris, &
secundum naturam. Secundus autem dictus, qualis in comate
& lethargo, &c. Paulo post: τῶν δ' ὑπνῶν τῶν κατὰ φύσιν, ὥσ-
περ ἐν καὶ τῶν ἐξηγηγμένων ἢ γενέσις οἷα πρὸθεν εἴρηται, θεο-
μένε μὲν ἅμα, καὶ ἀπορῆντος υγρότητος διαφκλῆς τῆ κατὰ φύ-
σιν ἐν τοῖς ζώοις δερμῶ, καὶ διὰ τὸ το συνιόντος εἰς τὰ σπλάγχ-
να, καὶ τὴν γαστέρα τῶν ὑπνῶν γινομένων. ἀντάρκως δ' ἀπολάυ-
σαντος ταύτης ὥς ἡ δὴ τὴν κατὰ φύσιν ποιότητα ἔχειν, τῆς ξη-
ρόσεως ἀποτελημένης, &c. Hoc est. Sōnorū uerò naturalium,
sicuti ēt uigiliarū generatio existit qualis antea exposita est,
nēpe ut somni fiant cū naturalis animantium calor indiget
quidē simul & destituitur copiosa humiditate, eoq; ad uiscera
& uentrē cōmeat: ut aut uigiliæ, cū idem calor hac humidi-
tate potius fuerit abūde, ut iā naturalē habeat qualitātē, &c.
Nā ex alimēti cōfectione multa uaporosa humiditas in ipso
calore, meatibus, omnibusq; particulis intermediis suggerit.

Somni ge-
neratio.

Virium

Mutua ui-
rium subfi-
dia.

Virium animalium requies.] Hoc est, ipsæ quidem non agunt, sed naturalibus subsidium adferunt: eoq; præcipitur recte, ut dum fit concoctio, etiam in uigilantibus, abstineatur à lectione, disputatione, aut cogitatione graui, ne uis naturalis alio distrahat, nā mutuo sibi ferūt auxilia, impedimētaq;.

Tempus
somni.

Tempus somni optimum à cibo.] Intellige, non statim: nā somnus statim à cibo, caput replet, ut etiam plethoricæ dispositiones, si Galeno in Aphorismis fidem accommodamus.

Terminus autem somni.] Non sunt audiendi qui unum omnibus terminum somni præscribunt. Nam alii celerius, alii tardius concoquunt: hi plus assumunt, illi minus. Quare Galenus recte in commentario de euchymia & cacochymia tradit. Quibus itaq; exercitationibus plurimis uti licet, & quam diu libet dormire, ij & cibos crassi succi, & uiscosos tuto assument. Quæ ita græce sonāt ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις οἶοντ' ἐστὶ γυμνασίοις τε πλείοσι χρῆσθαι, καὶ κομᾶσθαι μέχρις περ ἂν ἐθέλωσι, &c. ut supra dictum est.


IN XCIX. CAPVT.

Catapho-
ra.
καταφέ-
ρειται.

Cataphora.] Dictio græca est, à uerbo καταφέρειται, quod est obdormiscere uehementius. Vnde etiam καταφορικὸς ὕπνος dicitur. Latine interpretari possis, grauis aut uehementis soporis impetum. Galenus sub hoc nomine, alios affectus soporosos uidetur comprehendere, καταφορὰς inquit, βαθείας ἐργάζεται. ἃς ὀνομάζουσιν ἀποπληξίας, καὶ κάρους, καὶ κατόχας. Hoc est, Cataphoras profundas efficit, quas nominant apoplexias, & caros, & catochos.

In Epistola Dioclis habetur συνάγχην νύκτωρ. In qua uitiū esse puto. Nam quid sibi uelit νύκτωρ, non satis intelligo. Angina enim omni tempore solet excitari. Nihil itaq; mali erit, si legas pro νύκτωρ, νυκτάλωπα.

FINIS LIBRI PRIMII
COMMENTARIORVM.



COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER SECVNDVS.

CAPVT I.



LIBER hic secundus de febribus, & earum accidentiis facili tractat compendio, ex Galeni opere de medendi ratione ad Glauconem magna ex parte transcriptus. Nonnulla uero Paulus noster ex opere de Crisibus, pauca ex Prognosticis Hippocraticis, quædam ex aliis autoribus sumpsisse uidetur. Cæterum à morbis similibus auspicaturum se dicit, qui quatuor constant intemperaturis. Quia uerò calida omnium est efficacissima, merito ab hac appellationem desumpsit, febres, morbos nominās similes, qui nimirum etiam simpliciores dicuntur. Compositos in tertio quartoq; uolumine persequetur.

Oribasii compendio.] Iulianus olim Imperator medicinā suo tēpore uagam amplamq; intelligens, præstantissimos ex omni regione medicos Romæ colligendos magno studio curauit, delegitq; ex uniuerso illorū numero septuaginta duos, qui diuersis antiquorum aurorum monumentis euolutis examinatisq; necessaria magis in artem medicam compendiosa ratione comprehēderent. Hi igitur oēs, sua prius rōne & uia, singulatim explicata, uno tandem consensu scribendi prouinciam Oribasio ut facile principi, doctissimoq; tradiderunt. Is uaria Galeni opera, aliorumq; nonnullorum perscrutatus in compen-

compendium quoddā septuaginta duobus libris comprehensum (tot enim fuerant conuocati medio) artificiosè redegit. Paulus autem Aegineta opus hoc maius esse animaduertēs, quàm ut iter facturo circumferri possit: aut ab homine tenuioris fortunæ comparari, in septem tantum libros constrinxit.

Castigatur
codex.

Ex Galeni sane. In græco male legitur ἐκ τῶν Γαλινῶν μὲν ὡς μάλιτα. Hic ὦ est superfluum: ac legi debet Γαλινῶν μὲν ὡς μάλιτα. Hos & Orosius, & castigator Basilienſis præterit:

IN II. CAPVT.

αἰσώως.

VNa uice.] In græco est αἰσώως, quod cumulatim signat, ac una uice. Celsus dixisset semel. Contrarium huic κατὰ μέρος, & κατ' ὀλίγον, quod est, particulatim, & paulatim, multisq; uicibus. Quando scilicet morbi in abscessum finiūt pluribus diebus fit erisis.

Græcus
codex ul-
ciosus.

IN III. CAPVT.

NEq; enim capitis.] Ex Galeni 1. de diebus decretariis hac transcripta sunt. Desideratur autem in Paulo uocula, δέ, habet enim πυρετὸς εἰς βάλλων, pro πυρετὸς δέ εἰς βάλλων, quod neglexerunt Aristarchi.

Aliquem latere.] Galenus addit emphaseos gratia καὶ ἀναϊσθητότατος εἶναι, hoc est, etiam si stupidissimus, & ab omni alienus sensu fuerit.

IN IIII. CAPVT.

νεκρῶδες.

LEthales notæ.] Subsequentes scilicet, facies cadauerosa, sano quàm dissimillima, et quæ mortuum imitetur, unde græcis νεκρῶδες dicitur. Nam si ex Hippocratis sententia, similis sit sani præsertim ipsius, qui nunc ægrotat, faciei, optime sperandum est. Porro notæ hæc sunt in morbis acutis, diuturnis, animi defectionibus, doloribus, item omnibus defunctis. In faciei autem, quod imprimis appareant, & uim obtineant maximam: Cadauerosa, quoniam natura debilitata, nō amplius sanguinem & spiritum in hanc suppeditat.

Laurentia
nus.
Nares acu-
tæ.

Nares acutæ.] Ita Celsus interpretatur Nescio cur Laurentianus Nasus cōpressus uerterit, quod græcis dicitur ὀξεῖα ξίς Sunt autem nares acutæ, aut ob aliquam causam carnosas animalium partes consumentem, corrumpentemq; , aut ob debilitatem caloris natiui, qui non magis in extimas corporis partes extendi potest, sed in uisceribus solis exiguus remanet.

net. Quo fit, ut non amplius tantum sanguinis, aut spiritus in partes illas affluat. Cum autem in naso osseæ partes & humide carnosæq; sint, inuicem commissæ: deinde quum osseæ propter terrestrem ipsarum substantiam similes permaneant, humidiores autem consumi facile possint, & in se concidere ob inopiam tum spiritus tum sanguinis, fit ut nasus gracilescat.

Oculi concaui.] Ob easdem causas fiunt: sed quanto extremo naso humidiores, mollioresq; existunt, tanto citius cauantur. Imo etiam spiritus animalis copiosi participes existunt, & caloris non pauci, quibus ipsi destituti merito contrahuntur. Cadauerosa igitur facies quæ sequentia apud Hippocratem obtinet, in diuturnis sæpe morbis uisitur: raro per initia, ob quod & periculosissimū est, & in acuta morbo prorsus lethale: tãquã ne occasione quidẽ habuerit à tẽpore. In morbis autẽ lōgis nō adeo lethale: ita nec in frigido loco, hyeme, statu aeris frigido, & senectute: quia morbus naturæ respōdet.

Si hæc ueq;] Aut tali aliqua manifesta causa, minos periculosum est, quam si ob morbi malitiam, etsi præstaret, neque ab eiusmodi causis uirtutem prorsus debilitari. Celsus optime hanc sententiam lib. 2. exprimit latine. Si hæc, inquit, ita sunt, ut neq; uigilia præcesserit, neq; uentris resolutio, neque inedia. Dixit autem Hippocrates neq; ex uigilia: quia ex hac oculi, ueluti chorda ex siccitate tenduntur.

Vigiliæ,

Vacuatione. Intellige per alui profluuium, & mordicationem, ut Galenus apud Hippocratem interpretatur. Verum Hippocrates habet τὰ τῆς κοιλίας ἐξυγροισμένα ἢ σφοδρῆς, quod est: Alui uelementer humectata. Celsus dixit uentris resolutio. Paulus utitur dictione κοινώσεως.

Vacuatio,

Aut inedia.] Hippocrates dixit λιμῶδες τι, quasi famelicum aliquid, aut fames quædam Paulus ex Galeno ἀσιτία, hoc est, inedia. Cæterum & alui resolutio uehemens, & inedia corpus siccant, adeo quandoque, ut per se emortuam hanc faciem inducant.

Inedia.

Si oculi lumen refugiunt.] Hoc est, auersantur, ob uisoriæ facultatis imbecillitatem. Quæ quum propter instrumentorum affectionem laborat, quemadmodum in lippitudinibus, aut ob alium quendam fluxum præter naturam quidem est, non tamen mortale: cum autem per se afficitur, lethale.

Illachrymant, nō ex quadam] Hippocrates habet ἢ γὰρ τὴν

τὴν

Hippocra-
tes.
Celsus.

τὴν αὐγὴν φεύγουσιν, ἢ δακρύουσιν ἀπροαίρετως. Hoc est: Si n-
lumen refugiunt, aut illachrymant citra uoluntatem: nimi-
rum ob facultatis retentoriae imbecillitatem. In Hippocra-
te additur: ἀποτρεφῶσιν, quod est, peruertuntur. Celsus sim-
pliciter dixit, si præter hæc oculi quoq; lumen refugiunt, &
illachrymant. Paulus autem pulchre distinguit, causa tum ex-
teriore tum interiore, quæ sane utraq; lachrymas sæpe in ocu-
lis mouet.

Ad hæc si alter ex his minor.] Quæ nota facultatem ip-
sam dispensatam emori significat.

Album
oculi.

Quæq; in ijs alba.] Sicut in lippitudinibus quibusdam &
ebriosis nonnullis Iudicim uero est plenitudinis in cerebro,
eiusq; membranis: interim & inflammationis. Vtroq; enim
modo sanguis ad oculorum uenas exprimitur. Album oculi
pars est pupillam ambientis, pericranii extremitas.

Aut nigricent.] Refrigerata scilicet. Refrigerantur autē
emortua. Idcirco mali colores perpetuo apparent.

Pituita a
pud Celsū
in oculis p
græcorū.
Λήμας.

Crassior pituita.] Græce λήμας, quod Plinius lib 23. cap. 1.
dixit, græco usus uocabulo, uel inquiēs, si lemæ in oculis erūt.
Nos Celsum imitati libro secundo, de indiciis mortis, quod
caput ex Hippocrate transtulit, diximus, pituita. Habet ille,
pituitaq; in iis innatans nouissime angulis inhærescit. Cæte-
rum Galenus Lemas exponens, dicit semicocti alimenti esse
recrementum. Nam facultas oculum dispensans imbecilla al-
latum nutrimentum nequiuit concoquere. Iam fiunt etiam
lemæ in lippitudinibus tum ob humiditate præter naturam
copiam, tum ob instrumentorum uicium.

Per somnum alba.] Ex 14 cap. prognosticon Hippocratis
sumptum uidentur. Ita uero apparent, ob imbecillitatem fa-
cultatis palpebras mouentis, cum citra causam exteriorē
constituitur.

Stridor ex
quibus
causis.

Stridere dentibus,] Hippocrates adiicit, quibus à pueritia
consuetum non est. Fit autem ex cerebri offensione, & per se
delirium significat: cum delirio autem, mortem. Cæterum
fiunt stridores dentium, cum temporales & masticatorii mu-
sculi modo conuulsorio mouentur. Quibusdam accidit, ipsis
tantum musculis affectis, uel ab origine, uel postea ex quadā
causa. In nonnullis principio neruorum in eiusmodi affectio-
nem deducto, unde potissimum illorum quæ ab eo nata sunt,
conuulsiones

conuulsiones fiunt, ut hic neruorum musculus insertorum.

Aut in ueste floccos legere.] Hoc græce dixit Paulus unico uerbo κροκυδίαν, quod Hippocrates τὰς κοκκίδας ἀπὸ τῶν ἱματίων ἀποτίλλαν dixit capite uigesimo octauo. Celsus hoc interpretatus libro secundo: ait: Si in ueste floccos legit, sim- κροκυδίαν.
briasq; deducit. Id autē fit corporis humoribus ad caput exhalantibus. Quorum uapore purus ille pupillæ humor inficitur, unde prædictæ oriuntur imagines, ut in suffusis. Vbi enim niger aliquis, aut crassus antestat, lumē uisoriū prohibēs foras excedere, pro humoris subsistētis natura, imagines generant.

Si æger supinus.] Hoc à decubitu iudicium sumptum est. Galenus in prognostica Hippocratis capite septimo scribit, id neq; ad salutem, neq; ad mortem habere momentum, sed medium esse, aut parum ad alterum declinare. At si consuetū ægro est, ita cubare, & medicum ingredientem non reueretur, ex bonis signis est. Sin autem consuetum non est, & medicum reueretur, malum est.

Veluti resolutus.] Græce est ὅτον παρεμμένον. Nam πάρεσις πάρεσις.
idem quod παράλυσις: Sed illa incertis quibusdam partibus, hæc in toto corpore obuenire dicitur. Sit igitur, ueluti artubus resolutis. Forte idem est quod dixit Hippocrates καὶ χεῖρας καὶ τράχηλον, καὶ σκέλεα ἔχειν ἐκτεταμένα. Hoc est, & manus & ceruicem & crura habere extensa: non contracta. Celsus dixit, ubi supinus æger iacet porrectis manib & cruribus.

Vel si etiā deorsum.] Hoc inquit Galenus facultatis corpus gubernantis abolitionem testatur. Celsus dixit, ubi deorsum ad pedes subinde delabitur.

Spiritum.] Hoc est, totam respirationem frigidum, ob extinctionem caloris natiui. Græce est ἀναπνεῖν, quod est, respirare, Celsum secutus dixi spiritum elidere. ἀναπνεῖν.
Spiritus
elidere.

Item pulsus languidus.] Hippocrates pulsus non meminit. Languidus autem, quem alii obscurum uertunt, imbecillitatem uirtutis fatetur. Creber magnam necessitatem, deficiens per interualla, aut ut percipi uix possit, extremam debilitatem.

Sudore digeratur.] Græce est ἰδρῆν συγκοπτικῶς, quasi di- ἰδρῆν συγκοπτικῶς.
cas sudare ad syncopen. Vide Hippocratem. Celsus in Cardíaco dixit: Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas κῶς.
corporis, quod stomacho languēte immodico sudore digerit.

PAULI AEGIN.

Z

Pulsus

εὐσφυξία.

Pulsus uegetior,] Græca dictio est εὐσφυξία, quasi dicas: bona pulsatio Hoc est mediocris magnitudine, frequentia & celeritate: æqualis sibi per omnia.

προσφο-
ραι.

Bene erga cibū.] Paulo aliter sonant uerba græca, εὐέχειν πρὸς τὰς προσφορας. Hoc est: bene habere ad oblationem intellige c. bi.

IN V. CAPVT.

SI quatuor particul.] Quum nimirum materia est extra uasa. Sicut autem morbus totus quatuor, habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinationem, ita quoq; particulares accessiones Vide Galenum de morborum temporibus, & de totius morbi temporibus, quem librum nos latinitate donauimus.

Cuius extremus] Hoc est, longissimus, quasi dicas: Si longissime producat, in septimana iudicatur. Nam teste Galeno exacte peracutus is est, qui quartum diem attingit. Non exacte, qui ad septimum usq; producit. Ita inter acutos, alius exacte acutus, qui ad usq; diem quartum decimum producit. Non exacte uero, qui usq; ad uigesimalum durat, quāquam & ipse acutus sit.

Sin autem inde in quadragesimum incidit, acutus ex decedentia, quem græci κατὰ μετὰ πτωσιν appellant.

Quarto die crīsim.] Nam quarto plerunq; soluunt, aut occidunt. Si multum, ad septimanam perdurant.

Sed duodecim] Quæ accessionis longitudo maxima est, tertianæ exquisitæ dictæ, quæ intra quartūdecimum, hoc est, antequam omnino prætereat, soluitur.

Longus.

Talis morbus longus] Vt est quarta, & semitertiana, tertiana non exquisita.

Acutorum
duplex na-
tura.

At si particulares.] Galenus l. b. 2. Duplex autem horum acutorum quoq; natura est. Vel enim accessionum remissiones in exactum integritatem finiunt, uel continua, semper febris manet, quæ particulares accessiones non habet, materia in maioribus uiscerum uasis subsistente.

Corrigitur
codex græ-
cus,

Si quidem facies, & totum.] Intelligi primis diebus. Nā fieri potest, longo tempore ex parua febris, ut corpus modice collabatur. Modice autem dixit: quia nimium consumi & præter rationem facultatis retentoriæ imbecillitatem testatur. In codice græco, superflua est particula &. Nam legi debet: τὸ

πρώτων,

πρόσωποι, καὶ τὸ λοιπὸν, &c. non autem τὸ πρόσωπον εἰ καὶ τὸ
λοιπὸν, nam una hæc uocula sententiam peruertit, quod nec
Orosius intellexit, nec Basilienſis corrector.

Si prorsus nihil.] Græce est. αὐτὰ πᾶσιν ἀσύμπτω-
τον, quod est: Sin autem omnino non collapsum est. Celsus
latinius lib. 2. cap. 4. de signis lōgæ ualeitudinis dicit: Vbi æger
pro spatio parum emacrescit.

ἀσύμπτω-
τον.

Ex arteriarum motu.] Magnus pulsus, qui in omnem di-
stantiam attollitur, fit ob magnum refrigerij usum. Citatus,
ubi magnitudo pulsus non sufficit, additur Celeritas. Sicuti cū
qui magno incedit passu, non potest iter institutum tempe-
stius absolūere, nisi eundem gradum acceleret. Creber, ce-
leritatem adhuc adiuuat, dum breuem facit ab opere quietē.
Veluti qui nunquam intermitit, uerūm semper iter repetit,
quod celeriter perficit atq; maximum usum refrigerii indi-
cat. Vehemens, robustis uiribus, natura strenue se ad fuligino-
sa excrementa expellenda accingente.

Pulsus.
Magnus.
Cicatus.

Creber.

Contrarius longum] Hoc est: Paruus, tardus, rarus, lan-
guidus. Paruus quia tantus color nō est, qui refrigerari ualde
requirat, aut uiribus imbecillis, materiaūe oppressis.

Paruus.
Tardus.
Rarus.

Quatenus calidæ, & urētes] Subaudi ad tactum Hęc sum-
psit ex libro primo Galeni ad Glauconem capite de curatio-
ne doloris capitis.

Delitescentes.] οἷον σμυχόμενοι, græce est. Interpretantur
autem, grammatici σμυχόμενοι ἀφανιζόμενοι, quod est, non
apparentes. Galenus utitur hoc uerbo, præterquam in li-
bro supra citato, secundo etiam de iudicatoriis diebus. Qui
nanq; inquires, ad quartumdecimum, aut uigesimum diem
morbi prorsus acuti exciderunt, hi plane inceperunt tanquā
σμυχόμενοι, lento motu. Nihil refert etiam si interpreteris,
mitiores & languidæ. Habetur in codice Græco ante σμυχό-
μενοι dictio μαλακώτεροι, fac tu μαλακώτεροι.

σμυχόμε-
νοι.

IN VI. CAPVT.

Magna ex parte.] Recte dicitur, magna ex parte, quoniā
plurimi longi affectus teste Galeno libro secūdo de die-
bus decretoriis, etiam excretionibus finiuntur, sed non mani-
festis. Potissimum autem abscessibus, & concoctione. Qui
enim ad quartumdecimum crudi sunt, non ante quadragesi-
mum soluantur.

Dies decre-
torij qui.

Dierum decretoriorum.] Antequam dies ipsos enume-
remus, apte prius dicetur, cur ita appellentur, Græci uo-
cant, κρισίμους quasi iudicijs dicatos. In quibus natura cū mor-
bo pugnante, iudicium expectatur, natura ne morbum sit su-
peratura, an morbus naturam. Hoc autem fit, quando facul-
tas alicui siue qualitate, siue quantitate, siue utroque corpus
offendentis, operi suo ualentissime se accingit: quæ uere Cri-
sis dicitur. Hæc autē singulis diebus potest accidere, teste Ga-
leno, sed non æque frequenter, nec æquali fide. Hinc Paulus
noster inquit: Dierum decretoriorum alii de ægris frequen-
ter, cum fide, nempe cum excretionem quadam copiosa, aut
abscessu non obscuro. Post quæ morbi reciduae timēda nō est.

Salubriter.] Græca dictio est ἀγαθός, quod est bene: quo
die morbus ad sanitatem desinit, eoq; dixi salubriter.

Perfecte.] τελώς interpretatus sum perfecte, iudicat au-
tem is dies perfecte, qui nihil amplius in morbo facit reliquū.

Manifesto] Hoc est: Quo cum excretionem, aut abscessu
quodam euidenti morbus solutus est.

Natura
motibus
ordinatis
guberna-
tur.

Insigniter.] Paulus dixit græce ἐπισύμους, Galenus εὐσύ-
μους, quasi cum bonis signis. Hoc est, qui prius à contempla-
torio iudicatus sit, Iam intelligendum uenit, naturæ motus
proportionibus definitis fieri, & circuitibus ordinatis, cū mor-
bi materiā superauerit: prohibetur autem quum non plane
superauerit. Septenarij igitur circuitus ualidissima sunt uir-
tute præditi: mox quaternarij: quædam uero extra hos exci-
dunt: quos coincidentes seu intercalarios nominare licet. At
perfectus circuitus est, ex tribus septenariis compositus, qui
nimirum uiginti constat diebus Vnde liquet non omnes se-
ptenarios inuicem separari. sed nonnullos coniungi, ut etiā
quaterniones. Nam hi teste Oribasio in ipsis partibus à præ-
cedente numero incipiunt: post ipsas uero partes absq; præ-
cedente numero procedunt. Porro secundus sextenarius cir-
culus à primo disiunctus est, testimonio Hippocratis ex Apho-
rismo quarto decimo libri secundi, secūdi septenarii, octauus
dies initium est: tertius septenarius circuitus secundo cohæ-
ret. Vnde fit ut non eadem proportio post quartumdecimū
diem seruetur. Nam ab ipso quartodecimo, qui finis secundi
est, tertius incipit: post uigesimum diem, idem circuituū or-
do per-

do perpetuo cōsistit. Hinc est quod apud Hippocratem probetur maxime, post septimum, quartumdecimum, uigesimū, uigesimūseptimus, trigessimusquartus, quadragessimus. Respō debet ergo trigessimusquartus, quartodecimo, quippe qui ex duobus septenariis sit coniunctus. Et quadragessimus, uigesimo, ut qui tertium septenarium coniunctum expleat. Eadē ratione commendat sexagesimum, octuagesimum, centesimum, centesimum uigesimum, ut perfectos circuitus. Iā quaterniones ita habent. Secundus & primus coniunguntur: tertius à secundo separatatur. Quartus autē tertio, & quinto coniungitur: quintus iterum sexto. Atq; ita quoque post uigesimum, ut in septenariis proportio seruetur. Concidunt eis nonus, quintus, & tertius.

Sunt itaq; potentes ad iudicandum septenarii: mox quaterniones. Quartus enim dies morbos qui primo non desinunt, soluit. Undecimus quos septimus nō discussit. At si maior morbus sit quā ut quarto die crīsim subeat, certe solutio ipsius in eodem pręparatur: septimo autem finis morbi adiicitur. Qui uero morbi septimo die non finiunt, undecimo natura soluere molitur. Atq; sic in ipso uel decernit, uel quartodecimo pręparat. Ac omnibus pulchre euenientibus, nullo admissio errore, ad quaternionum circuitus iudicia omnino perueniunt. Erratis autem quibusdam admissis, in coincidentes, seu intercalarios recidunt, quanquam in facta iam crīsi iudicāda, pręstat eam in nono factam esse, quā octauo, ut quę sit tutior, & fidelior: Itaq; differunt quaterniones ab intercalariis, natura & usu: natura ut dictum est: usu, quod ad futurę crīsis cognitionem sufficiant. At morbi acuti impari dierū numero, longi pari iudicantur. Inuadunt quidam morbi secundum diem priore grauiorem habentes: quartum tertio, & totas accessiones in diebus partibus, qui longorum morborum iudices sunt. Protinus autem ut acuti propter accessionis uehementiam finiuntur, hi ēt secundo die interficiunt, & quarto: uerum sexto plurimos. Cæterum dies intercalarii, tertius, & quintus, non minus quā quartus decernunt. Nam perturbationis euidentia naturam ea quę molestant, etiā ante tempus propulsare compellit. Proinde primariam decernendi uirtutem non habent, sed per accidens aliquod sic eueniūt. Quoniam enim natura non conueniēti semper tempore de

morbis decernit, sed concitata plerunq; alias aliis de causis, à quibus accessio in morbis acutis maxime continua redditur, in imparibus acutorum iudicia fieri ratio est.

Exiguum naturæ impetum] Hoc est, si uel modice natura ad expetendum aliena se accinxerit. Ex primo Galeni libro ad Glauconem de curatione doloris capitis hæc transcripra sunt, ubi ita habetur: ἡ μὲν γὰρ ἐξ ὁδομῆς ἡμέρα, καὶ κατὰ τὰς βραχέας παρασκῶδ᾽ τῆς φύσεως ἔξομα πρὸς τὴν διὰ νύκτεως κρίσιν. Hoc est: Nam septimus dies etiam ex paruis naturæ apparatibus ad crisim quæ per euacuationem confit, erumpit, itaq; ad quartumdecimum usq; diem ualentissima. Græci erat ἀγωνιστικώτατα, hoc est, maximo cum certamine, & impetu naturæ. Ex lib. 2. de diebus decretoriis.

ἀγωνιστικώτατα.

Prorsus elanguescunt] Superius dixit de diebus post uigessimum succedentibus: quod scilicet uehementiam in iudicando remittant. ita hic eos qui post quadagesimum sunt, prorsus, lāguescere in naturæ moribus. Græce est τελέως εἰσὶν ἐκλυτοί, quod est, omnino sunt resoluti. Male autē in codice Græco impresso est ἐκλυτοί pro ἐκλυτοί. Nec hoc aduerterūt Oroscius & Gemusæus.

Lectione codicis Græci castigata.

IN VIII CAPVT.

Concoctionis signa] Galenus lib. 1. cap 3. de Crisibus eadem plane habet. Dicit autem signa decretoria nonnunquam male euenire, propterea quod apparētibus scilicet decretorijs citra concoctionem, natura ob perturbationis uiolentiam, quæ alias ab aliis causis accidit, ad expellendum coacta, crisis uel bona, uel mala fiat.

Neq; igitur per initia.] Ex eodē Galeni libro capite octauo sumptum est: sequitur autem in Paulo Græco: ἔτε ἢ ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οὔτε ἐν ταῖς ἀναβάσεσιν αὐτὰ φαίνεσθαι χρὴ, ἀλλ' ἐν τῷ τῆς παρακμῆς χρόνῳ. Hoc est: Neq; igitur per initia, neq; in augmento ipsa apparere, sed declinationis tempore conuenit. Galenus autem habet: ἔτε γὰρ ἐν ἀναβάσεσιν, ἔτε ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀκμῶσιν αὐτὰ ἐπιφαίνεσθαι χρὴ. Quod est: Neq; n. in augmento, neq; principio, sed in uigore ipsa apparere oportet. Cui lectioni ego assentior. Nam testimonio Galeni lib. 2. de Crisibus, capite quinto: Exquisita cōcoctio status tempore confit. Ergo si morbus ante statum iudicatus fuerit, malo est. Mutandum itaq; in Paulo ἐν τῷ τῆς παρακμῆς

Lectione codicis Græci uiniata.

παράκλησις ἐν τῇ αὐτῇ ἀκμῇ. Hoc nō intellexisti Orosci, nec tu Gemusēs aduertisti.

Si accessiones urgeant.] Galenus lib. 3. de Crisibus, capite quarto, inquit in hunc modum: εἰ μὲν γὰρ ἐπέγουντο, καὶ προλαμβάνειν αὐτὰ τῆς συνήθους ὥρας, &c. Hoc est: Si enim urgeant, praeuertantq; horam consuetam. Paulus habet: εἰ μὲν ἐπιτένουντο, hoc est, si intrudantur, quod postea explicatur per hanc clausulam: Et uehementiores multo fiant. Quare cum Galeno etiam legendum censeo, ἐπέγουντο, non ἐπιτένουντο, quanquam non adeo refert, utrum malis. Galenus certe paulo post eodem uerbo eadem in re utitur: πρόσθικλον inquit: ὥς ἐπὶ τὴν ἡρίαν ἐπέγεται, &c.

Item ijs qui ob rigores.] Nempe ijs qui febribus laborant intermittētib. Parum proprie dixi rigores, nam hi proprie de frigoribus uehementibus, aut duritie ex frigore cōtracta, aut etiam sine frigore dicitur. Vt apud authores idoneos est inuenire. Græca autem dictio ῥίγος, totius corporis cōcussio. Rigor. nem significat. Celsus eā uocabulo horroris qui Græcus φρίκη dicitur, interpretatus est. Plinius tamen libro septimo capite quinquagesimo scribit: Gertis pestifer calor remeat horis, aut rigor. Capiamus itaq; hoc loco rigorem, pro uehementi horrore, ut Galenus est autor.

IN X. CAPVT.

ANte quamlibet iudicationem, agrotus grauiter excruciat. tur.] Caput hoc ex primo Galeni ad Glauconem libro, sumptum est. Excruciat autem grauiter, quia natura in totum contra morbum insurgit, ad expellendum ea quæ præter naturam sunt. Græce est δυσφορία προηγείται Hoc est ad uerbum: Difficilis tolerantia præcedit. Nam δυσφορεῖν uerbum. signat agre morbum ferre, inquietū esse, exagitari & affligi.

Atque his obuenientibus.] Galenus libro citato: εἰ γὰρ ἐπὶ ταῖς ἀπασιν Hoc est: Si enim præter hæc omnia. Sublimius attollantur. Galenus libro tertio de prænotione ex pulsibus sumpta, inquit pulsum sublimem omnem excretionis indicem esse.

Ad hæc si dies decretorius indicetur.] Hoc est si prædicatur ab alto conremplatorio, ut septimus à quarto, quartusdecimus ab undecimo, &c.

Exilientem.] Subaudi è lecto. Galenus in commentario quem inscripsit περί προγινώσκειν, in hunc modum habet: Cū natuta incumberet in ea quæ grauabant, expellenda, æger erexit se tanquam uellet è lecto exilire: Rogatus cur id uellet facere, respondit se uidere serpentem rubrum ex regula emergentē, ac ueteri ne in uia ille aberrans, super ipsum caderet, eoq; fugere in locum quo decumbebat.

Si qua partium ipsius palpitet.] εἰ τὶ πάλλειτο Græcus codex habet, ut etiam Galeni primus ad Glauconem. Signat autem πάλλομαι, idem quod moueor, concutior, palpito. Vide libellum Galeni de palpitatione, quam alii tremorem interpretantur. Libro primo de crisibus pro πάλλειτο habetur, σείεται, quod est, mouetur, additurq; καὶ τρομῶδες γίνεται, id est, & tremulum fit, ut labrum.

Venæ in temporibus.] Quod signat sanguinem ad superiora erupisse, & calidissimum, cum alioquin proprium sit arteriarum pulsare.

IN XI. CAPVT.

Crisis.
Iudicium.
Iudicatio.

SI euacuatio.] Ex Galeno de Crisibus tertio, cap. 3. fere omnia transcripta sunt Meminerint autem lectores, aliquādo me dictione Græca crisi scilicet uti, quod medicorum familiæ fit & usitata, & familiaris. Aliquando interpretor iudiciū, uel iudicationē: quod ut mihi liceat post alios, oratos ipsos uolo.

IN XII. CAPVT.

Pulsus
partes.

PULSUS.] Hoc caput ex uariis Galeni libris de pulsibus transcriptum est. Primum itaq; Paulus definitionē ponit, qua dicit cor & arterias attolli, & deprimi. Attolluntur autem, longis fibris in se coeuntibus: aliis omnibus relaxatis. Submituntur, hoc est deprimuntur, astringuntur, longis relaxatis, latis in se coeuntibus, Græce est δ μὲν σφυγμὸς κίνησις ἐστὶν καὶ δίας καὶ ἀστηριῶν κατὰ διαστολὴν καὶ συστολὴν γιγνομένη. Hoc est: Pulsus sane motus est cordis, & arteriarum qui fit secundum diastolen & systolen.

Fuliginosa.] Quæ ex functione obita collecta sunt. Nam hæc teste Galeno, non aliter calorem natium, quàm flammā ignis extinguunt.

Primo pulsuum genus.] Hoc ad uerbum ex Galeni libello ad candidatos medicinæ sumptum est. Habetur enim: Ex iis quæ propria motus sunt, celeritas existit & tarditas: aliusurgens

urgens motus, alius resolutus.

Quoniam enim.] Hunc syllogismum ex primo de differentiis pulsum mutuatus est. Verba ita sonant: Quia uero & arteria tria interualla sortita est, sicut aliud quoduis corpus, lungum, latum, & profundum, necesse est omnino in singulis distantis quantitatem diastoles, & sistoles metiri. Verti autem interuallum, διατασιν, quod neoterici dimentionem interpretantur. Celsus libro tertio dixit: Si uenæ non æquis interuallis mouentur, arterias intelligere.

διάτασις
Interuallū

Humoris infusi.] Galenus libro de dignoscendis pulsibus quarto etiam ex infusione humoris differentiam pulsus constituit. Nā alias plus, alias minus in ea continetur, nunc crassior, nunc tenuior, nunc aquosa, nunc aerea humiditas.

Pleniorem.] Verba sunt Archigenis apud Galenum lib. quarto de dignoscendis pulsibus, admodum obscura, ut lectores facile iudicabunt. Cæterum plenus pulsus habet tria genera, ut summam dicam: Primum, quod ipsum corpus arteriæ, quo statu sit declarat: alterum quod qualitatem substantiæ quam continet: tertium natiui spiritus facultatem indicat.

Pulsus
plenior,

Quoniam uero caloris.] Hic locus ad uerbum ex lib. i de differentiis pulsum desumptus est, Verba ita sonant: ὅτι κατὰ τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον, ἐνεργέτερον γνωρίζομένης τῆς τῆ πυρετοῦ θερμότητος οἷα τις ἐστίν, ἢ ἐκὰτ' ἄλλοτι πόριον ἀπτοιο, πιθανὸν ἐδόξεν εἶναι τισι καὶ τοῖς τὸ γένος σφυγμῶν συναριθμῆσαι τοῖς ἄλλοις. Ex qua lectione uidetur addendum in Paulo τινές, ut sit ἡξίωσαν τινές καὶ τῆ το, &c. qđ pterunt Aristarchi.

Corrigitur
exemplar.

Nam cum arteria.] Galenus primo differentiis pulsum in hunc modum habes: τῆς ἀρτηρίας σώματος ὅσης κόιλου, καὶ μακρῆ καὶ περιφερῆς, κινεμένης τε δια παντὸς διπλῆν κίνησιν ἐξ ἐναντίων σύνθετον μορίων: ἢ γὰρ εἰς ἐαυτὴν συνιζάνει πάντα, ὅθεν ἢ διατέλλεται παντὰχόσε, καὶ τὰς τῆς διπλῆς κίνεσεως ὀνομαζομένης σφυγμῆ, διττὰς ἀναγκαῖον αὐτῇ συμπίπτειν ἡρμίας ἐφ' ἐκάτερα, &c. Hoc est, ut Græcæ linguæ ignari intelligent. Cum arteria corpus sit cauum longū, & teres, moueaturq; perpetuo duplici metu, ex contrariis composito particulis (uel enim in se undiquaq; subsidet, uel in omnem partem attollitur, qui motus duplex appellatur pulsus) necesse est, ut duplex ei quies in utroq; coincidat. Deinde pergit, atq; has duas quietes exercitata manus cognoscit, & ratio demonstrat.

Corrigitur
codex græ-
cus.

strat. Pauli lectio uidetur corrigenda. Habet enim codex im-
pressus τῆς γὰρ ἀετηρίας διπλὴν κινκμένης κίνησιν ἐξ ἐναν-
τίων συγκεκμημένων κινήσεων. Quod est: Cum enim arteria du-
plici moueatur motu, contrariis composito motibus, pro ἐξ
ἐναντίων συγκεκμημένων μορίων. Sic itaq; tu corrigit, Orosius
& Basiliensis corrector hoc sponte sua scilicet omiserunt.

Differentiæ rhythmī.] Ex primo de differentiis pulsum
Galenī transcripta sunt. Quare qui omnia planius fufiusque
explicata desiderabit, ad eos se commentarios conferat.

Ac cum secundum magnitudinē inæqualitas, id quod ma-
turius, aut tardius assumpserit.] Hoc est, ut apertius in interpre-
ter: quanquam sic habeant, ac cum inæqualitas ex magnitu-
dine sumpta, inæqualitatem quæ celeritatis, aut tarditatis ra-
tione constat, assumpserit. Sed malui esse obscurior, quàm non
fidelis Aristarchis nostris uideri.

Ac si id quod in situ est.] Eadem locutio. Idem intelligo.
ac si dicas: Si eam differentiam inæqualitatis sumpsit, quæ
ex situ arteriæ capitur.

Porro opportunum erit.] Sequentia Pauli dicta, ex Ga-
leni libris de causis pulsum, & de prænotione miro artificio,
compendioq; sunt decerpta.

Magnus igitur pulsus.] Galenus primo περὶ προγνώσεως
σφυγμῶν, in hanc sententiam ait de magno pulsus ἢ τοι γὰρ
διὰ τὴν ἰσχυρότητα τοῦ σώματος, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τῆς κρα-
σεως, ἢ διὰ τὴν ἐπίκτητον κίνησιν. Hoc est: Vel enim fit ob
corporis (intellige arteriæ) gracilitatem, aut temperamentī
calorem, aut motum acquisitum.

Causæ ipsos naturales.] Paulo post Galenus habet: ἀλλ'
αἱ μὲν ἐπίκτητοι κινήσεις, αὐτὰ καθεύδονται, παρὰ μέντοι δ'
ἐπὶ διὰ τὴν ἰσχυρότητα, καὶ τὴν κράσιν, quod est: Verum mo-
tus ascititij statim subsidunt, qui autem ex gracilitate, & tem-
peramento proueniunt, adhuc perseuerant.

Vt etiam manu admota.] Galenus ὥς' ἐνετίσσοι τῶν σφυγ-
μῶν ἀφαμένω, κάπειτα βραχὺ διαλείποντι, καὶ πάλιν ἐφαφα-
μένα σαφέστατα διαγνῶναι τὴν μεταβολήν. Hoc est. Vt liceat
tibi pulsus tangenti, & deinde paululum intermittenti, rur-
susq; iterum attingenti, mutationem manifestissimā digno-
scere, &c. Habetur autē in codice græco Pauli bis πάντως, tu
igitur postremum expunge, quod neglexerūt nostri mastiges.

Qui sane

Textus
græcus
castiga-
tur.

Qui sane ob balineas.] Hæc fere & sequētia lib. 1. iā citato inuenies. Nisi qđ Gal. uerbis nōnihil immutatis eadē dicat.

Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem, adhuc submissionem magis citatam.] Galenus libro. 2. προγνώσεως σφυγμῶν hanc sententiam interpretatur in eum modum: δὴ λῶσει τοιγαρὲν τὸ μὲν τάχος τῆς συστολῆς ἀξιόλογον τι πλῆθος αἰθωλῶδων περιττωμάτων ἀθροίζεσθαι τε ἀμὰ καὶ ἐκκρίνεσθαι. Et statim: παμπολὴ μὲν γὰρ ἀθροίζεται κατὰ τὰς σήφης τῶν χυμῶν, &c. Hoc est: Indicabit igitur, celeritas quidem systoles, eximiam quandam fuliginosorum excrementorum copiam colligi simul, & excerni, &c. Permultum enim ex humorum putredinibus colligitur. Iam libro primo de causis ita habet: Cum refrigerantem causam attrahit corpus arteriarum distenditur: cum fuliginosum excernit, comprimitur. Superat autē alias diastole, cum scilicet maior refrigerij usus est. Systole, cum plura recrementa expelli desiderant.

Cause pul-
sum & eo-
rum diffe-
rentia.

Verum ad magnum pulsum.] Galenus primo de causis: Conuenit igitur tria causarum genera sibi mutuo opitulari, ut pulsus magnus aut celer fiat: nempe usum generationis ipsum forum urgentem, uirtutem robustam, arteriarum tunicas molles, aut non omnino duras.

Celeritas accedit.] Eodem libro: Copiosiore calore in corpore collecto, necesse est animal maiorem desiderare respirationē pulsusq; maiores. Qua autem ratione maiores, hac etiam uelociiores & frequentiores. Vt enim sitientes nō solū multum, sed etiam cito, & frequenter potionem assumunt, ita qui refrigerantem substantiam requirunt, multam simul hanc, & celeriter & frequenter attrahunt. Quare proprii, sunt copię caloris pulsus magni, celeres, & frequentes non tamē necessarii frequentes, uerum si nullum ex prædictis impedierit.

Non amplius id quod in.] Primo de causis Galenus. Fortassis uidebuntur pugnare ea quę apparent tum inter se, tum una cum causis propositis. Conuenit enim, ut in caliditate primum sane magnitudo, mox celeritas, deinde frequentia erat, ita etiā in frigiditate primū sane paruitatem: mox tarditatem: tertium raritatem. Quę igitur solutio? Quoniam uirtute robusta, & si usus paulo minus fuerit, primam sane actionem, neq; exiguam, neque tardam necesse est fieri, secundam uero post longius tempus, si usus urget, ratio est absolui.

Sicut

Dubij so-
lutio.

Sicut enim cū urgebat stimulatq; & impellebat uirtutē ad actionem, ita cum non urget, diutius conuiescere permittit.

Sin autem tarditas paruitasq; accreuerint, ē contrario raritas in crebritudinem.] Quod fit cum non totum arteriæ spacium absoluit pulsus, sed medium duntaxat, unde sæpius repetere cogitur: alioqui in magno usu cum frequens est, totum spacium peragit, crebro id repetens. Si uerò maior frigiditas oborta, sit, eoq; usus abundē solutus fuerit, una quidem cum eo motus etiam celeritas ita soluetur. Minor autem erit & diastole si plurimum fuerit aucta frigiditas, rarissimos quidem, non tamen & tardissimos, & minimos pulsus fieri necesse est: sed tardiores semper, & minores sufficit. Quippe uirtute robusta absolute tardi, aut parui nunquam fient, etiam si usus admodum fuerit solutus.

Itaq; latitudo.] Latos omnino pulsus post criticas excretiones fieri docet Galenus lib. 2. de pulsuū causis. Paulo post: Frequenter lati fiunt ob humiditatem, & præsertim cū ipsa corpora arteriarum irrigua fuerint, ut in hydropē, aliquando ob pondus, quod extrinsecus arteriis accidit. Id autem pōdus plerunq; cutis ipsius rigositas est.

Quemadmodum sublimitas.] Sublimis in ira & ante crises, scilicet cū natura ijs quæ molestant, expellendis incumbit.

Longus.] Cum quo reliquarum duarū distantiarū quantitas existimatur, ob tenuitatem corporis, aut peculiare magnitudinem talis efficitur. Nam aliquando motus quatuor digitis occurrit arctus sane & gracilis adeo ut chordam tenuē repræsentet. Siue enim ueluti gracilis cuiusdam chordæ, siue ut pili occursum appareat, ex hoc ipso magna quædam tunica arteriarum durities apparet.

Non enim extrema.] Idem Galenus habet primo περί προγνώσεως σφυγμῶν, hisce uerbis: ἀσφυξία κατὰ μὲν τὴν ἀληθείαν ὁδὸν ποτὲ ἐν ζῶντι σῶματι γίνεται. Hoc est: Pulsus defectio reuera quidem nunquam in corpore uiuō accidit.

Corpore emaciato.] Hanc sententiam & superiorem, in libello de pulsibus quem ad candidatos inscripsit.

Vires dissoluuntur.] Vide libellum iam citatum, & prognosticum.

Durum pulsum.] Galenus lib. 3. de differentiis pulsum in calce: & 1. de dignotione: Durus inquit, & uehemens esse

esse possunt, sed non uehementissimus, & durissimus. Vide et primum de præsagijs pulsum.

Reliqua pituitæ uitia] Alia quæ arteriarum tunicas humiditate multa, & præcipue pituitosa irrigant. Primo de causis ad calcem.

Rhythmus.] Vide secundum Galeni librum de præsagijs, & tertium de causis pulsum.

Deficientes] Alii uocant intermittentes. Fit quando facultas grauatur humorû copia, & impeditur, quo minus motum conuenienti tempore auspicetur: uel ob crassitudinem, uel copiam humorû ora arteriarû cordi uicinarû obstruentê.

Pulsus deficientes unde.

Coincidentes.] Fiunt hi teste Galeno ob frequentiam inæqualem: quod cor sæpe functionem minus ac usus exigit, obierit. Hoc autem ipsum rursus fit, uel grauato corde humorum copia, uel instrumentis obstructis, uel coactis: quæ & deficientium causa erat. Differunt autem inter se, quæ coincidentes uirtutem testentur repugnantem, & contendentem cum ijs quæ molestant. Deficientes, detrectantem id subire. Coincidentes sæpe crism intulerunt. Deficientes illis periculosiores. Vtriq; accidunt in febribus ardentibus.

Coincidens pulsus.

Inclinantes.] Cum uirtus imbecillis erit, corpora autem arterias ambientia, emaciata & colliquata. Multæ sunt causæ. Inflammationes, scirrhî, abscessus, phymata cruda, omnis tumor præter naturam, durities squalida, frigiditas nimia. Galenus primo de causis.

Inclinans.

Caprizans.] Fit cum uirtus quantum ad se pertinet, naturale robur seruat, sed à motu impeditur, uel propter copiam immodicam uel obstructionem, uel instrumentorum cōpressionem. Vide secundum de causis pulsum.

Caprizans.

Dicrotus] Hic & caprizans bis ferunt, sed dicrotus duritiam instrumentorum habet, & intemperiem.

Dicrotus.

Vndosus & uermiculans] Hi duo quantitate sola differunt, una species existent. Sūt autem in diuersis particulis, sed uno in pulsu, causa est, imbecillitas uirtutis, aut copia humorum, aut mollities instrumentorum extrema: cum robur uitale arteriam nequit attollere.

IN XIII. CAPVT.

Aluus optima.] Hoc caput partim ex prognosticorû secundo, partim ex primo de Crisibus libro Galeni sumptū est. Dixi

Aluus.

est. Dixi autem alius, pro deiectione, secutus Celsum, qui libro secundo eandem fere sententiam habet. At uenter ei qui à periculo tutus est, reddit modo mollia, figurata, eodem fere tempore, quo secunda ualitudine assuevit, modo conuenientia his quæ assumuntur. Caterum qui causas omnium uolet intelligere, commentarium suprâ citatum lectitet.

Leuiter ruffa.] Sic interpretatus sum ἐπόπυξον quasi dicas subruffa: hoc est, quam bilis ex iocinore leuiter tinxerit.

Conuenienter spissa.] Græce est ἀμὰ τῇ τροσθηκούσῃ συστάσει, quod est cum conuenienti spissitudine. Apud Galenū de Crisibus non est, quod satis in uerbo συνεσθηκός, hoc est, cohærens intelligatur.

Non nimis foetida.] Hippocraticum esse dixit Galenus, quod Celsus aliquando interpretatus est, mali odoris, aliquando si magna foeditas odoris accessit.

Non exuccata.] Hoc est: Ex qua humiditas chyli aquositasq; non sit per uenas mesaraicas iecori distributa. Ut fere idem, sit quod alius liquida aquosâq;. Cum. n. distributio parum absolute peragitur in uentre, excrementa liquida, tenuia & aquosa permanent, si Galeno & rationi credimus. Græca dictio est ἀχύμων, quam Leoniceus uir alioqui in Italia habitus maximus in re medica, uertit, humoris expers, quod quam sit ad rem, eruditi iudicent. Est autem ἀχύμων, id quod Galenus lib. 8. de cōpositione medicamentorum secundū locos, ἀνεχύμων dixit, in hac nimirum sententia ὅταν μὲν ἐν ἔλκεν ἐκ τῆς κοιλίας τε καὶ τῶν ἐντέρων τὴν τροφήν ἀγονήσῃ τὸ ἥπαρ ὑγρὰ, καὶ ἀνεχύμωτα ἐκκρίεται διὰ τῆς ἐσθρας. Hoc est: Cum igitur iecur alimentum ex uentriculo & intestinis præ debilitate nequiuertit attrahere, liquida, & non exuccata per sedem excernuntur, &c. Ex hisce uerbis liquet nō debere accipi pro ἀχύλῳ, aut ἀχυλοποιηθέν, sicut nōnulli interpretantur. Nam deiectio liquida, & tenuis esse potest, etiam si uenter pro munere suo sit functus. Necessè autem est & circumpositas partes à uitio immunes esse, & distributionē probe in iecur fieri, ut alimentū concoctū esse, ex aluo iudicemus. Caterum ἀχύμων vī contrarium fere esse uerbo συνεσθηκός. Nam hoc tam est substantia moderatum, ut undiq; cohæreat, simulq; existat molle. Illud contra tam liquidum ut undiquaq; diffusetur.

At, mere ruffa.] Iam ad tertium deiectionū genus descendit, quod

ἀχύμων
τον.
Leonice-
nus.

dit, quod nonnihil ex recrementis à toto corpore in uētre
confluentibus: non ex ciborum confectiōe iudicare potest.

Viridis æruginosæ.] Aeruginosa in uentre gignitur & por
racea: aliæ bilis differentiæ in uenis procreantur teste Gale
no in commentario de atra bile.

Animantis particularum cōsumptionem.] Græce est σύν
την δυνάμει των τῶν ζώων πορίων, quasi dicas colliquationem ani
mantis particularum indicat: Intellige autem solidarū: quæ σύντηξις.
absolute particulæ dicuntur.

IN XIIII. CAPVT.

VRina igitur.] Ex lib. I. de Crisibus omnia mutuatus est
Paulus. Cæterum ubi de exacte aquosa agit, Galenus fu
sius pleniusq; persequitur. Habet autem Paulus: τὸ δὲ ἐσχά
τως ἀπεπτον, ὁ περὶ τὸ ὑδατῶδες ἀκριβὲς, οἷον ἀπεγνωμένης
πέφews σύμπτωμά τῃ φλεβῶδες γένους ὑπάρχον. Hoc ut inter
pretatus sum. Galenus autē τὸ τοῖνον ἐσχάτως ἀπεπτον ὑπὲρ
ἀπαντα ταῦτ' εἶναι. εἰν δ' ἂν ὑδατῶδες ἀκριβῶς τὸ τοῖστον,
ἔτ' ἢ δὴ πεπτόμενον, ὡς τὸ θολερὸν ἔτε μέλλον, ὡς τὸ μετ' ἐλί
γον ἀνατολούμενον. ἀλλ' οἷον ἀπεγνωσμένης τῆς πέφews σύμπτω
μα, τὸ τοῖστο τῇ φλεβῶδες γένους ὑπάρχει πάθος, οἷον ἀκριβὲς
ἀπεψία γαφρός. Quod est: Itaque extreme cruda præter has
uniuersas existit. Talis autem erit exacte aquosa, ut quæ nec
modo coquar ut turbida, nec coquenda est, ut quæ paulo post
turbatur, uerum ut desperatæ concoctionis accidēs. Talis ue
nosi generis affectus existit, qualis exacte uentris cruditas.

Vrina cru
da.

Hir uicina est.] Recenset ordine erudarum differentias,
quas etiam Galenus breuiter hunc in modum cōmemorat:
χέριτον μὲν ἢ αἷς ἔρα διὰ ῥῥοια, μοχθηρὸν δ' ἰκαίως καὶ τὸ λεπ
τὸν δ' οὕτως καὶ λυκὸν, οἷον περ καὶ τὸ ὑδωρ. τούτω δ' ἐγγύς
εἶναι ἕτερον οὗρον ἐν πολλαῖς τῶν νόσων φαινόμενον, ὡς οἶνον δὲ
κῆν ἰκαίως λυκῶ καὶ λυπτῶ μεμιγμένην εἶναι ἰδέαν. Quod
est: Deterrima quidem in urinas profluxio. Iam uerò praua
admodum est tenuis adeo & alba, qualis & aqua existit. Huic
aūt uicina est alia urina, quæ in multis morbis apparet: & uini
albi admodum & tenuis mixtam habere speciem uideat, &c.
Paulus fere eadē habet, nisi quod οἶνον hoc est, uini, nullā men
tionem faciat. Tu igitur apud te cōsidera, num Galeni scriptu
rā malis, an intelligere ἐγγύς ἰκαίως τῇ λεπτῇ καὶ λυκῇ, qđ
est: Alteram urinam esse admodum propinquam tenui & al
bæ urinæ,

Aduerte.

hæ urinæ, quæ aquam repræsentare dicebatur. Oroscius locū hunc nimia sua diligentia intactum præterit.

Castigatur
græca.

Tantum uero crassitie ipsam ab aquosa.] In græco codice est τὸ ὕδατος, hoc est, ab aqua: ubi legendum sit ὑδατώδης, id est, ab aquosa, nec hoc aduerterunt Aristarchi.

IN XV. CAPVT.

Sputa.

Putum subflauum, subrusum Ex eodē Galeni loco, & Orisbasij sexto libro collecta ista uidetur Hippocrates in prognosticon secundo prius omnia est complexus.

Etenim præter sanguinem.] Hæc periodus libro secundo prognosticon, a Galeno sic scripra est: πλὴν γὰρ τῆ αἵματος, ὅτις ἂν ἀκρατος ἢ μοχθηρὰν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐπὶ θερμότητι φλογώδει τὴν γενεσιν ἔκων, ὁ μὲν ξανθὸς, ἐξοπτωμένης αὐτῆς τῆς ὀρεώδους υἱρότητας. ἢς ἐπιμυγνυμένης ὡχρὸς ἐφάνετο, ἢ δὲ ἰώδους ἐξ ὑπεροπτησεως ταύτης, ὁ δὲ μέλας, ἢ τοι τῆς αὐτῆς ὑπεροπτησεως, ἢ περ δὴ κακίτη τε καὶ διαβρωτικώτατη γίνεται μελαίνα χολή, ἢ τῆ παχέος αἵματος ὁμοίως ξηραθέντος, ἢ λόγῳ νεκρώσεως τε καὶ ψύξεως. Hoc est: Nam præter sanguinē, quicunq; syncerus humor fuerit, prauam indicat affectionem, ex flamma caliditate trahens originem. Flauus sane, serosa ipsa humiditate retorrída, quæ admixta, pallidus apparebat. Eruginosus auem, hæc nimium adusta. Nigar, uel eadē supra modum adusta, quæ efficitur atra bilis & pessima, & maxime erodens, uel crasso sanguine similiter resiccato, uel ratione tum mortificationis, tum perfriktionis.

Cruenta igitur.] Galenus loco iam citato in istū modum habet: τὰ μὲν γὰρ αἱματώδη καὶ φλεγματώδη, μέτρια, τὰ τῆς ξαιτῆς ἢ μελαίνης χολῆς, χαλεπὰ. διαβρωτικά μὲν γὰρ εἶναι ἀμφω τῶν σωμασίων, καὶ τὰ τ' αὐτοῖς κοινόν. Hoc est: Etenim cruenta, & pituitosa moderata: Flauæ autem, aut nigræ bilis sputa difficilia. Quippe ambo corpora credunt, atq; hoc ipsis est commune. Paulus non habet φλεγματώδη.

Nam si prompte excreentur.] Hoc est ex Hippocrate: εἰ γὰρ εὐπετέως ἀναπτύσσονται. Galenus interpretatur dictionem εὐπετέως, quod nos uertimus prompte, hoc pacto. τὸ δὲ εὐπετέως ἀντὶ τῆ ῥαδίως τε καὶ ἐτόίμως οἱ Ἕλληνες λέγουσι. Rursus: εὐτετῆς γὰρ ἀναγωγὴ πτυέλου, τὰ τέτιν ἐτόιμη τε καὶ ῥαδία γίνεται μετ' ὀδύνης ἰσχυρᾶς ἔσης κατὰ τὸν ἰώρακα.

Castigatur
codex græcus.

Valde crassum.] Græcus codex habet ὑπάπαχην, quod est subcrassum

subcrassum, pro ὑπέρπαχυ, hoc est, supra modum crassum, ex pituita nimium assata nimirum. Præterijt Genusæus.

At si expuatur quidē.] Codex græcus deprauatus est, habet enim εἰ δὲ μὴ πτύοιτο μέλας, ἀλλὰ, pro εἰ δὲ μὴ πτύοιτο μὲν, ἀλλὰ, &c.

Emendatur græca.

IN XVI. CAPVT.

Diarias febres.] Hoc principium sumptum est ex primo Galeni libro ad Glauconem circa principium. Dicuntur autem ἐφήμεραι græcis, quasi dicas ad diem durantes: ἀμφήμεραι autem, circa singulos dies infestantes, quotidianæ uno uerbo latinis appellantur.

Diaria.

Opportuni sunt.] Ista cum sequentibus ex octauo Methodi Therapeutices huc translata sunt. Paulus ἐφ' ὧν αἱ ἀπόρροιαι τῆ σῶματος εἰσιν ἐκ ἀτμώδεις, ἀλλὰ δριμύτι καὶ οἶον καπνώδεις ἔχουσιν, &c. Galenus autē habet: ἐν οἷς ἐστὶ τὸ δεαπνέμενον ἐκ ἀτμώδεις, οἶον περὶ ἐν τοῖς εὐχύμοις ἀλλὰ δακνῶδεις, καὶ δρομύ, καὶ καπνῶ παρὰ πλείστον ἢ λινύ, &c.

Lauare quidem non subinde.] Paulus græce habet λούειν μὲν μὴ πολλάκις, hoc est ut uertit. Galenus autē οὔτε τρίψεων, ἔτε λυτρῶν δέωνται πολλῶν, quod est: Neq; frictionibus, neque balneis multis indigent.

Conferuntur loci.

Vehementer refrigerata.] Græcus codex deprauatus est. Habet enim ψυχρὸν τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶν καταχρῆν. &c. Vbi sit legendum ψύχοντα δὲ αὐτὰ σφοδρῶς, ut nos etiam uertimus.

Græca uiciata.

Victus dulcibus.] Hoc est bonis. Nam bonus in corpore succus, aut sanguis, dulcis & est, & dicitur: malus autem, amarum, acidum, aliamuē qualitatem extraneam habere ostenditur. Perperam igitur nos corripuit Orosius, quod dulcis succi γλυκύχυμος uerterim: cum idem sit dulcis & bonus in probi sanguinis significatur. Male habet græcus codex γλυκύθυμος. Vide Galeni octauum circa principium.

Codex græcus uiciatus.

Aliquos horum nutrire.] Codex græcus est deprauatus habet, τέτων τινὰ τρέφειν, pro τέτων τινὰς τρέφειν. Vide octauum Galeni de morbis curandis. corrigenda sunt omnia exemplaria impressa.

Sed ulceri quod.] Plenius in Galeno hæc sententia habetur in hunc modum: ἀλλὰ περ' ἑλκὸς ἐφ' ᾧ περ' αὖν ὁ βαβῶν αὐτοῖς εἴη γενομένης, αὐτῶν τε τῶ βαβῶνος προνοησάμενοι λέγεται κατὰ τὴν παρακμὴν τῶ γενομένου παροξυσμῶ. Hoc

Græca emendantur.

PAVLI AEGIN.

Αα est: Sed

est: Sed ulceri ob quod Bubo ipsis fuerit excitatus, ipsiq; buboni prospicientes in accessionis declinatione lauant.

Cæterum à uino.] Hæc clausula ad uerbum ex primo ad Glauconem sumpta est. Vbi etiam dictio *πρὶν* accipitur pro *μεχρὶς οὗ*, hoc est donec: aut sic dicendum: Cæterum priusquam inflammationes fuerint solutæ, arcendi à uino sunt ægroti. Atq; hoc pacto seruabit dictio communem significatum.

IN XVII. CAPVT.

Græca corrigenda.

Nota.

Corrige græca.

Putridæ febres.] Hoc caput ex primo Galeni de febribus libro totum transcriptum est: sed uarijs ex locis. Textus autem in græco Pauli codice deprauatus est. Habet enim τῶν ἐπὶ σήφει πυρετῶν διάγνωσις, τῷ μὴδὲν τῶν προκαταρκτητικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, καὶ τὸ μὴ ἀπὸ εἴγυς δὲ ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν. Hoc est: Febrium ex putredine contractarum dignotio est, quod nulla causa primitiua præcesserit, & quod non à rigore febris inceperit, &c. Quæ sententia plane falsa est. Nā proprium plane febrium putridarum est à rigore inchoare. Orosius & castigator Basiliensis, clarissimi & medici, & philosophi, ut ipsi audire uolunt, hæc opinor tanquam parua neglexerunt. Tu autem quisquis ueritatem amas in hunc modū corrigit: τῶν ἐπὶ σήφει πυρετῶν διάγνωσις τὸ μὴδὲν προκαταρκτητικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, τὸ δὲ ἀπὸ εἴγυς ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν, ἔτ' ἐγκαίσεως, &c.

Hoc enim singulariter.] In codice græco superfluum est τὸ, pōst μέγιστον adde δὲ particulam, quia noua incipit oratio.

Similiter ad ipsas.] Græce est ἰδίον ἐστὶ μάλιστα τῶν τοιούτων πυρετῶν. Galenus habet: ἰδίον δὲ ἐστὶ ἐν τοῖς μάλιστα. Si uoles, ita legito.

IN XVIII. CAPVT.

Si uires sint ualidæ.] Ex Galeni undecimo Methodi sumpta sunt ad uerbum. In nono libro circa principium, ait in eundem fere modum: Nam si præcedat ciborū cruditas, tanto tempore differre uenæ sectionem iubebit, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendat, uidebitur.

Putrida per u·inas.] Et hæc ex undecimo, sed paulo ante, mutuatus est Paulus. Oportet enim id quod putruit, omni ratione uacuare, quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducere, &c.

Si uero

Si uero febris magnitudo.] Galenus addit ad planiorem intellectum, ut in continuis. Hæ enim magis hominem affligunt, quam intermittentes.

Vires inualidæ.] Græcus codex Pauli habet καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires ualidæ, cum sit legendum καὶ τῶν δυνάμεων ἐκ ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires non ualidæ Præterijt hoc Gemusæus.

Textus
græcus
uiciatus.

IN XIX. CAPVT.

Tertiana febris cum sit.] Ex secundo libro de crisi- bus, capite tertio hoc transcriptum est iisdem plane uerbis. Cæterum Galenus post illa, in hanc quoq; sententi- am habet: τὸν ἐν ἀκριβῇ τριταίῳ ἐκ ἐνδέχεται μὴ ἔμετὰ ῥίγους σφοδρῶς γινέσθαι. Quam orationem Leonice- nus uertit. Tertianam itaque febrem fieri contingit sine rigore uehementi, &c. Cum sit dicendum: Exactam itaq; tertianam non licet nisi cum rigore uehementi fieri.

Leonice-
ni
error.

IN XX. CAPVT.

Exquisitam tertianam.] Ex primo ad Glauconē hæc Paulus transcripsit. Nonnihil autem à Galeno uariat, breuitate sermonis intelligo, quæ tamen sensum nonnihil obscurum reddit. Verba ad Glauconem ita habent: προτρέπαι ἐν χεῖ τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα κενοῦσθαι δι' ἐμέτων. τὸν δὲ κάτω ἐπίοντα ὡσαύτως διατῆς κάτω ἐκκρίσεως. Quod est: Humorem itaq; in uentriculum confluentem, per euomitiones euacuare oportet: inferius autem descendētem similiter per internam excretionem. Paulus autem in istum modum: καὶ τὸ μὲν εἰς γαστέρα συρρέον, κενοῦν δι' ἐμέτων τε καὶ κάτω. Hoc est: Et quod sane in uentrem conflu- it, euacuare per uomitum, & inferna, &c. In Galeni uerbis γαστῆρ pro uentriculo: apud Paulum pro toto uentre positum esse existiman- dum, si concordēs alioqui intelligas.

Conferen-
tur loci.

Vinis autem admodū uetustis.] Lectio in codice impres- so plane mutila & deprauata est. Habet enim ἀπέχειν δὲ μέλιτος, καὶ νάπυος καὶ ταρίκους, καὶ τῶν φύσει θερμῶν τὰντα μὲν ἐπὶ παλαιῶν. Ex Galeno & Oribasio legendum: ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νάπυος, καὶ ταρίχους, καὶ τῶν διριμέων ἀπάτων, καὶ οἶνων δὲ τῶν φύσει θερμῶν, καὶ παλαιῶν ἰκανῶς, &c. Atque sic nos reddidimus latina: In priore enim lectione nulla uel acrium, uel uini facta est mentio. Orosius & castigat

Basilienſis non aduerterunt.

IN XXI. CAPVT.

LAuare in tertianis ſpuris.] Hæc quoque ex eodem loco ſunt huc translata. Dictio autem τὴ in græco exemplari deſideratur. Lege igitur : ἀλλὰ τι καὶ τοῦ τμητικότερου. Quod ceu paruum Ariſtarchi noſtri contempſerunt.

IN XXII. CAPVT.

Quartana] Ex primo etiam ad Glauconem & ſexto Oribasij hæc ſumpta ſunt. De rigore autem quartanæ febris, Galenus cum alibi, tum in libello de tremore & palpitatione inquit : τὸ δὲ τῶν τετρατάων οἱ περιεχόμενοι ἀφ' ἑαυτῶν ὁ τῶν φασὶ δίκην, ὅταν ἢ σφοδρῶν. Hoc eſt: Rigorẽ quartanarum qui experti ſunt, etiam ad oſſa uſq; penetrare affirmant, cum uehemens fuerit.

Nec bilis uomitus.] Sed pituitæ intelligas, comitatur etiã lienis inflammatio, tumor, interim faſtidium, intenſa interim cupiditas.

Pulſus exiguus ac rarus] In hac febris inæqualitas pulſuũ in uno ictu maniſeſtiſſimã deprehenditur Multo enim uelocius principium motus finemq; inuenies quã medium.

IN XXIII. CAPVT.

Quartana.] Ad uerbum omnia ex Galeni libro iam ſepius nominato, compendioſe tranſcripſit. Quãquam id antea fecerit Oribasius lib. 6.

Caſtigatur
codex græ-
cus.

Qui refrigerant corpus ſiccantq;] In græco codice erat ὑγραίνοντων, hoc eſt, humectantium pro ξηραίνοντων, quod eſt, ſiccantium. Miror tam apertum uicium iudices noſtros adeo oculatos non deprehendiſſe.

Reſtitutus
codex græ-
cus.

Tum per dies aliquot] Male eſt in exemplari græco δι' ἡμερῶν τριῶν. Quod eſt: Per dies tres, pro δι' ἡμερῶν τινῶν. Id eſt: Per dies: aliquot. Baſiliẽſis corrector hoc quoq; neglexit.

Quod ſuccum Cyrenaicum.] Galenus hoc medicamentum maxime etiam commendat libello de Tremore, ceu ad rigorem, quartanosq; circuitus, utiliſſimum.

IN XXIII. CAPVT.

Quotidiana.] Ex quinto capite ſecundi libri de criſibus excerpta ſunt. At Galenus libello de Typis, latius accidentia enumerat in hunc modum : ἀμφιμερινῶς δὲ παρέρπεται ὑγρότης ἐξ ἑαυτῆς, καὶ φλεγματώδεις ἐμαρταί, καὶ δειφός οὐκ ἐπιτε-

ἐπιτεταμένον, καὶ βαρυσμός τοῦ σώματος ὕλης, καὶ ὕπνος καρώ-
δες, καὶ καταφορικός καὶ σφυγμός μέγας, καὶ ἄραιος, καὶ χαῦνος.
τὸ πρόσωπον ὑποπέδιδνον, καὶ χαῦνον, καὶ πεπονῶδες, καὶ πολ-
λὴν ἐμφαίνον τὴν τῆς ὕλης καχεξίαν, καὶ τροφὴν, &c. Hoc est,
ut ignari linguarum intelligant: Quotidianam uero comi-
tatur habitudinis humiditas, uomitus pituitosi, sitis nō inten-
sa, grauitas totius corporis, somnus soporosus, ueternosusq̃;
pulsus magnus, rarus, laxis, facies subliuida laxa, peponū mo-
do tumida, quæ magnam materiæ prauitatem, & mutatio-
nem repræsentet.

Aquosiora.] Gal. addit libro iam citato: καὶ φλεγματικώ-
τερα, quod est, pituitosiora, quæ ipsam febris cām ostendunt.

IN XXV. CAPVT.

Quotidianam curantes.] Ex primo ad Glauconē lib.
Galenī Paulus hæc descripsit.

Oxymelite.] Simplici intelligendū, ut quod omnes mea-
tus arctos aperiat, ne crassus alibi humor, uel glutinosus ad-
hærescat. Conuenit autē cum ætatibus, tum naturis uniuersis.

Primis diebus.] Græce est κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας. Male Galenī lo-
autem in Galeno ad Glauconem μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας ha-
betur, quod etiam castigator Basiliensis non mutauit. cus castiga-
tus.

Ventriculi.] Sic uerti γαστρός, quæ dictio nunc pro uentri-
culo, nunc pro toto uentre accipitur. Galenus libello de ty-
pis febrium ait: συνίσταται δὲ μάλιτα ἐπιτομάχῳ κακοπρα-
γνῆτι. Quod est: Constituitur autem potissimum ob stoma-
chum male affectum. Propterea Paulus recte dixit uētriculi,
& oris ipsius rationem esse habendam, quanquam accidat in-
terim, ut in hac febre etiam lien scyrrhum contrahat. γαστῆρ.

Idq̃; tam diu, quā.] Græce est: κατὰ πολὺ ἕως οὗ πάντῃ. Notā.
Hoc paulo secus sonat, quā reddiderim. Galenus nō haber:
Eoq̃; multi, à quodam alio quā Paulo fuisse adiectū putant.

IN XXVI. CAPVT.

Sit vitrea pituita.] Ex Oribasij sexto sumptum est. Vitrea
autem pituita à Galeno lib. 2. de febrium differentiis expli-
catur, in hunc modum: ὑαλώδης δὲ μοι δοκεῖ προσάγορεύειν ὁ
πρᾶξι γόρας τὸν χυμὸν τοῦτον, οἱ νεώτεροι δὲ ὦν ἐπὶ καὶ φίλιπ-
πος ὦμὸν ἀπλῶς. Item in commentario de Tremore in hanc
sententiam: οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς ῥίγος
ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῷ ψυχρῷ φλέγματι φιλεῖ γίνεσθαι καλεῖ δὲ ὑά-

λῶδ' ἡ τὸν χυμὸν τῷ τὸν δ' πραξαγόρας, &c Hoc est: Non solū autem ob flauam, aut nigram bilem rigor, sed etiam ob frigidam ualde pituitam fieri solet, uocat autem humorem hunc Praxagoras, uitreum. Subiungit autem: Verum hic rigor nō adeo uehemens est: quanquam pluribus nonnunquam diebus subsequētibz perseveret.

IN XXVII. CAPVT.

συνεχῆς.
συνόχης.

Continentes.] Ex sexto capite libri secundi de Crisibz excerpta sunt. Interpretatus autem sum hic febres continentes, quas Græci συνεχῆς appellant: continuas autē, quas συνόχης. In Latina quoq; lingua duas uoces usurpemus. Cæterum Galenus intelligit continentes, quarū materia in uasis subsistit: ubi enim ea per totum corpus delata fuerit, intermittentes appellatæ, sunt.

δξύτης.

Acumine.] Græce est δξύτης. Nam ut δξύς acutus morbus dicitur, ita deriuatiuum ipsius δξύτης, acumen, celeritas, aut præcipitantia, aut quocunq; modo liber appellare.

IN XXVIII. CAPVT.

Restituitur
codex.

Continuarum.] Vide nonum Methodi, & sextum Oribasij. Per cōtinuas autem hic intelligo συνάχους, qui ex sanguine potissimum constituuntur. Male in Græco codice legitur τῶν συνεχῶν pro συνοχῶν. Neglexit hoc Gemusæus. Nā συνεχῆς uocabulum generale de omnibus febribz ex quocūque humore continue affligētibz. συνοχὸς autem de febre ex sanguine uel putrido, uel efferuescente usurpatur. Barbari hāc fœminino genere synocham nominarunt.

Emendan-
tur græca.

In uigesimo nono capite codex Græcus habet παχῆα pro τραχῆα. Non enim crassa lingua, sed aspera, uel scabra dicendum est, hoc in loco, quod castigato Basiliensis in codice suo alioqui emendato non aduertit. Cæterum caput hoc & inferius ex sexto Oribasij descriptum est. Præcipit autem ardenti febre laborantes non sola aqua, sed mulsā aquosa nutriendos esse. Cuius rationem Galenus in commentario Hippocratis de morbis acutis. Aqua, scribens, natura frigida, tarde penetrat, & quā plurimo tempore in præcordiis subsistēs, in acutis morbis corrumpitur: mel bilescit, ob id mulsā aquosa dari debet: ut aqua nulla in superiore uētre facta mora à melle mixto ad distributionem trahatur. Non autem aqua cruda, sed cocta esse debet.

Sustinere

Sustinere.] Ita sum interpretatus διατᾶν, hoc est, nutrire, alere. Celsus ait, cremore ptisanæ sustentandi sunt. Atque hoc loco proprie dicendum est. Sustinere. Quia tantum cibi hic porrigitur, quantum uiribus sustinendis sufficit.

IN XXXII. CAPVT.

DVplex hecticarum.] Galenus lib. i. de febrium differentiis, Oribasius sexto eadem plane habent. Leonicens & Laurenrianns parum recte in translatione Latina a se gerūt. Quid autem sibi uelit Orosius interpretando, ἢ καὶ μείσθης ἐτι συχνῆς, uel etiam si humiditatis aliquid cōtinuum permaneat, eruditi iudicent. Cum melius dixisset, uel etiam mado-
re adhuc copioso, aut multo permanente. Nam συχνὴ nō tantum συνεχῆς significat, si Hesichio credimus, sed etiam πολὺς. Præterea sentus hunc significatum requirebat. Cæterū Hectica dicitur, quod stabilis sit, ac solutu contumax, uel quod totum corporis habitum occupat.

Aduerte.

IN XXXIII. CAPVT.

Hectica febre.] Vide Galenum lib. 10. Methodi medēdi: ubi paulo manifestius curationē hecticarū persequitur.

Moderato.] Græcus codex habet aduerbium, μεμετρημένως, quasi dicas mensuraliter. Nam Gal. 10. magnam curā habendam esse dicit mensuræ, frigide febricitantibus exhibēde.

μεμετρη-
μένως.

IN XXXIII. CAPVT.

QVandoquidem tertiana.] Hæc Galenus in secūdo fere de febrium differentiis, Oribasius in sexto tradidit. Cæterum nomēclaturæ rationem in libello de Typis interpretatur. Est autem semitertiana triplex: Parua, media, & magna. Parua uiginti quatuor horas absoluit. Media triginta sex. Magna quadraginta octo, atq; continuæ proxima est. Porro ætati mediæ accidit, & tempore potius autumnī, cū etiam ualde periculosa est, non solum stomachum, sed etiam nervosam partem, & ut summatim dicam, media attingens.

IN XXXV. CAPVT.

PVblica grassantes.] Vide Oribasij sextum, Hippocratē in commentario περὶ ἐπιδημιῶν, & de natura hominis.

Cæterū morbos publicæ grassantes uoco, quos Paulus παιδῆ μὲς & κοινῆς sua lingua appellat. Opportunū aut hic est explicare, quos nam Græci ἐπιδήμους, ἐνδήμους, σποράδας, παιδῆ μὲς, nominent. Galenus itaq; cōmentario primo in primum

ἐπιδήμοι
ἐνδήμοι.
σποράδες
πάνδημοι

ἐπιδημιῶν in hunc modum scriptum reliquit: μεμνησθαι χρὴ
 τέτων εἰς τὰ μέλλοντα λέγεσθαι γινώσκων, ὥς ἐνία μὲν τῶν νο-
 σημάτων κοινῇ πολλὰς καταλαμβάνει, ἃ δὴ λέγεται κοινά. Hoc
 est: Meminisse conuenit horum ad ea quæ post dicentur, sciē-
 dumq; nonnullos sane morbos communiter multos corripe-
 re, qui sane uocantur communes. Statim subdit: τῶν δὲ κοι-
 νῶν τὰ μὲν ἐνδημαῖοι, τὰ δὲ ἐπιδημαῖοι καὶ ἐπιδημία. τέτων
 δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη καλεῖται. Id est: Ex cōmunibus
 alii uernaculi sunt, alii aliunde in populum ingruunt. Horum
 periculosissimi, pestilenciales appellantur. Item ἐνία δ' ἐκά-
 στον ἰδίᾳ τὰ σποράδικοι προσαγορεύονται. Nonnulli singulos
 priuatim inuadentes diffusi, ac erratici nuncupantur. Paulo
 supra: δῆλον ἐν ᾧ τῷ γένει τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων ὅσα
 κακοῦτά τε γίνονται, καὶ λοιμώδη καλεῖται, τὸ δὲ τῶν ἐπι-
 δημιῶν ἐκ τῶν παιδῶν τε καὶ παγκόσμων γένος ἐστὶν ὁ ταῖς
 σποράδεσιν νόσοις ἀντιδιδιαιρεῖται. Hoc est: Itaq; cōstat ex po-
 pularium morborum genere eos esse, qui malignissimi gene-
 rantur, & pestilenciales dicuntur. Populares autem illorū ge-
 nere comprehendī, qui undiquaq; & communiter in omnes
 grassantur. Quod genus morbis priuatim, & inter se dissimi-
 libus opponitur. Habes fere omnium appellationes explica-
 tas, quo autem dilucidior fiat interpretatio, pauca ex primo
 Hippocratis de uictus ratione in morbis acutis subiiciā. Ver-
 ba sunt Galeni in commentario primo: δῆλοι δὲ διὰ τῶν λό-
 γων τέτων, τὰ μὲν τινὰ πολλὰ γίνεσθαι νοσήματα καθ' ἑνιαυτόν,
 ἅπερ ὅταν μὲν ὀλέθρια γένωνται, λοιμὸν ὀνομάζουσιν, ὅταν δὲ
 ἐπιεικέτερά, ἐτέρᾳ τινὶ προσηγορία δηλώσιν, ἐπίδημα καλεῖν-
 τες. ὥστε εἶναι τὸ μὲν ἐπίδημον νόσημα τὸ κατὰ χρόνον τινὰ
 πλεονάζει ἐν τινὶ χωρίῳ, τὸν δὲ λοιμὸν ἐπιδημίαν ὀλέθριον.
 ἐπὶ δὲ καὶ ἄλλο γένος νοσημάτων κοινὸν πολλοῖς ἢ περὶ τὸ
 κατὰ χώραν ἐπιγινόμενον, τὰ ἐνδημα καλούμενα. τέτοις δὲ αὖ-
 τίκεινται πᾶσιν αἱ σποράδες νόσοι, διαφερόντως ἐνοχλῶσαι τῶν
 νοσούντων οὐ κατὰ τὸν κοινὸν τρόπον συνιτάμεναι. Hoc est: In-
 dicat autem in hac oratione, multos sane quosdam morbos
 uno tempore fieri, quos, cum perniciosi fuerint, pestilentiam
 nominant, cum mitiores, alia quadam appellatione signifi-
 cant populares, aut uulgares nuncupantes. Vt popularis qui-
 dem morbus sit, qui certo tempore in regione quadam domi-
 natur. Pestilentiam uero morbum popularem perniciosi m.

Iam

Tam uero aliud quoq; morborum genus est, multis commune, quod ex loci natura superuenit, uernaculum appellatur. His autem omnibus opponuntur, priuati morbi, diuersa ratione ægrotos infestantes, non communi modo constituti, &c. Haftenus Galenus noster: cuius sententiam ita interpretor. Morbi qui undiquaq; populatim, nullo non tempore anni grassantur, nulliq; nec sexui, nec ætati, nec corporis statui par cunt, *πανδημῆς*, & *παγκόσμιος* appellant Græci, ex aere infecto trahunt originem. Qui autem certo tempore in regione quadam publicè dominantur, *ἐπιδημῆς*, quasi dicas populares, aut uulgares nuncupant, similiter ex aere, aquæ uiciatæ potu, stagnorum, paludumq; graui halitu procreantur. Qui autem perpetuo in regione quadā incrudescunt, *ἐνδημῆς* Græci, patrios nostri & uernaculos nominant, simili fere ex causa oriuntur. Porro fit interdum, ut morbus regioni peculiaris, & generalis uno tempore simul inuadant, pro aeris, aliarumque circumstantiarum ratione. At morbi priuati cuiq;, inter se dissimiles, *σποράδης* uocauit Hippocrates, ex uictus ratione trahunt originem.

Cibi q; igitur communes.] Non solum aer teste Galeno communes morbos efficit. Siquidem qui in Aeno dū fames grassaretur, leguminibus uescebantur, crurum impotētes euaserunt. Item qui Eruo genuum dolore cruciabantur. Nouimus autem nonnullos, qui etiam triticum semiputridum fame coacti ederunt, in communem incidisse morbum ex causa communi. Et alibi exercitium totum praua usum aqua similiter in omnibus militibus noxam sensisse.

Cibi communes.

Afflictiones corporis.] Cum Hippocrates dicit alios morbos ex uictu procreari, intelligit etiam uitæ studia. Nempe exercitia, otium, uigilias, tristitiam, iram, perfrictionem, in solatium, balnea quoq; non suo tempore usurpata, morbos excitare, saltem ratione secundaria.

Hæc quidem non] Græcus habet: *τὰυτὰ πένθ' ἐν*, quod sonat. Hæc quidem igitur. Verum mea sententia legendum uidetur *τὰυτὰ μὲν οὐ*, negatur id quod tum autoritate Oribasii, tum ipsa ratione probate possum. In primis enim Oribasius sexto libro hanc lectionem confirmat, deinde in eodem capite statim Paulus dicit. Siquidem in alias causas nec omnes simul incidimus, neq; eis tot die immoramur, aer autē quoniam

Castigan-
dus Græ-
cus.

Gemuseus
natura ma-
ledicus.

quoniam omnibus circumfusus est, & inspiratu attrahitur, ut animalium quoque corpora afficiat, est necesse. Nō dico quod Galenus primo commentario in Hip Epidemia, unde ista partim sunt excerpta, in hunc modum habeat: τα δ' ἐκ τῶν ἐδεσμάτων καὶ πομάτων πάντα ἐστὶ. Hoc est: Qui autem ex cibo, aut potu fiunt, rari sunt, &c. Gemuseus noster vituperandi studio, damnat hanc meam lectionem, nullam adferēs uel autoritatē uel rationē. Quis amabo ignorat populares morbos continenter quidem ex aere procreari, aliunde autem rarius? Sed inquit Gemuseus, ex euaporatione lacuum frequentius accidere: cui in hoc respondeo, nullum uel stagnum, uel paludem morbum communem generare, nisi τῷ βλάπτειν τὸν ἄερα, ut ait Galenus. Aer autem ipse uel calidior, uel frigidior, humidiorue sæpe nobis circundatur. Quare etiam is morbos potius, quam solæ paludum uaporationes, efficit. Quæ ut dixi, nunquam corpora humana afficiunt, nisi prius aerem ipsum corruerint. At rursus obijciat Gemuseus Galeni sententiam commentario secundo in libellum de natura humana, uerba hæc sunt: πολλάκις μὲν γὰρ ἀναθυμιάσεις τινὲς ἐξ ἐλῶν ἢ λιμνῶν, ἢ τελεμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίαι γίνονται τῶν τοιούτων νοσημάτων. Hoc dico Galenum uelle indicare non solum ex aere intemperato huiusmodi morbos procreari, quod Hippocrates uidetur innuere, sed etiam ex aere, euaporationibus paludum infecto. Nō tamen negat ex aere frequentius contrahi. Ad hæc omnia, ex oratione Pauli opinionem meam possum astruere. Nam cōferens ille aerem cum aliis omnibus supra nominatis causis, raro nos omnes simul in eas incidere pronunciat: non autem fieri posse, ut aeris usum effugiamus. Adde quod aeris tantum remedia enumeret, ubi intemperies aliqua subesse uidetur, reliquarū causarum, non item. Vix ergo candide lector, quid faciat procliuus hominum quorundam ad maledicendum natura.

Notæ

Præterea lignorum [Galenus hoc etiam confirmat libro de Theriaca ad Pisonem in eam sententiam: διόπερ ἐπαινῶ καὶ τὸν θαυμασιώτατον ἱπποκράτην ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκείνον τὸν ἐκ τῆς αἰθιοπίας εἰς τὰς ἑλλήνας φθάσαντα ἐκ ἄλλως ἐθεράπευσεν, ἀλλ' ἢ τρέψας τὸν ἄερα, καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μὴ ἐτι τοιῶν ἀναπνέενται. κελεύσας ἑγὰρ τὴν πόλιν ὅλην ἐξάπτεσθαι τοῦ πυρὸς, ἐχέπλην τῆς ἀνάφωστος τὴν ὕλην ἔχον, ἀλλὰ φεφάνωντε καὶ

καὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ ἐυωδέτατα, τοιαῦτα συνεβούλευσεν εἶναι τῷ
 πυρὸς τὴν τροφήν, καὶ ἐπισπένδειν αὐτῷ τῶν μυρῶν λιπαρώτα-
 τα, καὶ ἡδύαι τὴν ὁδὸν ἔχοντα ἵνα οὕτω καθαρὸν γενόμενον οἱ
 ἄνθρωποι ἀναπνεύσωσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τὸν ἄερα. Qd' olim
 sic Latine reddidimus: Quamobrē etiam Hippocratem illū,
 multis admirādum laudo, qui lucem illam pestilentiae ex Ae-
 thiopia Græcos inuadentem, non aliter curauerit, quā aë-
 rem mutando, alterandoq; ne talis amplius inspiraretur. Cū
 igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi iussisset,
 nō simplicem lignorum materiam, uerum feta, floresq; sua-
 uissimos, fomitem ipsius esse consuluit, unguentaq; pinguiissi-
 ma, & odorifera ipsis superfundi, ut aërem purum hoc modo
 redditum homines in mali subsidium inspirarent.

IN XXXVI. CAPVT.

Nares destillant.] Galenus in commentario Prorrhetici
 Hippocratis scriptum reliquit: ἀπασῶν δ' ὁσῶν τῶν ἀπὸ
 ξινὸς τᾶξεω χαλεπῶν ὅταν παχῆα, καὶ μέλαινα ἀπόταξις, τὰν-
 τας ὀλεθριωτάτας εὐρήσεις. Id est: Cum autem omnes e nare
 stillationes sint periculosa, cū crassa, & nigra fuerint, has per-
 niciosissimas reperies.

Venter colliquata.] ἡ γαστήρ τας συντήξεις habet græcus
 codex. Est aut̃ σύντηξις colliquatio, cōsumptioq; nepe cū par-
 ticularis quotidie aliquid decedit, nec alimētū recipiūt. Plinius
 lib. 22. cap. 25. hac uoce utitur, Tali, inquit, sorbitionis ge-
 nere emendantur syntexes, hinc syntectici eodem autore di-
 cuntur. Licebit igitur interpretari hāc snīam, uenter Tabida,
 & quæ ex ipsius substantia decesserunt, humore undiquaq; in
 ipsum confluente, emittit, partim uomitu, partim inferius.

Aloes partes duæ.] Hæc est descriptio pillularum cōmu-
 nium: quæ in Nicolao illo præposito uiciosa & deprauata Catapo-
 tra, habetur. Nam is ponit aloes uncias duas, croci & myrrhæ
 utriusq; unciam unā, in peste addendū consuluit, bolū arme-
 nū. Primū uetus scriptura croci nō meminit, deinde thymia-
 matis ammoniaci, non boli armeni unciā præcipit. Id genus
 permulta monstra in officinis nostris pertinaciter regnant.

Theriacen ex uipetis.] Hoc etiā Galenus lib. de Theriaca
 ad Pisonem confirmat in eum modum: τὸν αὐτὸν τρόπον νο-
 μίζω καὶ τὴν θηριακὴν, ὥς περ τι καὶ αὐτὴν ὅσαν πῦρ καθάρ-
 σιον, τὰς μὲν προπινοῦντας αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ καταστάσει, μηδ'
 ὅλως

ὅλως εἶναι ἀλίσκεσθαι τῷ κακῷ. τῆς δὲ ἡδὴ φθάσας παθῶν
ἐξαῖσθαι δύνασθαι, ἀλλήλῃσιν, καὶ τρέψασαν τὴν τῆ ἀναπνοῆς
δεντος ἀέρος ποιησίον, &c. Hoc est: Simili modo Theriacen ceu
ipsa quoq; ignis quidam purgatorius existat, præsumentes in
pestifero aeris statu, neutiquam malo corripī linere nouimus.
Correptis autem mederi posse, aeris inspirati maliciam in al-
terando mutandoq; In Galeni codice græco, qui Basileæ nu-
per impressus est perperā legitur ἀναπλασθέντος ἀέρος. Quasi
dicas: Aeris reformati, positum est pro ἀναπνοσθέντος. Quod
est, inspirati. Nam qui correpti peste sunt, malum aerem at-
traxerunt respiratu, non reformatum aut refectionem, aut quomodo
modocunq; dicere libeat.

Codex græ-
cus ulcio-
sus.

IN XXXVII. CAPVT.

Nota codi-
cum uarie-
tatem.

Nonnulli febricitare.] Galenus lib. 12 omnia hæc ad uer-
bum habet. Variat autem nonnihil lectio græcorum co-
dicum. Galeni habet ἐν ὕγκει τε μέζονι τῆ κατὰ φύσιν ὅλον τὸ
σῶμα ἐστὶ καὶ ἡ χροιά τοῖς μέν, &c. Hoc est: Et totum corpus
uastiore mole quam pro naturæ modo cernitur, & color, &c.
Pauli τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς, quod est, os uentriculi uastiore mo-
le cernitur. Mea sententia cū Galeno legendum esse censeo.

Corrige
græca.

Vt pote quos.] Apud Paulum impressum est οἱ δὲ καὶ χω-
ρὶς τέτων, pro αἵματι, &c. Sic etiam Galeni exēplaria om-
nia habent. Nam ratio datur cur missionem sanguinis, aut pur-
gationem non sustineant. Signat igitur hoc loco, si quidem, di-
ctio αἵματι. Præterit Orosius, castigatō Basilienſis neglexit.

Sin autem robore mediocri.] Galenus, si autē pulsus me-
diocri robore sit, & magnitudine, paulum ad ægrotantem re-
fert, cuius tamen uires ex pulsu cognoscuntur.

Ergo si æstas.] Galeus non habet, καὶ θερμὸς, quod ego
interpretatus sum, calidi temperamenti. Non enim referri
potest ad θερός, ut Grammatista putat.

Balneum his aduersissimum.] Galenus addit, & aer am-
biens uel nimium calidus, uel frigidus.

IN XXXVIII. CAPVT.

Qi tenuium humorū.] Ex eodē loco Galeni, & sex-
to libro Oribasij transcripsit. Dicit autem paulatim
& continue alendos huiusmodi humoribus laborantes: præ-
terea fructus, quos ὀπωρὰς græci nominant, exhibendos. Su-
pra uerti poma, quod nihil refert Nam fugaces seu horarios
seu

seu tempestiuos ὄγκους græci appellant. Hoc remedium olim Lutetiæ in quodā adolescente continua febris laborante sum expertus salutare. Nam quoties ille uel aluum deijcere, uel urinam reddere extra lectum uolebat, aut etiam quoties pedibus tantillum consistere, aut in sella, quousq; ei lectulus iter neretur sedere, in sincopen solebat incidere: ac uidentes hoc aliquot medici, de salute minus sperare cœperunt. Ego uidens iuuenem natura biliosum, tenuiq; sanguine præditum, cogitavi illi quoquo modo uirium dissipationem impedire, ac statim quum è lecto in sedem esset collocatus, porrexī ei uiam recentem nondum exacte maturam: nam initio Augusti accidit morbus: qua assumpta, paulatim per dimidiam horam seruauī hominem extra lectum citra animi defectiōnem, quod feliciter successisse animaduertens, sequenti die idē facere decreui: exhibitaq; paulo maiore portione, ad unam usq; horam sine ullo incommodo, ut prius seruauī. Factumq; est tandem diebus infecutis, ut tuto iam extra lectum in cubiculo obambulet, daretq; occasionem reliqua auxilia exhibendi. Hoc te nolui celare lector.

Historia.

IN XXXIX. CAPVT.

Reliquæ occasiones.] Ex eodem Galeni loco sumpta hæc sunt ad uerbum. Enumerat autem Paulus syncopæ causas, dolorem uehementem siue ex intemperie, siue humoribus, siue utrisq; uel etiam ex continui diuortio ortum, uigilias nocte dieq; affligentes, nā somno mediocri uires recreantur, immodica inanitio, aut per uentrem, aut uomitu, aut sudoribus, aut urina, aut sanguinis profluuiō. Ac in iis qui aliena loquuntur, hoc est, qui mente non constant, qui delirant, desipiuntq;. Nam παραπαίειν uerbum signat παραφρονῆσαι, ἀλλοφάσαι, cerebro scilicet affecto, adeo ut functiones suas peculiāres, nequeat edere. In ijs si motus quandoq; corporis fiat, uires collabi necesse est. Ad quas conseruandas, & ad syncopen uitandam, singulare est præsidium, temperamenti custodia. Ante omnia uero trium principiorum: mox reliquarum partium, quæcunq; illa in consortium affectus principia secum ex facili trahunt.

ἀλλοφάσαι.

IN XL. CAPVT.

ITaq; dolor.] Hæc magna ex parte Galenus in secūdo de locis affectis habet. Reliqua in 12. Methodi medendi.

Dolor

ναρκώδης.
ὀδύνη.

Dolor stupidus.] Græce est ἡ μὲν ναρκώδης ὀδύνη διὰ ψυχρὰν γίνεται διάθεσιν. Quod interpretatus sum ad uerbum in Paulo. Galenus libro iā citato ait. καὶ τὸν τὸ ναρκώδες ἀλγῆμα διάθεσιν ἐργάζεται ψυχρὰν τε, ἀμὰ καὶ ὀδυνηρὰν, quod est. Itaq; stupidus dolor affectionem frigidam simul & dolorificam parit. Aduerte lector. Paulus hic dolorem ut affectū, Galenus causam interpretatur. Verum sequētia in oratione Galeni eos conciliant. Nam stupor, inquit, frigiditas quædam est non exigua. eoq; membris hac occupatis difficilem & motum, & sensum parit, atq; ita stupidus dolor, non indicat doloris speciem, uerūm dolorem simul & uel affectionem frigidam, uel difficultatē sensus, motusq; ab ea particulæ obortā. Cæterū nō solū in neruis, sed aliis omnibus partibus accidit.

πόνος
σφυγμώ-
δης.

Pulsatilis autem dolor.] Græce dicitur σφυγμώδης, & σφυγματώδης πόνος, quasi interpreteris, pulsorins, & pulsatilis labor, uel dolor: insignium inflammationum proprius, arteriarum quidem semper, p̄timario affectu, aliorum uero corporum sensilium omnium, consortii lege. Cæterum uocem græcam πόνος Galenus sit exponit, ὃ γάρ ται πόνος αἰσθησις ἐστὶν ἀνιερὰ, καθάπερ ἡ ἡδονὴ προσήκης αἰσθησις. Hoc est: Si quidem dolor, sensus est molestus, sicut uoluptas est sensus suauis, quod Cicero elegāter dixit. Omne id quo gaudemus, uoluptas est, quo offendimur, dolor.

Colicus
dolor.

Sin autem tanquam à palo.] Colicorum dolor est, qui in imo uentris ea potissimum parte urget, qua urinarii meatus ex renibus ad uesicam exporriguntur. Atq; hinc non ita ex facili discerni à nephritide potest.

Puncto-
rius.

Punctorius autem.] Galenus habet: ἀρξόμεθ' ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῆς νυγματώδους ὀνομαζομένου, συνιπαμένῃ περὶ τὰς ὑμένας μάλα. οἷον εἰς τὴν τῆς πάθους κατὰ τὸ νύττωται δοκῆν ἐρησιμένης, ἐκτεινομένης δ' πλέον ἐπὶ ἐν κύκλῳ ἐπὶ τῇ τοῦ πῆς ὀδύνης. Hoc est, ut Copus noster uertit: Igitur iterū incipiamus à punctorio uocato dolore, ac uidetur quidē ueluti ipsius affectus interpungendū circa mēbranas potissimū. uerum dolor circa locū punctū ad magnū spacium extēditur. Nos autem, pace illius dictum sit, in hunc modum uertendum putamus. Incipiemus itaq; rursus à punctorio dolore dicto, circa mēbranas potissimum constituto, cuius affectus ueluti radix in eo quod pungi uidetur defixa est, dolor autem lōgius orbiculatim ad id extēditur,

reñditur, &c. In pleuritide hunc dolorem esse nemo ignorat, acri humore membranam costas succingentem pungente.

Pertundens, uehementissimis] Hic dolor græcis dicitur *Περτουνδῆς* διαίτων, quod idem est, ac si dicas *διόρμων*, id est, cū impetu perrumpens. Copus uertit turgidus dolor, qua ratione, ignoro. Certe in Cephalæa, caluaria ipsa perrumpi, pertundiue dolentibus uidetur. Id autem tunc accidit, quando ueluti à radice incipiens, ad uicina transit, ut ait Galenus.

Membrana quidem] In græco codice deest *μὲν* particula. Legendum enim *ὁ μὲν ὑπὸ τῷ δέρματι*, ut respondeat sequenti, *ὁ δὲ*, quod omnes nostri. Aristarchi non aduerterūt. Nec impressum exemplar à Gemusæo castigatum habet. Cæterū mēbrana cuti subiecta quæ sit, audi. Cōtinetur ea cute & corporibus subiectis p fibrarū tela modo subtiliū tractus: quæ uenæ cutē nutriendes & nerui sensum cōmunicātes permeāt.

Diuellentes cruciatus.] Impressa omnia exemplaria habent *ὅιον διασπαμένης* pro *διασπαμένους*: quāquam Orosius hoc & castigator Basilienfis non annotarint.

Profundi sunt.] Hoc est in alto delitescētes, unde quibusdam *ὀστέοποι* quasi ossium dolores appellantur.

Si igitur sanguinis sit copia.] Ex 12. Methodi medēdi Galeni, & 6. Oribasii sequentia sunt transcripta.

Auxilantes.] Miror cur Gemusæus hunc locum deprauatum reliquerit in suo codice, cū plane ad sensum nihil faciat dictio *προσλιπαρύντες*, lege igitur *προσβοηθῶντες* ex Galeno, ut nos etiam antea uertimus.

Irrorationibus.] Hoc est, asperfusionibus. Nā *κατανοεῖν* est *κατανθλῆν*, quod signat superfundere. Linacer uertit *κατανοήσεσι καὶ πυρεασέσιν*, humidis & ficcis fomentis. Quāquam non parum diuersa nomina sint, uariasq; res significant. Nam *κατανόησις* est asperfusio irroratioq; ut Celsi more loquar, ex oleo potissimum ad rem propositam idoneo facta, ueluti cū multa pituita in ore uentriculi hæret, oleū in quo absinthiū ebullierit, id superfundim⁹ *πυρίσσις* quæ & *πυρίαμα*, & *πυρία*, & *δέρμασμα* græcis dicitur. triplex est. Nēpe humida ficca, & mixta, si Hippocrati & Galeno credemus. Humidū fomentū, spongia mollis magnāq; ex aqua calida expressa, applicatāq; Huius generis est aqua calida, aut oleū in utriculos, aut uasa ærea, fictiliaq; aut in uesicā coniecta, partiq; dolēti admota.

Siccum

Viciatum
exemplar.

Viciosus
codex.

Castigatur
græci codi-
cis lectio.
*κατανο-
εῖν.*

*κατανό-
ησις.*

*πυρίσσις.
πυρίαμα.
πυρία.*

*δέρμασ-
μα.*

Fomentum.

Siccum fomentum est, milium, sal, harena in sacculos cōiecta, aut solum linthrum. Item lateres & titiones panniculis inuoluti, & sic circumdati. Pace cuiusdam docti uiri dixerim apud Celsum lib. 2. non esse uicium scripturæ in dictione, titionibus. Nam tertio eandem repetit, fomentisq; inquiring, protinus ualidioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Mixtum fomentum est, hordeum, eruumq; prius contusa, aceto & aqua macerata, uel etiam farina simili modo preparata, & in sacculis apposita. Ceterum humida fomenta conueniunt inflammationibus ex bilioso humore suscitatis. Sicca iis, quæ ex tenui & aquoso sanguine proueniunt. Mixta crassis, uiscosisq; humoribus incidendis, conficiendis, dissipandisq; expediunt.

δγκας. Sin moles.] Quidam parum uersati in medicina uertunt dictionem δγκον in græco codice positam, tumorem, nullo plane sensu, quanquam id quoq; hac uoce significetur. Voco autem hoc in loco molem, corpus, quod ab externo supercecidit: quod uel durum, uel magnū, uel graue, uel simul ambo fuit. In fine capitis male legit in codice i pressō ξυροῦ ἢ ξηροῦ.

IN XLI. CAPVT.

Quum per uentrem.] De hoc accidenti Oribasius lib. 6. eadem tradit Ceterum syntexin, seu ut latine dicā colliquationem corporis facies illa cadauerosa comitatur. Quod in marcore quem μαρasmus græci nominant, uidere est, aut etiam in hectica marasmode.

Castigatur codex græcus. Ex fonte.] Huius loci castigationem Orosius exemplari suo debet, & Oribasius. Nam omnia exemplaria quæ mihi uidere contigit, habent, ἀπὸ γῆς pro ἀπὸ πηγῆς, quanquā aqua ex terra intelligi possit, aqua ex fonte. Hoc præterit etiam Gemusæus.

IN XLII. CAPVT.

Nonnunquam palpebras aperire.] Hoc Galenus confirmat lib. 1. de febribus: οὐ μὴν inquiring, οὐδ' ἀνατέλλειν ἐπιπλέον οἰοῖτε εἰδὶ τὰ βλέφαρα, παραπλοῖως τοῖς κατὰ ζῶσιν, αἰεὶ διακείμενοι, καὶ μέντοι μύουσιν ὡς τὸ πολλὰ, καθάπερ ὑπνώττοντες. ἐστὶ δ' οὐχ ὁ ὕπνος αὐτῶν τὸ πάθος, ἀλλ' ἐγκληρόσεως ἀδυναμία. Hoc est: Nec uero palpebras diutius attollere possunt similiter nictantibus perpetuo affecti. Quinetiā plerumq; conuiuent oculis, ueluti dormitantes. At affectus ipsorum

ipsorum somnus non est, uerū uigilandi impotentia, &c. Hęc quidem de hectica Galenus pronunciauit: nos autē de omni febris, in qua uigiliæ urgeant.

Si cōnuent.] Male in græco codice *μῦσαι*, quod est uel *Restituo*
connuere, legitur pro *ἐμύσαιεν*, quod etiam Orosius anno- *exemplar.*
tauit: Basilienfis autem corrector neglexit.

Cibus quodāmodo sit magis accuratus.] Ita reddi dictio- *περιεργᾶν*
nem græcam *περιεργόττετα*. Nam uerbum *περιεργᾶν* in bo-
nam partem acceprum est, quod accurare. Id signat ex cura
& consilio aliquid gerere Aliquando in malam partem sumi-
tur, pro eo quod est *πράττειν τὰ περιττὰ*. Galenus alibi *διαί-
τη ἀκριβῆ* in eodem significato protulit, hoc est uictu ac cura-
to, exquisitoq; nō de tenui intelligēs, sed ex delectu sumpto.

Linctus ex papaueris.] Hanc compositionem etiam ho- *Diaco-
dyon.*
die officinæ uocant diacodyon. Dixit autem Paulus ex sapa,
quia duplici modo fieri solet, scilicet ex sapa, & ex melle. Quæ
sapam recipit ad somnum conciliandum utilis est. Quæ uero
mel, ad sputi reiectionem.

In quibus autem caput.] Contrario supradictis modo af-
fectos recenset. Nam illi ob tussim ex defluxu capitis pulmo-
nes infestantem dormire non possunt, eoq; diacodyon ex sa-
pa assumēt, quod tenues humores incrasset. Hi autem quibus
caput defluxionibus obnoxium non est, suffitu iuuabūtur. In
sequenti sententia pro *παραγμαῖς*, legitur *παρακμαῖς*. Item
pro *λι.* quod signat libram pone *γ.* quod notat drachmam.

Arnabo.] Recentiores quidam modo carnabum, modo
carnabadium, alii zarnabum, & zarnabadium. Odoramentis
expetitur. Vide Paulum in septimo. Sunt qui Doronicum in
officinis appellatum esse pronūcient. Non salicis folia, id esse
putes, ut quidam grammatista hæsitabundus exponit.

IN XLIII. CAPVT.

Soporis noxij.] Ita sum interpretatus dictionē *καταφορᾶν*, *καταφο-
ρᾶ.*
quam si penitus introspicias, & ex etymo interpretari li-
beat, impetus somni uehementioris merito dicetur, & inex-
pugnabilis pene dormiendi necessitas, ut Celsi more loquar.
Dixi autem, noxii, quia sopor etiam bonus est.

Lactis modo repenti.] Tantum ualet *γαλακτάδει*, quasi di *γαλακτω
δες*
cas, lactosa. Galenus multis in locis hac uoce utitur pro tepi-
do. Non autem pro eo, cui lac sit admixtum:

PAULI ÆGIN.

Bb

Si uero

Castigato
græcum
exemplar.

Si uero morbus.] In codice græco deest particula δὲ, ac legendum est ἐπιμενήσῃς δὲ τῆς νοσῆς. Noua. n. sentētia incipit, quod miror Orosiū & Basiliensem correctorē uoluisse prætere, cū alibi ēt minora à me p̄termiſſa ceu capitalia clamitēt.

IN XLIIII. CAPVT.

Nonnullis etiam cum igneus sensus] Hoc est, cum com-
buri uidentur nimio calore febris, pulicaris herba, quam
græci psyllium nominant, conducit.

Permulceriq;] Græce est διαφλεαφνέον, à διαφλεαφν, quod Celsus latine dixit, corpus eius leuiter ex oleo ueteri permulceatur, & hic autem manibus tātum permulceri debent, somni conciliandi gratia.

IN XLV. CAPVT.

Olei uox.

νάρδος.

EX absinthio.] Hoc est, ut Galenus ait, in quo absinthii co-
ma sit feruefacta. Siue aut oleum, siue unguentū, dicas, ni-
hil refert. Quamquam Orosius olea in quæ etiam aromata
coniecta sunt, unguenta dici nolit, contra ueterū sentētiā.

Nardino.] In græco codice est νάρδος, quod signat nardo:
eadem nimirum locutione qua usus est Celsus, & Scribonius
Largus aliiq; ueteres. Celsus lib. 3. ungi rosa debet, pro rosa-
ceo. Vt in compositione 210 apud Largum. Idem rosa dilu-
tum explet concaua uulnera, pro rosaceo dilutum.

Emendate
codicem
græcum.

Sin autem inflammatorium quiddam.] Codex græcus ha-
bet φλεγματώδης τὸ pro φλεγματώδης τι, quod omnes casti-
gatores Pauli, ceu momenti exigui neglexerunt.

IN XLVI. CAPVT.

Rigori.] Medici hodie dictione rigoris utuntur pro græca
ῥίγος quamquam non ita latine Celsus Hippocratis sen-
tentiam aliquando uertens pro ῥίγος horrorem reddit. Verū
nos φρίκην horrorem uocamus. Inopia itaq; linguæ, ῥίγος fe-
brium, quasi ad uerbum, rigorem interpretamur.

ἀγών.

Concertationē naturæ.] In græco codice est: οὐδ' ἐκλύειν
τῶν ἀγῶνα. Quod Paulus ἀγῶνα dixit, ego concertationē na-
turæ exposui. Nam in crisi natura certat cū morbo. Si eō fit su-
perior, bona crisis est: si morbus uicerit, mala. Quamobrē si
natura se accingit ad ea quæ offendunt, expellēda, ut in rigo-
re accidit, moliendū nihil est. Dixi igitur cōcertationē natu-
ræ dissoluere, uel certamē uel pugnā quā cū morbo habet. Na-
turæ quidē in græco non est, sed sniæ claritatis gratia addidi.

IN

IN XLVII. CAPVT.

A Diutareq; calfactu] Recenset hic Paulus, quibus modis sudor per crism erumpens, etiam adiuuari debeat, nempe fotu mediocri, quiete calido clystere, adeoq; in quiete manere ægros uult, ut sudorem non abstergant.

Recreare.] Græce est ἀναψύχειν, quod uerbum duo significat, refrigerare, & recreare, seu reficere. Hesychius grammaticus dicit idē esse quod ξιπίζειν, euentilare, & ἀναψυχὴν interpretatur παραθυμία, hoc est solatium Cōgruit magis id hoc in loco, nempe uires sudorū copia lassas, oppressasq; recreare.

Tenui uelamine.] περιβόλαιον λεπτόν in græco codice est. Celsus ait: Veste leui, madida, interpretatus sum ἐμβεβεγμένον ab ἐμβρέχω quod est irrigo, madefacio.

Ambæ siquidem.] Ad calcem & floces uini referuntur. In græco neutrum genus est. ἄμφω ἀναλαμβάνεμενα. ambo ad fouendum applicata, genuino corporis tempore siccantur: siccata meatus per quos sudores erumpunt, obstruuntur.

Qui per ualidam expressionem.] Græce est, κατ' ἐκθλίβιν, quæ sit natura quasi necessitate quadam oppressa. In doloribus uehementissimis & anima sæpe deficit & sudores frigidi erumpunt. Hi dicuntur fieri per expressionem, ualidam addidi, significantiæ gratia: Quidam pro ἐκθλίβιν, legunt ἐλλείβιν, quod est animi defectum, quod non male etiam hic quadrare potest. Eruditi iudicent.

IN XLVIII. CAPVT.

Hypoglottia.] Formulæ quædā medicamentorū sunt, quæ in tussi, thoracis arteriæq. uiciis assumuntur. Hodie bechicas officinæ, & penidias appellant. Fiunt autē potissimum ex radice dulci, tragacantho, terebinthina, zaccaro, aliisq; ad rē propositā cōgruis. Ceterū Galenus uocat ὑπογλωσσίδας.

Lana sulphure imbuta.] Græce est ἔριον τεθειομένον, ad uerbum sonat: Lana sulphurata. Oroscius corripienti studio potius quàm ueritatis, uertendum clamat, sulphure suffita. Quomodo autem lanæ suffiatur, nusquam me legisse fateor, homines suffiri sulphure in tussi lego Lanam autem ut pice, aut alio pingui, ita sulphure imbuī. Imbutas sic applicari. Nā suffitus parum in lana proficit.

Pingue] Græcus codex habet καὶ ἡ λιπὴς, pro ἡ λιπὴς, accipimus pro pinguitudine, aut oleo, aut quacunq; re pingui.

Bb 2 Petmul-

Permulceri.] Hoc est, molliter cōtrectare, supra interpretatus sum διαφιλῶσθαι permulcere, ex Celsi more.

IN XLIX. CAPVT.

Sternutamenta.] Vide sextum Oribasii, quomodo autem fiant: Galenus tertio de symptomatū causis explicat. Hic autem Paulus remedia persequitur sternutationis, quæ in febribus molesta esse solet.

λάγων.
κενῶν.
Corrige
græcum
codicem.
Castigato
codicem.

Ilium intentio.] Græci λαγῶνα & κενῶνα eam partē esse uolunt, quæ latinis dicitur, ilia. Quidam uero male ὑποχόνδρια uertūt Iliā, in bonis autoribus parum uersati. In codice impresso est ἐντασις lege ἐντασις, Neglexerunt Aristarchi.

Summatim partium.] Hic Orosius debet exemplari suo. Nam omnia quæ mihi uidere contigit habent, τῶν ἀκρῶν μέρων, quod est, summorum, musculorum pro τῶν ἀκρῶν μερῶν.

Mollis contrectatio.] Quod ante dixi permulcere, hoc molliter contrectare interpretor. Nam idem esse puto. Græca uox est, διαφιλᾶσθαι.

Spongiæ ex mari uacuæ.] Quidam in codice græco legūt pro κενοί, quod est uacuæ, καινοί, hoc est, recentes. Vtrunq; instituto conuenit: quam tu malis lectionem sequere.

IN L. CAPVT.

Vel attemperatos.] Cibi fastidium aliās ex humore pituitoso, aliās ex bilioso nasci solet. Si pituita in stomacho redundat, uomitu educenda est, si bilis supernatat, deorsum euocanda. Vbi uero totum corpus purgare uoles aliter faciendum docet Hippocrates. Quod si in primo uenis crudi humores semicocti; habeantur, dissecandi, cōcoquēdiq; quod Hippocrates πεπασμόν, quasi mutationē. Huius autē seculi medici perperam digestionē appellant. Si in extremis uenis & corporis habitu sint infixi, relaxandi ueniūt. At biliosi humores, & melancholici, q̄ ultra sanguinis terminū processerūt, caloris uolentia expelli prorsus debēt; Si in stomacho nausēā excitent per inferiora: si in toto corpore biliosi, quod æstate potissimū accipit, uomitu purgari debent: melancholicus autē infra semper. Porro cum iam educūtur, necesse est eos infrenare, coercereq; ne transitu partes afficiant. Item meliores hoc agēdo in locum restituere. Quā rationē, seu potius, ut Galenus ait, cacochymia curationē græci ἐπίκρᾶσιν nominant. Verba Galeni 9 Methodi in hunc modū habēt: χρὴ γὰρ δηλονότι κατὰ

πεπασ-
μός.
Nora.

ἐπίκρᾶ-
σις.

τὰς

τὰς τοιαύτας ἐναντιώσεως τῶν ἐνδείξεων κατὰ βραχὺ μὲν ἐκκε-
 νῆν τὸ μὀχθηρὸν, κατὰ βραχὺ δ' αὐτ' αὐτῷ το χρηστὸν ἐντιθέ-
 ναι. καλεῖται δ' ἐπίκρasis ὑπὸ τῶν ἱατρῶν, ἡ τοιαύτη θερα-
 πεια τῆς κακοχυμίας. Paulus igitur recte etiā dixit: αὐτοὶ ἀπορ-
 ρύψαντα ἐκκρίνουν, ἢ ἐπικεράσαντα, βελτίους ἐργάζεται. Quod
 est: Vel abstergēdo excernūt, uel attēperando, coercēdo, miti-
 gando furorē illorū, obtundendoq; meliores in locum resti-
 tuent. Hippocrates libro de ratione uictus in morbis acutis
 materiā eorū quæ attēperare possunt, cōmemorat. Galenus
 autē eius interpres paulo apertius in hunc modū differit: de
 torminibus orationē instituens: σκοπὸς δὲ ἐστὶν αὐτοῖς, τὸ
 μέντοι καθάραι τῆς κακοχυμίας, τὸ δ' ἐπικεράσαι, τὸ δ' ἐπιξη-
 ράναι, τὸ δ' ἐμψύσαι. τὸ μὲν ἔν γάλα τὸ ὄνειον, καθάρεσθαι δύνα-
 ται, καὶ ἐπικεραύνει, τὸ δὲ τῷ λίνῳ σπέρμα ξηραίνοντε καὶ
 φύχουν, τὰ δ' ἐκ τῶν πυρῶν ἀλφίτα, τὸ ἐπικερατικὸν ἔχει. κα-
 λῶς δ' αὐτοῖς ἀναμέμικται, καὶ τὰ κρίθινα, ξηραίνοντα τε καὶ
 φύχοντα. οἱ δὲ ἀ' ἰγύπτιοι κύαμοι μετρίως φύξαι δύνανται.
 τὰ δὲ ὦα καὶ ἡ σεμίδαλις, καὶ ὁ χόνδρος παχύχυμα καὶ ἔυχυ-
 μα, καὶ ἐπικερατικά. Hoc est: Eo ipsi spectāt, ut uiciosum hu-
 morem partim purgent, partim attēperent, partim deficcant,
 partim refrigerent. Lac itaq; asininum purgare potest, & attē-
 perare. Lini uero semē siccare, & refrigerare. Triticea polēta,
 attēperandi facultatē obtinet. Recte ipsis & ordeacea admix-
 ta est, quæ & siccant, & refrigerant. Aegyptiæ autē fabæ, medio-
 criter refrigerare potest. Qua similago, & chondrus crassi bo-
 niq; succi, & attēperatoria existunt, &c. Vides igitur, quō Ga-
 lenus utatur dictionibus ἐπικεράσαι, & ἐπικτεραύνει. Item
 ἐπικτερατικόν, & ἐπικρατικά. Galenus 12. Methodi de uinis
 fuluis agens scribit ἐπικτερατικοὶ δ' εἰσὶ καὶ δερπτινοὶ, quod
 postea interpretatur τρέφουσι δὲ μᾶλλον, καὶ κακοχυμίαν ἐπα-
 νορθεύουσι. Hoc est: Nutriunt magis, & prauitatem humo-
 ris corrigunt, emendantq; Linacer superiorē sententiā nescio
 quo modo exponit, certe dictionis uim ignorasse uidetur. Nā
 quid sibi uult, præterea mistibilia sunt, & nutriētia? Dicere. n.
 oportebat, attēperatoria aut sunt (intellige malorū humorū,
 bonos in locū reponēdo, & qui nondū longius terminos cō-
 coctionis excesserūt, reducēdo, acrimoniā ipforū obtundēdo.)
 Ne aut putes bilē absolutā, aut flauā, aut nigrā meliorē reddi
 posse: imo nec falsam pituitā, eoq; nemo doctus medicus hos

Aduerte,

Castigato
exemplar
græcum,
Restitue
exemplar.
Emendato
græca.

humores alterandos, cōcoquendosq; uel ut barbari dicunt, digerendos dixerit Sed purgādos potius, meatibus per quos trālibūt, adaperitis, medicamētis in id efficacibus. Ne aut acrimonia sua & rosione infestēt, ut in torminibus docuit Hipp. cibi & potus ἐπικτηρατικοὶ assumūtur, quibus potes etiā syrupos quosdā mitigatorios annumerare. Cæterū male in codicibus græcis πορρίφαιτα, qđ est, proiiciētes, pro ἀπορρίφαιτα, qđ signat abstergētes Præterierūt id Orosius, & Gemus & alii.

Potissima uero polēta] Codices græci oēs male cōgruā habent lectionē hāc, πειρατέον ὀνακτᾶσαι τὴν ὀρεξιν, μάλιτα δὲ ἀλφίτων, πάλιτα δὲ ἀλφίτων, aut μάλιτα δὲ διαλφίτων.

Non tamen ab iis multum] Hic quoq; deprauatus est codex græcus. Habet. n. μὴ πόρρω μὲν τοι τοῖς πυρετῶν χροῖς, pro μὴ πόρρω μὲν τοι τῆς τῶν πυρετῶν χρείας.

IN LI. CAPVT.

SI uero in grandem famem.] Apud græcos una dictio grandem famem signat composita ex βῆς & λιμός. Quicquid enim grande illi nolunt significare in una dictione per ἵππος, & βῆς, quod est apud nos si uerbum ex uerbo interpreteris, equus & bos, explicant, ut ἵππος ἐλινεν, βέλιμος, &c. Cæterum eadem fere habes remedia bulimi apud Gal. lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos. In sequētib; uerbi ὀξύτης pro sœuitia furore, ad uerbum sonat acumine.

IN LII. CAPVT.

QVONIAM igitur à pituita.] Galenus de symptomatum causis lib. 1. scriptum habet. Canina appetentia fit, cū uel ob acidi humoris uicium uētricus infestatur, uel ubi totum corpus immodice digestum dissipatumq; , continua nutritione indiget, &c. Cæterum in Aphorismorū libri secūdi commentario, cap. 20. curationē hanc ad uerbū persequitur.

Aduerte,

Incidant, abstergeantq;] Superius & hic male in codice Græco ξίπτουσιν, pro ξύπτουσι habetur, unius literæ mutatione: quod ceu nullius momenti castigatores Pauli neglexerunt, Quanquam ad sensus puritatem non parum faciat. Quippe diuersa sunt, proicere, & abstergere.

Pinguia.] Galenus addit, καὶ ὡς ἂν ἐπιτίς, ἐλαιώδη τιῶν ἐδεσμάτων, hoc est, & ut ita dicam oleosa esculenta.

IN LIII. CAPVT.

PARTICULARUM per quas] Hæ sunt, stomachus, os uentri-

culi,

cali, ipse uentriculus. Galenus commentario quarto in opus de ratione uictus in morbis acutis, partes commemorat, quas aliquando sitim procreare soleant. Idq; in hunc modū: πάντων μὲν πρῶτον καὶ μέλιτα τὸ φόμα τῆς γαστρὸς, ἐφεξῆς δὲ ἡ γαστήρ, καὶ μετὰ ταύτην ὁ φόμαχος, εἴτα πνεύμων, εἴτα νῆπις.

Prauas autem potiones] Codex Græcus deprauatus est. Emendatur
codex. Habet enim μοχθηρῶν δ' ἐπιθυμῶσι ποιότητων. Hoc est, prauas aut appetunt qualitates, pro πομάτων, quo edst, potiones. Orosius cum aliis Aristarchis negligenter hoc præterit.

Cæterū siti pressos] Hæc apud Gal. lib. i. de symptomatū causis inuenies. Habet autem ille paulo ampliora in istū modum: ἀπαύτοις δὲ δίψῃσι καταληφθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθανόντας οἶδα, τύντε καταφαγύντα τὴν ἐχίδνα (ἦν δ' ἄρα δίψας) καὶ τὰς ἐκ τῆ οἴνου πίνοντας ἐκ περιφάσεως θειράδας, ἐν ᾧ τοιοῦτον τὸ θῆριον ἐναποτεθνήκει, καὶ τὸν ἐξ οἴνου παλαιῷ μεθυθέντα, καὶ τὸν ἀποκαρτερεῖν ἀποβελήσαντα, καὶ τὰς ἐν τῷ πλοῖῳ ἐπιλιπόντος τῆ ὕδατος ὧν ὅσοι τῆς θαλάσσης ἐτόλμῃσιν αὐτὴ πῖν ἀμετροτεροῦντε διψήσαντες τῶν ἄλλων, καὶ τινες μὲν αὐτῶν ὑπαχθέντες τὴν γαστέρα, καὶ διχθέντες σφοδρῶν δξύτερον ἢ κατὰ τὰς λείπας ἀπέθανον, &c. Vide igitur an ex hac lectione, Pauli codicem in quibusdam uelis castigare. Ego sane saluo aliorū iudicio, legerē δίψῃσι δ' ἀπαύτοις καταληφθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθανόντας οἶδα τὰτε φαγόντες ἐχίδνας διψάδας, καὶ τὰς οἴνου παλαιῷ μεθυθέντας, καὶ τὰς ἐν τῷ, &c.

Rosaceo cum impetu salientis modo] Græce est μετὰ κρουνισμῷ γινομένη, hoc est: Cum crunismo facta: à uerbo κρουνίζειν, quod est, cum impetu decidere Gal. lib. 8. Methodi utitur uerbo κατακρυνίζειν in hac sententiā: εἰ δ' ὑγρὸν εἴν τὸ προσφερόμενον, ἐξ ὑψηλῆς ἀτον βάλλοντες, καὶ οἷον κατακρυνίζοντες id est: Sin autem id quod adfertur, si quidum fuerit, ex altiore loco deficientes, & in salientis modum fundentes. Ibidē usurpat dictionē κρουνῶς. ἔτι δὲ μάλλον εἰ κρουνῶς ὕδατος ψυχρῷ καταβάττει τῆ ἀγγείου φύχει τὸ ὑγρὸν. Hoc est: Præterea magis humorē refrigerat, si deficiens aqua frigida uas illidat, &c. Cæterum superfundimus aliquando liquores, ut in hoc symptomate, syncopei sublata in altū manu, p mediocrē lanæ hapsū.

Iam dilutum.] Sic uocamus humorem in quo aliquid maderit, aut maceratū per horas aliquot sit. Recetiores medici infusionē appellāt, ut infusionē rheubarbari, agarici, cotoneo-

ἀπόβρυ-
μα. rum Græci ἀπό βρυμα dicunt.

IM LIIII. CAPVT

Melius autem facit myxion.] Myxion uel myxa, uel my-
scion fructus est pruno similis. Galenus sericon appellat
forte hodie officinis dicitur sebesten.

Salem indicum.] Hic sal nimirum est saccharū quod nos
candū appellamus, natura non arte, proueniens quanquā ho-
die Veneriis & alibi artificio naturam imitentur. Auicenna
interpretatus hunc locum Pauli, saccharum tabarzet ponit.

IN LV. CAPVT.

Textus
græcus ui-
tatus.

Imbibito] Similia apud Galenum lib 7. medēdi Methodi.
Eadem uero apud Oribasium sexto. Sed perperā hic in Co-
dice impresso legitur ἀναπέμπτο μένον, quod est sursum misso,
pro ἀναπεπομένον quod ualet imbibito ab ἀναπίνομαι, inde
ἀναπέπωμαι. Sic habet Galenus loco supra citato, ἐνίοτε in-
quiens, ὅς ἐστι αὐτὰς τὰς χιτῶνας, ὥς ἂν εἴποι τις, ἀναπεπομένον
ἢ ἐμπεπλασμένον. Hoc est. Nonnunquam uero in ipsas tuni-
cas imbibitus, ut ita dicam, uel impactus.

IN LVIII. CAPVT.

Porro ubi concoctrix facultas.] Ex hac sententia opinio
quorundam de remediis spinæ applicandis in uētriculi af-
fectibus, satis refellitur, et si euidētia ipsa quæ in confectiōni-
bus apparet, quid in hac re faciendum sit, aperte doceat.

Vel manna uino macerata] Non in dandi casu, legenda
sententia est, sed nominandi. Corrige igitur codicem græcū
ita. ἢ μάλιν ἐν οἶνω φυραθεῖσα.

Agathium.] Pastillus est, qui retinendū suppressendūq; po-
testatem habet. Vide septimum.

IN LX. CAPVT.

Typhe.

Typhe.] Specie filigni nō dissimilis, simplici culmo, grano
multiplici, tunica uelato, atq; leuissimo, radice numero-
sa, largior eius in Asia prouētus regione, ut uult Galenus, quæ
super Pergamum sita est. Hanc agricolæ, quod triticum in op-
pida conuehi soleat, ad panificium usurpant. Huiusmodi igi-
tur arista, hoc est, spicæ apice narium foramina pungere inte-
rim præcipit Paulus, ut irritatus sanguis largius profluat.

FINIS LIBRI SECVNDI

COMMENTARIO RVM.

COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER TERTIVS.

CAPVT I.



TERTIVS hic liber de omnibus totius corporis affectibus particulatim agit: & singula unicuique particulæ cōuenientia remedia cōplectitur, Primum autē cuiusque morbi curandi Methodū artificiosam exponit, quæ ex causarū notitia, partis tēperamēto ægrique natura, & aliis indicationibus sumitur. Deinde sic ad ea ueniendum auxilia præcipit, quæ ipsis locis affectis induci debeant, Græci τοπικὰ nominant. Quod Galenus lib. 14. Methodi pulcherrime docet. Cæterum hic liber Pauli partim ex Galeni opere de compositione medicamentorum secundum locos, partim ex octauo Oribasij trāscriptus est: admixtis interim remediis quæ Paulus ipse usu comprobavit.

IN I. CAPVT.

Quemadmodum stirpium.] Ex 1. cap. Galeni de cōpositione medicamentorū secundū locos ad uerbū hæc sunt transcripta. Iam 14. Methodi pene eadē habentur. ascribam autē uerba Galeni, maioris perspicuitatis gratia: εἰδείχθη δὲ ὅτι τῶν διαπνεομένων χυμῶν ὅσον ἰλυῶδες εἶναι ἐξ ἀρχῆς τε εὐθέως, τὰς τρίχας ἐγενήσῃ, καὶ τὸ λόγου καθ' ὑπόφυσιν αὐξάνει. τὸ δ' οὖν ὅτι αὐτῶν ἀπόλλυται πάντα πασιν ἢ μοχθηρὸν γεννηθῇ, φθίρειται τὰς τρίχας ἀναγκαῖον εἶναι. καὶ γὰρ οὖν καὶ τὰ φυτὰ

Pilorum origo & nutrimentum.

τὰ φυτὰ κατὰ διττὴν αἰτίαν ἀπόλλυται, ποτὲ μὲν ἀπορέντα
 τῆς τρεφούσης ὑγρότητος ἐπὶ δ' ὅτι ἐκ οἰκείᾳ χρώμενα. Τέλειος
 μὲν ἀπολλυμένων τῶν τρέφοντος χυμῶν τὰς τρύχας ἢ φάλαγγας
 σις γίνεται, μοχθηρὰ δ' ἀποτελεσθέντος, αὐτὸ οὐ φιάσεις καλύμμε-
 ναι, καὶ αἱ ἀλώπεκες. Hoc est, ut rudiores, intelligant: Ostēsum
 uero est ex humoribus, qui per latētes meatus perspirant, li-
 mosum quicquid est, id, & statim ab initio pilos producere, &
 reliquo sequenti tempore, ueluti materiā suggerēdo augere.
 Hoc igitur, cum uel in totū perit, uel prauū generatū fuerit,
 pilos corrumpi necesse est. Quandoquidē etiā stirpes duplici
 ex causa pereunt, interim sanē humiditate quæ ipsas nutrit,
 destitute, interim nō propria utētes. Vbi humor pilos nutriēs
 prorsus interiit, caluiciū prouenit. Cum autē uiciosus est red-
 ditus, & opiafēs, & alopeciae excitātur, &c. Celsus hæc duo po-
 strema uicia cōi uocabulo Areas appellat, quod nimirū lo-
 ca pilis uacua eos in capite repræsentēt. Oroscius reprehēdit
 hic me qđ Celsum imitatus dixerim de areis, hoc est alopecia
 & opiafi. Recte facit literator, interpretādi muneris imperitus.

Caluiciū.
 Ophiafis.
 Alopecia.
 Area.

Nonnullæ uero alienis.] Græce est ἀλλοτρίοις ἐαυτῶν, qđ
 ad uerbum sonat, succis alienis à seipsis. Galenus paulo clarius
 dixit: ὑγροῖς ἀλλοτρίοις τῆς ἐαυτῶν φύσεως, quod est Humori-
 bus alienis à sua ipsorum natura Atq; ita nos reddidimus, po-
 tius indicantes esse, dict. onē sniæ addere, quā rē obscurare.
 Quemadmodum igitur quædā alimēta sunt homini, quædā
 sturno propria, ita herbæ quoq; idoneum, familiaremq; natu-
 ræ suæ humorem quo alantur, attrahunt, alienum respuunt.

Castigatur
 codex Græ-
 cus.

Inter se.] Deprauatus codex est Græcus, tū Venetiis, tū
 in Germania impressus. Habet enim διαφέρουσα τῶν ἄλλων,
 pro διαφέρουσα τῶν ἀλλήλων. Rursus hic Galenus apertius
 dixit: ὀνόματα δ' ἐσχικῶν διαφέροντα παρὰ τὸ σχῆμα. Hoc
 est: Nomina autem secundum figuram diuersa habentes.

Græcus
 mutilus in
 stauratur.

Quoniam in Ophiafi.] Codex Græcus hic mutilus est.
 Quid n. sibi uult ὅτι παραπλήσιον ὀφει τὸ βεβλαμμένον φαί-
 νεται μόριον, nisi addat in quo affectu. Addendū igitur necessa-
 rio ex Galeno nō nihil est, legēdumq; in Paulo ὅτι κατὰ τὰς
 οὐφιάσεις παραπλήσιον, &c. Oroscius & Gemus. nō animad-
 uerterūt, tam bonis alioquin ut ipsi gloriānt, exēplaribus usi.

Oroscius.

Deinde loco uitiatō.] Hoc ubiq; obseruandum præcipit
 Galenus, ut semper totius corporis uacuatio præcedat, nisi
 admodum

admodum exiguus sit affectus. Dixi loco uiciato auxilia inducemus, pro τοῖς τοπικοῖς ἀποθεραπεύσαμεν βοηθήμασι, quod est, localibus persanabimus remediis.

Si igitur color ad nigrius.] Hoc est, si nigrior, albidiorue conspiciatur. Nam quod Paulus εἰ μὲν ἐν ἐπὶ τὸ μελάντερον ἢ λευκότερον ἢ χροῖα παρὰ τὸν κανόνα dixit, Galenus in methodo in hunc modum: εἰ μὲν γὰρ λευκότερα τῆ κατὰ φύσιν, καὶ εἰ μελαντέρα. Quod est, si albidior quàm pro naturæ habitu sit, & si nigrior.

Antidoto Hiera.] Intellige, hiera diacolocynthidos, cuius descriptionē habes lib. 7. Pauli Archigeni ascriptam. Scribonius autem Largus eandem pene ad uerbū habet Officinę uocāt Hieram cōpositam Galeni: uerum in multis adulteratam. Quæ uero ex aloe, & aliis sex rebus, nēpe cinamomo, xylobalsamo, asaro, spica nardi, croco, & chiamastiche, cōstat, simplex dicitur. Et hæc in officinis, non parum ab illa Galeni discrepat. Primum sane præter medicamenta quę ab illo numerantur, duo insuper adiecta habet, puta xiloaloen, & cassiā, unū supposititiū carpobalsamum, loco xylobalsami. Deinde pondera etiam diuersa continet. Nam omniū partes equales habet. Galeni autem hiera, aloes cētum, aut cum præstatiore fieri cupit, aloes drach. nonaginta, aut etiā octuaginta recipit, quorū uero sex: ubi de capite sollicitudo est, croci tm̄ quinque.

Hiera diacolocynthidos,

Catapotia ex aloe] Hæc recipiunt cucurbitę syluestres. quam colocynthida uocant, partem unam aloes, & scammonii singulorum partes duas. Galenus hic absinthii succi partē unam admiscere solebat: antea quoq; mastichen chiam, & bdellium, rediguntur in granula Ciceri similia. His fere respondent Pilulę nostrę Cochię à Rasi descriptę.

Dein ad præsidia.] Cum iam purum ex purgatione corpus fuerit, humor qui in cute continetur medicamentis digerentibus discuti debet: diligentia adhibita, ne adeo calida, acriq; admoueantur, ut cutis exulceretur. Ad hæc ne nimium siccet, prouidendum est nam talibus non tantum uiciatus, sed etiam utilis qui confluit, absumitur. Græce erat ἐπὶ τὴν τοπικὴν χωρὲν ἐπὶ μέλειαν quod ad uerbum sonat, ad locale ueniendum curationem, sed Latinius est ut reddidi.

Methodus curationis.

Primæ asperitatis.] Locutio est Varronica pro asperrimo. Græce erat τὸ τραχύτατον.

Aliud

Additū est
hic ut cu-
riosis fiat
satis.

Aliud experientia prob.] Hoc medicamentum in Codice Ioannis Lascaris manu scripto, non habetur: nec compositio plane cohæret, ac peregrina plane uidetur.

Oroscius.

Vnciæ octo.] Habebatur in Græco χ cum superscripto ο sicut alia pleraq; absurda. Miror Oroscium in tanta ueterum exemplariorum copia hoc nō monuisse lectorē, cum tamen in sequenti medicamento adnotet legendum μὲς προκινός.

Viciata le-
ctio Græ-
ca.

Euphorbiæ, thapsiæ, baccarū lauri.] Male in Codice Græco habetur δαφνίνον quod est laurim pro δαφνίδων. ut Galenus habet. Nam postea mentio laurini fit. Præterea Galenus in eodem medicamento à Paulo ratione ponderū dissentit. Legit enim Euphorbij, thapsiæ, & baccarum lauri, singulorū drachmæ duæ, sulphuris uiui, hierati singulorum drachma: ceræ drachmæ sex, &c. Neglexerunt Aristarchi.

Oroscius
& corre-
ctor Basi-
lex.
Oroscius,
& Gemu-
sæus.

Nasturcii.] Impressus Codex tum Venetiis, tum Basileæ habet καρδαμόμα. Sed Galenus & ipse sensus requirit καρδά-
μυς quod impetigines & lepras discutit, eadem ui præditum qua sinapi. Nec hoc à castigatōribus animaduersum.

Oroscius,
& Gemu-
sæus.

Recimini aut ueteris.] Paulo ante etiam deest particula disiunctiua in codice Græco, habet. n. κικίνε παλαίου ἐλαίου: cum legendum sit ex Galeno κικίνε ἢ παλαίου ἐλαίου. Nam si ricinimum deest, etiam commune uetus oleum eadem præstate potest. Omiserunt correctores.

Gal. a Pau-
lo uariat.

Leporum uentriculi quinque.] Ex Critone hæc sunt, citate Galeno. Verum scriptura illius à Paulo uariat. Galeni codex habet κοιλίας ἕξ hoc est uentriculos sex. Paulus tantum habet πέντε. Vide utrum malis sequi.

Castigatur
codex Græ-
cus.

His adiiciantur.] Græci Codices omnes deprauati sunt hoc in loco. Nam habent, πρὸς τοῖς λάμβανε τὸ τρίτον, μυστίνης ἀκραιμόνων, ἀκακίας κάρπε, &c. Quid quæso hinc colligi possit? Legendū igitur cū Galeno censeo in eū modū: πρὸς τέτοις λάμβανε μυστῶν, μυστίνης ἀκραιμόνων, ἀκακίας κάρπε, &c. Pondere non nihil apud Galenum uariant.

ἵδυσμα.

Quolibet oleo aromatis imbuto.] Sic interpretatus sum ὃ δέλεις ἢ ἵδυσματι. Celsus dixisset, quolibet unguento. Nam Græca uox ἵδυσμα nihil aliud signat quàm unguentum ex oleis succisue præparatum, cui ex aromatis iniectis, odor suauior, & gratia accesserit. Non autē sum ignarus ἵδυσμα apud alios quosdā aliter accipi, ut apud Plinium lib. 13 cap. 1. ubi habet

habet in hunc modū: Ratio faciēdi duplex, succus & corpus. Ille olei fere generibus cōstat, hoc odorū, hac stymmata uocant, illa hedysmata, &c. In qua oratione plane à Galeno, cæterisq; Græcis dissentit. Nam olea ipsa quæ in unguentis sumuntur, hedysmata uidetur appellare: stymmata uero aromata. At Galeno & Dioscoridi stymmata, alia medicamēta aromatica, nempe quæ spissitudinem unguento cōcilient, appellantur, unde etiā spissamenta possis nūcupare, alia uero hedysmata, nimirū quæ gratiā odoris & suauitatē eis imprimant. Vide Dioscoridē in unguēto cinamomino, & Nardino aliisq; cum paucis. Galenus uoces Hippocraticas interpretans, hedysmata, inquit, pro ipsis aromatis apud Hippocratem accipi.

τύμμα-
τα.

Anemonæ flos tritus.] Orosius hic in græco codice legendum censeat, ἀνεμώνης τὸ ἐντὸς μέλαι τρίψας μετ' ἐλαίου μυρσίνης, hoc est: Anemonæ interior pars nigra, cū oleo myrreo trita, ut habetur apud Archigenem, citante Galeno lib. 1. de compositione medicamentorum secundū locos. Vide quid reprehendendi libido faciat. hunc locū adfert, de medicamentis nigrefacientibus, ab Archigene comprehensum, cū paulo superius singulare caput extet de fluidis capillis, de remediis illos conseruātibus, unde Paulus hanc orationem ad uerbum planè transcripsit. Habet enim Galenus ex sententia Heraclidis: ἀνεμώνης τὸ ἄνθος τρίψας μετ' ἐλαίου, κατὰ χρίε. Iam flos ipse non aduersatur aliqua ex parte pilis promouendis.

Orosius.

Stercus caprillum.] Apud Græcos proprie dicitur stercus caprillum σφύραθος, teste Galeno lib. 10. de simplici medicina, ubi habet συνεχέστατα μὲν ἐν χρώματι τῶν αἰγῶν κύπροις, (σφύραθαι δ' ἰδίως ὀνομάζονται.) Quod est: Frequētissime igitur caprarū stercorebus utimur, sphyrathi autem proprie nominantur. Orosius nouus interpres, aliorum autē, si diis placet, corrector, filum caprillum exponit.

σφύρα-
θος.

Orosius.

IN II. CAPVT.

E Cinere lixiui.] Paulus lib. 7 lixiuium, quod græci κονίαν appellant, cineris lotionē esse dicit: enumeratq; eius differentias, Aliud. n. ex cinere fici, caprifici, sarmentorū, & rithymallorū confit, quod uim absterforiam maxime, siccantemq; & exedentē propemodū obtinet. Si calx admisceatur, urentē, & πρῶτότακτος dicitur, quasi primarium lixiuiū. Interim ex sola σαπωνα-
ρική.

Lixiuiorū
genera.

πρῶτότα-
κτος.

σαπωνα-
ρική.

κοιλία

κονία. *κονία* nuncupatur. At nomē *κονίας* plura signat, nēpe calcem ipsam, & lixiuium, cineremq; . Solet aut̃ aliis adiungi, quæ ip-
κονία τὰ sum, qua de re intelligi debeat, interpretentur, utpote *κονία*
πτη. *τὰκτης*, pro lixiuio liquido, *κονία ἄσβετος*, pro calce uiua acci-
κονία ἄσ- pitur, cum ἄσβετος per se calcem non extinctam signet, ut *τὶ*
βετος. *ταυος ἄσβετος*. Porro cū *κονία ἄσβέτου* ponitur, hoc est duo substantiua alterum in nominatiuo, alterum in genitiuo, lixiuium calcis intelligendū uenit. Cæterū apud latinos scriptores lixiuii uox aliis atq; aliis dictionibus iuncta, diuersa etiā significat. Primum apud Varronem, Columellā, Plinium frequenter habetur Cineris lixiuiæ, cineris lixiuii, è cinere lixiuium, pro simplici lixiuio. Deinde apud Largum, unde Galenus aliquot medicamenta transcripsit, cōpositione. 228. Hæc terere oportet ex cinere lixiua. In sequenti rursus. Cum cinere lixiui diutius terere. Paulo post in altera: Teruntur ex cinere lixiua qua utuntur culinarij, sicut apud Paulum Aeginetam *κονία πιλοποιητικὴ* pro lixiuio quo pilearii utūtur. Legendū est in Codice græco per simplex *ι* nō per *η*, ut quidam faciūt, putantes à *πύλου* quod est lutum, *πιλοποιητικὴν κονίαν* appellari, ut sit lixiuiū quo figuli utūtur: cū tamen nullū eius ut mihi uidetur usum habeāt. Quare locus in 6. Methodi deprauatus Linacrum interpretem decepit: aliosq; non paucos eum citantes. Verba græca sic habent, *μὴδὲν ἐν τῷ παραχρημα φάρμακον ἔχων, ἥ τῃσα κονίαν τὰκτην, ἑωρακώς ἐκ χειτόνων τῇ κάμνοντος πιλοποιδόν*. In qua oratione *πιλοποιδόν* legēdum est. Galenus aliquando *κονίαν πιλοποιητικὴν*, Aliquando ὕδωρ *πιλοποιητικόν*, pro eadem re exponit: ut lib. 6. de cōpositione medicamentorū secundū genera in hūc modū, ἄλλη ἢ διὰ τῆ ἀφρονέτρης, ἢ ἐχρησάτο λάργος κυρὲ λίτραν ἃ τερμινθύνης λίτραν ἃ μάννης λίτραν ἃ, ἀφρονίσρου λίτραν ἃ ἐλαίου ξέτυν ἃ, ὕτος πιλοποιικῆ ξέτυν ἃ. μίσκος ὡμῆ Γο β. σιντήκη κατὰ τρόπον. Largus composuit. 2 : 6. temporis iniuria nonnihil mutilus est. Verba ipsius hæc sunt. Cerae pondo libra, resinæ terebinthine pondo libra, nitri rubri pondo libra. Hæc teruntur ex cinere lixiua, postea cum olei cyathis sex liquefiunt ad ignē: quibus adiicitur thuris pollinis selibra. Vides hic ὕδωρ *πιλοποιδόν* nihil aliud esse quàm cinerem lixiuium, aut lixiuiū, aut quomodocunq; uoles appellare. Atq; ita ego etiam antea sum interpretatus. Paulo post Galenus eodem in lib. *τὰ ξηρὰ δια-*
λύεται

ἔχειται πιλοποιικὴ hoc est arida dissoluuntur lixivia, ubi simpli-
citer πιλοποιικὴ dixit pro κοιλία πιλοποιικὴ. Apud Plinium ci-
neris uox simplex interim pro lixiuo usurpatur: nempe ex
Dioscoride uertit dictionem κοιλίαν. Ruellius uir alioqui anti-
quæ eruditionis etiam in postrema editione lib. 6 Dioscori-
dis κοιλίαν πιλοποιικτικὴν uertit cū luto suo lixiuiū, quàm accō-
modate iudicent alii, certe lutum nemo potui dabit, sed lixi-
uium, lacte in uentre coagulato. At Orosius noster nō tan-
tum sensu inaccommodato, quod de me dicit, sed longe om-
nium absurdissime uertit calcē qua in tectoriis, dealbandisq;
parietibus tectores utūtur. Vide optime lector quàm sit qui-
busdam maleferiatis hominibus innatum, alios reprehende-
re in iis etiam quæ ipsi non intelligant. Iā pondus uiciatū in
Codice græco non aduertit Aristarchus. Nam pro, < δ, qđ
est drachmæ quatuor, reponēdum δ hoc est sextarii quatuor:
Idem itaq; est κοιλία πιλοποιικτικὴ κοιλία πιλοποιικμὴ, ὕδωρ πι-
λοποιικτικόν, ὕδωρ πιλοποιικόν & φακτὴ τῶν πιλωταρίων.

Ruellius.

Orosius.

Græcus co-
dex depre-
uatus Oro-
scij.

IN III. CAPVT.

Porrigo] Sic interpretatus est celsus πυτυρίασιν. Plinius
etiam surfures secundum græcæ dictionis etymologiam
appellat: quæadmodum interpretes Auicennæ. Vide Galenum
lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos.

Resoluuntur.] Græce est: ἐπὶ τὴν ὥπότην, quasi dicas, esto
particularum eliquatio, uel particulæ eliquantur. Celsus re-
soluuntur, quem imitatus sum Nam quædam ueluti squamu-
læ surgunt eaq; acutæ, resoluuntur.

πυτυρία-
σιν.

Creta sutoria.] Sic interpretatur Largus μελαντηρία, cō-
positione 218. Aluminis inquiens rotundi, melanterius quæ
creta sutoria dicitur, qua ligulæ calceorum denigrantur. Di-
uersum est ab atramento sutorio si Dioscoridē consulas, quā-
quam Orosius exponat atramentum sutorium.

Melante-
ria.

Orosius

Cerusæ singulorum drachmæ] In græco codice habeba-
tur Γο.ιβ. quod est Vnciæ duodecim ego autem legendū cen-
seo > β hoc est drachmæ duodecim. Itaq; etiam habet Ale-
xander, & magis conuenit.

Viciatus
codex gre-
cus. ἰχῶ-
res quid.

Ex quibus sanies.] Græce est: ἀφ' ὧν ἰχῶρες ἀποτρίκονται.
Interpretes latini mirū in modū cruciantur, dum græcam uo-
cē ἰχῶς explicare studēt, alii namq; imitantes Pliniū ubiq;
sanem interpretātur, alii serofos humores & acres, tenuisq;
quidam

Calidæ.
Frigidæ.

Interpreta-
tio ichoros
apud Ga-
lenum.

Sanies.

quidam sanguinis cruorem, quidam ut Celsus ipsum sangui-
nem Aristoteles ἰχώρ δὲ, inquit, ἐστὶν ἀπεπτον αἷμα, hoc est
Ichor autem est sanguis crudus. Ex hac tanta uarietate, cer-
ti aliquid adferre conabimur, quod in authoribus exponēdis
tuto seq. possis. Itaq; ἰχώρες aquosæ, serosæq; & superflua san-
guinis humiditates existūt nūc acres & calidæ, nūc pituitosæ
& frigidæ. Galenus lib. 6. de sanitate tuēda ita scriptū reliquit.
ὅταν μὲν γὰρ ἢ μὲν ὅλη τῆ σώματος κρῶσις ἢ χολωδετέρα, τὰ
δὲ κατὰ κοιλίαν ἀτονώτερα, φηρίζεται δέεται διὰ τροφῆς ἐν-
φομάχου. μὴ γενομένου δὲ τέτου, καταρρέουσιν ἰχώρες εἰς αὐ-
τήν, ὥς ἀθροίζει τὸ σῶμα περίττης. Paulo post, εἰάν δὲ μὴ μήνον
ἢ κεφαλὴν θερμὸς ἰχώρας ἐπιπέμπει τοῖς κατὰ γαστέρα χωρίοις.
Rursus de frigidis in hunc modum. ὅταν ἢ τοιγε εἰς θερμὴν γα-
στέρα καταρρέουσιν ἐκ τῆς κεφαλῆς οἱ ψυχροὶ καὶ φλεγματώδεις
ἰχώρες, &c. Hippocrates lib. 4. de ratione uictus in morbis acu-
tis δρυμέας καὶ χολώδεας ἰχώρας dixit, quod Galenus inter-
pretatur in eum modum, ὅτι δὲ ἰχώρας ὀνομάζει τὰς λεπτὰς
ὕγρότητας, ἐνδύλον. Galenus autem lib. 2. de elementis: ὡς ἐν
ἐν τῷ γάλακτι τὸ μὲν ἐστὶν ὀρρόδς, τὸ δὲ τυρὸς, οὕτω καὶ ἐν
τῷ αἵματι τὸ μὲν ὄιον ἰχώρ αἵματος ἀνάλογον ὀρρόω γάλακτος,
τὸ δὲ ὄιον ἔλυσ τις καὶ τρήξ, &c. Quādiu igitur in corpore ad-
huc sunt ἰχώρες aquosæ serosæq; humiditates sanguinis, uel
aquosi humores sanguinis latinè dici poterunt. Nam ipse Ga-
lenus eosdem nunc pituitosos, nunc biliosos χύμους, quod est,
humores nominat. Vbi uerò extra corpus aut uiuū, aut mor-
tuum eruperint sanies appellari debent. Vt apud Galenū te-
nue in ulceribus excrementum ἰχώρ, nobis sanies non incom-
mode exponitur. Item in capitis uitiiis quæ ἰχώρας nuncupan-
tur ἰχώρες sanies recte dicūtur. Plinius in affati iecoris saniem
appellauit: humorem, qui abs iocinore, uel pulmone, uel alia
parte dum aflatur, emanat. Cæterum Paulus hoc in loco ap-
posite dixit ἀπατίζονται, hoc est, eliquantur, sicut in corpori-
bus mortuis per solis æstum fieri solet. Atq; hæc sanies crassa
uiscosaq; existit.

Medicamentum ex charta, xerion.] Huius descriptio est
in septimo. Vocatur autem xerion quod aridum sit, & in pul-
uere accommodatur.

Ad Achoras, recrementum.] In impresso codice habetur
πρὸς ἰχώρῳντας, hoc est, ad eos qui saniem habent, ego autem
puto

puto legendum πρὸς ἀχῶρεντας, hoc est: Ad eos qui Achoras experiuntur. Nam titulus idem habet, nēpe ad Achoras, non ad ἰχῶρας. Quanquam Oroscius ἰχῶρεντας legendū cēseat.

IN IIII. CAPVT.

Capitis dolor.] Hæc ex lib 2. Galeni de cōpositione medicamentorum secundum locos transcripta sunt. Paulus Oroscius. autem σῦμπτωμα dolorem esse refert, ubi Galenus διαθέσιν ponit. Ille hunc superuenire intemperiei, hic affectum ipsum esse pronunciat. Rursus apud Galenum plures causæ comme morantur, una sane, simplex intemperies citra humores, altera, horum qualitas, tertia ipsorum copia, item obstructions humorum, uaporumq;. Alia adhuc, quarundam capitis partiū Cause dolorum capitis. imbecillitas, interim externa quædam causa, quam græci προκαταρκτικὴν nomināt: ego sæpe primariā interpretatus sum.

Nisi caliditati aut.] Deest particula in codice græco impressio. Tu igitur lege μετὰ θερμῆς ἢ ψύξεως, quod est, cum caliditate, aut frigiditate. Deerat enim ἢ.

Addendum græco.

Prodest fronti & temporibus.] Recte hoc dicit, nā per initia spinalis medulla dolorem non experitur, eoq; posteriora capitis ungi non debent.

Pastilli ad cap.] Alexander medicus hūc pastillum describit. Sed pondera nonnihil in quibusdam medicamētis uariāt. Cōmendat enim ad diuturnos dolores, omnibus aliis remediis nihil proficientibus. Vbi Paulus, ex somniferis aliquid, dicit, Alexander opii momentum iniijciendum præcipit.

At si frigus.] Ad uerbum ex Alexandro hæc ut superiora mutuatus est Paulus. Facies non cōcidit, hoc est, non mactior est reddita, ut ex calore, sed colorem decoremq; amittit, pallida effecta. Sic ἀχρεν, quod est sine colore, ex Celso interpretatus sum. Sanguis enim ob frigiditatem partes externas relinquens, intro refugit, unde pallor uecessario superuenit. ἀχρεν.

Præsertim si recrementa.] Hoc est, si ex crassis, glutinosisq; humoribus dolores sint excitati. Græca sunt ἡ καὶ παχύτερα γλίσχρα περιπτώματα ἔν. Quæ uerba satis obscura in hunc modum intelligi debent, si humores crassi uiscosiq; in capite tenacius hærentes, dolorem excitarint. Locus obscurior.

Si biliosus humor.] Hæc & sequentia ex Galeni secundo de compositione medicamentorum secundum locos, nullo uerbo mutato, habentur. Cæterū ambo præcipiunt, tū Gale-

Quomodo
biliosus hu-
mor prepa-
rari debet.

nus, tum Paulus primū balneū tēperatū, inunctionē, cibū po-
tumq; refrigerantē. Deinde offerūt medicamēta bilē educen-
tia: qđ sane Alexāder medicus suo seculo clarissimus in hūc
fere modū exponit Cōuenit igitur, ut superflua medicamen-
tis bili ducēdā idoneis educātur. Verū ut hoc secundū rōnem
fieri possit, corpus antea pręparari humectariq; debet, cibis tē-
peratis, balneis & unctionibus. His. n. probe cōtēperatus, reso-
lutus, & quasi imbecillior effectus humor, facilius expurgabit.

Absinthij diluto.] Hoc est, ut officinæ uocāt infusione: tūc
nimirū cū pauca bilis stomachi tunicas imbuerit, irrigarisq;

Vel aloe.] Scammonia nunquam exhiberi debet, nisi ma-
xima bilis copia dolorē excitarit, aut alia uiolēta medicami-
na. Picra autē prodest, ubi crassi aliqui succi bili sint permixti.

συμπά-
θεια quid.

Lege con-
fortij.

Cōsensus.

ἐκμοχλε-
σαι.

Si caput confortii lege.] Græce est συμπάσχει, hoc est cō-
patitur. Celsus lege confortij, alij per cōsensum patitur, ex-
ponūt. συμπάθεια namq; est, cum pars aliqua corporis, alte-
rius malo, uel confini, uel connexus, uel cōmunicationis gra-
tia condolescit. Huic contraria ἰδιοπάθεια, uel πρωτοπάθεια cū
per se, & suo uicio tantum afficitur: quem affectum primariū
nominare licet, & ἰδιοπαθεῖν, primario affectu laborare.

Emolliemur.] Verbum græcum est ἐκμοχλεῖσαι quod de
pertinaciter hærentibus proprie dicitur, ut de uiscosis, crassis-
que humoribus partem aliquam tenaciter obsidētibus, item
de induratis affectibus, μοχλεῖσαι idem est quod κοῖνῃσαι, libro
septimo ait: ἡ πρὸς τὸ μοχλεῖσαι διάθεσις ἐσκληρωμένη, de
medicamentis efficacioribus sermonem habent. Propterea
mihi uisum est, emoliri uerbum non incōmode hic usurpare.

IN V. CAPVT.

παράμo-
νιμος.

V Terq; hic affectus.] Ad uerbum è Galeni secundo de cō-
positione trāscripta sunt, nisi quod pro hac dictione, per-
manens, Paulus παράμονιμος, Galenus χρόνιος καὶ δούλντος,
hoc est, diuturnus, & solutu cōtumax, habeat. Celsus acutum
& pestiferum morbum appellat κεφαλαίαν.

Hiera quam ex acueris:] Scammonio, aut ueratro adiecto
hiera uehementior redditur. Atq; id pet. ὀξύαντας intelli-
gitur, Nam ὀξύεις idem est quod acutum reddere, intendere, ue-
hementiorem efficere.

Vnguenti irini] Ad uerbum habetur hoc in Alexandro.
Apud Galenū uariat nonnihil hoc modo. Vnguenti Irini ex-
pressionis,

pressionis, castorei, singulorū pars una, baccarū lauri pars una viticis seminis pars una, rosarū siccarū, pars una, rutæ summum partes quatuor. Aceto resoluta excipiuntur cerato, &c.

Dum intabescerent.] Sie reddidi ἕως τῆς κερῶσεως, Celsum imitatus Orosius improprie usq; ad eliquationē dici iubet. Orosius.

Partem affectam irrorabit.] Lege in græco κατῆλκει pro κατέβαινεν, quod est, κατέβρεχε κατῆλκει, superfundebat, aspergebat non inspergebat ut vult Orosius. καταινεῖν. Orosius.

Drobbx.] Huius descriptionē habes in septimo Pauli ad finem, ubi etiam sinapismus exponitur. Hæc sunt medicamentum noxios humores in summam cutē euocantia, μετὰ συγκριτικά græci nominant. Sic etiam Celsus uerbum hac uidetur interpretari, ubi summam cutem, inquit, relaxari, euocari-que corruptū humorem, & habitū corporis mutari expedit. μετασυκριτικά.

Malagmate, quia liquidum est parygron] Galenus lib. 7. de compositione medicamentorum secundum genera, inter malactica ponit, quod recipit adipem suillum curatum, cerā, & argenti spumam. Eoq; merito interpretatus sum dictionē, contra opinionem Orosij. Male est in impressū πανύγρω.

Sani.] Lege in codice græco ὡς μετὰ λυτρὸν ὑγιᾶς γίνεσθαι παντελῶς τοὺς κάμνοντας, ut habet Galenus libro secundo iam sæpius citato, ad calcem. Corrigen-
dus codex græcus.

Apophlegmatismus.] Nunc uerto medicamentum, quod pituitam per os educat, nunc quod saliuam moneat. Ut hoc in loco, Celsum imitatus in capite de Cephalæa, cap. 4. Cæterū in græco codice habetur Γο.β. quod est, uncia 14. ego puto 1β. legendum, sicut interpretatus sum. Nota.

IN VI. CAPVT

AT quæ mentis alienatio.] Quia multa in hoc caput uoculæ incidunt, idem propemodum significantes, non abs re fuerit, eas curiosius in utraq; lingua distinguere. Mētis igitur alienatio uerti pro græca dictione παρακώπῃ. Nam in febris uehementis statu, ut ait Galenus, accidit ægros παρακώπῃ, παραχθῆναι, παραληρῶσαι, & παραφρονῆσαι, quæ latini exponunt, mente alienari, mente non cōstare, aliena loqui, delirare & desipere. Si autem hoc continuè accidat, phrenitis dicitur. At si in statu demētia superueniat in declinatione autem cesset, delirium, non phrenitis est appellanda. Celsus eādem ponit distinctionem libro. 3. cap. 18. Phrenitis, inquit, παρακώπῃ. παραχθῆναι. παραφρονῆσαι. Phrenitis, Dementia, Delirium.

tum demum est, cum continua dēmentia esse incipit.

Læmæ.

Orosius.

Vellæmis, hoc est.] Orosius male exponit λημώντας, id est lippientes. Non enim Læmæ lippitudinem signant alio- qui omnes quibus Læmæ in oculis innatāt, ut hectica uel po- tius marasmo cōfecti, lippitudine laborarēt, supra dixi Pliniū dictionem græcam usurpare. Celsus pituitam interpretatur.

Coma.

Coma] Galenus commētario in primum τῶν πρόρρητι- κῶν refert, Coma & Cataphoram apud Hippocratem idē es- se. Sed Coma duplex inuenitur pro humoris ratione. Nam cum per se est, ex pituitoso generatum humore, grauis sopor, & quasi inexpugnabilis dormiendi necessitas. Quod si bilio- sus humor mixtus præpolleat, uigilās coma dicitur. Quo qui detinentur, nequeunt uigilantium munia subire, sed tum pal- pebras claudere cupiunt, tum dormire sperant.

προσφό-
ρος.

Panis lo-
tus.

Commodum incident] Hoc est, opportunitate & occa- sione sumpta se ingerent. Hoc enim apud græcos προσφύως ἐντυχάνειν significat.

Panis quoq; aqua lotus.] Galenus panis eluēdi rationem inuentam esse scribit, ut obstructionem in cibo impedirent. Nam hic panis lotus quā minimum habet crassicie, gluti- nisq; utpote ex terrestri ac graui, aereus, levisq; factus.

Duracina,
Rhodaci-
na.

Peponis duracini.] Sunt qui non duracini legendum cen- seant, sed rhodacini, quanquam Palladius. Paulus, aliiq; recen- tiores græci ut Constantinus δωράκινα legāt, quos Palladius ubiq; imitatus, duracina conuertit, quicquid sit siue rhodaci- na, hoc est, à Rhodo nominata, siue duracina à duritiē, persica proferas, non multum interest Plinius etiam cerasa, & uuas duracinas nuncupat: Tu utrum malis sequere;

ὥμῃ λύ-
σις.

Hordeacea farina.] Græce est ὥμῃ λύσις quasi dicas cruda solutio, uel cruda farina ordeacea, ad differētiam polētæ quæ torretur Verum latini interpretes crudam omittunt, iectori id intelligendum relinquentes. Aliquando etiam de aliorum farina ὥμῃ λύσις dicitur, uerum tunc apponitur frugis nomen, ut πυρίνη ὥμῃ λύσις, ἢ λιγροπέριμα. Sæpe ex superabundanti κριθίνη ὥμῃ λύσις nominatur,

IN VII. CAPVT.

ἀτη.

Orosius.

Mltus angor.] Caput hoc ex octauo Oribasij transcri- ptum est. Græce habetur πολλὴ ἀτη quod interpretatur pleriq; sicut etiam Orosius, fastidium, cum uerē hoc loco sic dicendum

dicendum multus angor. Nā adeo torquētur, ut nesciant qd
ipsis sit agendū. nunc lecto se erigunt, nūc rursus decūbunt ui-
tā quasi pertæsi. Morbus hic intra septimum sæpe iugulat.

Tumore molli.] Sic reddidi οἰδημα, qui tumor premēti- οἰδημα.
bus digitis cedit, eoq; dixi, molli. Tu si libet dicas, cū edemate.

Emissicii.] Hoc est, qui foras propelluntur, dolore nimio
exprimente. Græce est προπετῆ γίνονται.

Porro utitor.] Post totius corporis uacuationem deriua-
tionemq; per propinquiores particulas ad topica uenit reme-
dia. Primum aspergines ex hydrelæo, aut uino & oleo, ut in
aliis partibus inflammatis conueniunt: deinde cataplasmata
ex pane, aut farina hydrelæo subacta, quæ ad maturationem
perducunt. Id enim uerbum πεπαίνειν significat.

IN IX. CAPVT.

Lethargus.] Oribasius lib. 8. omnia ad uerbū habet. Gale-
nus cōmentario in primū prorrheticon, in hūc modū scri-
ptum reliquit. φρενίτις μὲν γὰρ ἡ ἀκρεβής, καὶ ἀμικτος ἐτέρω
νοσήματι γίνεται χολῆς ξανθῆς καταλάβειν τὸν τόπον ἐν ᾧ
τὸ πῆς ψυχῆς ἡγεμονίαν ἔχει. λήθαργος δὲ τὸν αὐτὸν τόπον ὑγρα-
ναιτὸς τε καὶ διαβρέξαντος φλέγματος, Consentint hæc cum
Paulo, nisi quod ipse pituitam frigidiorē habeat.

Caros.] Vide Galenum secundo commentario Prorrhē-
ticorum, ubi refert tres quasi species Cari, nēpe morboſi, quo
de hic agitur, medii ut ex uino contracti, & boni qui post lon-
gas uigilias solet accidere. Cæterum arteriæ Carotides à ca-
ro nomen habent, quanquam si intercipientur, nō statim mu-
tum animal, aut soporosum euadat, sed omnes arteriæ quæ su-
pra uulneratas partes habentur, pulsum amittūt. Interpretari
licet, soporem ueternosum.

Cari spe-
cies,

Febrium accessionibus.] Emēda codicem græcum, ac pro
παρόξυσμο lege παρόξυμοις, quod Orosius & castigator Ba-
siliensis studio, opinor neglexerunt.

Orosius

Membranæ custode.] Sic interpretatur Celsus lib. 8. cap.
3. Quomodo os excindatur. Hæc autem sunt ipsius uerba: Fa-
ctis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circū-
spectius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandem mē-
branam uiolet, donec fiat aditus, per quem membranæ custos
immittatur, μινυγγοφύλακα græci uocant, &c. Nunc quid sit
mēbranæ custos, audi. Lamina, inquit, ænea est firma, paulum
Cc 3 resima,

Membra-
na custos

μικρογγο-
φύλαξ.

resima, ab exteriori parte laevis quæ demissa est, ut exterior pars eius, cerebro propior sit, subinde ei subijcitur quod scalp pro discutiendum est, ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur, eoq; & audacius, & tutius scalp rû malleolo subinde medicus ferit, donec excisum undiq; os eadem lamina leuetur, tolliq; sine ulla cerebri noxa potest, &c.

Nota.

Quæ cito transeunt] Hoc est, quæ cito per totum corporis habitum rapiuntur, quale est quod etiam Diacalaminthes inscribitur. Habes utriusq; compositionem apud Galenum libro quarto de sanitate tuenda. Græce est τινὸς τῶν ὀξυπόρων. Non intelligit hic Paulus, quæ per aluum cito transeunt.

βομβυ-
λια.

Ijs autem qui in uetustatem.] Id est, quibus morbus in uetustatem incidit, quiq; tremuli sunt. Nā postea ob diuturnitatem morbi externarumq; partiū imbecillitatē, tremor accidit.

Angustioris uasculis] Sic interpretatus sum βομβύλια. Nā Hesychius ait : βομβυλίδος ποτηρίκι γένος κατὰ μικρὸν πότον τάξαντος, ὅθεν διὰ τὸν ἦχον οὕτω κακλῆσθαι. Cōuenit igitur ut eiusmodi poculis dulcis aliqua potio ita affectis instilletur.

IN X. CAPVT.

I Nterim rubore tincta est.] Græce erat ἐρυθρός αὐτοῖς ἐπαυθεῖ. Hoc est, rubor eis efflorescit, uiuidus est. Auicenna hoc caput ut alia pleraq; in suum librum quasi transcripsit, mutato ordine tantum, uocatq; affectum Suber asahari.

Qui uero malo uicti sunt.] οἱ δὲ κρατηθέντες. Celsus uertit malo uicti. Opponatur ijs qui mediocriter habēt: qnī morbo possunt resistere.

In ijs autem periculum maius est.] Reddidi sic græca hæc χάλεποι δὲ μᾶλλον εἶσιν, quod est, difficiles autem magis sunt curatu scilicet, quibus uigiliæ sunt continuæ.

IN XI. CAPVT.

Causa prou-
dentia.
Stultitiæ.

C Ausam habent communem.] Subintellige, mentis noxa, & memoriæ iactura. Fatuitatis causam Galenus commentario in libellum Hippocratis de natura hominis ita memoriæ prodidit: τὸ μὲν ὀξύ καὶ συνετὸν ἐν τῇ ψυχῇ διὰ τὸν χολαῶδη χυμὸν ἔσται. τὸ δὲ ἐδρεῖον καὶ βέβαιον διὰ τὸν μελαγχολικόν. τὸ δ' ἀπλὸν καὶ ἡλιθιώτερον διὰ τὸ αἷμα, τὸ δὲ φλεγματος ἢ φύσις εἰς μὲν ἡθοποίαν ἀχρηστος. Quæ uerba olim sic reddideram: Acumen ingenii & prudentia ex bilioso humore nascitur. Cōstantia uero & firmitas ex melancholico: simplicitas stoliditasq;

Soliditasq; ex sanguine: pituitæ uero natura ad mores fingē-
dos inutilis, &c. Cæterum communem causam refert Paulus
& mentis noxæ, & memoriæ iacturæ. Male habebatur in græ-
co codice καὶ ὡν pro κοινῶν, ut annotauit Orosius quoq; Sed
hoc sane debet exemplari suo. Quod autem τὴν συντάξαι uer-
terit, illic consistentem, cum dicendum esset, constituentem,
efficientem eruditioni suæ & ingenio debet. Nam si cōsisten-
tem, hoc in loco Paulus dicere uoluisset, non opus erat arti-
culo τὴν, qui ueluti autorē & opificē demōstrat. Sic etiā Gal.
intelligit lib. 3. locis affectis, unde hæc partim descripta sunt.
Vel utiq; in humiditate inspersa.] De ea nimirū dicit hu-
miditate, quæ per totū corpus cerebri dispersa est: Gal. tertio
locorū affectorū habet sententiā eandē, sed paulo apertius.

Vitiatus co-
dex græ-
cus.
Orosius

IN XIII. CAPVT.

Vertiginum affectus.] Vide Galenum libro tertio de locis
affectis. Alibi autem refert causam inordinatam flatuosi
spiritus motionem, qui uel in cerebro generatur, uel ab infe-
rioribus sursum fertur.

δίνη.

Rotas, uortices uē.] Græce est οἶον τρόχους ἢ δίνας. Gale-
nus τρόχους ἢ δίνας ἐν ποταμοῖς, hoc est, rotas uel uortices in
fluminibus. Nā δίνη συντραφεῖ ὑδάτων, At δίνος, ait Galenus,
ὀνομάζεται, ὅταν ἡ κεφαλὴ περιφέρεται, φαίνεται ὅταν δὲ
σκοτώδης ἡ ὄψις ἀμὰ τῷδε φαίνεται σκοτὴ δίνος καλεῖται, &c.
Apud latinos uertigo alterum nominari potest, alterum si ad
uerbum interpreteris. Tenibricosa uertigo.

δίνος.

Vertigo

Medicamentis quæ odore mouent.] Hoc est, quæ naribus
odoranda adhibentur, atq; ita cerebrum commouent, græce
dicuntur ὀσφραίνεσθαι. Cellus, quæ odore mouent, conuertit.

ὀσφραίνεσθαι

IN XIII. CAPVT.

Morbus comitialis.] Vide Galenū lib. 3 de locis affectis,
& Oribasium in 8. unde Paulus hac ad uerbū transcripsit:
Græci uocant ἐπιληψίαν, quæ dictio cōprehensionē, retēsi-
onem, obturationemq; significat. Nā spiritus animales hoc in
morbo detinent, adeo ut in mēbra corporis distribui nequeāt.

Vel certe aliis quoq;] Græce est ἡ γυναικαὶ ἐξ ἀναδούεως
ἐτέρων μορίων, ad uerbū sonat: Vel ēt ex aliarū partiū dīstri-
butione, quod est, uel ēt aliis partibus cerebri cōicantibus.

τάσις.
ἀπροσά-
ρεσις.

Voluntatis & consilii experts.] τάσις ἀπροσάρετος in græ-
co codice habetur, quod est: Status qui citra uoluntatem &

Cc 4 propositum,

παρακο-
λῆθῃν
ἐαυτῶ.

propositum, fit, ueluti angustia, aut tristitia. Aristoteles distin-
guit προάρεσιν ab ἀκυσίου. Illa. n. fit cū ratione & intelligen-
tia, ἀκούσειν cōtra. Possis itaq; dicere, inuitus corporis & ani-
mi status. Galenus libro suprā noīato ait; Dormiētes spirāt,
quāuis nulla alia accedat actio, quæ uolūtate & cōsilio regat.
Itē μηκέτι παρακολῆθῃν ἐαυτῶ, quod est: Non amplius cōsta-
re mēte & intelligētia: ad uerbū uero sonat, seipsum assēqui.

Eorum quæ perceperat.] In græco duæ tantum dictiones
habētur, τῶν προσεχῶν λήθῃ, Suidas προσέχειν interpretatur
πρωσοχῇ hoc est, meditationem, perceptionemq;. Sunt qui
malint τῶν προσεχῶν λήθῃ exponi propinquorum obliuionē,
uel necessariorum.

Mēstruis purgationibus.] Græce est simpliciter κατὰ τὰς
καθάρσεις, mox addit ἢ τὰς κινήσεις, hoc est cū in utero habere
cœperint Celsus apte dixit. In pueris, ueneris, in puellis men-
struorū initiū tollit. Paulus hoc pubertatis uocabulo cōprehē-
dit. Vide Aphorismū septimū lib. 5. eiusq; cōmētariū, Galeni.

Si infans adhuc fuerit.] Galenus exiguū quidē, sed elegan-
tem puero eomitāli cōmētariū dicauit: in quo morbi hu-
ius omnē curandi methodum & rationem est cōplexus. Re-
liquarum ætatum meminit etiam lib. 3. de locis affectis.

Viciosus
græcus
codex

Sinapis-
mus.

Mane passum auferetur,] Codex græcus habet κεράσαν-
τα, pro αἰράσαντα, quod Orosius annotauit. Gemusæus ut
exiguum nimis præteriit.

Sinapismus.] Nempe ut noxii humores ex alto corpore
in extrema euocentur habes autem sinapis oblinendi rationē
lib. 7. Pauli abunde & eleganter expositum.

Iam etiam acrium ciborum esus.] Græce est δρυσιφαγία.
Celsus de eodem morbo uerba faciens, acria, inquit, assumat.
Marcellus Dioscoridis interpres, male conuertit uomitionē
acrium ciborum esu concitatam.

Vidi autem quandoq; puellum.] Galenus hoc cōmemo-
rat lib. 6. de simplici medicina, ubi de herba Glycyfide dispu-
tat. uidi inquit puerū totis octo mensibus, morbo liberū &
cū forte fortuna radix à collo cecidisset, rursus cōstictatū, &c.

Inuasuro quidem symptomate. Addidi ad euidentiorē in-
tellectum, communicare morbum aliās obscura nimis esset
sententia, ἐπειδὴν αἰσθάνονται μορίου, id est ubi senserint par-
ticulam, intelligendum affici, uel à particula morbum exci-
tari.

tari. Hæc dixi ne Aristarchi nostri aliquid me præter sensum Pauli assuisse clamitent.

Cum autem remitti.] Græce est ἐν δὲ ἀνέσειν ἀποθερα- ἀποθερα-
πεύειν. In remissionibus autem apothērapia uti Est aut ἀπο- πεύειν.
θεραπεύειν corroborare & firmare corpus, nec non uindicare
à lassitudine. Sequitur autem omnium exercitationem ma-
gnam ne corpora in lassitudinem incidant. Hic autē post ac-
cessionem corpus ante agitatū recreare nonnihil oportet,
uel particulam, unde morbus excitatus est. firmare caustico
medicamēto, qđ calorē in eo excitet, ne amplius in eā humor
frigidus, aut superuacuu cōfluat, & inde ad cerebrū feratur.

Incōueniens ē sublimi cōspectus.] Sic exposui καὶ τὸ ἀτο- ἀτένιζεν.
νίζεν ἐξ ὑψους, quod ad uerbū sonat inconniuentē conspicere
ex alto. Celsus uertit clare ē Græcis, loci præcipitis cōspectus.

IN XIII. CAPVT.

MElancholia.] Galenus de hac multa lib. 3. de locis affe-
ctis Oribasius eadē lib. 8. habet. Cæterū uno oēs cōsensu
dicūt insaniā, mentē ipsā occupare, nūc cerebro ipso peculiari
uicio laborāte, nūc toti⁹ corporis affectionē simul experiūte.

Per se ægrotante.] Ita interpretatus sum Græcam dictio-
nem, πρωτοπαθὲντος quasi primario affecto exponas. Idem
uero est, per se apud idoneos scriptores, quod nimirum nullo
alterius consensu.

Homines auersantur.] Misanthropia est eiusmodi animi
affectio, qua quis in solitudine uiuere cupiat, uitet hominum
confortia, ut Homērus de Bellerephonte scriptum reliquit.

Qui miser in campis mœrens errabat Aleis,

Ipse suum cor edens, hominum uestigia uitans,
ut Cicero uertit. Dicimus etiam μισανθρωπῆν, & apud Hip-
pocratem ἀπανθρωπεύειν, hominum cōsuetudinem auersari.

Inane uiolēter tractent.] Ita exposui διαχειρίσθαι Cel-
sum secutus in capite de phrenitide, ubi habet: Alii consur-
gunt, & uiolenter quædam manu faciunt. Non sum ignarus
διαχειρίσθαι ab Hesychio exponi φονεύειν, quod est occide-
re, uerū hoc non semper contigit. Tractant quidem uiolē-
ter eos, tum feriendo, tum mordendo, tum alia faciendo. Ne-
que hic debebat Orosius nimium esse grammaticus.

Qui igitur ex primario.] Hæc ex libro tertio de locis affe-
ctis ad finē transcripta sunt Reddidi πρωτοπαθὲν primarium
affectum,

μισανθρω-
πῆν.
ἀπαντρο-
πεύειν.
διαχειρί-
σθαι.

Orosius.

affectum, qui non ex alterius partis dolentis consensu oritur. Caterum omnia remedia melancholiæ Galenus loco supra citato enumerat præter hoc, una cum decenti animi delectatione, quæ Græcis dicitur *θυμωδία*.

θυμωδία.

*γύργα-
θον.*

Aut gestandi grabato intra lecticā infanientibus peculiariter.] Celsus ē inquit, maxime suspensi lecti motus. *γύργα-θεν κλινὴ ἐκ τῆς παρέτους καὶ διαμονιώδεις τροβῆσι.*

IN XV. CAPVT.

Incubo.

*Nocturna.
delubria.*

E Phialten.] Hunc affectum appellauī Incubonem secutus Scribonium cōpositione centesima, ubi inquit: Facit hæc compositio ad suspirium, & ad uocis abscisionē, & subitas præfocationes ex qualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab Incubone deludi. Plinius nocturna delubria noīat.

IN XVI. CAPVT.

αδράνες.

Q Vi lycanthropia detinetur.] Hic morbus apud Latinos nomē nullum habet: si ad uerbum interpreteris, Lycanthropi sonat lupini homines, hoc est, qui lupos imitantur. Auicenna integrum caput de Cutubus hinc transcripsit.

Oculi ad uidendum imbecilles.] Græce est, *δραῶν αδράνες*, quod sonat, uident imbecille. Nam *αδράνες* idem quod *αδένες*. Auicenna: Oculi ipsorum sunt debiles & submersi.

IN XVII. CAPVT.

Nota.

A Mores.] Barbari uocant, amor ereos, quasi dicas, amor amoris. Nam *ἔρως* Græcis amor appellatur. Auicēna ijsci nūcupat, ex Paulo multa transcripsit. Habet autem diuersum de oculis, & sunt, inquiēs, omnia membra arefacta, præter oculos. Paulus refert: Et cum reliquæ corporis partes non collabantur, soli hi amantibus concidunt.

αλυσία.

Pulsus propriè nullus.] Vide Galenū in libello *περὶ προγινώσκειν*, ubi se mulieris amorē ex pulsu deprehēdisse testatur.

Balnei abstinētia.] Orosius legit, *παλυσίας*, hoc est balnearū abstinētiis, *αλοντίας*, hoc est, uinculis ut exponit: quasi amātes in uincula sint cōijciēdi. At sequēs snīa Pauli facit, ut *αλυσίας* legendū cēseā. Nā prudentiores inquit, ad balnea, cōpotationemq; eos ducendos præceperūt. Tu aut cādide lector, utrā malis scripturā sequere. Nā haud ita multum refert.

IN XVIII. CAPVT.

Q Vando cōmuue quidem.] Ex tertio Galeni libro de locis affectis, & deinde ex octauo Oribasij hæc collecta sunt:

Ita sunt. Galenus aut nō meminit dictionis, hemiplagias, quæ idē signat quod paralyſis. Ad uerbū ſi interpreteris, ſonat ſemiplexia, hoc eſt in dimidia parte percuffio. Nā uerbū *πληται*, unde apoplexia, & hemiplagia deriuatur, ferio, percutio apud nos ſignificat: unde non omnino male tali percuffos affectu, attonitos Celfus noīat, quorū ſcilicet, & mēs, & corp⁹ ſtupet.

ἡμιπλη-
για.

Commune neruorum principium] Cerebrum omnium neruorum tam ſenſilium, quā mouētium fons & origo exiſtit. Medulla uero ſecūdario neruorū mouentium principium dicitur. Nam & ipſa à cerebro propagatur. At in hoc affectu primum anteriores uentriculi, deinde medius poſtremo ij qui in cerebello habentur, obturantur adeo, ut ne pauxillū quidē ſpiritus animalis ad medullæ ſpinalis neruos deriuetur. Vnde ſenſus, motusq; intercidat, aboleaturq; neceſſe eſt.

Quomodo
fiat apo-
plexia.

Ita ut pariter principis animæ.] Tres ſunt ſecundū Plato- nis, Ariſtotelis, & Galeni ſententiam in humano corpore ani- mæ ſpecies. Vna *θυμοειδής*, altera *ἐπιθυμητική*, tertia *ἡγεμονέ- σα*, uel in neutro genere τὸ θυμοειδές, τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ ἡγε- μονέν, ἢ λογικόν, ἢ λογίζμενον. Prima in corde ſedem, ac do- miciliū habet. Scd̃a in iocinore. Tertia quæ aliarū dux & prin- ceps eſt, in cerebro. Merito igitur ea impeditur, uētriculis oī- bus obſtructis, p̃ſertim medio, ubi ratiocinatio cōſiſtere dicit̃.

Sin autem in altera] Hoc eſt, ſi alterius partis cerebri tan- tum, ſinus, aut uentriculi, aut quomodocunq; appellare ue- lis, impediti, obſtructiq; fuerint.

Voce inter mortua.] Græce eſt *ἀναυδοί*, quod ad uerbum ſonat, ſine uoce, ut apud Hippocratem *ἀναυδούς*. At Galenus interpretatur, *ἀλόγως*, quod eſt ſine ſermone. Nam *αυδὴ* etiā λόγος dicitur. Intellige igitur uoce inter mortua, pro ſermone edere non ualentes, quippe omnes nerui, tum ſermo nis, tum aliarum actionum duces, ſpiritu animali ſunt deſtituti.

αυδὴ:

Toruli eleuantur.] Hoc eſt, ipſæ uenæ attolluntur, quod capitis repletionē teſtat̃ Græce eſt τῶν σφαγιτίδων ἐπαρμα.

Ipsi inhæſcunt.] Haud ſcio cur Oroſcius *ἐγκέμενα* mo- leſta uerterit. *ἐγκέμαι* enim ab *ἐν* & *κῆμαι* uenit. Nec pituita ſolum ori moleſta eſt. Imo non adeo moleſta eſt iis quibus ſenſus omnino periit. Rectius igitur quæ inhærent, aut eo de- cumbunt ex capite, auferantur.

Oroscius

Cibus mollis, diſtribui facilis] In codice Græco habetur *παράλη-*

χυλώδης
τροφή.

παράληψόμεθα τὴν ἀπαλὴν καὶ ἐν δισίκητον, καὶ χυλώδην τροφήν, quod est: Assomemus tenerum, & distribui facile, & succulentū nutrimentū Celsus lib. 3. de morbo comitiali inquit: Neq; sorbitiones autem bis, aliq; molles, & faciles cibi, &c. At per χυλώδην quod nos reddidimus succulentū, intelligit cibum ex cremore, uel ptisanæ, uel chōdri, uel alterius frumētī. Nā χύλος cremorē significat, qui in sorbitionibus dari solet.

Vnctioni uero accommodata.] λιπάσματα τε σύγχριστα τριαῦτα. In Græco exemplari est, quod Celsus expressisse vī: Vnctione uero, inquit, aptissimū est uetus oleū. Ad uerbum sonat Græce, pinguedines quæ illini queant, huiusmodi sunt.

ἐνταρι-
χεύεται.

In quo scilla intabescit.] Græce est ἐνταριχεύεται uerbum, quod signat proprie ægros abstinentia immoderata exicare. Ita scilla in Sole eliquescit, consumiturq;. Celsus etiam dicit: In quo scilla intabescit.

Vitiatus
codex
Græcus.

Attendentes.] Male in codicibus Græcis legitur πρόεχοντας, pro προσέχοντας, hoc est aduertētes. Deinde in eadē snia: διὰ τὸ μὴ συναιδάνεσθαι εἰ μὴ ὑπερκαυθῶσιν pro διὰ τὸ μὴ συναιδάνεσθαι μὴ ὑπερκαυθῶσιν. Quo in loco dū Orosius alios reprehendit, nec locū Græcū emendat, & male uertit ὑπερκαυθῶσιν, ne uehemēter urantur: cū Paulus uelit uehemēter quidem, sed nō nimīū, nō supra modū, nec magis quā cōuenit.

Orosius.

φοινιγμοί.

Cutis ruborem.] Sic interpretor τες φοινιγμους, Celsus habet: Prodest etiam torpentis membri summā cutem exasperasse, uel urticis cesam, uel imposito sinapi, sic ut nbi rubere cœperit corpus, hæc remoueantur.

Orosius.

Feculæ.] Græce est φέκλης quæ fex combusta dicitur. Gal. lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos ad Achoias, inquit, τρυγὺς οἶνου κεκαυμένης, ἢ ῥωμαῖσι φέκλην καλεῶσιν. Latina itaq; dictio est fecula, quam Græci imitantes φέκλην nominant. Largus etiam utitur pro fece uini combusta. Hoc ignorabat Orosius, dum alios reprehenderet.

Canina cō-
uulsio.

Canum more conuelluntur] Verbum ē uerbo reddidi. Largus autem interpretatur quid sit spasmus caninus, his uerbis. Facit ἀδυνάμειον σπασμόν, cum in utramlibet partem deprauata est facies. Celsus libro quarto habet: Circa faciem uero morbus innascitur, quem Græci κυνικὸν σπασμόν nominant. Is cum acuta febris est, os cum motu quodam peruertitur, ideoq; nihil aliud est, quā distentio oris.

Per

Per narium clysterē.] Græce est διὰ ξινεγχύτης, hoc est ad ξινεγχύτης-
uerbū per nariū infundibulū, per quod medicamenta in nares της.
infundūtur Quēadmodū ατεγχύτης, clyster auricularius, & μη
τρεγχύτης uterinus. Celsus lib. 4 cap. 2. fere eadem.

Per rectos siphones.] Sic uidetur Galenus significare, qui κατέτης.
καθετήρας lib. 5. Methodi εὐαυτρήτους, quasi recto foramine
præditos canales interpretatur. Oroscius rem medicam ex Oroscius.
Celio maluit discere.

Lentisci.] Male in utroq; exemplari habetur σχόινον, quod Codex
est iunci odorati pro σχίνε, nam astringentia in hoc morbo Græcus
requiruntur. deprauatus.

Vitulinumq; & oleum.] In Græco codice deest particula
καί. Nam habetur tantum, τέαρ βειον, και χύνιον και μολόχινον
έλαιον. Cum sit legendum: και έλαιον in fine. Nam molochi-
num oleum nullum dicitur.

Corrige
Græca.

Cum communi curatione.] Hoc est præter communem
resolutorum curationem, quæ medicamētis extrinsecus adhi-
tis, aliisq; absoluitur, etiam hæc quæ sequuntur, facies.

Nostra ætate.] Quod Paulus suo tēpore accidisse in mor-
bo colico commemorat, nos quoq; nostra ætate frequenter
uidemus. Nempe ex magno, diuturnoq; colico cruciatu ar-
tuum resolutionem, præsertim brachiorum, quanquā & cru-
rum imbecillitas summa adfuerit. Iam ex febris quæ humori-
bus ad intestiua cōfluētibus, ibiq; dolorē uehementū excitan-
tibus finita fuerit, secuta est artuum resolutio, quod nuper in
Canonico quodā, sed non iuxta regulā uiuēte, sum expertus.

IN XX. CAPVT.

Cum particula corporis in anteriora.] Hoc Celsus paucis
comprehendit: Cum mentum inquiring, pectori annecti-
tur, emprosthotomos, cum scapulis opisthotonos: cum rectā
& immobilem ceruicem intendit, Tetanus dicitur.

Optimum itaq; præsidium.] Hippocr. lib. 4. Aphorism. se-
ctione 57. Qui conuulsione, aut distentione neruorum tuen-
tur, febris superueniente liberantur.

Nonnunquam & risus ipsis Sardonius oboritur. Dioscori-
des lib. 6 sardona ranunculi genus esse testatur, quæ uescenti-
bus mentem adimat, & quadam neruorum distentione, dehi-
scere in rictus ora cogat, ita ut imaginem ridentium præbeāt.

Risus Sar-
donius.

Cucurbitulas ad mouere cum lancinatu.] Græce est μετά
ἀμυχῶν,

ἀμυχῶν, quod sonat cum uibicibus excitatis. Sic intelligo hoc loco lancinatum scalpelli.

Orosius.

[Abstergere, ne imprudentes.] Dum Orosius alios reprehendere instituit, ipse corrigendus uenit, qui tam impure, & nullo sensu penitus uertit, ne perfrigerati occultentur. Videtur autē lexicarius adhuc esse interpres, μὴ λάθωσιν ψύξαντες, quod ad uerbum sonat, ne lateant refrigerantes, hoc est, ne imprudentes, nescii, ac non aduertentes, refrigerent particulas.

[Hydromeli spissius.] Sic exposui ὑδρομέλι λιπαρὸν, hoc est ad uerbum, hydromel pingue. At nulla pinguetudo in eo habetur. Sit itaq; λιπαρὸν ad pinguetudinis crassitiem incoctum. Nam ad dimidias coqui præcipit.

Orosius.

[Et laserpicii radice.] Nescio cur hic Orosius succum laserpitij intelligi uelit, cum apud Galenum Dioscoridemq; ipsum, ubi liquoris mentionem facit, οὗ πὸς ponitur. Adeoq; in opisthotonicis. At radicē tum in puluerem redactam, tum decoctam sæpe & in his, & in aliis affectibus dari legimus, ut plane nō sit, quod Orosius in hoc loco uersionē nostram reprehendat. Quin potius in exemplari græco legendū putet ἐμπροσθέντα pro ἐμπλασθέντα & ἀφεψίμα αὐτῆς ἢ ἀφεψίματι, ut sit decoctum ipsius radice. Quid enim est, silphij radice cochlearia duo, aquæ mulsæ cyathis tribus inspersa, uel decocto ipsius dare? Quorsum referri debet, decocto? ad mulsam ne? quæ iā cocta est, quantū opus est. Itaq; ad radicē magis cōpetit. Ea. n. uel pulueris modo inspersa, uel decocta exhiberi pōt.

Male græca.

Græca uitiata.

Orosius.

[Myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopiq; decocto.] Hic rursus codex græcus deprauatus est, habet enim ἡ σμύρνης < α μελικράτω ὑσσώπω τε ἀφεψίμα. Cum nimirum legendum sit ἡ σμύρνης < α σὺν μελικράτῳ, ὑσσώπου τε ἀφεψίματι, quod Orosius & Basiliensis castigatores non aduerterunt.

[Nardi.] Dictum est pro nardini, ut apud Celsum & Scriboniū aliquādo Rosæ pro rosaceo, nardi pro nardino usurpatur.

IN XXI. CAPUT.

[Remoris origo.] Vide libellum Galeni de Tremore, quē nos aliquando latinitate donauimus, ubi habet: τρέμος μὲν ἐν γίνεσθαι τῆς ὀχέσεως καὶ κινήσεως τὸ σῶμα δυνάμειως ἀρρωστίαν. ἔγχαρξ ἐξ ἐαυτῶν δὴ περὶ τὰ μόρια τῶν ζώων οὕτως οὐτὰ βαρέα καὶ κάτω φέρεσθαι πεφυκότα, τὰς εἰς ἅπαντα τόπον ἔχει κινήσεις. ἀλλ' ἡ διὰ τῶν νεύρων τοῖς μυστίν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιπεμπομένη

πεμπομένη δύναμις. οἷον ὄχημά τι, καὶ πτέρωμα τῆς κινήσεως
αὐτοῖς εἶναι, ἢ ὅταν μὲν ἀπολέσῃ τελέως ἀπόλλυσι δὲ τὰ παρα-
λελυμένα, καταφέρεται καὶ πίττεκάτω δίκην ὄρνιτος πτερο-
ῦντος αὐτός. ὅθεν ὁ δὲ μία κίνησις ὁπολείεται τοῖς ὅντων παθεῖν.
Hoc est ut linguarū rudes intelligant: Tremor itaq; fit imbe-
cillitate facultatis, quæ corpus uehit, mouetq;. Quippe ani-
maliū particulæ, tā graues cū sint, & deorsum ferri natæ, nō ex
seipsis nimirū motiones, in oēm locū habent. Verū facultas,
quæ à principio per neruos musculis trāsmittitur ceu uehicu-
lū quoddā, & alia motionis ipsis existit, quā cū prorsus perdide-
rint, perdūt autē resoluta deorsum feruntur, caduntq; auis pē-
nis destitute modo, unde nullus motus ita affectis relinquit.
In oleum descendant. Hoc est in solium oleo repletum, quo
olim uti solebant, resoluti, contracti, arthretici, tremuli, Græ-
ce est. ἐμβιβαστέον εἰς ἔλαιον. Celsus descendant in soliū, ait.

IN XXII. CAPVT.

Q Vanam ex affectione corporis.] Hoc in omniū par-
ticularum morbis obseruādum docet Galenus, ut cor-
poris primū affectionem, quam uulgus dispositam appellat,
græci διαθεσιν, intueamur. Nam hac neglecta, quicquid parti-
culis admoveamus, sinistre accidit. Cæterum hoc te admoni-
tum uolo candide lector, ubi in uersione mea dictionem inue-
nis, affectionem, pro διαθεσει, positam esse, intelligas. Nā di-
spositio hoc in significato apud idoneos autores nō usurpat.

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore natu-
ræ alieno. Postrema clausula, naturæ alieno, male in codice
græco habetur, περὶ τὸ κατὰ φύσιν. Vbi legendum παρὰ τὸ
κατὰ φύσιν.

Membrana adnata.] Intelligo membranam coniunctam,
siue coniunctiuam, ut barbari appellant. Græci τὸν ἐπιτεφυκό-
τα, eo quod aliis quæ oculum ipsum constituunt, tunicis ex-
trinsecus adnascatur, ligamentum & ipsa existens toti q; oculo
ad ossa circumiacentia, ex pericranio ducens originem.

De defluxionis impetu.

Angiologiam, arteriotomiam, hypospatismum, & petiscy-
phismū.] Omnes has rationes Paulus libro. 6. cōplexus est.
Prima est uenarum in fronte ad tēpora præfectio quod in he-
micranis etiam fieri solet. Altera est arteriarum retro aures
per

Tremor.

Affectio.
διαθεσις.Græca de
prauata.Membra
na adnata.Angiolo-
gia.Arterio-
mia.Hypospa-
tismus.Petiscy-
phismus.

per transuersum sectio. Tertia est ab instrumento chyrurgico appellationem sortita, quasi dicas spatæ submissio intra partes quæ à subiectis liberabuntur. Quarta ratio est, qua diuisionem in fronte à tempore ad tēpus transuersum moliūtur, cura tamen adhibita ne tēporaliū musculorū motus uioletur,

Oroscius.
Specularium.

Recte huic specularium.] Hic legit Oroscius σφεκλάριον, ut significet σφέκλιν, hoc est, ficulam, cupiditate magis reprehēdi, quàm rōne adductus. Diligēs homo nō legerat apud Galenum hoc remediū citari pro lapide speculario: nec etiā apud Paulū qui lib. 7. hunc in modum habet: σφεκλάριον, οἱ δὲ διὰ μὲν φ̄ σφεκλάριον. ὅτινες, ἀντι σφεκλῶν ἐν ταῖς θύρεσι χρωῖνται, διὸ καὶ διαφανὲς μροσαγορεύται γυψῶδες ὑπάρχον τὴν ἐστίαν, δύναμιν ἔχει παρὰ πλῆσιον τοῖς κεκαυμένοις ὀφθαλμοῖς ἢ γὰρ ὀφθαλμοῖς. Si uerò fex cōbusta q̄ ardens est, natura oculis ut ille putat, adhiberi deberet, certe elote elotā esse oporteret.

Ξεροφθαλμία.

Xerophthalmia.] Celsus lib. 6. interpretatur aridam lippitudinem Est enim, inquit genus aride lippitudinis, ξεροφθαλμίαν græci appellant, neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam grauescunt, & noctu præ graui pituita inarescunt.

Ertropion.

Ertropion.] Hoc uiciū est inferioris palpebre, qđ parū sursum artollitur, sed pēdet & hiat, neq; pōt cū superiori cōmitti. Id interdū accidit ex mala curatione, interdū ex senectute.

Aegilops.

Aegilops.] Est ueluti parua fistula maioris anguli, per quā pituita assidue distillat. Nonnunquam etiam exeso ossē usq; ad nares penetrat.

Oroscius.

Lixiuio quod ex cinere & calce.] Græce habetur absolute πρωτοστάκτω, quasi dicas, primario lixiuio Paulus lib. 7. habet: εἰ δὲ προσλάβοι καὶ τιτάνου ἢ τέφρα καυτικὴν ἐργαζέται τὴν κοίαν ἢ δὴ καὶ πρωτόστακτον ὀνομάζει. Quæ uerba Oroscius non uidetur intellexisse, dū interpretatur cinerē lixiuium, qui primus distillauerit, secutus Hermolaū. Recte igitur quis interpretetur lixiuium, quod per cinerem & calcē distillauerit.

Cum manus opera.] Hoc remedium in exemplaribus uulgatis non est, sed in Lascaris codice manuscripto additū inueni. Si itaq; placet ascribere, aut expūgere, per me certe licebit.

Chalazion.] Celsus sic appellari dicit, quod mobilia, & digito huc, illuc impellantur curationem manu præstandam docet libro sexto.

Encanthis

Encanthis naturalis.] Varijs de causis hoc uicium gigni so- **Encanthide.**
let. Interim ex ungue parū exciso, uel ob tuberculum, quod
palpebras parū deduci patiūt. Quod si ungue carūcula nemiū
abscindat putrescit forame per quod postea humor descēdit,
ac uiciū superiori cōtrariū nascit, quod grēci ξυάδα nomināt.

Tertia samia.] Duplex ea terra apud Dioscoridē habetur, **ξύας.**
una simpliciter terra samia dicitur, altera γῆ ἀσῆρ, hoc est, ter- **Terra sa-**
ra aster, quasi dicas, terra stellata. Celsus itaq; , ubi posterioris **mia du-**
mentionem facit : Terrā, inquit, samia, quā ἀσῆρ dicitur. Nō **plex.**
ut Oroscius uolebat, terrā alteris, obscure nimium. Ceterum **Oroscius.**
ante hoc medicamētum in græco exēplari est δια μύλκ per-
peram pro δια ἀμύλκ, quod etiam Oroscius annotauit.

De oculis purulentis.] Duæ sunt apud Græcos dictiones.
quæ fere in omnibus sibi respondent, nempe ὑπό μνος, & ὑπό- **ὑπόπιος.**
πιον. Prima significat pus subesse membranæ corneæ. Largus **ὑπόπιον.**
& Celsus uocant oculos purulentos : altera dicitur, teste Ga-
leno, quasi ὑπὸ & ὠπας, hoc est, sub oculis. Ac ueteres latini
hoc uicium appellant, suggillata, genere ecchymomatum cō-
prehensa. Parum prudenter Oroscius, dum in aliorum erra- **Oroscius.**
tis castigandis occupatur, ipse in grauissimū incidit. qui ὑπό-
πιον, quod est, purulentum, conuerterit suggillatum.

Floris æris.] Hoc medicamentū in impressis nō habetur, **Arida me-**
sed in manuscripto codice Iani Lascaris scriptum inuenitur. **dicamēta,**

Contritis ad læuorem aridis.] Hoc est, aridis in tenuissi- **ξηρά.**
mum puluerem redactis. Græce est λεάνας τὰ ξηρά, hoc est, læ-
uigans arida Celsus autem de Aridis mentionem facit libro
quinto, capite uigesimo secundo in hunc modum : Quædam
misturæ medicamentorū sunt, quibus aridis, neq; coactis uti-
mur, sic ut inspergamus aut cum aliquo liquido mista illina-
mus. Alia medicamenta sunt his apposita, nempe quæ liquari
possunt. Hæc græcis τηκτὰ nominantur. Vbi itaq; Galenus **Liquida,**
aliisq; habet τὰ τηκτὰ τήκονται, τὰ ξηρά δὲ λεαίνειν δὲ ἢ λειο- **τηκτὰ.**
τρίβειν. Latini scriptores exponunt, quæ liquari possunt, ad
ignem eliquētur, arida conterantur : Celsus inquit lib. 5. ari-
da ex eo conteruntur. Rursus arida medicamenta cōtrita hu-
more non pingui coquuntur. Item arida ex aceto teruntur.
Largus simili utitur locutione, & uerbum λεαίνειν δὲ læuiga-
re oportet, interpretatur. Quæ cum ita sint, immerito Oro- **Oroscius.**
scius nos reprehendit, negans latine, & fideliter dictum, aridis

PAVLI AEGIN.

Dd

contri-

contritis, cui magis placet, pulueribus dilutis. Et si apud nulum idoneum scriptorem huiusmodi locutio inueniatur.

Orosius. Sublinimus medicamentis:] Hic quæso candide lector animum aduertas cauillationis Orosii. Damnat me quod uerterim ex græco τοῖς πρὸς τὰς παλαιὰς διαθέσεις, medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur, ipse enim mauult dici collyriis. Quasi uero collyria non sint medicamenta. Certe ego à præceptoribus meis olim didici substantiam collyriorum, esse & dici medicamenta: ipsum uero nomen collyrii, formam medicamenti indicare. Celsus lib. 6. ita inquit: A secundo die graui quoq; lippitudini per medicamēta recte succurritur. Item in collyrio trygodes. Quo grauior quoq; inflammatio est, eo magis liniri medicamentum debet.

IN XXIII. CAPVT.

AN ob exteriorem causam acciderit.] Ex octauo Oribasij hæc mutuatus est. Exterior autem causa est uentris frigidior, aut lauacrum aquæ frigidæ, similiaq;. Hæc itaq; solent interrogari, an ægrotus in ambiente frigido obambulauerit, uel lauacionem frigidam expertus, uel alio modo fuerit affectus. Græcus codex habet ἡ καμνοντος ἀνακρίσεως, ubi ἀνάκρισις idem ualeat quod ἐξέτασις. Nonnulli autem lexicarii interpretes contemperamentum uertunt.

Fomenta. Cucurbita ex aqua calida.] Idem Galenus commemorat ex Apollonio, lib. 3. de compositione medicamentorum secundum locos in hunc modum: πυρίαις δὲ χερσέον τὰς διὰ τῶν σπογγῶν εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀμποβεβρεγμένον, τέτων ἱκανῶς τε ἐκτεθλιμμένοι, καὶ τὰς διὰ τῆς σικλῆς. Hoc est: Fomentis aut utendum est, quæ per spongas fiunt, in calidā aquā intinctas, easq; abundè expressas. Itē illis quæ per cucurbitam adhibētur, &c. Ego itaq; προπυρίου μέν ἢ Paulo, uerti fotu prius facto. Quāquam possis dicere, cucurbita prius aqua calida concalfacta.

Per specillum lana.] Græce est διὰ μηλώτιδος, quasi dicas specillum auricularium, ut Celsus etiam exponit. Nam eodē capite meminit specilli lana inuoluti, specilli auricularii, & clysteris auricularii, strigilisq;.

Fomentū per arundinem. Vel etiam arundine.] Apollonius etiā sententiam recitat, uapore per arundinem perforatum elato. Erit autē alterum arundinis extremum concauitati euriculæ accommodatum, alterum in ollam cutus operculum foramen habeat incubet. Decoqui-

Decoquitur in olla absinthium, cuius uapor auditorio meatus insinuat. At hic nullū forū arundine adhibere præcipit. Verum exugi humorem, si quis, forte in aurem receptus sit.

Græca mu-
tila,
Orosius
corrector.
Basilienis.

Sin aut pauca.] Græcus codex mutilus est, nec Orosius, nec Basilienis castigat aduertit. Deest enim εἰ δὲ, ad inregram sententiam explendā, quæ sic legi debet: εἰ μὲν ἂν πολὺ διὰ τὸ φόματος, καὶ τῆς καλαμίδος αὐτὸ ἐκμηζάνειν δεῖ. εἰ δὲ ὀλίγον, &c.

Cardamomi & nitri.] Galenus libro iam citato legit καρδάμυϊκανόν, καὶ νίτρον βραχὺ σύκε σαρκὶ χωρὶς κεχραμίδων ἀναλαβὼν ποίησον κολλύριον, &c. Quod est: Nasturcii, quod satis, & uitri paululū fici carne sine granis exceptū, in paniculum redigito, &c. Verum cardamomi & cardami quod est nasturcii, eadem fere potestas est: nisi quod nasturciū sit ualētius.

Idq; in aurem demittendum.] In græco codice hæc clausula quidem non est, uerum à me addita, ad sententiam absol- uendam. Alexander etiam in hunc modum ex Galeno pro- fert. Hoc te celare nolui.

Nota.

Hyssopum medicamentum.] Hyssopum & herba, & medi- camentum appellatur. Verum ubi herba notatur, simplici uo- cabulo hyssopum dicitur, ubi medicamentū additur ipsa me- dicamenti dictio. Quanquā in eo nulla sit hyssopi herbe men- tio, sed lanarum potius succidarum. Nonnulli autem adiiciūt hyssopum herbam.

Bulborū, polentæ.] Admonuit Orosius græcum codicem esse uiciosū, q̄ habet: βολβῶν ἀφρώων pro βολβῶν ἀλφίτων, &c.

Græca ui-
tiata.

IN XXIII. CAPVT.

Linamento ex ellychniis cōtorto.] Varia sunt apud græcos λινάμηνων, hoc est, linamentorū genera. Aliud uocāt τρεπτόν, quasi dicas tortile, aliud ξητόν, hoc ē, rasile, aliud τιλτόν, qđ est cōcerptū filatim, aliud ἐλλυχνιωτόν ex ellychniis præparatū. aliud πριαπισκωτόν à pudēdi humani similitudine nun- cupatur: aliud, quod cunei formā referat, aut quia cunei modo foramina obturet, aut cōiuncta separet, σφήνισκος dī. Vt Pau- lus sexto uocat σφήνισκος τρέπτης ἐκ ξάκας, hoc est, cuneo- los intortos ex pāniculo. Adhuc aliud est λημνισκός græcis di- ctū, implicitū in longitudinē linamentū, si Celso credimus, qđ alibi uocat linamentū inuolutū & oblongū. Sicut τρεπτόν li- namentum implicitū, seu intortū simpliciter appellari possit.

Linamēto-
rū genera.
τρεπτόν.
ξητόν.
ἐλλυχνιω-
τόν.
πριαπι-
σκωτόν.
σφήνισ-
κος.
λημνισ-
κός.

Dd 2 IN

ἑρεγμός.

ἄλδρον.

κνάμιον.

ἔτιος.

λέκυθος.

Orosius.

ἑρεγμός.

Ephelis.

Lenticula.

Suggillata

Parulis.

P Tisanæ fresæ.] Hoc est confractæ. Græce est ἰρεως ἢ πτισάνης ἑρεγμός. Vt ἑρεγμός significet omne id quod fresum est, uel ipsam confractionem, omnium scilicet, leguminū, nomine tamen ipsorum appposito, ut κριθῆς ἑρεγμός. Cum uerò simpliciter ἑρεγμός ponitur, de faba fresca dicitur. Quæ si molam experta sit: ἄλδρον κνάμιον & ἑρέγμιον ἄλδρον appellatur. Ferculum autem ex faba, cicere, & reliquis leguminibus fresis paratum, ἔτιος, ex fresorum autē farina pulmentariū, λέκυθος Galeno cum alibi, tū in libello de bonis malisq; succis generandis nūcupatur. Quoties autem in Paulo aliisque græcis inuenitur κνάμιον ἔτιος, pro faba fresca elixata ad ferculū intelligito. κνάμινι λέκυθος, pro fabæ fresæ farina elixata ponitur. Sic πτισάνης λέκυθος, & ὀρόβινος λέκυθος, aliornmq; leguminum dicitur. Vbi uerò hæc uox λέκυθος sola citra alterius adiectionem ponitur, Lutheum oī significat apud medicos, Orosius male ἑρεγμός pro lomento tantū usurpauit.

Ad Ephelidem & lenticulas.] Ephelis asperitas quædam & duricies mali coloris est in facie lenticula & in alia parte nō nunquam nasci solet. Celsus ineptias putat curare uaros, lenticulas, & ephelidas.

Suggillata.] Græci uocant ὑπόπια ut antea annotaui. Sūt autem ex genere ecchymomaton, quæ & Hippocrates & alii pleriq; medici appellant cutis affectum, quo uenis in ea tenuibus contusis sanguis inde effunditur, qui ita excretus non uno in loco, nec subito concreuit. Temporis spacio liuescit, nigrescitq; cutis.

Cum melle admovento.] Galenus habet in eodem medicamēto, ὅξει ἀναλαβὼν ἐπιτίθει μέλιτος ὀλίγον ἀνακόψας. Hoc est aceto recepta, mollisq; momento subacta.

IN XXVI. CAPVT.

D Entium dolorem.] Ex quinto Galeni de cōpositione medicamētorū secundū locos ad uerbum hoc caput est transcriptū, nisi quod ubi Paulus ad inflāmationē habet, Galenus & Oribasius ad dolorem dentium medicamenta subscribunt.

Ad parulidas.] Parulis græca dictio est, ἀπαρὰ qđ est iuxta, & ἄλῃ gingiua hoc signat gingiuam. Celsus lib 6. cap. 3. Solent ēt interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quædam oriri dolentia παρουλίδας græci uocant.

Tonsillæ.

Tonsillæ.] Glandulæ quædā sunt in ore utrinq; singulæ penitus sitæ, spōgiis similes, quæ humiditates ex capite recipiant ad fauces humectādis παρίσθια græci nominant, quæ si post inflammationem induruerint, αντίαδες appellantur.

παρίσθια.
αντίαδες.
κίονις.

Vua.] Græce est κίονις, quod ad uerbū sonat columella. Est aut hæc carnosā quædā particula, in summa oris parte suspensa uocis plectrū, recipit ea madorē à cerebro quo superiores palati partes humectat. Si plus iusto humiditatis recipiat, interim laxat, ac fastigata descendit, interim inflammationē experit, & ne potus, nec cibus deuorari possit impedit. Veteres græci γαργαρεῶνα & κίονα recētiore κινίδια appellant. ταραχλὴν uero quasi dicas uuā, partē ipsā appellari nō uult, sed affectum. Celsus aliisq; latini scriptores ēt partē, uuā nominant.

γαργαρεῶν.
ταραχλὴ.

Vbi æqualiter crassa fuerit.] Paulus præter Galeni morē κίονα appellandam particulam censet, ubi in æqualem crassiciem intumuerit. Nam interim tenuis, acuta, albaq; cernitur. Interim una crassa, summa tenuis, & liuida est.

IN XXVII. CAPVT.

Angina.] Apud recentiores medicos uaria sunt anginæ nomina nunc per literā κ, nunc per σ, inchoātia. At Galenus cōmētario tertio in prognostica Hippocratis parū interessē dicit, modo de re ipsa constet, κινίαν γλυν, an σινίαν γλυν proferas. Ibidem ēt tres anginæ species enumerat ex Hippocratis sententia: Pessimè quiens, agunt, qui uehementer quidē dolent nullū autem in ceruice & faucibus symptoma experiuntur. His succedunt, qui quidem non difficulter spirant, uerū dolent grauiter, collū ipsis intumescit, fauces apparent rubicūdiore. Postremi neq; dolēt, neq; ægrē spirant, ita ut suprema gutturis pars λάρυγγα græci nomināt incolumis quidē ipsis permaneat, sed fluxio magna parte biliosior, aut in fauces, aut in collum, aut in utraq; descenderit, &c. Rursus lib 4. de locis affectis quatuor species recenset. Paulus itē noster quatuor enumerat, pro musculorū, uel interiorū, uel externorum inflammationum ratione. Ego sane musculos primum intelligendos puto, qui in ore circa linguā ex omni parte habentur: qui superiores palatum uersus eam mouent. qui inferiores deorsum, Laterales in latera adigunt. plurimi ex offe & græcam literē u referente prodeūt. Deinde duodecim proprios, summæ arteriæ parti quā λάρυγγα uocant octo autē cōes, qui scilicet

Species
anginæ.

laryngem corporibus uicinis colligant. necnon eos qui ceruicem constituunt. Iam musculis qui cæso phago subiiciuntur, inflammatis, angina quædam oriri solet.

φάρυγξ.

Faucium pharinga græci uocant.] Magna harum uocum ambiguitas apud authores inuenitur. Vnde fit, ut pleriq; græcorum librorum interpretes mirum in modum torqueantur & subinde etiam aberrant. Itaq; φάρυγξ duo significat, nempe fauces, & asperam arteriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gulæ, tum asperæ arteriæ extrema concurrunt. Grammatici genere distinctionem faciunt hoc pacto: φάρυγξ δὲ λαχῶς σημαίνει τὴν κυρίως φάρυγγα ἢ δὲ εἶναι ἢ ἀχανία ἢ μετὰ τὴν τῆς γλώττης εἶζαν ὅτε δὲ ἀρσενικῶς σημαίνει πολλάνης τὸν λάρυγγα. Quæ uerba sonāt ita Pharynx feminino genere prolata, proprie dictam pharyngē, hoc est fauces significat. Hæc autem est oris ampla capacitas post linguæ radicem sita. Masculino autem genere diuictis pharynx, laryngem, quod est, arteriæ asperæ summum uel ipsam arteriam signat. Hippocrates libro prognosticon per dictionem φάρυγγα in femīnino genere fauces etiam intelligit, cum ait: φάρυγξ δὲ ἐλκου μέν σὺν πυρετῷ δεινόν, Paulo post, αἱ δὲ κυνάχαι δεινόταται μὲν εἰσι, καὶ τάχιτα ἀναίρεσιν, δόκοσαι μήτ' ἐν φάρυγγι μηδὲν ἐκδήλον ποίουσσι, hoc est: Anginæ grauissimæ sunt, & cito interimunt, quæ neq; in faucibus, neq; in collo quippiam manifestum edunt, &c. Hanc sententiam Galenus exponens inq̃t: ὅτι φάρυγγα τὴν περικειμένην χώραν τομάχοι τε καὶ λάρυγγος ὀνομάζει, δῆλον ἐστὶ. Hoc est. Quod pharyngē nominat regionem, gulæ & asperæ arteriæ summo præpositā, nemo ignorat. Rursus φάρυγγα δὲ τὴν ἐν τῷ διαίξαι τὸ τόμα, καὶ πιλῆσαι τὴν γλώσσαν κάτω φαινομένην ἐνρυχορίαν ἐν ἣ τὰ δύο τόματα εἶναι τότε τῷ τομάχῳ, καὶ τῷ λάρυγγος. At pro larynge, & aspera arteria positam, non solū in masculino genere, ut Suidas putat, sed etiam in fœminino inuenias: præcipue apud Galenum, ut secundo de placitis Hippocratis & Galeni: τὸ μὲν γὰρ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἢ περὶ δὴ καὶ φάρυγγα προσαγορεύομεν. Ibidem, ἐπὶ δὲ τὰ τοῖς ἀπασιν ἐξῆς ὑποδείζομεν σοι τὸ τῆς φωνῆς ἴδιον ὄργανον τὸν φάρυγγα, καὶ τὰς κινεῖν τὰς αὐτὸν λῦς. Hic pro larynge accipit: de qua ita scribit, octauo de usu particularū: καὶ τό γε πρῶτον τε καὶ κυριώτατον ὄργανον τῆς φωνῆς ὃ λάρυγξ ὀνομα, τὸ ἄνω πύξας ἐπὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἢ δῆ καὶ

ἡ καὶ φάρυγξ καλεῖται δ' αὖτις, πρὸ τῆς λάρυγγος, hoc est: Ac primum, principalissimumq; uocis instrumentū, quod larynga nominant, superior pars asperæ arteriæ existit, quam sanè etiam pharynga uocant, eodem nimirum uocabulo quo pharynx (id est, fauces) ante arteriæ asperæ caput, nuncupatur. Atq; hic in feminino genere ut superius in masculino positum est nomē pharyngis, contra grammaticorum opinionē. Pollux audiendus non est, qui τὸν φάρυγγα masculino genere prolatus, pro gulæ extremo accipiat.

λάρυγξ.

Pueris raro talis.] Pueris iterim uertebrae colli è loco suo excidūt propter ligamentorū quæ eas cōnectūt imbecillitatē. Vnde angina periculosissima oriē, quæ nullis cedit remediis, quare ei admouēda manus non est. Intelligenda aut sunt hæc.

Nota.

Pueris raro talis.] Raro quidem, sed tamen interdum angina hæc accidit, idq; in pueris magis, quàm adultis, ob causam superius dictam. Hippocrates huius meminit lib. 2. περὶ ἐπιδημιῶν in istum fere modum: ἦν δ' ἐ τῶν κυναρχικῶν παθήματα τρία, δὲ, τὸ τράχηλον οἰσπόνδυλοι εἶσω ἔρξεν. τῆς μὲν πιπλέον, τοῖς δ' ἐπ' ἐλάττον.

Porro ex strangulatis.] Hippocrates lib. 2. Aphorismorum hanc profert sententiam τῶν ἀπαγχομένων καὶ καταλυόμενον μὴ πωδὲ τεθνηκότων ἐκ ἀναφύεσθαι οἷς ἀνὰ φρὸς ἢ περὶ τὸ στομαχόν, hoc est, Quibus strangulatis, solutisq; nondum uero mortuis spuma circa os extiterit, non restituntur.

Discussis autem colli.] In græco codice est διαλυόμενων δ' ἐ τῶν περὶ τὸν τράχηλον ἐρυσθιμάτων, quod antea uerterā. Simulatq; uero colli impedimenta dissoluuntur, intelligens nimirum uincula quibus strangulantur.

Aduerte.

IN XXVIII. CAPVT:

Grauedo.] Celsus libro quarto dictiones græcas elegāter exponit, κορύζαν grauedinem nominās, κατατάγμης, uel ut Paulus habet, κατὰ ῥέους distillationes.

κορύζα.

Aquiloniis diebus.] Græce est ἐν βορείαις καταστάμασι qd est aquiloniis aeris statibus seu constitutionibus. Ego Celsum secutus sum.

Tussis.] Tussis uariis de causis excitatur, nūc ob intēperiē, nūc ob humores, uel tenues, uel crassos ex alto descēdētes. Iterim ob iocinoris inflāmationē: iterim ob pulmonis affectū.

Tuscis.

Anaphotici.

Anaphoticos.] Interpretatus sum eos q. ægrè reiciūt, scilicet.

Dd 4 cec

cet qui crassa glutinosaq; ex pectore reiciunt, hi enim difficulter propter crassiciem educunt. Sunt qui ad sanguinē reijcientes referant, mea opinione, incommode.

IN XXXIX. CAPVT.

Qui febris expertes.] Galenus lib. 7. de compositione medicamentorū secundum locos copiosius hæc, Aetius item & Oribasius ante Paulum pene eadem tradiderunt: non autem eo compendio quo Paulus, usi sunt. Cæterum *ἀσπμα* suspirium uertit: quod latine etiā dici possit anhelatio.

Acetum scilliticum.] Valētia hic commemorat medicamenta, purgationemq; fortissimā, ea nimirū ratione, q̃ multas numero partes pertransire oportet, antequā ad pulmonē perueniāt, nepe os, gulam, stomachum, uentriculū, tenuia intestina, uenas meseraicas, uenas in sima parte iocinoris, item eas, quæ i gilba habētur, hinc uenā cauā, postremo pulmonē.

IN XXX. CAPVT.

Tunica oculi ceratoides.] Ex octauo Oribasii hæc sunt transcripta, Dixi autem in pinguetudinem lāguescit, pro modice aut leuiter pingues sunt, græce est *ὑπολιπαροὶ φαίνονται*, hoc est subpingues apparent. Locutio est Pliniana in pinguedinem languescit.

Explicata sententia.

Suffragantibus qui huc req.] Græce est *ἐπιτρεπόντων μὲν τῶν εἰς τὸ ἀσπμῶν*. hoc est ad uerbum, permittentibus quidem ad hoc numeris. Quæ sententia obscura quibusdam uideri possit. Hoc autem sibi uult, omnibus quæ huc requiruntur, indicationibus consentientibus: nempe uiribus, morbi natura, ætate, & aliis id genus reliquis.

Hydrosatū Aetij iunioris.

Hydromalo.] Hoc est potione dulci ex malis Cotoneis, melle & aqua confecta.

Hydrosfato.] Huius etiam misturam Paulus libro septimo exponit, ex rosis, aqua & melle. Recentiores autē græci, ut actuarius paulo delatiori compositionem hydrosfatū appellant, ea recipit aquæ libras decem, Zuccari libras quinque, hæc feruescunt una donec spissitudo fiat: postea additur succi rosarum libra. Febribus conuenire dicunt.

Orosceius Castigatur codex.

Idem insparfam.] In Græco codice est *ἰσπας ἐμπεπασμένης*. male nimirum, pro *ἰσπας ἐμπεπασμένης* quod Orosceius & Basiliensis castigatō mutare noluerunt.

Epithema.] Hæc dictio quidem in Græco non est, sed intelligenda

Intelligenda uenit. Nā Aetius eam apponit. Cæterū per resinā, intellige terebinthinam, Per medullam, ceruinam. Nam ista sunt excellentiæ uocabula, Per æsypum quod in Græco est, ὀσσῶπω, intellige medicamentum liquidum in septimo descriptum. Aetius legit οἰσύπου ὑγρῶ, hoc est æsypi liquidi. Cæterum iridē siccam mandi detritam, ac in puluerem redactam.

IN XXXI. CAPVT.

CRuentum sputum.] Tribus potissimū de causis sanguis per os educitur Velenim exesa parte aliqua uenosi generis, uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto Primam διαβρωσιν, secundam ῥῆξιν, tertiam ἀνατομωσιν Græci appellāt, authore Celso lib 4. At sanguis uel confertim uel paulatim erumpit. Vase quidē eroso sensim educitur, nisi magna adeo sit iactura, ut etiam pars aliqua pulmonis, uel eius cartilaginis reiiciatur, aut si casus ex alto, uel compressio uel aliud id genus superuenerit. Rupto autem cumulatim prorumpit, ut in aperto quoq; ore fieri solet. Paulus à Galeno dissentire uidet cum ait, εἰ δὲ κατὰ διαβρωσιν ἢ ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὴ τῆ αἵματος ἀναγωγὴ γίνεται Nam ille quarto de locis affectis libro inquit, αἱ δ' ἐξ ἀναβρώσεως ἀθρόα κενώσεις αἵματος ἐμὲτε προηγυμέναις γίνονται βραχείας τίσεσι καὶ τοῖς εἰς τῶν πνεύμονα δρῦμεσι ξείμασι. Hoc est: At cumulatæ sanguinis euacuationes ex erosione post pauca fiunt sputa, & acres in pulmonem fluxiones, &c. Quomodo igitur hæc cum Pauli uerbis consentient? Aetius lib 8. in istum modum litem dirimit: Quibus ex erosione uenarum pulmonis, eductio sanguinis contingit, his per interualla modica sigillatim expuitur. Mox subiicit. Fieri etiam potest ut ex erosione sanguis coaceruatim erumpat. Cum enim præcedenti tempore paulatim quis expuerit sanguinē, nec diebus infecutis uel casus, uel alia quædam causa uiolenta superuenerit, sanguinis tamen eruptio multa prodierit, magnam subesse erosionē oportet, &c. Itaq; primis diebus paulatim ex erosione sanguis reiicitur. Si aciores fluxus in pulmonem destillarint, quæ magnam erosionē pepererint, confertim prorumpit. Non possum satis hoc in capite Oroscium demirari, qui pro dictione Græca πλήθος multitudinem uerterit, tantus medicus ut ipse uideri uult.

Quercus membrana] In Græco est δρυὶς τὸ ἰνῶδες, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ κελύφει τῆς βάλανος. In septimo tantum, ὑμειῶδες legitur.

διαβρω-
σις.
ῥῆξις.
ἀνατό-
μωσις.

Oroscius.

**Mēbranæ
quercus.**

legitur. Dioscorides habet τὸ μεταξὺ τῆ φλοιῆ καὶ τῆ πρεμνοῦ ὑμενοδές. Prima est interior & subiecta cortici tilia quæ ligno membranacea cohæret, altera tunica putamini glandis subiecta ὑμενοδές itaq; sit ὑμενοδές. Vtraq; astringendi uim obtinet.

**Lectiōnem
obseruā.**

Phagi autem & ilicis mēbranæ præstantiores sunt.] Gal. lib. 6 de simplici medicina eadem fere habet σφοδρύτερον δ' ἐτιστύρει φηγὸς καὶ πρίνος. Intellige τὸ ὑμενοδές.

ἑπόραι.

Cochleare unum.] Exemplum Græcum Basilensis habet κοχλιάρια, id est hoc est cochlearia uidecim. quæ mēsurā magna est nimis, eoq; legendum κοχλιάριον. α̃.

Fructibus.] In Græco erat δ' πῶρων. alias uerti poma, quod scilicet lignosi nihil habeant. uerum hic reeuset etiam malū punicum extrinsecus durum, ob quam causam, fructibus, dixi, quia latius patet, fructus quā pomum. Et differētia superius exposita nonnunquam confunditur.

IN XXXII. CAPVT.

ἐμπύμα

Puris illuuiēs.] Sic interpretatus sum ἐμπύμα: quasi dicas puris in parte aliqua collectio. ἐμπυοι Purulenti Plinio uocantur. alii exponunt, pectore suppurati.

IN XXXIII. CAPVT.

**Iugulum
præcordia.**

Pleuritis.] Celsus interpretatur laterū dolorem lib. 2. & 4: Huic, inquit, accedit febris & tussis. In Græco uerbū est συνεδρεύεται, quod signat, simul accedit, assistit, ac quasi indiuidua est.

Vsq; ad iugulum & præcordia.] Alii dicunt usq; ad clauiculam, & hypochondria. Ego Cellum imitor, qui clauiculam seu κλειδᾶ iugulum exponit, & ὑποχόνδρια, præcordia. Distinguit autem postea, quando ad iugulum dolor, quando autem ad præcordia pertingit.

**Pulsus
ferrans.**

Pulsusq; durum & ferræ modo inæqualem.] Hæc pulsus species secundo libro exposita est. Galenus eam aperte interpretatur libro quarto de pulsum causis in hunc modum: εὐλόγως ἐν σκληρότερος ἅπασιν τοῖς ἐπὶ φλεγμονῇ πυρέττουσιν ὁ σφυγμὸς γίνεται, καὶ προσέτι γε διὰ τὴν ἐδυσκрасίαν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνώμαλος κατὰ μίαν προσβολὴν, καὶ δὴ λανθάνει τῶ σφυγμῶ, τὸ οἷον ἐμπρίον τὴν ἀβήν. οὕτω γὰρ ἀνάγκη φαίνεται εἶδαι τὸν ἀπτόμενον ὄργανον σκληρῆ τὴν προσβολὴν ἀνώμαλον ἔχοντα. Hoc est: Bona itaq; ratione omnibus qui ob inflammationem

Inflammationem febricitant pulsus oboritur durior. Præterea ob intemperiem arterias obfidentem inæqualis in uno ictu, & nimirum ambobus coeuntibus pulsus erit species à quibusdam dicta, ueluti ferra tangentis manum secās. Ita enim necesse est imaginari eum qui tanget durum instrumentū quod occursum habet inæqualem.

Quæ nihil emolitur.] Hoc est, qua nihil exspuitur. Sic Celsus loquitur libro quarto.

Atq; si tumor purulentus.] Hoc est ex inflammatione musculorum externorum collectus, nisi dissipetur, in exteriorem partem scalpello incidi debet. Græce est ἐπὶ τὰ ἐκτὸς ἐπιτμηθῆναι παραγίνεται, quod ad uerbum sonat, ad exteriora incidi cōmodo est. Nam παραγίνεσθαι signat βοηθεῖν, ἐπιχειρεῖναι. Hoc Orosius in Albano quem ferè in singulis uerbis reprehendit, non adnotat.

Illa nanq; nisi uel extra, uel intus.] Hoc est, nisi per os, uel per aluū fuerit expurgata. Foras. n. per cutē purgari non pōt.

Remedium est sanguis dimissus.] Non dicit qua ex parte mitti debeat. Hippocrates sane lib. 4. de uictus ratione in morbis acutis manifesto docet his uerbis: ἢν μὲν ὁ δύνῃ ἀνω περὶ αἶμα πρὸς κλινίδα ἢ περὶ μᾶζον καὶ βραχίονα τέμνειν χρὴ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν ἄνω ἐφ' ὁκότερον ἀν' ἢ τῶν μερῶν κατὰ τόδε. Hoc est: Siquidem dolor sursum ad iugulum, aut circa mammam, aut brachium pertinent, internam brachii uenam secare oportet, illa nimirum parte, qua dolor fuerit. Galenus exponens hæc ait: Cubiti internam incidere conuenit illius partis, qua dolor fuerit. Oribasius capite de sanguinis missione habet: Pleuriticis autem ex ipsa parte quæ dolet auferendus est sanguinis. Hæc obiter posui candide lector, ut isti Arabum sectatores uideant, ueteres illos ex eadē parte initia semper, non ex aduersa sanguinem detraxisse.

Pleuriticis
unde mit-
tendus san-
guis.

Solidiore utetur cibo.] Græce est καὶ τῇ ἀδρότερά. Nam λεπτότερα, hoc est tenuior, seu qui extenuet, ut est, mulsa fortitio ex ptisana chōdro, aliisq; opponitur δρότερα, q. recte dicitur solidior, qui uidelicet magis nutrit. Gal. interpretatur ἢ παρὰ ὑπερστροφῇ, quod est adaugēs alimentū, quod Celsus dicit ualētis materiæ. Vt enim tenuis cibo corpori parū adiicit, aut nihil, sed uires tm cōseruat pro tātillo tēpore, sic solidior plus corpus alit. Nō est quod Oros. alios reprehēdat, uertētes

Cibus so-
lidior,
ἀδρότε-
ρον.

ἐδρότερον

ἐδρότερόν solidius. Non nego aliquando plenius posse dici.

IN XXXIII. CAPVT.

COrdis affectus.] Gal. cum in quinto de locis affectis, tum uero secundo in librum Hippocr. de ratione uictus in morbis acutis commentario de cordis affectibus pene eadē tractauit Principia itaq; tria in humano corpore existunt, cor, cerebrum, hepar. Hæc autem interim per se afficiuntur, interim ex consensu tum mutuo, tum aliarum quarundam partiū. Corde itaq; affecto per se, præsens est periculum: secundum locum obtinet cerebrum, postremum iecur. At si ex uentriculi dolore, cor afficiatur, syncope oritur, si cerebrum consentiat, delirium, uel conuulsiones.

Syncope
differētiæ.

Syncope appellatam.] Syncope totius habitus est resolutio. Sunt autem aliquot eius species, cardiaca scilicet, quæ intemperiem cordis, uel inflammationem, uel erysipeles sequitur. & tomachica quæ ab oris uentriculi affectū, corde simul confortii lege dolēte generatur. Flatuosa, ex cruditatib. cōstituit.

παλμός.
Palpitatio

Noui inquit.] Lib 5. de locis affectis hanc historiam commemorat Galenus, unde etiam hæc sunt transcripta. Est autē palpitatio quam Græci uocant πάλμον, qui est teste Galeno περι τρύμου καὶ παλμῶ, καὶ σπασμῶ, καὶ ξίγους: διατάσις καὶ συνήκησις παρὰ φύσιν, ac omni parti accidit palpitatio, etiam immobili. Causam eodem libello Galenus ostendit his uerbis πνεῦμα παχὴ καὶ ὡτμᾶδες ἐκ ἔχον διέξοδον, hoc est spiritum crassum, & uaporosum qui non habeat exitum. Cordis autē palpitationem humor aliquando generat, in ambiente cor tunica quam pericardion: Anatomici uocant, collectus.

IN XXXVII. CAPVT.

NAm si sola.] Ex octauo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos, & ex Oribasio hæc sunt tractata. Paulus dixit, sola, ubi Gal. habet ἀμικτὲ τῆς τονωτικῆς δυνάμεως hoc est, non admixto corroborante præsidio.

Orosius.
Castigatur
codex.

Omphacii drachma.] Omphacium est uuxæ acerbæ succus: quem Barbari agrestem uocant Male in Codice Græco legitur ὀμφακίνης pro ὀμφανίου. Orosius neglexit.

Orosius.
Deprauatus
codex.

Augendus autē.] Vitiose legitur in Græco ἐξεπλῆρι παρὰ ξεν pro παρὰ ξένον, quod ēt uterq; Aristarchus præterit.

Aloe trita inspargitur.] Græcus Codex perperam habet ἐπιπλάσσειται pro ἐπιπάσσειται nec hoc aduertentibus Aristarchis,

starchis, sicut ēt paulo post ἐμπλάσας pro ἐμπάσας habet.

De cibi fastidio.

SI cibus quodammodo præter uolūtatem.] In Græco Co
dice est, εἰ βιασθέντες τι πραφῆναι τύχοιεν. Huic responderet
Gal. hoc ad Glauconem primo: οἱ δὲ εὐθύς τὸν στόμαχον φαύ
λως ἴσχουσιν ὥστε ἀποστρέφεται τὰ σιτία, καὶ εἰ βιασάμενοι
λάβοιεν, ἢ μὴ κάτεχεν, ἢ μὴ πέττειν καλῶς, hoc est, quidam ue
ro statim os uentriculi habent affectū, ut cibos auersentur, &
si coacti assumpserint, aut nō retineāt, aut male concoquant.

Quam Romani Meleam.] Cōstātinus Cæsar Meleæ præ Melca.
parationē lib. 18. de agricultura tradit. Est aut lac in feruētes
ollas, quæ iam acetū incalescēdo absorpserint, reconditū aci
dumq; redditū, ut species eius quod oxygala dī, uideri queat.

Condito.] Constantinus Cæsar lib. 8 conditi præparatio Conditū.
nem in hunc modū tradit: πεπέρεως πεπλυμένε καὶ ἐφυγμέ
νη, τριβομένου ἐπιμελῶς γράμματα ἢ μελιτος ἀττικῆς εἶσθ. α.
οἶνε παλῆς καὶ λόνκῃ ξεπας δ'.

Maloplacuntion.] Hoc est placentula ex malis Cotoneis.
Paulus lib. 7. latius exponit.

Sorbitionibus ex oleo.] In Græco codice ἐντὸς male le Castigatur
codex.
gitur pro ἐκ τῆς ἐλαίου. Gemusæus uiciosum reliquit exēplar.

Aloe, masuchæ.] Masucha cōpositio, nō simplex remediū
existit. habes eius descriptionem lib. 7. Pauli expressam.

IN XXXVIII. CAPVT.

CVM tormine intestinorū.] Græca dictio est στρόφου, quæ
Largo tormina intestinorum significat, quanquam & do
lorem stomachi haud absurde interim interpreteris licet.

Exigua caliditate.] In Græco est, ὑποθερμότητος χλιαρᾶς,
quasi dicas caliditate tepida Aetius mediocri dixit.

IN XXXIX. CAPVT.

CHolera est immodica.] Cholera commune stomachi &
intestinorum uitium uideri potest. Nā simul & deiectio,
& uomitus est, præterq; hæc, inflatio, intestina torquentur Bi
lis supra, infraq; erumpit.

Hydromalum.] Hoc est aqua ex malis Cotoneis præpa
rata scripturam eius habet lib. 7. Paul. sumitur autem & per
se potui, & cum micis panis.

Horarios seu fugaces.] Alias exposui qui sint horarii quos
Plin.

Plin uocat temperarios & tempestiuos. Sunt autem hi qui diu offeruari nequeant.

Suum petunculi.] Hoc est suum pedes. Celsus alibi Trunculos nideret nominare suū pedes inter ea q̄ bani sunt succi.

IN XL. CAPVT.

Leuitas
intestino-
rum.

[Enteria.] Celsus ad uerbum interpretatur hāc uocē, leuitatē intestinorū nominans. In hac cibus nō cōtinetur, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus redditur.

Cerata ex myrteo.] In græco legitur κερωτὰ διὰ μυρσίνης pro κερωτὰ διὰ μυρσινίνης quod est, Cerata ex oleo myrteo. Sic etiam Aetius habet.

IN XLI. CAPVT.

ἀπαρά-
τητος.

[Implacabilis desidendi.] græcè erat ἀπαράτητος πτοθυμία πρὸς ἑκκρισιν. Celsus ponit frequens desidendi cupiditas: ἀπαράτητος signat ineuitabilis. Melius sonat hic implacabilis, frequens & assidua est. Quidam τεινέσμον scribingendum putant à uerbo τένω, quod est tendo.

IN XLII. CAPVT.

[Atini tormina.] Celsus lib. 4. ita inquit, Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consuerunt, δυσεντερίαι Græcis uocantur. Vide Galeni librum sextum de locis affectis, Oribasii librum nonum.

Tenesimi mutatione:] Græce est ἀν μεταπτώσεως τήνους μῦ, quasi dicas ad uerbum ex decidentia tenesimi, cum uidelicet Tenesmus in dysenteriam degenerat, transit, mutatur.

Corrigitur
codex
Orosius.

Deinde leuiter subcruenta.] In Græco male habetur οἷα πρὸς γόγον αἵματώδεις pro οἷα πρὸς ὀλίγον αἵματώδεις. Celsus etiam quodam loco interpretatur. Leuiter subcruenta. Orosius & Gemusæus non annotarunt.

Cochlearum integro tostarum.] Græce est κοχλιῶν ὅλων quod sonat cochlearum totarum, quod nostri dicunt, cū toto.

IN XLIII. CAPVT.

Nota.

[Colon.] Hoc intestinum apud Latinos scriptores uaria fortitur nomina, nunc intestinum crassum, nunc plenius, nunc laxius appellatur, Paulus dicit, cū pars sit intestini crassi, hoc est, recti. Nam rectum octo fere digitos longum, statim colon uocatur, quod tenuibus est crassius. A sinistro rene ad dextrum super ventriculi fundum fertur, donec sæpenumero & lienem, & iecur attingat. Quod dicet aliquis quod Paulus contra

contra Galeni sententiam à dextra ilium regione peocedere colon pronunciat. Huic respondet Si à tenuibus intestinis numeremus, per dextra ilia prius superuectum colon ad sinistra prodit. Sin à recto incipiamus, à sinistra parte incipit, in dexte riorem obliquum conuertitur.

Ex cruciatur præsertim sensu.] Græce est ἡ ὀδὺν γίνεται, μάλιτα δὲ κατὰ θέσιν τῆ κώλου τρυπανόδου συναισθήσεως γι νομένης. quod ad uerū sonat. Color oritur, maxime uero iuxta fitū Coli, terebrali (ut sic dicam) sensu excitato. Galenus hāc doloris speciem lib. 2. de locis affectis exponit his uerbis, οἱ δὲ δὲ καὶ ἐμαυτῷ ποτὲ συμβάσαν ὀδύνην σφοδρῶτατην, ὥς τρυ- πάνω δοκεῖν διατιτρεῖσθαι κατὰ τὸ βάθος τῆς κοιλίας. Rursus in eodem capite, τὰ μὲν δὴ τριαὺτα τῶν ἀλγημάτων ὥς ὑπὸ τρυπάνου φαίνεται γινόμενα.

Dolor co-
li qualis.

Brassicæ caule probe polito.] Græce erat κραιμβῆς καυλῷ καλῶς ἐξεμμένα. Orosius intelligit per ἐξεμμένα, cocto, quod ἐξεμμένα potius significasset. Præterea Dioscorides leuiter fer uesfactam, si edatur, aluo idoneam: percoctā uero aluū sistere.

Iubebis ut lauent, incalescantq; laconico.] Ad humorem pituitosum concoquendum consulit naturales balneas, & La conicum. Est autem Laconicū etiam hodie adhuc in usu, te- studo, illa thermarū, quæ igne concalfacta uaporem siccū ex- citat, qui deinde sudorem mouet in corporibus: Columella meminit his uerbis, quotidianam cruditatem laconicis exco- quimus, & exusto sudore sitim quærimus. Græca sunt πυριᾶ- σαι ἐν διαπύροις τόχοις, quasi dicas desudare intra ignitos pa- rietes. Non opns erat ponere ignitos parietes, cum Laconici uox hoc cōprehēdat, sed ut sciolis quibusdā fiat satis, apposui.

Laconicū.

Cucurbitæ quā maximè cū flamma.] Sic interpretatus sum σικύαι ὥς μέγισται διάπυροι, quasi dicas cucurbitæ quā maximè ignitæ. Celsus cū flamma dicit, quem imitatus sum.

Tāquam in crisi, causa.] Paulo pluribus uerbis reddidi hāc sententiam: ὥς περ ἐν κρίσει μετατάσεως τῆς αἰτίας, hoc est ad uerbum, tanquam Crisi causa mutata. Is autem sensus est, Co licus hic morbus tandem ex intestinis materia tanquam per crisin expulsa in alias partes finitus est.

IN XLIIII. CAPVT,

Ileos.] Morbus hic nomē claturam ab ipsa parte affecta, ut Superius, colicus, accepit. Nā tenue intestinum, uti ieiunum etiam

Ileos.

etiam dicitur. Incipit, si ab imo incipias à cæco, & definit in ieiunum, in uarios implicatum orbes. Quidam recentiores morbum nocant Voluulum.

Voluulus.

Colica affectione.] Hoc Paulus superius dixit ubi habet: Inter colicas affectiones hæc est grauissima, quæ in Ileū transitionem mittatur.

IN XLV. CAPVT.

Colicis in dexteriore potius ilium.] Quia per dextra ilia superuectum, uentriculi fundo incumbit lineam & iecur attingens: deinde ad sinistra prodit, si de superiore ipsius initio, cæco intestino, dici intelligas. Nam infra sinistram magis partem occupat.

**κατ' αὐτὸν
καθ' ἑξιν.**

Eiusdē lateris ac è.] Hoc signat græce κατ' αὐτὸν & καθ' ἑξιν si Galeno credimus. Hippocr prior his dictionibus usus est.

Oroscius.

Hoc inspergi potest.] In codice græco perperam scriptū est κατὰ πλάτον, pro κατὰ πάτον. Nam de puluere, nō emplastro mentio est. Aristarchi libenter omiserunt.

**Acroto-
meli.**

Phylli; momēto ex mero & melle.] Hoc est, phylli modico cū mulso. Nam ἀκρατόμελι nihil aliud est, quàm οἶνόμελι. Contrariū est μελίκρατον, quod uidelicet ex aqua & melle confit. In græco erat ευκρατομέλιτος pro ἀκρατομέλιτος.

Iniectione recti syphonis.] Lib. 7. hanc rationem indendi canalīs recti in uesicam habes expositā. Vocant καθετηρισμόν ab instrumento κατετήρης. Solent autem quassationes corporis simul adhiberi, ut calculus facilius excidat.

**Hermo-
laus.**

Ex uino & oleo rosaceo, uel ex aqua & oleo.] Græce est ἐξ οἴνου ῥοδίνου ἢ ὕδατος ῥοδίνου. Quidā de uino rosaceo, & aqua rosaceo intelligunt: male nimirū quia ῥοδινὸν per se oleum rosaceum significat. Hermolaus barbarus in corollario suo, pace illius dixerim, oxyrhodinū interpretatur, acetum rosaceum, pro aceto & oleo rosaceo, ut Galenus, & alii græci accipiunt.

**Deprana-
tum exem-
plar græ-
cum.**

Archigenes in epistola.] Idem refert Aetius sermone undecimo. Ad finem deest particula, in græco habetur enim σικίου σπέρμα κακαθαρμένον ἀριθμῷ λ. cum legendum sit, σικίου ἡμερῶν σπέρματος κακαθαρμένον κόκκους ἀριθμῷ λ. Paulo post, amyli cochlearia duo. Perperam character, qui heminam signat, ac legendum est. Κοχλ. ut sit cochleare. Iterum: σικίου σπέρματος ἢ pro σικίου σπέρματος κόκκους ἢ.

Nonnihil

Nonnihil ex uena laxant] Hoc est ut latius exponit Aetius, ex uena caua propter amplitudinem osculorum remittunt. Interim per circuitus hoc mali repetit. Per initia ægri nihil mali sentiunt, eoq; nihil tentandum. Sin autem perseueret, occurrédū, alias grauissima symptomata solēt prouenire.

Aut lixiuium.] Simplici uerbo dixit Paulus ἡ τὰ κτην, quod antea quoq; annotaui.

Diabetes.] Multa nomina hic affectio habet, uide Galenū Diabetes. de locis affectis lib. 6. Venit à uerbo διαβημι, quod signat, pertranseo. Potus enim quàm primū assumptus est, statim trāsit,

Rosato.] Forte legendum in græco pro ξοσάτῃ υδροροσάτῃ. Nam apud Paulum in septimo nulla est mētio rosati, sed hydororosi, ubi etiam Rodomelon exponit. Nota.

Musculus qui ceruicem.] Musculus hic transuersis constat fibris, uariaq; habet officia. Primum quidem uesicam claudit, licet sine illo claudi possit, Deinde post emissionem urinæ contractus undiquaq; id quod in meatu est propellit. Præterea quicquid in exprimente in urinarium meatum incidit, id ne diutius immoretur ibi efficit, sicut cūm urina mordax est. Ex anatome cōstāt

Resolutionem repræsentat.] Græce est παραλύσεως ἔμφασιν ἐργάζεται, quasi dicas, resolutionis emplasm efficit. ἔμφασις autem est repræsentatio rei cuiusdam, aut adumbratio.

In succum quidem conuersa.] Hoc est in chylum medici dicunt, & ut latinam dictionem per græcam interpreter. Habet autem Paulus χυλοποιηθέντα, quod est in succum seu chylum redacta beneficio uentriculi. Simile uerbum Gale. lib. 8. de compositione medicamentorum secūdum locos habet, ut antea quoq; annotaui: nempe χύματα quasi dicas exuccata, sed hoc plus signat, chilum scilicet à iecinore attractum ita ut liquidior pars sit distributa, siccior ueluti recremētum relicta. Dicimus itaq, Chilū ἐκ χύματος cum & uentriculus probè concoxerit, & iecur attraxerit, ubi uero ille quidem concoxerit, iecur autem attrahendi uim habeat infirmam, ἀνεκχύματα & liquida excernuntur. χυλοποιηθέντα.

Bilis insigniter colorata.] Hoc est bilis colore suo abunde exaturata per aluum descendens uel deiectio meræ bilis. Nā Gale. apud Hippocratem interpretatur κατακόρεα, τὰ ἀκρατοχολῇ διαχωρήματα. κατακόρεα.

Quādo iecoris substātia.] Græce est ἡ δὲ δὲ καὶ τῆς ἐστίας ρῆς.

PAULI AEGIN.

Ee αὐτῇ

αὐτῇ συντηκομένης τῆ ἥπατος, quod ad uerbum sonat. Iā uerò etiam iocinoris substantia cum ea colliquefcente: Cū ea, intellige bile. Nam ubi humor fermè consumptus est, corpus ipsum contabescit cuiuscunq; partis:

Flāmeus ardor] Sic fere ubiq; sum interpretatus dictio-
φλόγωσις nē φλόγωσιν. Inflammationē uerò φλεγμονήν, secutus Cellsum.

Chamæpyteos radicis] Paulus apud Galepū & Alexandrum medicū uariat Nam Chamæpyteos drachmæ octo ponuntur. Verum Aetius cum Paulo consentit.

Troximū. Adhæc intybum, troximum, & sonchus.] Troximum hoc est, eris per se esui aptum significat. Sereos autem genera tam hepatis affectibus cōueniunt, ut etiam cruda comedi possint.

Exemplar In qbus calor intenditur.] In codice græco habet, τὰ τοῖς
græcum uic
ciosum, τερμοῖς ἢ τὰ τῆς θερμότητος. Basiliē. corrector hoc nō castigauit.

Corruda.] Græce est μνάκινθα, quæ latinis Corruda dicitur, hoc est asparagus syluestris.

Illud aut in summa præcipiendū] Hoc Galeus lib. 8 de cōpositione medicamentorū secūdū locos cōmemorat. iecur & stomachum semper astringētia cum relaxātibus requirere. Aliàs sæpe stomachicis syncope iocinorosis interius suscitāt.

Copton] Sic dicitur medicamentū quod tunditur. Est aut malagma lib. 7. ad duriciem stomachi & iocinoris inscriptū.

IN XLVII. CAPVT.

Cottabismus.

Cottabismi.] Cottabismus olim ludus apud Græcos erat, quo uinū ex alto fundebāt, strepitū faciētes Hic aut possit accipi pro superfusione in partē aliquā, aut pro ruboris excitatione quo sanguis in exteriora eliciatur, hæc dū meliora occurrūt, boni consule

IN XLVIII. CAPVT.

VT corpus albido, & pituitæ colore.] Græce est, ὡς λευκὸν καὶ φλεγματῶδες τὸ σῶμα φαίνεται ad uerbū sonāt hæc, ut album & pituitosum corpus appareat. Dicit aut de externo colore apparente. Eoq; albido & pituitoso colore uertendum erat, quanquam parum refert dicere, album & pituitosum apparet, mortuus instar. Ex nono Oribasij sumpta sunt.

Codex græcus uitiosus.

Coqui autem possit etiam in aqua.] Perperam in codice, græco legitur ὕδασι pro ὕδατι. Cæterum πινωμένοις de futuro intelligendum est.

φαιμμομός quid.

Ad hæc in arena cōtecti desudent.] Sic interpretatus sum φαιμμομόν. Solēt aut hydropici in arena à sole ex calfacta sepeliri

peliri capite excepto, ut humiditas meatib⁹ apertis extrahat.

Quia si cum febris aqua subter cutem.] Si duo uno tem-
pore uicia infestent, uehementiori insistendum, altero nō ne-
glecto, quod Paulus per uerbum τὸ κατεπαγον signat.

τὸ κατε-
παγον qd^r
urget.

Corpus emaciant, colliquantq; releganda. Quidam nasu-
tus propter malè impressum codicem latinum hic me corri-
gendum censuit, q^d liber habuerit eligenda. Quasi uero nescie-
rim quid sit περιαιρετέον. Gemusæo Luteriæ indicant legen-
dum releganda pro eligenda.

περιαιρε-
τέον.
Calūnia.
παρακέν-
τησις.

Ad perforationem ueniendum.] Græcè uocatur hæc chi-
rurgiæ administratio παρακέντησις, hoc est pertusio & pūctio.
Nam cos qui ascate laborant, ad peritonæum usq; imo in uē-
tre diuidunt, sicut lib 6. de hydropicis comprehensum est.

IN XLIX. CAPVT.

CVM lien melancholicum.] Galenus lib. 9. de cōpositione
medicamentorū fecundū locos. Oribasius lib. 9. & Aetius
10 sermone de liene in eandem ferè sententiam tradiderūt.

Centaurij] Male habet codex græcus ταυρίου pro κεν-
ταυρίου, nec tamen hoc castigator Basiliensis.

Ceræ libra, terebinthinæ.] Græcus codex habet κηρίων τε-
ρεβινθίνης, pro κήρυ λίτρα. α. τερεβινθίνης λίτρα. α. Oroscius
cum Basiliensi hoc neglexit.

Cinis ex officina fabrilii.] Cinis hic est, quem ferrū dum
in officinis fabrilibus ignitur, ac malleo tunditur, abijcit. Ver-
ba græca hæc sunt, καὶ ἡ τέφρα τῶν χαλκείων, ubi Oroscius in-
terpretum censor, pro χαλκείων legendum putat κοχλειῶν. At
Gal. lib. 9. iam citato, primum aquam in qua ferrum ignitum
sæpius extinctum sit, potui lienosis præbet. Paulo post Cata-
plasma ex cinere fabrilis officinæ obducendum exhibet, hoc
pacto inquiring, καὶ ἡ τέφρα ἐκ τῆ χαλκείου μετ' ὕδατος.

τέφρα
χαλκείων.
Oroscij
error.

Acetabulū cum oxymelito.] Lectio codicis græci depraua-
ta est: habet enim ξύβαφον πάντα ἢ ὄξυμέλιτος, ἀναγαλλί-
δος, pro ὄξυβαφον μετὰ ὄξυμέλιτος, ἢ ἀναγάλλιδος.

IN L. CAPVT.

SI enim febricitante ægro.] Græca sonant, εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ
πυρεκτικῇ νόσῳ ἀθρόως γέγονω δ' ἵκτερος ἀποπάυσιν τὸν πυρε-
τὸν, hoc est ad uerbū. Si. n. post febrile morbū subito ortus ar-
quatus febrim finierit. Vide nonū Oribasij, & decimū Aetii.

E e

2

Si absq;

Excremen-
ta alba.

Si absq; febris alba deiciantur.] Alba quia bilis in meatibus obstructa ad intestina non potuit descendere, quæ excrementa tingeret.

χρυσάτ-
τικόν γλυ-
κόν.

Seminis aut atriplicis scrupuli octo cum Chrysattico, aut alio passo.] In græco exemplari habetur, μετὰ χρυσάττικόν ἢ ἄλλον γλυκέως. Aetius meminit passi Chrysattici. Alexander item sæpius citat, dicitur esse coloris aurei. Scribit Dioscorides atriplicis semen cum mulsâ Ictericis conuenire.

IN LI. CAPVT.

ἐξόμφα-
λον.

Causam umbelici prominentis.] Hoc uitium uno uocabulo Paulus uocat lib: 7. ἐξόμφαλον, quod uidelicet aut rupto in ea parte peritonæo, prolapsq; aut omento, aut intestino, interim ocioso humore umbilicum subeunte: interim carne subnata, alias sanguine ob uenæ, aut arteriæ rupturam concreto alias spiritu indiderim collecto, generatur. Celsus etiam caput facit de umbilico prominente.

ἐρεγμός

Fabæ fresæ corticum.] In græco est ἐρεγμὸς λεπύρων. Significat autem ἐρεγμός fabam fresam seu fractam. Dicitur autem etiam de aliis legum. nibus confractis, nomine ipsorum appositio. Quâquam hic possit simpliciter de faba dici καταχρηστικῶς, ut sit fabæ corticum. tu utrum malis sequere.

IN LII. CAPVT.

ἐνίσκοι.

A Sellorum domesticorum qui tacti conduplicant se in orbem Sic interpretatus sum ex Largo ἐνίσκων κατοικιδίων τῶν σφαιρουμένων. Ipse autem addit in pilæ rotundissimæ similem. Cæterum uaria habent nomina, πολυπόδες enim græcis κουβαρίδες Dioscoridi κύαμοι Galeno appellatur. Nascuntur sub aquariis uasis ut ait Archigenas: imo etiam omnibus locis humidioribus.

ἄσβετος,
κονία.
κονία ἄσ-
βέτου.

Calcis uiuæ partibus duabus.] In græco est ἄσβετου κονίας. Nam ἄσβετος κονία. In extinctam calcē significat. Si autem κονία ἀσφύτου ponatur, pro Lixiuio calcis accipiendum est.

IN LIII. CAPVT.

Nota.

Qua frigida perfruso.] Græce est προκατατλήσας ὕδατι ψυχρῷ. ante hoc προανατρίψας habetur, uidetur legēdum προανατρίψας, ut scilicet prius intro reprimatur. Nā quid confert prius intestinum conficere, quod προανατρίβειν signat, nolui tamen immutare, quod non haberem quem sequeretur.

Amolyn-
to.

Medicamento tam spisso.] Sic uerti ἀμολύντω χρῶ. Signat autem

autem ἀμόλυντον non nominans à uerbo μόλυνω Coquuntur
medicamenta nunc, ut liquida permaneant, nunc ut dura sint.
Liquida immirtentis digitos inquinant. dura ac spissa non
item. Est itaq; ἀμόλυντος spissitudo qua digiti, aut manus nō
inquinantur, quanquam Orosius uerterit, postquam ex co-
ctura recrementa iam separata fuerint.

Erratum
Orosij.

IN LIIII. CAPVT.

Tenuissimæ parti.] Sic fere ubiq; πατάρων sum interpre-
tatus: aliquando pollinem, quod Orosius reprehendit,
mihi uero placet, cū alios et doctissimos ita uertisse uideam.

Error Oro-
scij.

Aphthæ ulcere pressos ὀφθαλμούς in græc o habetur, quid
sit ὀφθμ alibi exposuimus.

ὀφθμ
τες.

IN LVII. CAPVT.

Riapismus.] Galenus ad uerbum lib. 10. hæc habet: Vbi
male ī codice græco ἐνέματων legitur pro ἐμμοτων, quod
miror correctorem Basiliensem non aduertisse.

Nymphæam igitur.] Vulgo nenupharim appellāt insigni
refrigeratoria ui præditā. Duplex est eius species: de qua alias.

IN LVIII. CAPVT.

De particulis inefficacibus.] Hoc loco particulas intelli-
go, eas corporis partes, quæ generationi dicatæ sunt. Bar-
bari caput faciunt de frigidis & maleficiatis.

Particulæ.

Priuatim stellio cōcrematus.] Hoc ex Oribasio sumptum
est. Aetius sermone. 1. 1. mentionē facit, aliorumq; cōplurium.

Satyriace.] Hoc est medicamentum, quod penem erigat,
à satyris dictum, qui naturalibus arrectis depinguntur.

Saryri.

IN LIX. CAPVT.

Sin etiam altè descenderint.] In græco est εἰ δὲ καὶ βάθος
αὐτοῖς τι συνέλιν, hoc est: Sin autem profunditas etiam que-
dam ipsis adfuerit.

Iuuat resina fricta.] Hoc est, sicca & retorrída. Duplex, re-
sinæ species est, sicca & liquida. Sicca præparatur, ut Dioscori
des memoriæ prodidit. Liquida utribus conditur, quanquam
idem autor ex iisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi
liquidas autumnat. Sicca græcis φρυκτὴ nominatur, liquida
ἢ ἐκ τῶν κεράμων ὑγρὰ, hoc est si ad uerbum exponas, retorri-
de, & ex utribus, seu dolijs liquida.

Resina.

Puluis inspergitur parti uino prius.] Hoc est, ista in pulue-
rem redacta. Textus græcus deinde sequens deprauatus est,

φρυκτὴ.

Ec 3 habes

habet enim προαπονίπτων ἀπίω, ἢ προαπονίπτων δίνω, ut ego cōverti. Nec Orosius nec Basiliensis calligator animadvertit.

Triginta numero.] Viciosus est codex græcus, ut qui habeat < & hoc est drachmam unam pro λ quod signat triginta, facili nimirū lapsu. Galenus & Oribasius unde Paulus sumpsit, lectionem hanc confirmant.

Hemor-
rhoidum
differen-
tia.

τυφλῆ.

Situs he-
morrhoi-

ἀπίσι-
τος.

Oris uenarum quæ quod,] Ita simplicem dictionē græcā αἱμορροΐδες sum interpretatus. Sunt autem uenulæ quædam recti intestini, ore hiantes, eo quod statō tempore sanguinē crassum feculentumq; excernunt, hæmorrhoides appellatæ: cum autem aperto non sint mihiq; excernūt, sed tumidæ apparent, sanguine in eis suppresso, τυφλῆ græcis, Cæcæ, quasi foramen nullum habentes, latinis uocantur. Differunt autem situ & origine, si Galeno in Anatomicis fidem accommodamus, aliæ liquidem in recto intestino, aliæ in ano, aliæ in circulari musculo aluum constringente qui σφιγκτήρ appellatur, consistunt. Atq; hoc est quod Paulus dicit, quædam superius delitescunt, non apparentes, ob loci longinquitatem.

Quantum ad originem attinet, aliæ uidentur ex ramis uenæ portæ, qui omento, lieni, uentriculo communes sunt, propagari: aliæ ex caua uenæ diuaticatu in crura facto, ubi grandis arteria cauam uenam conscendit. Hæ itaq; uel ex porta, uel ex caua ortæ nunc iusto largius profluūt, nunc supprimuntur, quando remedia adhibere conuenit. Sin autem mediocriter fluant corpus multis morbis liberant.

Infeliciter contabescere] Sic reddidi τὸν ὥς ἀποσίτες γίνεσθαι. Abusus est Paulus uerbo ἀποσίτες pro ἀσίτοις, hoc est: ἀτρέφες γίνεσθαι, qđ signat, cibū nō sentire, contabescere.

Quare cum plures sint hæmorrhoides] Ex Hippocrate sumptum est apho, lib 6. ubi habet, αἱμορροΐδας ἰκθύντι χροίας, ἢν μὴ μία διαφυλαχθῇ κίνδυνος ὑδρωπάς ἐπιγενέσθαι ἢ φάσιν. Miror cur Aetius à Galeni sententia, aliorumq; fere omnium græcorum discesserit, nullam esse relinquendā cēsens.

Quædam uero superius] Hoc est, quædam in recto intestino habentur: quæ superiorem locum occupant, quam quæ in ano, & circulari musculo apparent.

Cæcæ autem.] Hoc est cum apertæ uenæ, dolorem movent, copia humoris melancholici grauatur.

Cretæ sutoriæ, aluminis rotūdi singulorū.] In græco codice deest

ce deest ἀνά, & τρογγύλης per se signat alumen rotundū, sicut σχιτὴ scissile. Aliqui tamē pro μελανθηρία, legunt τυπθηρία.

Recremēti plumbi rus syriaci singulorum drachmæ.] In vulgari codicibus græcis habetur uncia octo. Verū Galenus & Oribasius habēt drach octo, quod nō annotauit Oroscius.

IN LX. CAPVT.

Circa statum menstruale tempus.] Græci uocāt certum, præfinitumq; tempus προθεσμίαν, uel προθεσμίαν τακτὴν & προμερίαν ut Budæus etiam annotauit.

προθεσ-
μία.

Detrahetur autem sanguinis.] Hodie sumus timidiore quam ut libram integram una uice detrahamus, tantū abest, ut libras duas & dimidiam auferamus.

Est autē pressus.] Descriptio pessarii. In græco codice autē superfluum est ἦτοι, uel in hunc modum legi debet: πεσσοῦς δ' ἐστὶν ἐριον διεξασμένον ἦτοι καὶ σφαιρωθὲν. Aliqui legēdum putant ἦτοι καὶ, hoc est, uel aliquid.

Amus, sion] Malè in exemplari græco impresso σίνων habetur, pro σίων aut σίσον utraq; uim semina prouocandi mentes obrinēt. Paulo post κερκίδες pro κεδρίδες substitutum est.

IN LXII. CAPVT.

OB legitimum partū.] Hoc est, absolutum, perfectumq;. Nam postea dicit, uel ob abortum, illegitimū scilicet partum profluuia accidere. Verum quæ ex naturali partu fiunt, sua sponte plurimum cessant. Erat in græco ἐπὶ τελείαις ἀποτέξεσιν, quod Oroscius noster uertendum censuit. In fine partus, quàm eruditè, uel mediocriter literatus indicare poterit.

ἀπότεξις
τέλεια.
Erratum
Oroscij.

Vel cōbustæ ipsius cinis.] Lege in cod. græco pro κενυμένῳ, κεσμένῳ αὐτῇ ἢ σποδία, qđ castigatores omiserunt. Paulo post κηκίδα βράβυ ἦ, tu fac κηκίδος βραχὴ. Quod ēt annotauit Oros. ex suo exemplari.

IN LXIII. CAPVT.

Vntio ex melle.] Sic Gale. libello de prænoscendo præcipit in uxore Boethi, Romanorū cōsulit. Ita fere sonāt uerba ipsius: ἐνόησα τὸν σκοπὸν τῆς διαίτης ποιῆσθαι, διὰ τε πόματος ἐλαχίστου καὶ τρίψεως ὅλης τοῦ σώματος, ἐπὶ τε χρίσεως οὐτω σκδυαζομένης, ἐδὶαπίττητε καὶ ῥητίνης, ἀλλὰ διὰ μέλιτος μόνου μεχρὶ πλείονος μὲν ἐψηθέντος, hoc est ut rudiores intelligāt: Cōsideraui scopū intētionēq; uictus instituire ex potione paucissima, ex totius corporis frictione, & ppea unctione ita pparata, nō ex pice, & resina, sed ex melle solo diuti⁹ incocto.

Ee 4 Quercus

Corrigitur
codex Oro-
scius.

Quercus liber.] In græco codice habetur δρυὸς τὰ ὑπὸ τῶ φλοιῷ τὴ πρέμνι τὸ ὑμενῶδες. Galenus ita legit, δρυὸς τὰ ἐν τῶ φλοιῷ τὴ πρέμνι τὸ ὑμενῶδες. Dioscorides, τὸ μεταξὺ τῶ φλοιῷ καὶ τῶ πρέμνι ὑμενοειδές. In Paulo igitur legendum cenfeo: δρυὸς τὸ ὑπὸ τῶ φλοιῷ τὴ πρέμνι ὑμενῶδες. Quod Orosius neglexit, & castigator Basilienfis.

IN LXIII. CAPVT.

Tendo me-
dius inter
neruum &
ligamen-
tum.

DE inflammatione uteri.] In ipso titulo græcum exēplar deprauatum est. Habet enim παρεγκλίσεως pro παρεγκλι-
σεως, quod etiam Aristarchi omiserunt.

πίλημα.
Error
Orosij.

Dolor capitis, tendinis.] Hic nimirum intelligit tēdinem in utraq; capitis parte situm, corpus tenue, ac fibrosum, quod excrecentiam uermicularem ad particulas natibus cerebri, utrinq; adiacentes, illigat, ne errabunda uagetur, uel neruos in sincipite intelligunt.

Per hapsum.] Sic reddidi πίλημα contra Orosij opinionem. At Celsus libro septimo ita inquit: Tum multo is oleo perungendus, inducendusq; hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus, &c. Quid sibi uelit uelamē Orosij, nemo facile intellexerit. Ex lexico suo ita exponendum censuit.

IN LXV. CAPVT.

Orosius. PRæterea uero inordinatæ.] Orosius græcum codicem deprauatū dicit, legendūq; putat πυρετοὶ δὲ ἀτακτοὶ μετὰ φθίκης ἐν ταῖς ἐπισημοσίαις γίνονται, hoc est: Febres autem inordinatæ cum horrore in accessionibus sunt, &c. At ἐπιση-
μασίαι, per se febriū accessiones significant: nisi forte inflam-
mationum accessiones, aut in pure generādo intentiones na-
turæ intelligere uelimus. Tunc enim, ut ait Hippocrates, do-
lores ac febres accidunt magis quàm in iam confecto. Vtram-
tu malis, sequere lectionem. Certe omnia antiqua exempla-
ria quæ mihi uidere contigit, impressi codicis uerba habent.

ἐπισημα-
σία.

Aut candidum oleum.] In græco est λευκασμένον ἔλαιον hoc est, dealbatum oleum. Quomodo oleum fiat candidum, ex Dioscoride condiscas.

IN LXVII. CAPVT.

εἰδεχθεῖς. TURPem humorū colluuiē.] Græce est εἰδεχθεῖς, hoc est, turpem aspectu, qualis in Elephanticorū facie aliisq; par-
tibus uideri solet. Vñus est eo uocabulo lib. 4. in hac snia. Ha-
bet. n. εἰδεχθεῖς τὸν δὲ πῶς μόνον τὸ πρόσκειπον. Hoc est: Faciem
autem

autem solam aspectu quodāmodo terrā hortidā & deformē.

Amurca] Hoc sedimentum in æneo uase ad mellis spissitudinem decoqui solet. Interim torrei in duriciem, seu puluerem. Ac postea etiam aliis liquidis commisceri.

IN LXVIII. CAPVT.

Elleborismus.] Paulus lib. 7. aliquot rationes tradit ueratri exhibendi. Tu inde colligito.

Metasyncritidem.] Superius exposui, quid sibi uelit μετασυγκριτικόν, quod alii male recorporatum interpretatur, nisi forte intelligas noxium humorē euocando restauraticium.

IN LXIX. CAPVT.

Sanguinis uero eruptionem.] Cū mola scilicet in utero affligit, ita curabimus, ut sanguinis profluuium, quod in immoderata purgatione ex abortu potissimum accidit. Item sicut muliebrem fluxum, de quo supra quoq; est comprehensum Basilienensis corrector dictionem unam expunxit superfluā esse ratus. Nam legit. τὰς δὲ αἰμορρογίας ὥς περ καὶ τὸν ῥῆν. Ego ex ipso sensu & exemplari ueteri legendum censeo: τὰς δὲ αἰμορρογίας, ὥς περ τὰς αἰμορρογίας καὶ τὸν ῥῆν. Primum αἰμορρογίας refertur ad id quod Paulus ante in eodem capite dixit: τισὶ δὲ καὶ αἷμα φέρεται, hoc est quibusdam uero etiam sanguis effertur. Secundum αἰμορρογίας ad caput de immoderata purgatione ubi habet: συνεχῶς δὲ καὶ ἐπὶ ἀμβλώσειν ἰσχυρῶς αἰμορρογῶσιν.

IN LXXII. CAPVT.

Ve interaneum id.] In græco codice est οἱ κατέχουσιν τὸ σπλάγχνον, quod est, quæ continent uiscus. Appellat uterum, uiscus. Ego dixi interna eum, nam cor iecur, cerebrum pulmo, lien proprie uiscera appellantur.

σπλάγχ-
νον.

Interaneū.

Quidam uero & totam uuluā.] Paulus negat totam uuluum posse procidere. At nostris temporibus in una & altera totam procidere extra sinum uidimus, ex cornibus tantum & quibusdam adhuc ligamētis suspensam, cuius rei etiam hodie testimonium adferre possumus.

Vulua pro-
cidit.

Vaporibus & suffimentis uaporum.] Verba græca ita habent, ὑπατμισμοῖς καὶ θυμιάμασι, quasi dicas subuaporationibus & suffimentis.

ὑπατμισ-
μοῖς.

θυμιάμα

IN LXXV. CAPVT.

In uulue ostio.] Rimæ, aut fissæ uocantur latinis, quæ apud græcos σχισμαί, et si nonnulli τομίδας ita nomenent. Cel-
sus libro

σχισμαί.

sus libro sexto rhagadia appellat.

Subliuida & feculenta.] Codex græcus impressus aliiq; nonnulli scripti manu habent: *εποπέλιοι και τραγγώδη*, pro *υποπέλιον και τραγγώδη*, ita etiam legēdum putat Orosius. Gemusæus autem non aduertit.

μύδιον.
Volfella.

Volfella præhēsas.] Græce sonat *μυδία διακρατήσαντας*. Est autem *μύδιον*, ferramētū quo aliquidprehendimus, quod Celsus Volfellam nominat: Neq; quicquam, inquit, cōmodius est qnām uolfella prehēdere, sub eaq; quod uolumus excidere. Græcus quidā autor anonymus ait: *ait τὸς δὲ κεχαλασμένας ταφυλάς ἀέτρωσ ἐκτέμνομεν μυδία λαβόμενοι*, hoc est: *Vuas aut immodice relaxatas uolfella phēsas excindim⁹.*

IN LXXVII. CAPVT.

σφαίρωμα.

A Gibba natium regione.] Græce legitur *ὁ δὲ πόνος αὐτοῖς ἀπὸ τῶν κατὰ σφαίρωμα και τὸν βεβῶνα τόπων*. Ad uerbum sonat: *Dolor autem ipsis ex locis iuxta sphæroma, & bubonem, &c.* Quæ iam pars sit *σφαίρωμα*, audi. Autor quidam græcus anonymus ita scriptum reliquit: *ἀλλοι δὲ ἢ ὅσους εἰς τὸ ἱερον ὄφθιν. πᾶρ ὁκάτερα δὲ τέττον τὰ ἰσχία ἐντὶ, ἐφ' οἷς οἱ γλῆτοι διὰ τὸ ὁτᾶ εἶναι ὑποκειμένα μέγιστα εἶδεν ὑπεστρώθην αὐτοῖς σώματα σαρκώδη, τὰ κυρτώματα ἐκτὶ περιφερῆ εἶναι, σφαίρωματα πρῶτα γορεύεται*. Hoc est ad uerbū. Definūt autem lumbi in os sacrum. Vtraq; huius parte coxæ sunt super quas nates eo quod ossa subiecta sint maxima. Hinc carnosa corpora ipsis substriata sunt, quorum gibba, inde quod rotūda sint, *σφαίρωματα*, quasi orbiculata appellantur.

Orosius.

In quibusdā & uomitus à radiculis.] Ita ferè semper Celsus intermittatur, *εμετος ἀπὸ ραφαλιδων* intelligit autem raphabum. Vide septimum librū, ubi de uomēdi modis præcipit. Lixiuio.] Sic græcis *κονία*, aut *κονία* *τακτη* uertimus. Male Orosius hic *κονία* *πρωτοτάκτην* lixiuium uertit cinerē, qui primus destillauerit, cum *πρωτοτάκτη* sit lixiuiū quod cinere & calce adiecta sit, apud Paulum in septimo.

IN LXXVIII. CAPVT.

N On sola particulatū.] Vide Galenū lib. 10. de cōpo. medi camētorū fm locos Oribasij nonū, & duodecimū Aetij.

Et cum absunt.] Deest in græco codice particula *και*, ut sit *και χωρὶς*. Vult itaq; Paul ut lauēt & cū defluxiones adsunt, & c ū nō adsunt, Orosius & Basiliensis corrector omiserunt.

Statim

Statim igitur cum quis morbum primum experiri ceperit, sanguinis missio erit tentanda. Nam quas iam fluxio frequenter infestari, ij plus.] Pauli sententia est, ut quāprimum quis fluxione ceperit infestari, mittendū sanguinem curet. Vbi autem iam saepe eadē fuerit conflictatus, prācipue in frigidioribus natura, & imbecilibus. Nescio quid Orosio in mētem uenerit, legenti ὡς εἶγε φθάσαντες ἡδὴ πολλάκις ῥέματα θῆναι, βλάπτονται, &c. Cum & ratio, & uera sententia in hunc modum habeat ὡς οἶγε φθάσαντες ἡδὴ πολλάκις ῥέματα θῆναι, βλάπτονται, &c. Nō sum ignarus Aetium ferē cū superiori sententia conuenire, ubi habet: Quare necessaria maxime est sanguinis, ac reliquorum humorum in fluxionibus sanguineis, detractio, prācipue in ijs qui sanguine redundant, ac reliquis humorum recrementis. In his enim antequā dolores oboriantur, uenam secare oportet, bis in anno, &c. At Paulus de iis mentionem facit, qui iam ex sanguineo temperamento, ad pituitosam inclinant temporis processu, naturaq; frigidiores, ac imbecilli sunt, quā duo sanguinis missionē recusāt.

Orosius.

Anxietatem, & cibi fastidium.] ἀσώδης καὶ ἀνορέκτης, hoc est, anxios & inappetentes. ἄσθι quid sit, antea sum interpretatus. Aliqui nauseabundos hic exponunt.

Nec miraculum est si materies.] Hoc est humor pituitosus per se frigidus; ubi accensus, inflammatusq; fuerit temporis spacio, ut uiridia ligna, aestuat, incandescitq;, & si bilem habuerit admistam, tanto facilius accenditur. Eoq; dicit, ut bilis admistionem omittam.

Bulbi per se: uel cum polentæ polline ad ruborem usque suffricti.] Orosius legit ἕως συμμίζεως, hoc est, ad cōmitionem usq;, idq; ex suo antiquo exemplari cui plus credit, quā rationi & ueritati. Nō enim ad commistionem usq; sunt infricandi bulbi, sed ἕως ἀμύξεως, quod est ad ruborem usq; in cute excitatum, unde tumor relictus discutiatur.

Orosius

IN LXXIX. CAPVT.

O Lei lentiscini.] Deest in codice impresso τὸ αὐταρκές, qđ Orosius prae nimia diligentia præterit:

Minii.] Sic uerti μίλτης, Celsum imitatus qui μίλτον συνοπικὴν reddit minium Synopicum. Manardus reprehendit Barbarum, quod μίλτον exposuerit minium, & non potius rubricam.

Calcis

Orosius.
μοτοί.
Emmoton.

Calcis uiuidæ.] Hoc est, calcis non extinctæ, Verba duo græca idem significant. ἀσβετος, & ζώον. Sed primum calcem uiuam per se positum signat, dū dictione ζώον, calcē tantum, Emmoton.] Hoc est, medicamentum, quod linamentis filatim conceptis excipitur. Nam μοτοί linamenta græcis appellantur, quibus oræ uulnerum obturari solent.

IN LXXX. CAPVT.

Clauis.] Celsus inquit: Clauus autem nonnunquā quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, dolo-remq; etiam, si non alias tamen ingredienti mouet.

Syringiacus puluis.] Hoc est puluis qui fistularum callis exte- rendis conuenit. Dixit græce Paulus συριγγιακὸν ξηρὸν quasi syringiacum aridum.


IN LXXXI. CAPVT.

IN græco codice habetur συμμάτων, quasi dicas spissamenti- torum. Orosius σύμμεως legendum ex ueteri exēplari pu- tat. Mihi autem uidetur δέρον, quod est, lupinorum, ut supe- rius etiam habetur. Nam de coctione metallorum, præsertim sty-mmeos in hac re nihil apud bonos autores habetur.

Ne manus inquinent.] Hoc est, tam scissa duraq; fiant, ut digitos iniectiones non inquinent, ea enim est emplastrorum crassities. Græci eam ἀμόλυντον appellant, ut superius anno- taui. Hic disiuncto uerbo dixit Paulus, μὴ μολυνέτω. Atq; hæc contra opinionem Orosii, qui in hoc ipso uerbo reprehendendum me censuit.

FINIS LIBRI TERTII

COMMENTARIORVM.



COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER QVARTVS.

CAPVT I.



LEPHANTIA, Morbus hic Græ-
ca tantum habet nomina, uocaturq; Elephan-
tia, ἑλεφας, ἑλεφαντίασις, ἑλεφαντία, A
quibusdam λεοντίασις, aut σατυρία-
σις. primam ab elephāto, aliam à leo-
ne, & satyris nomēclaturam accepit.
Est autem is nimirum, qui uulgo di-
citur lepra Græcorū enim lepra cu-
tis tm asperitudo est. Iā barbari ele-

phasim uocant pedum tumorem quendam, qui febribus su-
peruenire solet, ne te fallat interim nominum diuersitas.

Extrema decidūt.] Hoc est digiti pedū manuūq; auricula-
rū summa, pili, nasus, sed hæc posterius. Istā speciē efficit atra-
bilis ex flaua supra modū naturæ adusta, quæ ideo perniciofa
esse uidetur Galeno. qđ uehemēter crudat, & terrā fermēte.

Neq; tamē eminētia tuberosæ.] Sic reddidi *μῆτε μὴν ὀχ-*
θας Sunt. n. ὀχθοι tumores uerrucosi, tuberosiq; in elephāticis
apparētes. Vnde ὀχθῶς ἐλκη ulcere dicūtur p̄tumidis labris.

Sola capitis adustione.] Vide lib. 6. ubi habes expositum,
quomodo ferramento quinq; excitant crustas in elephanti-
cis. Est autem eap. 2.

Nunc saltu, nunc magis alteribus.] Miror hic Oroscium
nihil uel ex antiquo suo exemplari, uel ingenioso cerebro at-
tulisse, cū & codex Græcus ip̄pressus sit uiciosus, & multi hoc in
loco

Oroscius.

loco impegerint. Primum enim habetur in Græco, τὰ μὲν ἀφ' αλλόθεν, τὰ δὲ πλέων ἀλκῆσι cum legendū sit τὰ μὲν ἀφ' αλλόθεν, τὰ δὲ πλέον ἀλκῆσι. quod etiam antea in meis annotationibus monuerā. Quia igitur Paulus ualidæ exerceri uult elephanticos, præcipit illis saltū, alteres & follis usum.

Halteres.

Sunt autem alteres massæ quædam graues, uel ex lapidibus, uel metallis, quales hodie in librandis rebus adhibentur. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda inquit πολὺ δὲ δὴ μάλλον εἴ τι βάρος ταῖς χερσὶν ἀκροῖς περιλαβὼν ἑκατέρω κατὰ μόνους οἴα- περ οἱ κατὰ παλάτρου εἰσὶν ἀλκῆσι, ἀτρεῖμας ἔχει προσένας, ἢ ἀνατένας αὐτάς, hoc est: Multo autem magis fiet si quodā pondere summis manibus prehensio utraq; seorsum (qualia sunt quæ in palæstra alteres dicuntur) protensis, aut iursum elatis ipsis in eodem consistat habitu. Item eodē in libro exercitii modū præscribit in hunc modū ἐνιοι μὲν καταθέντες ἀλ- τῆρας ἐν τῷ πρόδην διεσπῶτας ἀλλήλων ὠρύβην, εἴτα ἐν μέσῳ ἴσταντες αὐτῶν αἰρῶνται προκίποντες τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ, τὸν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τῇ δὲ ἀριστερᾷ τῶν ἐν τοῖς δεξιῷ, καὶ αὐτοὶ ἑκά- τερον εἰς τὴν οἰκίαν κατατίθενται χώραν. Ex his satis liquet,

Alteres.

quid alteres apud Martiale, & alios ueteres scriptores fuerint. At litera una addita ἀλκῆσι, dicti, nō sunt massæ quædā, sed adminicula, quibus in saltu innitimur: quales sunt cuspides, hastæ, arūdines: Galenus horū quoq; mentionē facit libro iam citato, in hanc snām: καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ τῶν χειρῶν ἐνεστὶν ὅξυ γυμνάσιον ὁμιόροπον γυμνάσασθαι χωρὶς τῆς κατέχειν ἀλκῆ- ρας, &c. Hæc exercitia supernis partibus ualēt, lūbis & obliq; spinæ regionibus. Basilienſis castigatō reliq; locū deprauatū.

[Insuper melissæ herbæ.] Quæ herba ita uocetur nōdum apud idoneos authores comperi nec castigatores locum cor- rigunt. Aetius eam docet Milesiam herbam Sermone 13.

[Conferunt etiam si bibantur.] Quia meatus uiscerum ui quadam peculiari adaperiunt, & alium etiam mouent com- primendo ea quæ intestinis inhærent.

**Ἐφιδρω-
τήρια.**

Eandem habet efficaciam.] Interpretatus sum Ἐφιδρωτή- ρια, quæ defudationes mouent. Sudor autem Celſo authore duobus modis elicitur aut sicco calore, aut balneo. Siccus ca- lor est & harenæ calidæ, & Laconici, & Clibani, & quarundā naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus uapor, ædificio includitur, sicut super Baias in Murtetis habemus.

IN

IN II. CAPVT.

VTerq; affectus.] Non de lepra uulgari hic agit, sed de extraneo cutis affectu, ut antea monni. Vide Oribasii lib. 7.

In qua corpus consumitur.] Græce est μετα ἀποτήξεως σῶματος. Est autē ἀπότῃς qua semper aliquid à corpore abscedit, eliquatioq; . Sic in externis, lib. 2. de internis usurpat. Nā pfora & lepra melantholici cutis tantū affectus sunt. Nam si ἀποτῃς. in uenis & carne proueniant, cancri uocabulum sortiuntur.

Stercoris argenti.] Vno uerbo græce dictum ἐλκίσματος. quanquam etiam σκωρία ἀργυρίου & ἔγκωμα apud Dioscori dem appelleretur.

ἐλκυσμα.

Lotariorum rubrorum.] Græce est λωτάρια ἐρυθρά, forte legendum λωτάρων ἐρυθρῶν. Hermolaus barbarus Lotarium rubens quasi diminutium loti interpretatur, nisi quis non de siluestri potius dictum accipiat, alii de Aegyptica intelligunt Citatur apud Paulū lib 7. Pastillus dia Lotarion ad pudendorum, sedisq; uitia Præterit Orosius.

IN III. CAPVT.

PLeriq; hoc solo impetigines.] Has Galenus lib. 5. de compositione medicamentorum secundum locos nominat μετάρχας, uocē nimirum ex latina & græca dictione composita, quod contra rationē grāmatica fieri uidetur. Plinius etiā lib. 16. huius meminit, aitq; sub Claudii Tiberii Cæsaris principatu potissimū hanc menti impetiginē inualuisse quidā hanc morbū quē hodie Gallicū, aut Hispanicū uocār, esse opinant.

Orosius.

IN V. CAPVT.

LEuce, cutis.] Leuce uiriliginis species est albida, & altius descendens: in eaq; albi pili sunt, & lanugini, similes.

Leuce.

Due uero, alię restant, alphas & melas appellatę Celso. Paulo autem alphas albus & niger. In prima color albus est, ferē subasper, & non continuus: ut quędam quasi guttę dispersę esse uideantur: Interdum etiam latius, & cum quibusdā intermissionibus serpit. Altera colore ab hac differt, quia niger est, & umbrę similis. Leuce quem occupauit, non facile dimittit.

Acu per summa leucen pungito.] Celsus lib. 5. eadē fere habet: Vtrum autem, inquit, horum aliquod sanabile sit, an nō sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pūgi, si sanguis exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non potest.

Experimentum.

IN

Stigmata. **S**tigmata curabis.] Stigmata in uetere medicina dicta sunt non puucta, sed maculis punctorū quantitate & forma decolorata hominis cutis. Porro latinis etiā in usu est ea dictio. Plinius enim & Largus aliquoties usurpant.

Quod matulæ adhærescit.] Hoc est, qđ in urina subsidet, hoc nāq; matulæ solet adhærescere Diosc. oculorū cicatrices expurgari commemorat.

IN VIII. CAPVT.

Exanthemata. **E**xanthemata.] Pustulæ sunt exiguo Celso, quales ex urtica, uel sudore fiunt. Interim pituitæ eruptiones, ita Plinio appellantur, de quibus hic agitur. Græci ēτ ἐξανθήσεις, quasi dicas efflorescencias nominant, à uerbo ἐξανθίσθαι.

Cuticula. In superiore pellicula.] Græce est ἐπιδερμίδα, quā Latine possis interpretari cuticulā. Nā summa pars, & ueluti ipsa cutis efflorescentia existit.

IN IX. CAPVT.

Splenio illitas.] Hoc est, panniculo lienis modo oblongo. Plinius, superimponi oportet splenium è melle decocto.

Salsorum esus.] Malè in codice Græco est προσφορὰν, tu fac προσφορὰν, eiusmodi minutias neglexerunt aristarchi interpretum.

IN X. CAPVT.

VT humoris colluies habeat emissarium.] Græce est κατὰ ὑπόρρυσιν, quasi dicas, ex confluxu. Quidā Græcus autor habet κατὰ ὑπόχυσιν in eodem significato.

Calidis eruptionibus.] Sic uerti ἐκβράσματα feruētibus papulis, περιζέματα. Gliscentibus seu manantibus capitis ulceribus, ἀχῶρας. Atq; hac autoritate ueterum.

IN XI. CAPVT.

Ambusta.] Latini πυρκαυτὰ ambusta, uel cōbusta, uel exusta, citra ignis uocabulum additum exponunt, Propriè uero signat usta igne, eoq; Paulus primum πυρκαυτὰ dixit. Cōbustionem uero ex aqua calente, κατακαίματα ἀφ' ὕδατος. Quauquam & aliæ materiæ sæpe adurant.

Codex castigatur. Qui albumē.] Male in cod. nro legit ὡδὶ ὅλον, pro ὡδὶ λουκέν. Ita ēτ Auicēna habet, & Dioscorides. Annotauit id Oros.

Ordei farina.] Simpliciter in Græco codice est κριθαῖς, qđ est ordeis. At significantius ex Auicenna & Serapione ordeī farina positum est.

Illitumq; lintheolo.] Male Græcè hebetur ἐμπάστων pro ἐμπλάστων. Id qđ neglexit Orosius, & Basilicēsis castigator.

IN

IN XII. CAPVT.

Ouum integrum.] Græca sonant ὠὸν ὁλόκληρον χωρὶς τῶν ὀρύβων, hoc est: Ouum integrū sine eruis. Quid sibi uelit, eruis, nō uideo, cū nulla sit ante mentio eruorū facta. Puto igitur legendum, χωρὶς τῶν ἐρέγμων, hoc est, sine putaminibus. Quāuis ēt eruū cælis cōueniat. Hūc locū præteriit Orosius.

Orosius.

IN XVII. CAPVT.

MAli punici corticibus uino incoctis, rhu & polēta.] Galenus eodem ferē lib. 2. ad Glauconē habet. Vnde lectio- nem Pauli corrigendā puto, ut legatur ἔστε καὶ ἀλφίτων, pro καὶ ἔστε καὶ ἀλφίτων. Nam cera hic nihil proficit, sed sumac, ut barbarorum more loquar, astringendi ui præditum. Orosius hunc locū sua spōte præteriit, & Basiliensis castigator omisit.

Castigatur
codex.

Orosius.

IN XVIII. CAPVT.

CAtaplasmate ex ficis siccatis.] Vide librū Galeni iam ci- tatum. Voco autē ficus siccatas ἰσχάδας: quas etiam Ca- ricas nominare licet. Galenus autē habet. Nō autē oportet ip- sas caricas assumere, sed aquā, in qua illæ decoctæ itabuerint.

ισχάδες.

Si uoles magis intēdere.] Hoc est, si uehemētius uoles sic- care. Nam Galenus pro ἐπιτένειν habet σφοδρότερον ξηραίνειν.

Galenus autē memoriæ.] Lib. 14. Methodi medendi memi- nit, unde etiam Paulus hæc quasi mutuatus est. Eadem ferē tradit etiam lib. 2. ad Glauconem, & commentario de Tnmo- ribus præter naturam ubi ad uerbum ista habeatur.

Qui humorum ex loco in locum decubitu.] Græca lectio nonnihil est uiciata, habet enim τοῖς ἀπὸ σκήμματος μάλιτα χρονίσασιν ἀποτήμασιν, pro τοῖς ἐξ ἀποσκήμματος μάλιτα χρο- νίσασιν ἀποτήμασιν. Nam una dictio est ἀπόσκημμα. Quam Galenus in hunc modū exponit: ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς δια- θέσεις ἐκείνας, ὅταν χυμοὶ τινες ἐνοχλῶντες ἐτέρῳ μορίῳ, κατα- λιπόντες ἐκεῖνο, εἰς ἕτερον μεταφῶσιν. Atq; hic alter modus est generationis abscessuum. Sit itaq; ἐξ ἀποσκήμματος quod τὸ πρῶτον ἀποσκήμματος, ut ait Galenus. Differunt igitur inter se ἀπόστημα, & ἀπόσκημμα, ut apud idoneos autores licet condi- scere. Non aduerterunt nostri aristarchi.

Locus ca-
stigatur.ἀπόσκημ-
μα.

Orosius.

Porro abscessuū generationē.] Græcus codex uiciatus nō- nihil ē, ubi habet τῆς τῶν ἀποσημάτων γενέσεως, ἢ τῆς δὲ τῶν ἀποσημάτων γενέσεως, dictio δὲ omīssa snīam poterat cōfunde- re. Oros. & castigator Basiliē. quātūuis oculati nō annotarūt.

Codex de-
prauatus.

COMMENTARIUS
IN XIX. CAPVT.

νεκρῆται. **C**Um inflammatio neq[ue].] Inuenies penē eadem in secūdo ad Glauconem libro. Verti autem *νεκρῆται* membrum emoritur, quod alii barbarē exponunt, mortificatur.

IN XX. CAPVT.

CUm bilis flaua nulli mixta humori.] Hoc est, cū sincera bilis, nullū aliū humorē uel pituitā, uel bilē atrā, uel sanguinem coniunctum, habens Oribasius lib 14. similia habet.

Codex uiciatus. Porri succi cyathi dimidium.] Viciatus est codex græcus impressus. Nam pro *βυ.ζ.* legendum est *βυ. ήμισι.* quod ualeat Cyathi dimidiū. Paulo post, myrtei uncia sex, in græco erat *το. ι. S. pro S. hoc est sedecim, pro sex positum.* Statim in eadem linea, Vino diluta, græcus codex habet *οἶνω ήμισι.* pro *οἶνω δις.* Nō multo post, cremēti plūbi uncia una. S. græce erat *σκαρίας μολιβδῆς δευβάφου* < .S. pro *σκαρίας μολιβδῆς*

Orosius. Basilienis.

το. ι. S. q̄ loca nec Orosius, nec Basilienis corrector aduertit.

Circa tedam.] Hoc est circa lignum ad tedam aptatū, cui lana cum alia quædam pinguedine circumuoluitur, ad flammam alendā, cuiusmodi hodie etiam lucernarum loco utunt.

Thuris, aluminis scissi.] Hic quoq[ue] diligentiam Basilienis Correctoris desidero, qui lectionē græcā & cōfusā & mutilā reliquerit. Nā habet *λίβανου σχιτῆς* < ᾱ quod ad uerbū sonat, thuris scissilis drachma nullo sensu, cū legendū sit *λίβανου σχιτῆς, ᾱν.* < ᾱ. qđ signat thuris, aluminis scissilis, singul. drach distinctione post thuris additā, deinde post *σχιτῆς ᾱν.*

IN XXI. ET XXII. CAPVT.

Erysipelas.] Multi inter latinos scriptores interpretatur erysipelas sacrum ignē. Celsus aut hūc ab illo separat, eoq[ue] malui græca uti dictione q̄. expositione esse obscurus. Vide Galenū secundo ad Glauconē: Aetiū lib. 14. & Oribasii septimū.

Abcessorij tumores.] Hoc est q̄ abcessum representāt. sic uerti *ἀποστηματώδεις* εἴη, quasi dicas apostematici tumores.

Phyma & Phygetlon] Tubercula sunt tumida. Celsus græcis nominibus quoq[ue] appellat Bubo à loco nempe inguine, cui solet magna ex parte accidere appellationē accepit, quam etiam alas, & ceruicem interim infestet.

IN XXIII. CAPVT.

Oribasius] Lib. 7. huius tuberculi mentionem. Pauli autem lectio nonnihil est uiciata habet enim, *ἐπεκείναι δὲ αὐτῆς*

αὐτῷς ἀνω κάτω pro ἀνωτάτω. Paulo post, τὸ ὑπὸ κάτω pro ὑποκάτω ut sit una dictio. Id qđ Aristarchi nostri omiserunt.

IN XXV. CAPVT.

Carbunculus.] Sic uerti græcā dictionem αἰθρακες, id est, Codex im-
ad uerbum, Carbones Celsus autem, quem libēter in di- pressus.
ctionibus latinis imitor, Carbunculum nominat.

Quod ulcus est crustaceum.] Habetur in græco εἴπερ εἰσὶν
ἔσχαράδῃ ἑλκε, quod est, siquidem sunt crustacea ulcera. Ego
autem legendum puto pro εἴπερ, οἵπερ ut referatur ad αἰθρα-
κες. Sua sponte praterierunt hoc, Orosius, & Gemusæus.

Depascaturq;.] Sic exposui, μετὰ νομῆς quod est cum de-
pascione, Sensus est, ita carni subiectæ affixa est, ut eam quoq;
depascatur. Volui itaq; uersionis meæ rationem reddere, ne
quis seuerior censor nos à uerbis ipsis discessisse clamet.

Circumscribuntur.] Ad uerbum exposui περιγράφονται.
Signat autem hoc loco circumscribi, tolli, aboleri. Nam qui περιγρᾶ-
carbunculi carnem obsidentur, facile tolluntur, qui partes so φεδαι.
lidas, pertinacius hærent.

Vel & ipsum similiter dilutū.] In Græco codice pro εἰ tu
fac ᾗ, quod et si exiguū sensum tñ poterat cōfundere. Neglexe-
rūt Censores interpretum.

IN XXI. CAPVT.

Cancer in qualibet.] Hoc caput quasi ad uerbū habet Ae-
tius lib. 14. Oribasius septimo. Galenus secūdo ad Glau-
conē. Habet aut lectionē deprauatā in exēplari græco, οἷον ἐστὶ
τὸ ἐπίθυμον πλῆθος, Γο. δ. S. quæ sonāt ad uerbū, quale est epi-
thymū pōdere unciarū quatuor. At nemo nō medicinæ peri-
tus intelligit nunquā epithymū dari tāto pōdere Legendum
itaq; uenit in hūc modū, οἷον ἐστὶ τὸ ἐπίθυμον πλῆθος Γ. δ. S. id
est, quale est epithymū pondere drachmarū quatuor & S. Nā
Dioscorides, aliiq; eiusmodi ferè pōdus admittūt. Miror Oro-
scium tam grauem interpretū Censorem & Gemusæū, alio-
qui in medicinis exhibendis peritum hæc non aduertisse.

Orosius,

Codex e-
mendatur.

Gemusæus.

IN XVII. CAPVT.

OEdema latus quidā.] Oīa ex Galeno ad Glauconē, 7. Ori-
basij 14. Aetii trāscripta sunt. dixi aut indolēs tumor, hoc
est doloris expers tumor. Vide et Galenum lib. 14. Methodi.

Affectus qui hominē premit.] Lectio Galeni libro iam ci-
tato corrupta est, habet enim τῆ κατέχοντος πλῆθος, quod Li-
nacer exponit multitudinis, quæ hoīem premit, cū legendum
datur.

Galen, co-
dex emen-

Ff 2 sit τῆ

fit τῷ κατέχοντος πάθος, hoc est affectus, qui hominē premit.

Ellychnion.

Tenerrimum ellychnion.] Ellychnion est quod ex papyro sparta canabe, aut stupa tortum in lucernis uritur, dixi tenerrimum, hoc est mollissimum, græci ἀτἀλῆτατον.

IN XXX. CAPVT.

διαπήδῃσις.

Per subsultum.] Græce subsultus dicitur, διαπήδῃσις Gale nus lib. 5. Methodi quomodo fiat, exponit in hunc modū. Diapedesis ex tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine uero tenuato: interim etiam ex graciliū uasorū adaptū nascit̃, &c. quando aut̃ hoc fit, sanguis ueluti subsiliendo ex uasis prodit.

IN XXXI. CAPVT.

ῥήγμα.

Rvptio.] Vnitatis solutio pro particularum natura, nomē claturā sortitur. In esse græcis κατάγμα quasi fractura dicitur, in carnosiss musculorū partibus ex distēctione perueniēs, ῥήγμα hoc est ruptura, de qua hic fit mentio. Cum autē filamenta similiter tensa rumpuntur, uulsum. In carne uulnus.

IN XXXII. CAPVT.

Exactos quidē scirrhus.] Vide secundum ad Glauconē. & quartūdecimū Methodi: Vnde hæc omnia fere sunt trās lata, quāquā Oribasius antea & Aetius ea quoq; rrāscripserint.

Oroscius,
Nota lectionem,

A balneo autem in totum.] Oroscius simpliciter uertit à Lauacris uerò continuis abstineant, quod mihi non placet. Nam uidetur Paulus præcipere ut in totum à lauacris abstineant scirrhus laborantes, aut si id non fiat, saltem à frequentibus, alioqui dictio συχνῶ ex superfluo fuisset adiecta. Ego itaq; lego ἢ γὰρ duabus dictionibus, non ἢ γὰρ ut habetur in exemplaribus. Aetius abstinendū præcipit à balneis medicamentosis quæ atrametum futorium, alumen, aut sulphur resipiant.

IN XXXIII. CAPVT.

Codex emendatur.

Nasturcii.] Male in codice græco καρδαμῶμε pro καρδάμου habetur, item σκληράς pro σκληρίως. In fine ἀμωμικῶ θυμάρματος. < β. Vbi Gemusæus ex codice Ruelli legit à quo hic non dissentio.

IN XXXVII. CAPVT.

Oroscius,

ἄχνη.

Qvercus folia applicata ulceribus.] Vide Oribasii librum septimum, ex quo Oroscius græcam lectionem castigādā putat, legēdumq; ἄχνη ἀλεύρε pro ἀράχνη ut sit pol len farinæ, nō aranei telū, quanquā hoc ēt recētibz uulneribus cōglutinandis cōducatur. Sed malo cū Oribasio legi ἄχνη. Anagallis.

Anagallis.] Rursus ex Oribasio, ponendum anagallis, pro ἀνάπλινπρι. Expunge periodum.] Exemplaria Ruellii, & Lascaris ueterem lectionem retinent

Corrigitur
lectio.

IN XLV. CAPVT.

Myrrha.] Galenus tertio methodi fusius hæc exponit. Aetius pro myrrha uidetur, legere, myrtus, non omnino male, nam ulceribus conglutinandis, si Dioscoridi credimus, efficax est, præterea astringit, & siccat citra rosionem quod proposito cōducit, facilis erat lapsus σμήγμα ex σμυρδίνη, aut μυρτα.

Nota.

Ostreorum.] Aetius habet, ostreorum crematorum, item in fine habetur singulorum uncia octo nimirum pro drachmæ octo. Nam antiquum lascari exemplar non ʒo. quod est uncia, sed < habet. Orosius & Gemusæus noluerunt hoc annotare Rursus in sequenti emplastro, cadmiæ drachmæ sex. In græco male habetur ʒo. pro < mox sequitur, æris combusti, singulorū drachma, ubi Codex ʒo. hoc est unciam habet.

Deprauata
lectio.

IN XLVIII. CAPVT.

SI inferius spectet.] Galenus secūdo ad Glauconē hæc ferre ad uerbū habet, unde ē textus codicis Pauli impressi corrigendus est, legēdumq; κατὰ ῥόπῃ δὲ ὄντος αὐτῆς ubi habet ἀπὸ ῥόπῃ δὲ ὄντος αὐτῆς, cōtrario nimirū sensu, Galenus autē dicit κατὰ ντους δὲ ὄντος αὐτῆς. Idem namq; est κατὰ ῥόπον, & κατὰ ντες. Omisit Orosius & Basiliensis corrector.

Corrigitur
græcus textus.

Etenim in cubito.] Sic interpretatus sum ἐν πῆχει, quæ uox græcis significat eā brachii partē, quæ ad manū tēdit interius ulnā quidā recētiore nomināt ἀγκών flexura ipsa recte dī. Veteres sanguinē ex cubito detrahi p̄cipiētes, hæc intellexerūt.

πῆχυς.

ἀγκών.

De finibus diruptus.] In græco codice est περὶ ῥακωδῶν κόλπων. Signat autē ῥακωδῆς idem quod ῥωγάλευς, καὶ διεῖ ῥωγῶς, hoc est fractus & ruptus Venit autē à ῥάκος, quæ uox significat pannū & uestē laceratam. Sicut ῥάκων apud Aristophanē uestem uilem, detritam, & pertusam Hic itaq; ῥακωδῆς abscissui accommodatur in quo cutis pus congestum integēs, erosā extenuari deteriq; instar pellium detritarum contigit.

ῥακωδῆς.

ῥάκος.

Vt neq; admodum sit durum.] Mirum est quā Orosius hic memor sui non sit. Antea me reprehenderat, quod dictionē græcā ἀμόλυντον uerterim, manus non inquinans. Hoc autē loco nō uidet à Paulo emplastrū liquidū intelligi, cū dicit μή τε σκληρὰν, μήτε ἀμόλυντον. Galenus ad Glauconē eadē habet.

Orosius.

AT scopus crustā generantiū.] Hoc est, eo cōsiliū in crustā generātibz dirigit, ut calefaciāt simul & astringā t. Calx aut calefacit tantū eoq; non ita cōmode adhibetur. Hæc sunt ex Rufo, petita.

IN LIIII. CAPVT.

Neruis uulneratis.] Paulus hæc fere ex Galeni tertio secū dum genera mutuatus est, mutato tantum docendi ordine. Aetius lib. 14. Oribasius septimo habet eadem. Cæterum uocat in neruis uulneratos, νεύρωτῶτους in tēdonibus, τενον-
τος. τωτῶτες. Curatio autem communis est.

Specillo subunctorio.] Sic reddidi ὑπαλείπτρω nimirum à uerbo ὑπαλείφο quod subiungo significat, deriuato.

Maiores conuulsionis metus.] Male in codice græco habet, δ μὲν κίνδυνος τῆ σκεπαδῆναι, ἢ δὲ μὲν κίνδυνος τῆ σπαδῆναι. Orosius & Gemulæus non aduerterunt.

IN LV. CAPVT.

Ancylas] Celsus & Scribonius eius discipulus, Contra-
ctionem, ligationemq; articulorum interpretantur græ-
corum dictiones ἀγκύλας, & ἀγκυλώσεις.

IN LVI. CAPVT.

Nam colligantes nerui.] Hoc loco intelligit per σινδετι-
κά νεύρα, ipsa ligamenta, quæ ossa colligāt : uocat autem
neruos quod eos imitētur. Nā alibi tres species enumerant,
alios qui sensum motumq; præbent, alios qui motui tm ser-
uiunt, ut tendines, alios qui ossa cōpagem ligant, uinciuntq;.

IN LVII. CAPVT.

Tres sunt uniuersæ.] Aetius lib. 9. eundē fere docendi or-
dinem seruat Celsus duorum generū meminit, Latorum
quos etiam peiores dicit, & teretum, Græci addunt etiā asca-
rides. Habetur in Græco codice ἀσθρων pro ἀκρων, hoc est extre-
morū perfrictione potius quàm articulorū, antea notauerā.

Cochleari.] Sic exposui ζωμήρυσιν, qđ Grāmātiti Græci di-
cūt infirmū esse, quo spuma ab ollis tollit. Quia igitur nullum
cōmodius uasculū ad hanc rē inueni, cochleati interpretatus
sum.

IN LVIII. CAPVT.

Carnem falsam.] Recētiore medici carnē suillā pingue,
falsamq; uolunt subiici. Aetius pinguedine adempta subdi
præcipit. Tu uide quos imitari malis, utrobiq; bona est ratio.

Finis libri quarti Commentariorum:

COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER QVINTVS.

CAPVT I.



E uirulentis bestiis.] Hoc libro in multis Dioscoridē Paulus imitatur quanquam Galenus etiam librū de Antidotis conscripserit post eū Oribasius, Aetiusq;.

IN II. CAPVT.

Homo adhibēdus est qui uulnus exugat. Celsus lib. 5. idem præcipit. Si cucurbitula inquiens nō est, quod tñ uix incidere pōt, tū quodlibet simile uas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uulnus exugat. Græce erat. ἐκμυζήσας, hoc ē exultione uti.

ἐκμυζήσας.

Galenus memoriæ prodit.] De uipera multis in locis meminuit, tum in commentario simplicium medicamentorum, tū ubi antidota, confectiōemq; Theriacæ comprehendit.

Aut paliutū.] Codex græcus deprauatus particulam ἢ de- siderat Legi debet, ἢ παλιῦτον, quod etiam Oribasius lib. 8 habet, præterit Castigator Basilienfis.

Codex castigatur. Castigator Basilienfis ἰδρωτῆρια.

Desudationes.] Græce erat ἰδρωτῆρια hoc ē, quæ sudores mouēt, ut laconicū, aliq; id genus modi, ut. s. uenenū ab internis foras inuocent.

IN III. CAPVT.

Hydrophobiam.] Celsus hoc morbi genus miserrimum, aquæ timorem appellat. Largus aquæ hoc est, liquoris metum interpretatur ἰδρωφοβία.

Aquæ timor. ἰδρωφοβία.

F f 4 Sudore

ἀπορία. Sudore & anxietate.] Verti ἀπορίαν anxietatem. Est autē proprie ἀπορία consilii, aut propositi inopia, incertitudo, ex qua quis nescit, quid potissimum acturus sit. Ruellius uertit ἀπορίαν languorem.

περισσεύειν. Carnis præscisio] Græce erat τὸ μὲν περισσεύειν, quasi dicas circa carnem sectio, uel circūscriptio. nam interim carnem amputare scalpello conuenit.

IN IIII. CAPVT.

Celsus. **L**ata manu morsum ferito.] Hac locutione Celsus etiam utitur. Si manus, inquiens, uulneri imponitur, super q̄; id duobus digitis uerberatur.

πεπρωμένα δὲ γμάτα. Ad feruidos autem iam morsus.] Græca sonant πρὸς δὲ ἢ δὴ πεπρωμένα τῶν δηγμάτων, hoc est ad morsus quos inflā-matio iam feruida inuasit.

IN V. CAPVT.

Lac ficulneum. **E**t lac ficulneū.] Hoc est, liquor ficulneus sic lac papaueris lac laseris aliorumq̄; cōsimiliū pro liquore, aut lachryma.

IN VI. CAPVT.

Dioscorides & Paulus uariant hic. **S**ed leniter rubidus.] Græce habet ἀλλά μετρίως μὲν ὑπερ-ευθρος, quod est, sed mediocriter quidem subrubens. Dioscorides impressius habet pro ὑπερ-ευθρος, ὑπερ-ευχρος, hoc est humidus, atq; ita uertit Ruellius. Marcellus autem ὑπερ-ευθρος, quā-quā supra Paulus dixerat. ἐνεργεθῆς. uide utra placeat lectio.

Et uiridiū cupressi foliorū.] Mutilus est codex græcus. Nā desiderat dictio φύλλων legēdumq̄; uenit χλωρῶν κυπαρίσσου φύλλων ἢ σφυρίων. Id Oroscius nō aduertit nec Gemusæus,

IN VIII. CAPVT.

Particula. **P**articula intenditur.] Hic intelligo particulā penem ipsum. Sic etiam apud græcos τὸ πορίον accipitur. Dioscorides δὲ ποτρίχιν huius loco habet, quod est pilorū erectionē.

IN IX. CAPVT.

Confer autem thes. **A**t tolliturq̄;] Pauli Codex Græcus habet ἐπάρεται, hoc est attollitur, Dioscorides unde hæc transcripsit, περισίπεται hoc est computrescit, legit. Item Paulus δυσινδῆ ponit pro δυσίατον, hoc est δύσφορον.

IN XII. CAPVT.

νομή. **A**lbū ulcus apparet.] hoc est ulcus depascens, quod νομή græcis appellatur.

Frigidi madoris.] hoc est corpus frigido sudore perfunditur, mador

tur, mador initium sudoris est. νότις græce dicitur.

νότις.

IN XIII. CAPVT.

DE amphibena.] Hoc animal biceps est, autore Galeno, & utraq; parte ingreditur, unde nomen illi est inditum.

IN XV. CAPVT.

DRyinus.] Iude Galenū de Theriaca dictus est à δρύς, quod Dryinus. in quercuum radicibus uiuat.

Tortiones.] Græca dictio est τρέφοι qui proprie tormina τρέφοι. sunt circa umbilicum, omneq; id spaciū quod in anteriore parte ab ore stomachi ad umbilici partes descendit hominem torquens.

IN XVI. CAPVT.

Qui hæmorrhoi ictum.] Hæmorrhæus & hæmorrhæus Hæmorrhæus, suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem adferunt. quippe percussī ab eis, sanguine per os, nares, totoq; corpore effuso intereunt.

Redduntur corpora.] Græcus codex habet αῖματά, hoc est raritatis. Dioscorides quē Paulus sequit, σώματα eoq; sic uertendum duxi, quod Orosius & castigator Basiliensis præterierint.

Et si cicatrix toto corpore.] Sic quoq; legit Aetius, quāquā Marcellus Virgilius aliter legēdum Dioscoride sentiat.

Quem euomentes.] Pauli codex impressus ἐξαιματῆντες pro ἐξεμετῆντες habet Dioscoridem secutus sum unde Paulus hæc transcripsit: licet sententia non multum uariet. Oroscius non dignatus est annotare.

Aduersus feram præsidia.] Græca sonant πρὸς τὸ θηρίον. θηρίον. Orosius dum nimis exacte loqui studet, in aliis corrigendis, maxime fallitur. Paulò superius damnauit quendam quod θηρίον bestiam uertisset, semper eam dictionē pro uipera accipi affirmans. Cuius hic contrarium uides.

IN XVII. CAPVT.

Natricis morsu uulnus factum.] Natrrix primum in terra uiuit, & Chersydios appellatur. deinde in aqua, unde hydros dicitur. Similis est pusillæ aspide, præterquam qd ceruicē latam non habeat ut aspidēs.

IN XVIII. CAPVT.

Nasturcium.] Dioscorides legit καρχήμων hoc est cardamomum nō καρχήμων quod est nasturcium, sequere utrāque malis lectionem.

Dioscorides & Paulus uariāt.

IN

Reginam Cleopatram.] Vide Galeni commentarium de Theriaca, ubi historiā ampliter comprehendit, speciesq; aspidum enumerat. Oroscius putat in fine capitis aliqua ex Dioscoride apponēda, at ego breuitatis cā omīssa existimo.

IN XXIIII. CAPVT.

Drachmis duabus.] In Aldino exemplari erat Cyathio uno. Basiliēsis corrector fecit cyathis duobus. Aetius integram lectionem ita habet. Drachmis duabus ex cyatho uno aceti: Sequēti die drachmis quatuor ex cyathis duobus. Tertia die drach. octo ex tribus cyathis. hoc præterit Oroscius. Lege igitur in græco <.β. μετ' ὀξους βυ. α. τῇ δὲ ἐξῆς <.δ. μετ' ὀξους βυ β. τῇ δὲ τρίτῃ <.η. μετ' ὀξους βυ γ.

IN XXVIII. CAPVT.

Rex Mithridates.] Galenus ea commemorat lib. de Theriaca ad Pisonem, unde Paulus transcripsit.

IN XXXII. CAPVT.

Historia
Mithrida-
tis.

Ficus bridæ, item.] Transposita & peruersa uiderur lectio in Pauli codice impresso. Nam Dioscorides unde omnia hæc sumpsit, aliter habet. Fac itaque in hunc modum συκαὶ ξυρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν σὺν οἴνῳ παρακμάζοντος δὲ τῆ κατ' ὀξύτητα κινδύνου ὠφελοῦνται θυβαϊκάς βαλάνους ἐθίσοντες ἢ λελεασμένους σὺν οἴνο μέλιτι ἢ γάλακτι πινόντες, ἢ καὶ ἀπίων ἀπαν τὸ γένος ἐθίσοντες καὶ γάλα γυναικεῖον πινόντες, Ita quoq; nos reddimus. Pauli scriptura ad uerbū hēt ut sequet συκαὶ ξυρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν σὺν οἴνῳ ἢ γάλακτι πινόντες, ἢ οἶνο μέλιτι, καὶ ἀπίων μᾶν γένος ἐθίσοντες, καὶ γάλα γυναικὸς λαμβάνοντες παρακμάζοντος δὲ τῆ κατὰ τὴν ὀξύτητα κινδύνου. ὠφελοῦνται θυβαϊκάς βαλάνους ἐθίσοντες λελεασμένους σὺν οἴνῳ hoc est iuuantur, si ficus aridas sumant, earumq; decoctum cum uino aut lacte bibant, aut mulso, ac pirorum omne genus comedant, & lac muliebre assumant, ubi periculum lenius fit & declinat, confert, si glandes thebaicas detritas cum uino edant.

Nota.

IN XXXIII. CAPVT.

Mens impeditur.] Græca habent. λαλιᾶς ἐμποδισμός, hoc est loquelæ impedimētū. At Dioscorides unde hæc sumpta sunt διανοίας ἐμποδισμός, id est mentio seu intellectus impedimentū habet. Ita quoq; Aetius lib. 13. scribit. Quibus authoribus

authoribus mutādam lectionem putavi, saluo aliorū iudicio.

Et resolutione urget.] Hic quoq; uicium exemplaris græci est habet enim καὶ ἐκλύσεως πρὸ ἐκλύσεως, nec hoc annotauit Oroscius.

IN XXXV. CAPVT.

Piscibus uirosis.] Corrige lectionem græcam mutaῖ; ex, ὁμοία ἰχθύος, βρομάδης. In ὁμοία ἰχθύσι βρομάδεσι. Paulo post, ὑδρεῖσι δὲ δυσώδη αἵματι μεμιγμένα. Mutila est lectio, quæ sic instaurari debet. ὑδρεῖσι δὲ δυσώδε, καὶ μετ' ἑσυχολώδη ἐνίοτε δὲ αἵματι μεμιγμένα, ut nos uertimus. Oroscius & castigat. Basiliensis hæc duo loca deprauata reliquerunt. Nō multo post πόνκεδάνα male habetur, pro κινδάμιν.

Lectione græca emendatur.

Oroscius, Castigat. Basiliensis.

IN XLII. CAPVT.

Cum oleo & passo.] Variat lectio Dioscoridis à Paulo impresso habet σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκῇ, hoc est cū oleo & passo, ubi Paulus σὺν οἴνῳ καὶ γλυκῇ, quod est cum uino & passo. Aetius tantum ex uino dulci habet, sequere quæcunq; ualet.

Instauratur Pauli lectio ex Dioscorides.

IN XLVI. CAPVT.

Presertim in exurgendo.] Hoc est cū è lectulo leuare se conantur, ut ait Largus. Græca sonant, ἐν τῷ ἐξανίστασθαι.

Opobalsami drachma cum uino.] Dioscorides habet cū melle aut lacte. In primo libro etiam opobalsamum ualere contra aconitum tradit, uide an malis cum Dioscoride legere. Ego exemplar sum secutus.

Nota.

IN XLVIII. CAPVT.

Totum corpus prurire facit.] Græce est κνησμός καθ' ὅλον τὸ σῶμα. Dioscorides etiam in hunc modum habet. Largus autem cuius mentionem Galenus subinde facit, pro corpore, habet os in hunc modum. Ephemerum potum protinus quidem os prurire facit, uelut scilla tactum postea etiam adurit, quasi pipere manducato. Hæc te, lector, latere nolui.

Largus.

Nota.

IN LIII. CAPVT.

Pharicum dictum.] Multi scriptores dubitant, simplex ne sit an compositum. Largus ex compluribus componi affirmat.

Nardum syluestrem.] In codice Pauli Græco deerat ἀγρία. Tu ex Dioscoride restituito Basiliensis castigat. omisit.

IN

Castigatur
textus græ-
cus.

VT uinum dulce cum rosaceo.] Deprauatus est Codex græcus impressus, habet enim γλυκὺν οἶον pro γλυκὺν οἶνον. Omisit Gemusæus.

A Tramētum sutorium.] Hic quoq; uiciatus est codex græcus, habet enim χάλκη ἄνθος hoc est, flos æris pro χάλκαον θον, ut sit atramentum sutorium. Ex Dioscoride castigatum: Basilienfis castigator hoc etiam non aduertit. Largus habet æris flos, sed male opinor.

Impressū
exemplar
græcū cor-
rigitur.

Dentes tincti.] Græcus codex impressus habet ὀδόντες βεβρυμένοι hoc est dentes erosi. Dioscorides ὠδόντες βεβαμμένοι quod est Dentes tincti. At Aetius legit gingiuae cor rosæ. Secutus sum Dioscoridem. Præterit Gemusæus.

Marcel-
lus.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum.] Sic interpretatus sum γάλα ἐμπιτυαδὲν ἀψροῖν. Nā si prius coagulatum est quā fuerit assumptum, non opus habet, ut rursus congeletur: Longe dissentio à Marcello cui ἐμπιτυαδὲν uertendum censet, cui coagulum sit admixtum, cū Paulus coagulum superbibi cū aceto præcipiat. Sed ἐμπιτυαδὲν intelligo intus, hoc est in corpore congelatum. Ibi enim aliquando coit in grumos, & densatur, ut respirationem impedit. Vbi igitur lac assumptum repente, ac cumulatim, in corpore coierit, remedia adferenda sunt.

E cinete lixiua.] Turpiter hic Ruellius Marcellus, aliiq; interpretes lapsi sunt, qui κονίαν πιλοποϊτικὴν uerterint, nunc lutum excolatū, nunc lixiui genus aliquod. Nihil enim aliud est quā à cinere lixiuium, quo & pilotarii, & alii artifices utuntur. Sicut apud Galenum ἰδωρ πιλοποϊτικόν, quod Largus in eodem medicamēto dixerat, ē cinere lixiuium, ut alias annotauimus.


Castigatur
codex græ-
cus.

HOrmini semine. Male habetur in codice Græco δερμίνου ἀγρίου pro δμίνε ἀγρίε. neglexit Gemusæus.



COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER SEXTVS.



V M humor oculis.] Liber hic sextus curationem tradit, quæ ferramentis & manu administratur. Certe difficilis existit, tum quod nemo hæc eo ordine tractarit, tum quod ij unde trāscripsit, non extant. Curabo tamen pro mea fide, ut nihil quod lectorem remorari possit, indiscussum relinquaſ.

Ferramentis nuclei modo rotundis.]

καυτηρας πυρρνοειδεις. Græce dicuntur πυρρνες, extrema speculorum siue acuta, siue caua, siue rotunda. Hoc autem loco, rotunda ut ustio commodius administraretur, aliqui nuclearia uocant instrumenta Celsus tenuibus, retusisq; ferramentis ait lib. 7. de oculorum humoribus reprimendis sermonē faciens.

At in elephantiasi.] Paulus hoc lib. 4. iam docuerat, nempe multos qui ne in totū insanabiles fierent, ex capitis ustione seruatos.

IN III. CAPVT.

Hydrocephalon.] Celsus lib. 4. Inuenitur genus quod longum potest esse, ubi humor cutem inflat eaq; intumescit, & prementi digito cedit υδροκεφαλον Græci appellant.

In ociosam inutilemq; mutato substantiā.] Oroscius omnia grammaticorū Lexica introspectit ut me in dictione Græca αργην, tanquam male eam interpretatum reprehenderet, ac tandem Budęum nostrum in commentariis in Græcā linguam consulens, αργην, inuenit significare, contrariū ei quod elabora-

Sextus liber omnium difficillimus.

πυρρνες.

Tenuia, retusaq; ferramenta. Ustio capitis.

Hydrocephalon.

Oroscius. αργος.

Crudum.

elaboratum, confectum, concoctumq; est, eoq; exponendum hic censuit ἀργὴν, crudam, non attendēs, quo modo in re medica crudum dicatur. Nam sanguis nunquam dicitur, post absolutam sanguificationis terminum crudus fieri, sed mordax, acris, crudum uero aut semicoctum succum, sanguinem mutari, aut sanguinem minus elaboratum, ac crudū adhuc in perfectum degenerari. Gal. enim lib. de sanitate tuenda quarto cōcoctionem ponit crudorum, uel etiam semicoctorum humorum eductionem acrium. At sanguis non consistit citra concoctionis terminum. Et si adhuc in uenis etiā illis capitis semicoctus ac crudus existeret, tamen non diceretur extra uasa elapsus, in crudam mutari substantiam, sed putridam potius ac peregrinam. Qui enim extra instrumenta sua elapsus est, nō potest non corrumpi. Crudus autem fieri, non item. Quare Oroscius hunc laborem castigandi, non alio quā calumniæ studio sumplisse uidetur, ipse maxime corripiendus.

κεκυρτωμένος.**Oroscius.**

Puluino sublimi.] εἰς ὑψὺν κεκυρτωμένος, hoc est, in sublimē eleuatus, quemadmodum puluini in superficie tument, gibbero extrante.

Et quia paucis particulis subiectus.] Oroscius coniungit hic sequentia cum prioribus. Græca sic habent δι' ὀλίγα σώματος ὑποπεπτῶν κατὰ τὴν ἐπερείτιν τῶν δακτύλων. At clausula hæc posterior κατὰ τὴν ἐπερείτιν segreganda est à priori, connectendaq; sequentibus, in hunc modum, κατὰ τὴν ἐπερείτιν τῶν δακτύλων ῥαδίως ἐπείκων.

Lineis incidere.

Duabus utemur lineis.] Hoc est duas diuisiones molimur. Celsus ubiq; loquitur eodem modo, ut lib. 7. Reperti in Græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent. Itē Reperti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducere. Græce est δύο κεχρήμεθα διαίρεσεις.

IN V. CAPVT.

A Vt etiam acutus.] Fluxiones in oculos nunc longæ, nunc breues eueniunt, pro humorum in illos decumbentium ratione particula δ in Græco codice male pro ἢ posita est, nec Oroscio, nec Gemusæo aduertente.

Aut etiam ceruix deligata sit.] Vt scilicet magis conspiciatur. Nam Celsus lib. 7. de eadem re tractans, frequens curatio est, uenas in temporibus adurere: quæ fere quidem in eiusmodi malo

de malo tument, sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendāt, ceruix ante modice deliganda est.

Membranam detrahemus.] Codex Græcus uiciatus est, ut qui ὑφ' ἐν habeat pro ὑμένα omisit Orosius, aliiq; castigatores. In fine capitis ἀφελωτικοῖς uertit crustam inducentibus, cum dicendum esset, cicatricem inducentibus.

IN VI. CAPVT.

HYpospatismo.] Anonymus quidam Græcus inquit, hypospatismus itaq; tribus fit super frontē diuisionibus post latiore specillo quod spatululam uocant, per corpora quæ interiacent, transmissio.

Hypospa-
tismus quæ
si spatæ
transmis-
sis.

Exilem spatam.] Hoc est gladiola modo latam Græco uocat Paulus ὑποσπαδίτηρ. Paulo post σπάδιον, quasi dicas spatulam. Hac autem dictione usus sum non quidem latina, sed medicis cognita.

ὑποσπά-
διτης.
πτύγμα.

Panniculumq; implicitum] Græci πτύγμα & πτυγμάτιον appellant. Galenus in commentariis de Chirurgia.

IN VII. CAPVT.

Periscyphismus.] Citatus supra Græcus author, memorie prodit periscyphismus est, cum transuersis lineis coronæ modo frons secatur.

Penicillis] Sic reddidi σφηνίσκος, quæ linamenta dicuntur cunei modo intorta. Vnde quidam reddunt cuneolos ex linamentis.

σφηνίσ-
κος.

IN VIII. CAPVT.

DE sutura] Titulus capitis habet περί ἀναρῥαφῆς quæ dictio deriuata est à ῥάφῃ & ἀνα Sicut inferius caput facit de καταρῥαφῆς hoc est de sutura inferioris palpebræ à κάτω & ῥάφῃ.

ἀναρῥα-
φή.
καταρῥα-
φή.

Græci appellant διτιχίασιν. Celsus eleganter lib 7. hanc dictionem interpretatur, Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit. Quo authore ego quoq; uerti, cum naturali pilorū ordini, alii præter naturam pili succrescūt, nihil tamen ex Pauli snia commutauī. Græce sonāt in huius modū ἐκλουμένη διτιχίασις ἐπὶ μὲν ἐκφυσίου παρὰ φύσιν τρύχων, ἐστὶν κατὰ φύσιν τρύχων τῆ βλεφάρου προσγινομένη τρύχων.

Interim in phalango si.] Phalangosis est cū pilorum subnascantium duplex, triplex uel acies uel in superiore, uel in inferiore palpebra prouenit.

φαλάγγω-
σις.

Cuspide

πυρῆν.
σμήλης.

Cuspide specilli.] Græce est πυρῆνι σμήλης. At intelligendum uenit apud Græcos πυρῆνα nunc pro cuspide accipi, nūc pro extremo quidem capi, sed cauo, unde aliquid infundi pōt. Itē rotūdo, nucleoq; specilli. Hic igitur specilli cuspide palpebra in rugas, plicasq; aut sinum coacta quod κολπώσαντες significat, inuertitur. Dixi autem in rugas coacta, pro inuoluta circa cuspidem.

κροκινόν.
διὰ ρόδων.

Vt croceno diarhodon.] Sic appellat collyrion apud Paulum 7. lib. quod ex rosīs inscribit, adiecto croco in Græco codice κροκινόν habetur pro κροκυνόν. Neglexit Orosius.

Et ueluti lacte infu.] Græce est ὡς γάλακτι ἐγχύτω. Orosius uoluit instillato dici, quasi uero non etiam infundi dicatur in oculum medicamēta. Cels. Quicquid inspergitur, auerso specillo infundi debet.

IN IX. CAPVT.

Orosius.
Vrina impubis.

Vrina pueri impubis.] Orosius diligens aliorū iudex. ἀφ' ὅρου uult à me exponi, uenerem non experti. At ego Plinium secutus dixi impubis. Ante pubertatem enim uenerem exercere nequeunt pueri. Hermolaus alijs; docti uiri eo quo ego modo sunt interpretari. Simili calumnia in sequente capite utitur, reprehendens ἱκανόν uerti amplam notandā magnam, sufficientem, dicendum autem putans. idoneam contra Grammaticorum suorū quibus adheret pertinaciter, opinio-nem. Item in Aldino exemplari habebatur, ὅθεν γὰρ, ubi ipse ὅν relatiue legendū censet, at ego ex Ruellii exemplari & sensu sine ὅ in hunc modum corrigendum codicem dico δὲ γὰρ αὐτὴν τὴν ἐλάν, &c. In 11. cap. pro διτυχίαν, facito διτιχίαν.

IN XII. CAPVT.

DE ectropio.] Inferioris palpebrę uitium est, quod parum sursum attollitur, sed pendet & hiat neq; potest cum superiore committi, ut ait Celsus.

Ectropiū.

Ectropion oboritur.] Vide librum septimum Aetii. Inuertuntur palpebrę nonnunquam exulceratione precedente & carne ipsarum adaucta: nonnunquam ex duriore cicatrice.

Auersum specillum. Ita exposui autoribus Celso & Scribonio, ut etiā antea annotauerim. At Crēci τῶν κυανθίσκων τῆς σμήλης uidentur sepe cōfundere. Nunc pro cauo, & ad fundendum apto specilli extremo, nunc pro acuto & in cuspidē abeunte accipitur, ut hoc in loco. Celsus etiam lib. 5. Quicquid, inquit,

Celsus.

inquit, inspergitur, auerso specillo infundi debet. Item libro septimo, nam quod paruulum est, super inguem in aluum uel digito, uel auerso specillo repellendum est. Iterum uulnus digitis, uel aduerso specillo diducendū est, ut torquentibus exitus detur: ijsque effusis tū diutius pura urina descendat. Scribonius compositione 227. Ac quarto die auriscalpio auerso, quam partem *κυσθισκόν* græci uocant sensim tentare, mouere ab alienatū oportet, quo celerius excidant hæmorrhoides.

IN XIII. CAPVT.

A Nabrochismum græce dictū.] Nulla est apud latinos dictio, quæ anabrochismum significat. Deriuaturq; à *βρόχις*, & *ἀνά*, quasi illaq; ationem dicas. pili autem ansulis ex filo factis comprehensi euelluntur, ut non sit quod Oroscius damnet, pilorum euulsionē à me dictā, quæ per filū administratur.

Auriscalpio.] Græce est. *μήλωτις*, quod deductū est à *μήλη* *μήλωτις*. hoc est specillum, & *ἑστῶτις*, auris proprie enim auribus destinatum est. Dicitur etiam *μήλωτρος*.

Specillum quod utroque extremo in cuspidem.] alein codice Græco habetur *διαπύρινον* pro *διπύρινον*. Quod instrumentum est duplici cuspidē præditum. Nam *πυρῆνα* extremum, ac summam cuspidem, seu nucleum, seu capitulum exponunt. Oroscius reliquit codicem deprauatum, sicut etiam Basiliensis Castigator.

IN XIIII. CAPVT.

P Alpebræ cuti præter naturam.] Codex deprauatus græcus τῆ βλεφάρου δέσματι κατὰ φύσιν habet, pro *παρὰ φύσιν*. Notauit Oroscius.

Collectionem quandam.] Ita exposui, *συναγωγὴν τινὰ τῆς ὑδατίδος*, hoc est congregantes aliquo modo hydatidem intra digitor.

IN XVIII. CAPVT.

P Terigion.] Celsus libro septimo ita scriptum reliquit. Vnguis uero quod *πτήρυγιον* græce uocant, est membrana nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoque perueniet, eique officit &c. Hunc ego imitatus, dixit unguem oculorum.

Hamulo modice inflexo.] Græce est, *ἀγκιστρῶμις κοκαμπῆ*. Celsus eleganter dixit hamulum paulum mucrone intus recuruato, alibi, hamulos intus recuruato.

Staphyloma est.] Celsus nomen staphylomatis probe exponit libro septimo. In ipso autem, inquit, oculo, nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue luxatis, & similis figura acino fit, unde id staphyloma græci uocant. Itaque κύστωσις recte exponitur eleuatio. Nam alius quidam græcus dixit μετεωρίσμος.

IN XX. CAPVT.

De purulentis Galeni uerba] Græce purulenti ἐπόπυοι dicuntur, cum scilicet totum oculi orbem, aut eius dimidiū pus occupat. Historiam apud Galenum habes in Methodi medicatoriae libro quartodecimo.

Nisi quis admodum diligenter.] In codice impresso græce habetur, εἰ μὴ πανὺ τις ἀκρῶς. Deprauata nimirum pro εἰ μὴ πανὺ τις ἀκριβῶς. Orosius & Gemusæus ceu exiguum præterierunt.

IN XXI. CAPVT.

Suffio.] Latini interpretantur ὑπόχυματα, suffusionem. Barbari Cataractam. Alibi Celsus enim ὑπόχυσιν nominat.

Lanam oui luteo cum rosaceo.] Hunc locum Græce ita habemus ἔριον λουκῶ ὡς σὺν ῥοδίῳ δόθεν, quem Orosius male & imprudenter uertit, Imponemus oui luteum rosaceo exceptum, deligatumque.

IN XXII. CAPVT.

Et si ad malas, subluuies.] Hoc est si ad genus humoris im-
petus deciderit. Paulus dixit, καὶ εἰ πρὸς μῆλον ὑποπίπτει ἡ ὑπόφορά.

Ab uisione lenticula melle adiecto.] In Aldino exemplari habebatur omphacomeli, cuius descriptionem habes septimo Pauli inter potiones dulces. At hic nihil proficit. Sed phacomeli, legendum, quod est lenticula melle addito, ut superius τηλόμελι fœnugræcum melle adiecto, item malicorio ex σιδωτῶ reddidimus, à σίδια. deriuatum.

IN XXIII. CAPVT

Hic affectus à prima.] Celsus septimo penè eadem habet. Solet inquit tamen tumere, uel à prima natali die pro-
tinus, ual postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, eoque audiendi usu careat,

careat, &c. Græci uocant πόρος ἀτρήτους. In titulo male per ἀτρήτους
tota ἀτρήτους impressum est.

Postea accidit.] Hoc est, post natalem diem accidit hoc ui-
tium, si præcesserit exulceratio.

IN XXIII. CAPVT.

A Vriculario specillo.] Sic exposui μηλωτίδα, quod aliquan-
do etiā pro simplici specillo accipitur, ut in sequentibus
interpretor.

Violenta capitis concussione, aure super circulum.] Cel-
sus libro sexto ex Hippocrate inquit, Tabula quoque colloca-
tur media inhærens capitibus utrinque pendentibus superq;
ea homo deligatur in latus uersus, cuius auris eo modo labor-
rat: Sic ut extra tabulā emineat. Tunc malleo caput tabulæ
quā a pedib⁹ est, ferit, atq; ita cōcussa aure, id quod inest, excidit.

Iam uero Calamo, græce] est διακαλαμίδας. Sic enim a-
qua potest elici, exugendo: καλάμις.

IN XXV. CAPVT.

P Olypus.] De hoc lib. 3. comprehensum est, uocat autem
hic molliores, dictione græce ψαφρωτέρες, quan dicas te-
neriores fragilioresque.

Spatula.] Celsus etiam hac dictione utitur lib. 7. de Poly-
po. Ergo, inquit, hunc ferramento acuto in modum spa-
thæ factō, resolvere ab osse oportet. Spatula.

Manubriolo ipsius.] Græce est τῷ, κηαθισκῷ αὐτῷ, quod
superius exposui auerlām specilli partem. Celsus autem ui-
detur manubriolum capere pro aduersa specilli parte, ut li-
bro 7. de Chalcio. Dein scapelli manubriolo diducenda ab in-
tegris partibus sunt, &c. quanquam etiam dicat eodem libro,
Aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione.

Duplici cuspide præditi.] Male rursus in codice græco δια-
πυρίων impressum est, pro διπυρήνη, nec hoc emendauit Oro-
scius Gemulæus. Orosius.

IN XXXVII. CAPVT.

A ntheron puluerem.] Libro septimo Pauli compositio-
nem Antheri habes comprehensam. Dicitur autem ἀν-
θηρόν. quod rosarum flores inter alia recipiat. Pulvis An-
theros.

IN XXX. CAPVT.

T Onfillæ.] Latinos in hoc uitio peculiariter significando
uerborum inopia laborare testatur. Si quidem per tonsil-
las & partē corporis, & morbum exponere cogimur. Græci autē
ἀντιόδες. Paristh-
mia.

Gg 2 distinctum

distinctum partem παρίσθια, affectū αντίστας appellant.

Deuorationi spirationiq; negotium,] Græce est δυσχερῆσαι τε παρέχοντα τῇ τε κατὰ πόσει, καὶ τῷ πνεύματι, quod est ad uerbū, difficile usum deuorationi, & spiritui exhibētes.

Quantum licet] Hoc est quoad possumus, ὅφ' ἔσον δύναμει. Aut lib. 3. Trahuntur ad exteriora quantum est possibile.

IN XXXI. CAPVT.

Garga-
reon.
Cion.
Gargulio.
Columella

GVirgilio] Eadem fere Galenus libro sexto de compcsitio-
ne medicamentorū sūm locos habet, Carnosa (inquiens)
ut nos uertimus quædā particula in summa oris parte suspen-
sa apparet, si quis toto ore plurimum aperto linguā deprimat
hæc inquam caruncula duobus nominibus à ueteribus græcis
nominatur Gargareon, & Cion hoc est Gorgulio & Colum-
na. His posterius medici prope omnes non ita, sed cronida
quod est columellam ipsam nominant. Nam eorum qui sta-
phylen, hoc est uuam uocitant, satius est nō meminisse. Non
enim particulam, sed unum aliquem ipsius affectum, Staphy-
len hoc est uuam appellamus, &c.

Vua.

Tenuis aut oblongæ] Celsus partē ipsam contra græcorū
opinionē, uuam appellat lib. 7. uua inquiens, si cum inflāmatio-
ne descēdit, &c. Paulo post quasi uerba Pauli recenset in hunc
modū. Si uerò inflāmatio quidē nulla est, nihilominus autem
ea ultra modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta alba,
præcidi debet. Itēq; si ima, lucida, & crassa, summa tenuis est.

IN XXXIII. CAPVT.

Larynx.
Pharynx.

QVomodo aspera arteria] Caput est περί λαρυγγοτο-
μίας. Superius annotaui quid ὁ λάρυγξ apud græcos
medicos sit, quid ὁ φάρυγξ & ἡ φάρυγξ. Hic dico τὸν λάρυγγα
& φάρυγγα pro aspera arteria usurpari & inter se confundi, si-
cut etiam βρόγχον. Gale. eodem modo utitur lib. 2. de placi-
tis Hippocratis & Platonis magis autem ὁ λάρυγξ pro sum-
ma parte arteriæ, ὁ φάρυγξ pro tota ipsa ponitur. Verba Gale-
ni sunt. τὸ μὲν γὰρ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἥνπερ δὴ καὶ φάρυγ-
γα προσαγορεύομεν, &c. Paulo superius. πληττομένη γὰρ ὑπὸ
τῶν κατὰ τῶν λάρυγγα χόνδρων, οἷον ὑπὸ πλήκτρων τινῶν ἢ ἐκ-
φυσκαίσι ἀντι φωνὴ γίνεται, &c. Iam eodem in loco ἡ φάρυγξ,
nisi uicium sit codicis, pro ἡ φάρυγξ usurpatur, in hanc senten-
tiam. οἷδ' ἐδὲ ἄλλοι ἔχουσι λέγειν, ἢ δὲ ὅτι πλείσιον ἐστὶν ἡ καρ-
δία τῆς φάρυγγος διὰ τὸ εἰς ἐκείνης ἀρχεῖσθαι τὴν φωνήν, &c.

IN

IN XXXIII. CAPVT.

ANo proximos.] Codices nostri deprauati erāt, δάκτυλου habentes, pro δακτυλῖς ubi non parum debet Orosius exemplari suo. Paulo post fac διάτρησιν ex διάτρησιν.

Implicitum aliquod in longitudinem.] Sic interpretatur λημισκὸν. Celsus lib. 7. cap. 28. Intus inquit, & implicitum in longitudinem linamentū (λημισκὸν græci uocant) in aceto tinctum demittere. In codice græco est διασυστόν distinctum, quasi duæ dictiones sint, impressum, quod legēdū est διάσυστόν, quod pertrahi possit & implicari.

Fomentum & medicamen.] In exemplari græco habetur τὴν αὐτὴν ἐμβροχὴν μοτοφυλάκιον φάρμακον, pro quo legēdū censeo τὴν αὐτὴν ἐμβροχὴν, καὶ μοτοφυλάκιον φάρμακον. Nā antea uino & oleo, aut aqua & oleo aspergi uolebat, inde medicamē in lintheolis illitū accommodari. Capitur autem eodem fere sensu, quo ἐμμοτον. primum non annotauit Orosius, nec Gemusæus.

Orosius.
μοτοφυ-
λάκιον

IN XXV. CAPVT.

IN Ceruice.] superstitiosi quidam doctores, pro in ceruice, censent dicendum, in collo, quod ἐν τραχήλῳ græce dicitur. At Celsus fere ubiq; ceruicem pro collo, ut libro quinto de strumis agens in hunc modum, nascuntur maxime ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus.

τράχιλος

Arteriæ quas Carotidas appellant.] Hæ arteriæ in dextra sinistraque circa guttur sursum procedentes ultra aures feruntur, quæ nomen inde sortitæ sunt, quod ἡτρεῖæ, aut alterationem quandam expertæ Caron inducunt, quemadmodū musculi καρσιδεῖς apud Hippocratem de articulis.

Cartides.

Nerui recurrētes.] Hi sunt nerui sextæ coniugationis cerebri, qui iuxta carotidas arterias deorsum feruntur, communi utrinque uelamento, & in Anatome plenius condiscēs.

Musculi.
καρσιδεῖς
Nerui re-
currentes.

IN XXXVII. CAPVT.

Arteria aperte.] Galenus libello de tumoribus præter naturam hūc in modum habet. ἀρτηρίας δ' ἀνατομωθείσας, τὸ πάθος ἀνευρίσμα καλεῖται. γίγνεται δὲ καὶ τρωθῆσθαι αὐτῆς, ἐπειδὴ αἱ εἰς τὴν μὲν ἀφίηται τὸ προσκείμενον αὐτῇ δέρεκα δ' αἱ μὲν τῆς ἀρτηρίας ἑλκος, μήτε συμφυεῖσι, μήτε συνουλωθείσῃ, μήτε σαρκὶ φραχθείσῃ: διαγινώσκειται δὲ τα τοιαῦτα παθήματα τῷ σφιγμῶ τῶν ἐργασζομένων ἀρτηριῶν, ἀλλὰ καὶ θλιβομένων.

μένων ἀφανίζεται πᾶς ὄγκος παλινδρόμησης εἰς τὰς ἀρτηρίας
τῆς ἐργαζομένης αὐτὸν ἐσίας. Ex quo sententia, addendum in
Paulo superius est ἔλκος, legendumque μένει δὲ τῆς ἀρτηρίας
ἔλκος, non μένει δὲ τὸ τῆς ἀρτηρίας, &c. Hæc non annotavit
Orosius, uel Gemusæus.

Tumor omnis euanesceat.] Codex græcus habet πῶς δ' ὄν-
κος pro πᾶς ὄγκος. nec hoc aduerterunt Aristarchi nostri.

IN XXXVIII. CAPVT.

Βρογχοκῆλη **Λη** **G**randis in ceruice & rotundus.] Celsus lib. 7. inquit, At
in ceruice inter cutē, & asperā arteriam tumor increscit,
βρογχοκῆλην. græci uocāt, &c. Qui hoc uitio laborāt gutturo-
si apud latinos nomināntur. IN XXXIX. CAPVT.

συτροφή **G** Anglion.] Verti ganglion est nerui in modum concretio
quod græce est συτροφή νόδῳ. Nā indurātur nerui, contor-
quenturq; ac in nodosam affectionē coeūt. συτρέφεται signat
inspissari, coire, indurescere. IN XL. CAPVT.

Copia uero ipsius] Vide Galeni commentarium de ple-
nitudine: ubi copiam utramque susissime exponit.

Ordo ue-
narum in
mittendo
sanguine.

At in capitis morbis.] Galenus libro de anatomicis tracta-
tionibus quarto in eandem fere sententiā habet. In iis qui in
fra iugulum afficiuntur, siquidē sanguinē detrahē oportet,
principium locum præsidii ratione uena possidet: quæ cubiti
flexū accedit sē quæ ad cubitū ipsum defertur. Tertiū com-
munis, quartum quæ ab humeraria ad flexū cubiti pergit, po-
stremū humeraria ipsa. In illis autē quos supra iugulum mor-
bus infestat, contra, humeraria primum, quæ inde ad cubiti fle-
xum porrigitur secundum, tertium communis, quartum quæ
ab interiori parte flexum adit, quintum, quæ cubitum ipsum.

IN XLI. CAPVT.

Λενὴς cucurbitula **L** Euis itaq; Cucurbitula.] Dicitur leuis cucurbitula, quæ
sine scarificatu, & flamma imponitur. uide Galenū in li-
bello de hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, scarificatu.

Alii cucurbitulis usi sunt uitreis.] Celsus duo genera cu-
curbitularū ponit æneum, & corneū quanquā ex aliis quoque
materiæ generibus fieri doceat. ac si cætera defecerunt calcu-
lus quoque pultarius oris cōpressioris ei rei cōmode apratur.

IN XLII. CAPVT.

Genera cu-
curbitula-
rum.

Hippocrates.] Libro de Articulis de ala mentionem fa-
cit, non autem certe altius ferrum adigi præcipit, quod
nerui,

nerui, uenæ, & arteriæ subsint, quæ calorem istum ex ferramento tolerare nequeunt. IN XLIIII. CAPVT.

Conuenit igitur.] Græcus codex plane peregrinā habet lectio nē, quid enim sibi uult aristolochiæ mentionē facere, uti ferramento crustæ excitandæ sunt. Habet autē in hunc modum. δει ἐν τῆς μακρᾶς ἀριστολοχίας τὴν ρίζαν ἀλαίῳ ὀδυσσας ἐντίθεναι αὐταῖς πεπυρακτωμένας τὰς ἐσχάρας. hoc est conuenit igitur longe aristolochiæ radicis oleo imbuta imponere ipsi crustas ignitas. Mihi autem legendū uiderur δει ἐν αὐτοῖς κατηρίοις πεπυρακτωμένοις τὰς ἐσχάρας ἐνχίθηναι, ut nos uertim⁹. Neglexerūt locū Orosii & Basilien̄is castigatōr.

IN XLV. CAPVT.

Galenus solam administrationem.] Libro quartodecimo Methodi hæc ad uerbum inuenies.

IN XLVII. CAPVT.

Vomica laborat. Græce est ἀφυτάμενον quasi dicas, abscedens. Celsus de uisione iecoris agens, dicit si uerò iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationib. quidā etiā contra id scalpello aperiunt, ipsam uomicā adurunt.

IN L. CAPVT.

Quo ueluti in utrem aqua colligitur.] Hoc est, si ascites hydrops est. Nam ἄσκος utrem signat. Auicenna administrationem ex Paulo sumpsit.

Imum abdomen adusq; tenuem.] Sic redidi ὑπογάστριον, quod ad uerbū sonat imū uentrē. Sed abdomen imum ex Celso sumpsi, nam exterior uētris pars est, abdomen. forte ἐπιγάστριον legendū est, ut in sequentibus, χαλκῆν καλαμίσην διατετῆς τῆς ἐπιγαστρίου, καὶ τῆς περὶ τοῦ αἵματος διατρέσεω καθόισμεν.

IN LII. CAPVT.

Quomodo peritonæi.] Hoc caput ex sexto medendi Methodi libro sumptum est, uerum in codice græco, mirum quam mutilū & deprauatum. Orosius aut, & Basilien̄is castigatōr non aduerterunt, in erratis interpretū occupati.

Quare etiam remedium.] Lege in codice græco ὡς τε καὶ ἡ ἰασις ἐν τῷ θερμῇ.

Mox expressa calefacere.] fac ἐκθερμῆσαι τὰς τῶ ἐντερον.

Quæ græci Syringotoma.] μεταῖνα καλέμενα ὀρθρὰ σιγγότομα. Figura autem laboranti. Adde in græco dictionem hoc pacto ἐπιτήθειν δὲ σχῆμα τῷ κάμνοντι.

Gg 4 Cum

Vomica in
pectore.
Ascites.

Ascites.

Cum in superioribus deorsum.] Deest in græco, πρὸς δὲ τοῖς ἄνω, κατὰ ῥόπον.

Quoad totum exacte persuatur.] Deest aliquid. Legendum enim ἄχρι πέρ ἂν ὅλον ἀκριβῶς ῥαφῇ.

In per reliquum abdomen.] Fac ex διαπείρειν τὸ ἕτερον ἐπιγαστρίον hoc, διαπείρειν τὸ ἕτερον ἐπιγαστρίον.

Deinde ab hoc rursus.] Hic multa desiderantur plane necessaria quæ superioribus adiciantur, ne quis cōpendii causa ab ipso Paulo prætermittenda censeat. Sic igitur ex Geleno instaurari debet. εἴτ' αὖτις ἀπὸ τούτου πάλιν ἀρχαμένους συρῶ-
ῥάπτειν αὐτῷ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίᾳ. καὶ ταῦτα διεκβάλλειν διὰ τῆ πλησίον δέσματος. ἐκείθεν δ' ἂν πάλιν εἰσω διείρειν, συρῶσάντων αὐτὸ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίᾳ διεκβάλλον-
τας τε διὰ τῆ πλησίον δέσματος, εἴτα, &c.

Pari modo si proxime oras] Legendum est ἔτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἐχρητάτω.

Id autem fiet in eum modum] Fac ἔσαι δὲ τῆτο κατὰ τὸν δὲ τὸν τρόπον. Quid enim sibi uult ἔτω δὲ τῆτο κάτω, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον. Vbi hic tua diligentia Oroscie?

IN LIX. CAPVT.

καθέτην

Sympto igitur Cathetiro.] hoc instrumentum à demittendo dictum est. nam per id aliquis liquor in uesicam demittitur à κατὰ & ἵκημι. Est autem rectus syptho, ut ait Gal.

IN LX. CAPVT.

Ligaminibus sex processuū.] Hoc est sex appendiculorum ἑξασκελεῖς enim ad uerbum sonat, sex crurum. a geometris petita dictio est, qui figuras quasdā ἑξασκελεῖς nominant.

ἐπικόπος

Super lapidem qui excidendis subiicitur.] Græce est κά-
πειτα διέλωμεν κάτω τὸν λίθον κατ' ἐπίκοπον αὐτοῦ τῆ λίθου hoc est deinde diuidemus infra calculū super ipsum lapidē qui incidendis subiicitur. At uitiū exemplaris esse puto, ponendumq; pro τὸν λίθον, quod est calculū, τὸν καυλὸν hoc est colem. uerū Aetius & alii ueteres, sectionē in cole non infra ad futurā, uerū supra fieri præcipiūt sed κάτω. Sunt qui intelligāt super lapidē ipsum qui inciditur. IN LXI. CAPVT.

Nota,

ἑξασκε-
λεῖςDartos.
Erytheroi-
dos.

Tunica erythroides.] Duæ sunt testiculorum tunicae, dar-
tos, & erythroides. Hic autem male habetur in Græco ἐλπιθειδῆς pro ἐρυθροειδῆς. Paulo post inuenies ἐρυθρὸν pro ἐρυθροειδῆ posuit. Gæmuseus locū iā citatū reliquit uitiatū.

IN

IN LXII. CAPVT.

Hvmoris ociosi in particulis scrotum impli.] In græco est ἄργον ὑγρὸν συλλεγόμενον περὶ τὸ μέρος τῶν τῶν ὀσχεῶν διὰ πλεκόντων σωμάτων, quod ad uerbum sonat. Oroscius humor collectus circa partem corporum scrotum implicantium, Mihi uisa est superior rranslatio manifestius. hoc te meminisse ueluti. Cæterum commune ramicum nomen est, Hernia ut ait Celsus: unde Herniosi appellantur.

IN LXIII. CAPVT.

Hernia.

RAcosin.] Ita appellant græci ῥάκος quod uile detritumq; linamētum, ut superius annotatum est. Cum itaq; laxior cutis scroti & ueluti lacera pender, rhacosia uocant.

Rhacosia.

Quod incidendis subiicitur.] Græce est κατ' ἐπικόπου σαιδίδις, quasi dicas super asserem, super quem aliquid inciditur. Superius de calculosis dixerat, κατ' ἐπικόπου τῆς λίθου. Nōnuli calculum ipsum qui inciditur, exponunt, uerum in sequētib; dictio ἐπικόπος inotescet magis.

ἐπικόπου.

IN LXXII. CAPVT.

Pessarium aliquo cicatricem inducente unctum.] πριαπισκὸν reddidi pessarium, nam illud nihil aliud est quā penicillum, pudendi uirilis figuram repræsentans. Superius autem habetur, spiculo quod græci δίοπτρα appellant, à perspicendo, Nam hoc instrumento triplici crure prædito, naturalibus dilatatis, latentes in utero morbi cōspiciuntur modum uero aptandi instrumenti uocant δισπτρισμόν.

πριαπισκός.

δίοπτρα.

IN LXXIII. CAPVT.

Speculi tridente.] Sic exposui τῆς τῆς δίοτρας λώτῃς. Cum enim speculum tria habeat crura, aut columnulas, aut dentes, inuicem iunctos, sed qui diduci possint, non plane abhorere uisum est à sensu, si tridentem speculi dicerem. Nā quid sibi λώτῃς apud græcos aliud uelit, nescire me fateor. Bernardus felicianus, qui mihi in Pauli sexto uertendo successit, græcam dictionem reliquit, Loton inquiring speculi.

λωτός

Lotos.

IN LXXIII. CAPVT.

Contractum.] Male in græco codice est συνημένων pro συνημένην Paulo post λελεπτυσμένην, pro λελεπτησμένην, rursus, postea indicem digitum unctum, λελεπισμένην habetur pro λελιπασμένην. quæ omnia Oroscius neglexit.

Hydrocephalon sit, hoc est aquam in capite.] Hoc est ferè quod

Hydrocephalon.

quod Celsus dicit, solet etiam euenire ut infans humore distendatur, ex eoq; profluat foedi odoris sanies.

IN LXXV. CAPVT.

MAnu siquidem sinistra calida, inunctaq;.] Græce est, τὴν γὰρ χειρὰ τὴν ἀριστερὰν θερμὴν καὶ λελεπισμένην. fac λελεπισμένην ἀλιπαίνω. Et hoc reliquerunt aristarchi.

IN LXXVII. CAPVT.

SI oblique, specillo duplici cuspide.] male in codice Græco habetur, διαπυρίνα pro διπυρίνω.

Caulis modo porrecton.] Græce est ἀποκαλιθεῖν, hoc notat caulium modo transuersim fractum.

IN LXXVIII. CAPVT.

Fistulæ.

ANi fistulæ latentes.] Fistulæ ani aliæ tortuosæ, aliæ multiplices, aliæ transuersæ, aliæ simplices habentur.

Vel specillo per fistulam.] Rursus male in græco διαπυρίνω pro διπυρίνω habetur.

διατορὲς

διόπτριον

Instrumento quod ad sedem.] Vocatur hoc διατορὲς διόπτριον quasi dicas distendens speculum, uerum propriè dicitur διόπτριον de utero Potest autem accommodari etiam sedi, cum latentes in ea morbi sint

IN LXXXIII. CAPVT.

DE extremarum partium præcisione.] Sic uocatur græcis ἀκροτηριασμός. Celsus lib. 7. de Gangræna inquit, Gāgræna inquiens, inter ungues, alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta uincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

ἀκροτη-
ριασμόν.

Ex causa exterius adueniente.] Græce est ἐκ προκαταρκτικῆς αἰτίας, quasi dicas præincipiente aut primaria causa, ut προηγουμένως de intentione causa dicitur.]

IN LXXXV. CAPVT.

Pollicibus.] In græco est πῆς πρὸς μεγάλῳ δάκτυλῳ, hoc est ad uerbum in manus digitis magnis. Quia uero pollex quasi maximus omnium est, uerti pollicibus, Celsū imitat.

IN LXXXVI. CAPVT.

VT sanie excreta, secta hæc.] Codex græcus tātum habet, ἵνα ἐκκριθῆντος, ubi addendum est ἰχώρος, legēdnmqs; ἵνα ἐκκριθῆντος ἰχώρος quod Orosius & Basiliensis corrector nō annotarunt.

At in rectū superne deorsum.] Hic quoq; mutila est lectio exemplaris

exemplaris græci. Habet enim εἰ δὲ κατ' εὐθυ ποιήσαις τομήν
ἐκ τῶν ἀνωθεν εἰς τὸ καλὸν μενον ὑπεσάρκομα γίνεται τῆς, &c ubi
legendum est, εἰ δὲ κατ' εὐθυ ποιήσαις τομήν ἐκ τῶν ἀνωθεν εἰς
τὸ κάτω, τὸ καλὸν μενον ὑπεσάρκομα γίνεται, τῆς, &c. Istud quo
que Aristarchi nostri neglexerunt.

IN LXXXVIII. CAPVT.

Telis extrahendis.] Telum uocatur, quicquid manu iaci
mitiue in aliquem potest, unde quod græcos βέλος à βάλ βέλος
λω quod est iaceo dictum est.

Hastilia.] Sic exposui ἄτρακτα Galenns in exegeſi Hippo
cratis inquit ἄτρακτοι εἰ μόνον τὸν εἰς ἱερουργὸν χρῆσιμον, ἀλ
λά καὶ τὸ ξύλον βέλους, hoc est attrahito non modo ad sacrifi
cium utilē, sed et sagittæ lignum significat. Alibi appellat τὸ
ἐπίθεμα, nempe id quod imponitur Ego ut obtēperare Oro
scio hostile di*, q̄ quā interpretatio mea satis erat manifesta.

Belulcum.] Celsus lib 7. hoc ferramētum ad Authorem
Dioctem refert. Est autem lamina uel ferrea; uel ænea etiam
ab altero capite, duos utrinq; deorsum conuersos uncōs ha
bet, ab altero duplicata lateribus, leuiterq; extrema in eā par
tem inclinata quæ perforata est.

Succus ex uentriculo.] Hoc est Chylus, quæ uox licet græ
ca sit, medicis tamen non est incognita. Est autem proprie
Chylus, succus ex alimento in uentriculo prima concoctione
factus, nec proprie succus latine dicitur, quia uero aliam di
ctionem non habemus, ea utendum fuit.

Lamina quæ membranam custodiat.] uocatur græcis in
de μνηγγόφυλαξ. Celsus ut alias annotaui lib. 3. exponit in
hunc modum. Lamina ænea est, firma, paulum resima, ab ex
teriore parte leuis quæ demissa est, ut exterior pars eius cere
bro proprior sit, subinde ei subiicitur, quod scalpro discutiē
dū est, &c. Sequenti capite rursus ait, subiicienda lumina est, q̄
custodē eius mēbranæ esse proposui, & super eā quicquid spi
nosum est, & intus eminet excidendū est, forte non male ἐπι
κόπος dici potest.

IN XC. CAPVT.

VSque ad laminam secundam.] Græce erat ἀρεὶ τῆς δι
πλόης Recentiores, ijq; barbari dicunt ad caluariæ tabu
laturam, alii usq; ad duplicationem.

Mirum in modū Galeno cōmendatur.] Vide librum sex
tum Galeni Methodi medēdi, ubi de fracturis caluariæ agit.

Chœnicion,

ἄτρακτον

βελελκόν

χιλός

μνηγγό
φυλαξ

ἐπικόπος
διπλόη

Χοινίκιον
Modiolus.

Chœnicion.] Celsus interpretatur modiolū qđ ita describit lib. 8. cap. 3. Modiolus ferramentum cōcauū, teres, est imis oris serratū per quod mediū clauus ipse quoq; interiore orbe cinctus demittitur. IN XCII. CAPVT.

Celsus.

TEnui & sorbili cibo.] Celsus lib. 8. in quo Hippocratē magna ex parte sequitur, habet. Deinde die tertio humidū cibū, quod Paulus dixit λέπταις, καὶ ῥοφηματώδες τροφαῖς.

Fracturarū
differētiæ

Maxilla intra tres potissimū septimanas.] Huic snia Celsus astipulatur. ferē uero intra quartum decimū & unū & uigesimum diem sanescunt, maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapulorū, costæ, spina coxarū, os tali, calx, manus planta.

Quod si fractura per transuersum.] Fracturarum differentia quinque sunt, prima quæ sit schidacedon, altera caledon. Tertia raphanidon, quarta sycydon, postremo alphitedon, prima assulatim quasi per rectitudinem, secunda per trāsuersum, tertia in raphani modum per fissuras, quarta cucumeris modo, quinta in minutissimas partes ut farina efficitur.

IN XCII. CAPVT.

Lamina quæ à tuendis.] Græce erat μινυγγοφυλάκος ἢ ἐτέρας ἐκκοπέως. Adhibetur et lamina quā in cerebri membranis usurpamus, aliis quibusdam excidendis: ut corium, uel asser, uel massa plumbea æneaq; . Puto autem legendum ἐπικόπου pro ἐκκοπέως. Nam superius ἐκκόπων facta iam erat mentio. Præterea subiungitur, dictioni μινυγγοφύλακος. In sequenti capite Græce habetur προτυπᾶται pro προτυπᾶται. quæ omnia Orosius & Corrector Basiliensis neglexerunt.

IN XCIX. CAPVT.

MAnubrii ligonis.] in Græco codice male habetur οἶον τυλίον, pro οἶον τελεός qđ Orosius & Gemusæus præterierunt. Exponit autem Galenus, rationem administrationis huius commētario secundo in librum Hippocratis de fracturis.

κῶλα
Artus.
Membra.

In medio membro.] Græca sonant, ἐν μέσῳ τῶ κῶλῳ frequentius uertunt τὰ κῶλα artus. Celsus autem lib. 8. uidetur etiam in articulis enumerādis, dictione, membri, uti primum in hac sententia Si breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt. Item donec id membrū cōfirmetur, de humeris, brachiis, cruribus, feminibus, digitisq; cōfractis uerba faciens.

IN CVII. CAPVT.

A Daptamus uero ossa uecte.] Hoc est in locum suum com mode

mode restituiimus. Cæterum *μοχλίσκον* quod à *μοχλὸς* descēdit, uestem reddidimus uide Hippo. lib. de fracturis, ubi habet, *μοχλίσκος*. *σιδήρια* χρὴ πρόειδαι ἐς τῆτον τὸν τροπὸν ὅνπερ ἔχουσιν οἱ *μοχλοὶ* οἷς οἱ λάτυπροι τρέονται, τὸ μέντοι πλατύτερον, τὸ δ' ἐτίτε νότερον, &c.

Membris coniugalibus.] Dicuntur membra coniugalia, cum duo inuicem iungantur, ut in cubito duo ossa, in tibia itē duo. Rursus aiuga, quæ solæ sunt, nulli consimili iuncta, ut brachium, femur, aliâq; id genus. Apud Galenum in anatomicis φλέψ ἀζυγος de uena, quæ ex paribus thoracem intercurrentibus, solâ absq; pari relinquitur, mentionem faciens.

Vt in litera χ.] Græce est κατὰ τὸν χιερμένον, male pro χιερμόν, ut in sequentibus etiam habetur. Est autem χιερμός, imitatio literæ χ.

Linamento illitum.] Idem *μοτοφύλαξ* & *ἐμαμοτόν* apud græcos est, prius quā in lintheolo seruatum significat: alterū in lintheolo illitum. *μοτόφυλαξ*, *ἐμμοτόν*.

IN CXI CAPVT.

Differentias.] Celsus ita scriptum reliquit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo quæ iuncta sunt inter se dehiscunt: ut cū latum scapularū os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure, tibia à sura. Interdū salu, calcis os à talo. Modo articuli suis sedibus exci- dūt, &c. primū *παράρθημα* dicere poteris: alteru *ἐξάρθρωμα*.

Vsq; ad superficiem.] In græco legitur *μεχρὶ τῆς ὀσφύος* male nimirum pro *μεχρὶ τῆς ὀσφύος*. neglexerunt locū Oroscius, & Gemusæus. *παράρθημα*, *ἐξάρθημα*.

IN CXII. CAPVT.

DE maxilla,] apud Græcos γένυς cum uoce κάτω significat maxillam, cum uoce ἄνω, malas. quanquam barbari maxillam inferiorem & superiorem appellent. Græci etiam dictione γνάθος in eodem significatu utuntur.

Σχάται.] Galenum commentario secūdo in librum Hippocratis, de articulis exponit quid sibi uelit σχάται. in hunc modum ὥστε τὸ σχάσθαι μυνῶν καὶ νδρῶν ἐπὶ πάθος ἀνέν ἀρ- θρήματος. ὁποῖον δ' ἐτί τὸ πάθος τ' ἐπ' ἐπ' ὁπλὸν μὲν καὶ τ' ἐφ' αἶναι παραλλαγαί. hoc est, quare σχάσθαι musculorū & neruorum affectus est citra articulamentum. Qualis autem affectus hic sit, constat quidem ex eo quod dicit, peruerfiones.

Maxillam

Maxillam cōmittūt.] Hippocrates legit συμβάλλουσι τὰς κάτω γνάθος. codex impressus Pauli dictionē κάτω nō habet. Tu lectionē corrigito secundū Hippocratem, ex quo hæc ad uerbum sumpsit Orosius, & Castigator Basiliensis.

Interpre-
ratio Hip-
pocr.

Sin autem utraq; maxilla.] Græca sonant, ἐν δὲ ἀμφότεραι αἱ γνάθοι. Hoc est si maxilla utraq; parte luxata fuerit nō ut recentiores interpretantur, maxilla inferior, & superior, quæ malæ rectius dicendæ sunt. Galenus orationem Hippocratis, unde hæc sunt transcripta, in eum modum interpreta-
tur, ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει δύο γνάθους ὀνομάζειν οὐ τὴν γένυν ὅλως, ἀλλ' ἐκάτερον τῶν μερῶν, καθ' ἃ πλάτνιεται αὐτὴ δύο διέ καὶ τὰ κάτω πέρατα καθ' ἃ γυμνον καὶ ἀσαρκον τὸ ὅτι ἐν ὀνομάζειν γένυας, &c. Quæ ita exponere possis. In hac oratione uidetur γνάθους non absolute maxillam appellare, sed utrāq; partem, in quibus ipsa dilatescit, uidetur etiam ima extrema i quibus os nudum & ex carne est, maxillas nominare.

Secundum horum directam aciem.] Pauli codex græcus habet κατὰ τάξιν, forte καθ' ἕξιν & ut Gal. dicit καθ' ἐὐθυπο-
ρίαν, ut scilicet dentes primores in maxilla, primoribus in ma-
lis, Canini caninis, molares molaribus respondeant. Hippo-
cratis uerba hæc sunt, τὸ δὲ ἀτραβὲς μάλιστ' ἂν γνῶναις τοῖσιν
δρίοισι τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω καθ' ἕξιν. Nō an-
notauit Orosius, nec Gemusæus correxit.

Orosius,
καθ' ἕξιν.
καρροειδὲς
οἱ μῦες.
Quomodo
caros.

Nam muscoli hi dum alterantur, & præter naturam inten-
duntur, carum inducunt] Græca ita sonant, καρροειδὲς οἱ μῦες
οὗτοι καὶ ἐντείνονται παρὰ φύσιν. Galenus locum exponens
commentario supra citato inquit, utrunq; & alteratio. & mu-
sculorum tensio carum potest efficere. Nam tensio hæc fit, fi-
lamentis quæ prius erant laxa, nunc omnibus secundum re-
ctam lineam extensis Alteratio, dum calefacti, aut refrigera-
ti, aut humectati, præter modum fuerint, aut inflammationē,
aut erysipelas fuerint experti.

Hicigitur decimo die potissimum moriuntur.] Mutilus
est codex Græcus Pauli. habet enim οὗτοι ἐν καὶ θνήσκουσι καὶ
μάλιστ'. pro quo legendum est, οὗτοι ἐν θνήσκουσι δεκατὰ οἱ
μάλιστ', ut habet Hippo. lib. de articulis. Gal. ibidem exponit
dictionem μάλιστ'. pro ἐπὶ τὸ πολὺ, quod est plurimum, ma-
gna ex parte, & ut nos diximus. potissimum. Orosius & Ge-
musæus locum præterierunt.

IN

Processus ancoræ similis.] Est hic processus interiore in parte exiguus, acutusq; anchoræ modo, qui etiam ab aliis *ροσάνοειδης* dicitur, quod extrema ipsius pars, ita corniculæ rostrum exterius inclinat.

Musculi bicipitis.] Vide Galenum de usu particularū, & de Anatomicis tractationibus. Est aut ex colli musculis anterioribus, qui in duplici capite ligamēta fortia obtrinet, unū ex processu anchorali, alterū ex elata superficie scapularū cernicis.

Ipsūq; humeri fastigium.] Quidam anatomici scapularum cū iugulo cōpactionem Græce nomināt *ἀκρωμίων* quasi dicas summum humerum, alii tertium os esse prædicāt, quod in ipsis tantum hominibus deprehenditur, ubi igitur in Græco codice habetur *ἀκρωμίων*, ego reddidi summum humerū, aut humeri fastigium.

Lignum quod Græci hyperon.] Lignum est pistilli modo factum, unde etiam nomen habet, frequens apud Hippocratem de articulis. Hyperon.

Atq; hoc in scalæ gradu.] Celsus lib. 8. de humero luxato Paulo consentit, sic (inquiens) brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradū traicitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit. Hippocrates hanc restitutionem per scalæ gradum separat ab ea quæ fit per hyperium, estq; apud illum, quintus restituendi modus, quanquam in sexto modo, scalæ etiam faciat mentionem. Scala gal.
linaria.

Ambe.] Ad uerbum transcripsit ex Hippocrate, & Celsus Hippocratem lib. 8. quasi expressit in hunc modum. At si uastius corpus, neruiue robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos perueniat. In qua summa capitulū est rotundum & leniter cauum, ut recipere particulam aliquā ex capite humeri possit. Ambe.
Celsus imi-
tatur Hip-
pocr.

Panniculo circumdatū.] Celsus idem aliis uerbis exponit. Eoq; spatha fascia inuoluta, quo neruis tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur.

IN CXV. CAPVT.

Sani cubiti inspectio.] Methodus hæc est quam Hippo. lib. de medicina exponit, quamq; Galenus similitudinis, & dissimilitudinis. Optime enim affecta pars cognoscit, si cū sana conferatur. Codex autem Græcus male habet *παθῆσις* pro *παθῆσις*. Methodus
similitudi-
nis, & dis-
similitudi-
nis.

πάθῃσις. Quid enim sibi uult, ἢ τῷ ὑγιαίνοντος ἀγκῶνος ἐλέγχει πάθῃσις, hoc est sani cubiti affectus arguit, quomodo id quod sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia πάθῃσις quod est disciplina, ego dixi inspectio. Aristarchi non si non aduerterunt.

IN SEQVENS.

Appellari Brachiale eam uincturam, qua brachium cū extrema manu committitur. Celsus palmam nominare uidetur in octauo. Græci dicunt καρπὸν.

IN CVIII. CAPVT.

Verbrez spicæ.] Hoc caput Paulus magna parte ex Hippocrate transcripsit. Auicēna autem quasi ad uerbum ex Paulo transtulit. In hoc discrepamus, ubi ego sculpturā uerti, ille foueam habet, ubi ego asserem, ille tabulam.


IN CVIII. CAPVT.

Intenso autem affecto Crure.] Mutulus est codex Græcus impressus uel Basileæ, uel Venetiis id quod etiam ex Auicenna manifeste constat. Habet autem codex in hunc modum: ἐν τεταμένῳ τῷ πεπονθότος ὑπὸ τῶν ἀγγέλων ὥς δύο δακτύλους, nimirum pro ἐν τεταμένῳ δὲ τῷ πεπονθότος σκελὸς πλεόν τῷ ἑτέρῳ ὥς δύο δακτύλους. quod miror Orosium ex suo castigato exemplari non aduertisse.

Comprehendens qua crassissimum.] Hic etiam male in Græco legitur κατὰ τὸ βραχύτατον, pro τὰ τὴν πᾶσχυτατιον. Id etiam omiserunt Orosius & Gemusæus. Ex superioribus lectio poterat cortigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent oculati.

FINIS LIBRI SEXTI

COMMENTARIORVM.






COMMENTARIORVM

IN PAVLVM AEGIN.

LIBER SEPTIMVS.



LIBER hic septimus Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride partim etiam ex Oribasio, transcriptus est, ordines Galenus præcipue, uires & descriptionem Dioscorides, cōpositionem medicamentorum Oribasius tradidit, quanquam hic quoq; à Galeno & alijs misturarū rationē acceperit. In codice Græco habetur *ἐκνεκροῖ* hoc est ad uerbū emortuū reddit, nos diximus sensū aufert. Oroscius maledicit legendū *ὀνδρῶν*. cū potius quadraret *ἐκνδρῶν*, qđ est eneruat.

Oroscius.

IN II. CAPVT.

Moderatum sane medicamentū.] Galenus s̄m genera inquit, medicamentū affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Cæterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci *τάξεις καὶ ἀποτάσεις* nominat. Galenus etiam *ἀριθμῶς* hoc est numeros appellat, nos ordines, interualla, abscissus, & gradus appellamus.

*τάξεις.
ἀποτά-
σεις*

Vt iam sensu priuent.] Græce est, *ὥς ἡδὴ νεκρῶν*, quasi dicas, ut iam mortificent, hoc enim frigida uehemēter, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuq; priuentur. In summa nihil aliud est *ἐκνεκρῶν* quàm uita & sensu priuare.

ἐκνεκρῶν.

Poterat Oroscius ex hoc loco, superiorem lectionem satis castigatamprehendere, uerum calumniandi animus eò illū prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

PAULI AEGIN.

Hh

IN

Lignum
aloes.

A Gallochum.] Aetius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilaleon nominauit. Hunc secuti recentiores quidam non dubitarunt Lignum aloes, appellare. In sumatra nuper à Lusitanis inuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem gentes hæ utuntur. Nam si in manu lignum hoc retineatur, optimum spirat odorem.

πλάδης

Flaccidum est superfl.] Gale. πλάδον interpretatur περίτην υγρότητα. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus, flaccescit, resoluiturque. Hæc dixi, ut intelligas, Lector, uersionis mea rationem.

Polytri-
chum.
Callitri-
chum.
Tricho-
manes.

Anchuiæ quatuor.] Ex Galeno transcripsit: quāquā & Dioscorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dioscoride dissentiunt, quod onochelon uiperarum morfib; conuenire dicant, forma cataplasmatidis adhibitam, ad alligatum, & comestam his uerbis, κατὰ τλασσομένη τε περιπτόμένη, καὶ ἐδιόμένη. Dioscorides de foliis ἐσδιόμενα. καὶ πινόμενα, καὶ περιπτόμενα.

Adiantum.] Adiantum & Polytrichon idē sunt, Callitrichum, & Trichomanes etiam idem. Duæ igitur species tantum sunt non quatuor, ut officinæ putant. Vna herba est adianthos in duas partes separata, una proprie adiantum dicitur, de qua Dioscorides priuatim in uno capite tractat, foliis magis albis coriandro similibus & longioribus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes, foliis filicis tenuibus, nigrioribus primo, & breuioribus hæc proprie uocatur Callitrichon. Pharmacopolæ in duobus communi uocabulo capilli ueneris utuntur.

Capilli Ve-
neris.

Athera.] Ex Dioscoride sumptum, uerum clausula hæc apud illum non adest, ἀπὸ σίτου quod est è frumento. nec apud Galenum, nec Oribasium inuenitur.

Aegilops.] Auene secundum genus. Primum βρόμος dicitur.

Quid loco
acatie ue-
ræ summi
possit.

Acacia.] Veterum acatiam non habemus. utimur autem quadam ex fractu pruni syluestris facta. uerum recte aliquis utetur loco acaciæ ueteris, rhu obsoniorum, quod sumach uocant officinæ, ut quidam eruditus annotauit.

Brancha
ursina.

Acanthus.] Si Dioscoridis acanthum, & nostram Brancham ursinam conferas, idē plane esse intelliges. Verg. dixit, mollis acantibus.

Acinos.] Ex Dioscoride tantum hoc transcriptum est, ubi φύγεον

λον

Αcoron interpretatus sum panum, & ἑρσιονπέλατα sacros ignes. **Acorus ueterum.**

Acoron] Acorus ueterum, Galanga nostra est: noster autem acorus species glandioli.

Amaracus.] Paulus & Galenus duo capita de amaraco & sampsucho faciunt: easdemq; uires utriq; attribuunt. ac si autores conferas idē plane sunt. Amaracus aut magis apud cyprum celebratus, sampsuchus in tota Græcia præterea amaracus paulo erit odoratior, quam hodie apud Gallos maioranā gentile dicunt quēq; magis humi serpit. Sampsuchus erectior minusq; odoratus. Dioscorides etiā diuersa fecit capita de ungueto amaracino & sampsuchino, qđ alterū ex nobiliori maiorana in Cypro & cyzicenis, alterum per totā græciā fieret. Galeni aut Amaracus est, quā hodie Matricariā nominamus.

Amaranthus.] Nota herba est apud Gallos, uocāt eā passe- uelutum, quod coloris gratia sericum coccineum uincat. annotauit Ruellius. **Matricaria.**

Ambrosia.] Frequēs reperit in gallia inter exiles & madi- das segetes qua mēssores se coronāt Vinosa herba rusticis dī, alijs uinosa ruta, qđ folio rutā, & odore uinū imiteť. Quā of- ficinā ambrosiā noīant, polemoniū antiquorū ē, nō ambrosia.

Ampeloprasum] Exulcerat. Græcus codex habet κακῶι. at ego legendū ex Gal. censeo ἑλκῶι. quod castigatōr Basilien- sis dissimulat me annotasse priorem Orosius neglexit. **Ambrosia.**

Anemonæ omnes.] Hoc est oēs satiuæ species. Duo n. ge- nera tm habentur. Satiuū, & syluestre. Satiuū nos papauer ru- brū appellamus, eoq; utimur in triticis nascente. ueteres aut nunquā papaueris noīe uocarūt. Germani clapperrosen, gal- li passe fleur. Ipsa nomenclatura à uēto sumpta est, qđ eo flā- te, flos ipsius aperiat. Erratica nūcupat gallis coquerelles, pri- mo uere crescit flore purpureo, mulierculæ hac noua tingūt. **Polemonium.**

Lac in mammas suggerūt.] Ex Gal hæc omnia sunt tran- scripta. Verum in illo ἀνασπῶσι quasi dicas, sursum in mam- mas adducunt. In Paulo autem & Dioscoride κατασπῶσι. **Orosius.**

Aparine.] Addendum in codice græco particula, τι. nam sententia imperfecta est, si tantū legas ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές. fac igitur ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές. Hoc Orosius & Castiga- tor Basiliensis annotasse debuerunt, uel exemplari adiecisse. **Duo ge- nera.**

Aristolochia] Duab. tm specieb. in officinis utimur, Lōga & Rorūda. Sarmetacea negligit, unguētis alioquin utilissima.

- Lappa.** Arction profopitis.] Herba est, quam officinæ uocant Lappam maiorem. Alterum arction uirbasco simile, Lappam minorem appellant.
- Major.**
- Minor.** Armeniacum.] Hoc est lapis armenius apud Diosc. lib. 5.
- Arnabo.** Arnabo.] Idem est, quod Serapio uocat Zurumbet, Cassiæ fistulæ, & cubebis uiribus respondens.
- Arthemisia.** Arthemisia.] Duplex, monoclonæ, & polyclonæ, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distinctæ. Nam & hæc plures habet ramos.
- Baccara.** Asarum] Vulgus Baccharam appellat. Germani Haselwurtz. Galli, Racabarant.
- Fuligo.**] In græco est κατάγματα. Sic etiā habet Dioscorides. Nescio cur Orosius τραύματα legendū censeat, cū ipse quoq; fracturæ ossium ad cicatricē uenire dicantur. siquidē raro sine ulcere carnis, fractura accidat, nec κατάγματα solū de capitis fracturis dicitur, ut putat Orosius, sed omnium mēbrorum quod intellexisset Orosius si Hippocratis librum de fracturis legisset.
- Orosius.** Aspalthus.] Vero aspaltho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Munia loco ipsius uti. Nā in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturq; postea. Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, aliisque id genus conduntur.
- Mumia.** Asphodelus.] Pharmacopolæ, aphroditorum uocant.
- Atriplex.**] In græco codice uidetur addendum ταχέως. Nam διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται, quod est, quare etiam per uentrem transit, imperfecta est sententia, & communis cū aliis omnibus. Nam per uentrem uniuersa quidē transeunt, alia uero cito, quæ ταχύπορα, alia tarde, quæ βραδύπορα dicuntur. Legendum igitur cum Galeno διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται ταχέως. non aduerterunt nostri Aristarchi.
- Ungula taballina.** Bechion.] Officinæ uocant ungulam caballinam.
- Borago.** Buglossum.] Dioscorides & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem uocamus. Ei uero quam buglossam appellant officinæ, respondet ueterum Cirsiion dictū. Itaque buglossum duplex erit, alterū minus, diceturq; nostra uulgaris borago, alterū mai⁹, qđ Cirsiō apud ueteres dici monuimus.
- Buglossum.** Sabina.] Duplex est, altera Cupressio similis, altera tarmarici Germani seuerbaum, Galli fauinier appellant.
- Corallina.** Muscus marinus. Officinæ Corallinam uocant. In græcia ad uermes

ad uermes puerorū quasi præsentanæo remedio utuntur. Imo etiā purgare dicit, etiā uim astringentē ueteres ei ascripserūt.

Lemnium miniū] Celsus miniū uertit *μίλτον*. Manardus corrigat Barbarū, quod minium dixerit, non rubricam, ipse culpandus. Cæterū officinæ uocant Tertam Sigillatam, quā multis annis fictitiam, imo etiam hodie uendunt, rubricā quandā ex terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. uerā nunc Venetiis ex Lemno allatam habes: quæ ibi in collæ quodam fuluo colore nascitur. olim Dianæ sigillo eam imprimebant, unde etiam sphragis dicitur. nunc Turcico insignita est.

Minium.

Terra armenia.] Hactenus globulos quosdā in medio impressos ex Germania aiatos pro bolo armeno officinæ uendi derūt, uerus aut bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis literis, si supremā & inferiorē partē auferas. nam cū in Turcia imprimunt, adiiciunt fabulū albū, ut melius signū recipiat.

Senecta anguis.] Hoc est exuuiū, qđ uerno tēpore deponūt. Nuclei acinorū uue.] Græcus codex deprauatus est, qui habet *φυχα* hoc est frigidi. pro *φρυγα* quod est acerbi. Dioscorides dixit *τυπτικα* hoc est astringētes. Orosius omisit. Gemusæus inuitus cōcedit ita legendū, dissimulās me id antea annotasse.

Gingidiū.] Paulus ficcare dicit ordine tertio: Galenus, *κατα την δοντέραν απότασιν*, hoc est secundo ordine uel abscessu.

Nota.

Pollen farinaceus.] Tritici intelligendū est.

Tede] Teda proprie dicta, à græcis *δάς* & *δάδιον* uocatur sui generis arbor in Illirico est, redundantior humore quā reliquæ parciore liquidiorq; quā picea, flammis & lumini sacrorum quoq; grata. Improprie tedus appellamus, tum piceæ satiuæ partes imas tum alia quoq; ligna, quæ flamma olei uel picis illitu concepta faculæ modo lucent.

Teda.

Daucos.] Vero dauco caremus, qui in Creta nascitur, Noster daucus in officinis est species pastinacæ syluestris. Cum autem easdem uires haheant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictamnus.] Hanc non habemus. In Creta tantum nascitur, unde facile haberi potest, quā officinæ pro Dictamno uendunt, non est, nec etiā pseudo dictamnus.

Dictamnus.

Dracunculus.] Duplex est, maior, & minor. maior Serpentaria in officinis appellatur.

Quercus. Quod sub glandis corio. Dioscorides etiam habet. Tunica glandis putamini subiecta.

Hh 3

Ehenus.]

Oroscius. Ehenus.] Paulus habet græce ἐπιφατῆντα nullo sensu pro
ἐπισκοτῆντα. Sic etiam Dioscorides Oroscius non aduertit
nec Basiliensis castigat.

Veratrū.] Olim ueratrū album in usu frequentissimum
erat, nunc nigrū, idque solum forte quod illud molestius eua-
cuet. At ueratrū album si recte correctum exhibeatur, citra
molestiā purgat, maxime atra bile laborātes, & lue hispanica.

**Hermoda-
ctylus.** Hermodaetylus.] Alius hic est ab eo quē officinæ hermo-
daetylū appellant. Hermodaetylus serapiones duo cōprehen-
dit, ephemerū, & colchicū. Illud nō lethale, hoc perniciosum.
Sed in Italia colchicū min⁹ noxiū est, officinarūq; hermodaety-
lus, colchicū existit. Soluit ad sanguinē usq; Ephemerocarem.

Eupatorium.] Eupatoriū antiquorū est nostra agrimonia,
quid autem nostrum Eupatoriū sit adhuc me nescire fateor.

Spelta. Zea.] In Germania inferiori, & Italia speltam appellant.

Zithus.] Potus est ea ordeo aqua resoluto. uocant ubiq;
cereuisiant quanquā ea ex aliis etiā frugibus fieri soleat.

Isatis.] Glastum latini uocant. Galli Guadam.

Caucamum.] Serapionis lacca est, non autem ea quam offi-
cinæ uendunt. Tria enim nomine laccæ ueneunt, unum ue-
rum caucamum, alterum grana quædam arte facta. Tertium
unde color carmesinus confit.

Oroscius, **Cadmia.]** Manifestus error in græco. Legendum enim
βοτρυτῆς λεπτομερετέρα πλακίτις δὲ παχυμερετέρα. Oro-
scius omisit Gemusæus dissimulat me annotasse.

Calamintha.] Nepita Romanis uocatur. Tres sunt spē. Pri-
ma foliis ocymī, altera odorē pulegii habet. Tertia foliis men-
tastrī. Officinæ secundā uocant herbā cattorum. Tertiā cala-
menthū, quæ cæteris est ignauior. Quidā secundā spēm, pprie
Nepitā à Romanis noīari dicūt. Gal. aut libello de paratu faci-
libus inqt, Calaminthā absolute Nepitā Romanas appellari.

**Calamin-
thæ.**

Caros.] Officinæ Carui appellant.

Carpesium.] Myropolæ Cubebas nominant.

Cubebæ.

Nux.] In græco deesse aliquid ex dictione καὶν intelligo.
Nam Galenus ita habet, κάρυα τὸ δένδρον ἔχει μέντι καὶν τοῖς
βλαστῶνς τυπτικόν, καὶν τοῖς φύλλοις. Tu igitur hinc restitue. Ca-
stigatorum neglexerunt.

Cassia.] De Cassia odorata hic intellige Cassia fistula an-
tiquis eadem erat quæ odorata. Officinarum Cinnamomū,
seu

seu canellæ uilioris frustra, Cassia illa antiquorū uideretur. Nūc autem uulguſ cassiā fistulā accipit pro filiqua illa humore nigro intus plena, ueterib. incognita. qua purgamus hodie bilē.

Ceraſia.] Acida inquit conueniunt phlegmaticis & excrementosis stomchis. Male in codice græco legitur φλεγματώδεσι καὶ φλεγματικῶις. Mutanda autem ex Galeno φλεγματώδεσι καὶ περιττωματικῶις. Quod Cēsores nři nō annotarūt.

Ceratonix.] Pauli codex græcus habet, ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ ψυκτικῆς hoc est siccantis facultatis est & refrigerantis. Galenus pro ψυκτικῆς, legit τυπτικῆς, hunc nos sumus imitati non admonuerunt castigatores,

Galla.] Duo gallarū genera tantū in usu mediocrem sunt: unū solidū, alterū perforatū. aliorū compluriū nullus est usus.

Cinnamomum.] Hoc caremus. Nam quod nos Cinnamomum, aut canellam uocamus cassia potius fistula antiquorum existit Nam cinamomum fistula aut canella non est, sed arbuſtum uide Galenum de Antidotis.

Hedera.] Quod officinæ gummi hederæ, appellant, non est lachrima hederæ, sed alterius cuiusdam arboris quam ignoramus. potest autem haberi lachrima uera hederæ.

Gummi
Hederæ.

Cichoreum.] Paulus uocat cichoreum, syluaticam serem, seu, intybum. Græci tamē alii cichorei uocabulo tam domesticam, quā agrestem appellant. Domestica duplex est. una latioribus foliis, lactucæ similibus quam uulguſ corrupto uocabulo Endiuia quasi intybum nuncupant. Altera strictioribus folijs. Officinæ has duas scariolā quoq; nominant. Iam syluatica etiā duplex habetur, ac proprio nomine cichoreum seu picris ab amaritudine dicitur. Quanquam græci alij cichorei nomine, tam domesticā quā agrestim serim accipiāt. At quā hodie uulguſ herbariorū Endiuia ostendit in aruis sponte nascentē, folio lactucæ pusillo, aculeato, caule spinulis horrido, cādicāte, cui succus inest lacteus, syluestris lactuca existit.

Intybi spe
cies.

Clematis.] Bis habetur in codice græco κληματίτις pro κλημάτις. non emendarunt censores.

Orosius.

Cnicus.] Officinæ Cartamum appellant.

Gummi.] Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuū.] Protoſtaſton multi etiā celebres uiri trāstulerūt cinerē qui primus destillauerit, uerū ideo non est dictum lixiuum protoſtaſtū, sed quod primariū sit lixiuū, & principale.

Lixiuum
protoſta
ſton.

H h 4 Costus.]

Costus.] Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria haberi.

Hordeum.] Polenta græcis ἀλφίτα dicitur. Est autem proprie ordeum torrefactum. Pūsana uerò ordeum decorticatū.

Sigillum
Mariæ.

Cyclaminus] Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut Rapum terræ latinis à rotunditate dicitur. Altera Sigillum Mariæ, officinis appellatur.

Lichen.] Hæc est herba, quam officinæ hepaticam nominant, iocinorum fibris similis.

Leucoion.] Per se signat uiolam albam quam gariophylla tam albam uulgo nominat. Refertur tamen nomen hoc leucoion, etiam ad omnes alias uiolas, præsertim ad eas quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue purpureæ, siue luteæ fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

πέυκης
πύτις
κῶνος

Fuligo.] Fuliginē pini, coni, & piceæ acriorem esse prodir. Mirum in modū uariant interpretes in his uocibus reddendis misereq; se torquent. Gaza πεύκην transfert pinum, πέτιν, piceam. Κῶνον, Conum. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πεύκην exponat tedam. Conū autem nucē pineam interpretatur, ut accipit Dioscorides, alijq; ueteres græci. Galenus autem Canon arborē appellat, fructum eius, hoc est nucē, κόκκαλον, & τρύβιλον. Atq; hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides.] In græco est μέροφος, lege μόροφος. Dioscorides uocat μόροχθον, alij etiam μόλοχθον.

Lycium.] Officinæ uerum Lycium non habent.

Atramentum Indicum.] Dioscorides uocat lapidem Indicū, præterea astringentis esse naturæ tradit. unde codex Pauli græcus emendari debet legendūq; τῶν στιφόντων pro τῶν ψυχόντων, quod Orosius non annotauit. Gemusæus dissimulat me id ostendisse, textumq; relinquit deprauatum.

Melantheria.] Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea caligulas calceamentorum tingi scribit.

Melanthium.] Nigella est. Quam officinæ ostendunt, uera non est. Nam semē est subflauum, cū nigrū esse debeat, acutū, boni odoris. Galli melle noyre. Germani ratten appellār.

Myxa.] Officinæ Sebestem nominant.

Oenanthe.] Duplex, una solau foliis herba, quæ uitis nō est, sed ob fructū racemosum uitis appellat. Altera labrusca quæ à uite domestica nihil differat, nisi quæ syluestre habitum referat,

referat, nec colitur, uocant Oenanthe, labruscæ flores, quam-
quam & herba sit eiusdem nominis.

Opos.] Codex Pauli Græcus ὀπιον habet, Galenus ὀπος. ὀπος.
Superius de lachryma papaueris quæ opium dicitur, actum
est. Hic de laserpitii liquore: qui partim belzuinum partim
assa fetida dicitur officinis.

Eruum.] Dubitatur, an officinarum eruum uerum sit nam
intus flauescit, cum album esse debeat.

Orminum.] Vulgus in Gallia uocant: Toute bonne, aut
Balsamitie.

Oryza,] Vulgus Rizam appellat, prima adempta litera. Rizum.

Petroselinū.] Verū petroselinū nō habemus, forte nostrū
est apiū hortēse, qđ Dioscorides cōdimētis accōmodatū dicit.

Peuce] Vbiq; interpretes græcorum πεύκην pinum, inte-
rim pinastrum reddunt.

Pistacea.] Officinæ, phistica nominant, aut phystico rum Physica,
grana. codex græcus male habet λεπτων, pro λεπων. Nō emē Orosius.
darunt censores nostri.

Pityides.] Dioscorides pini, piceæq; fructus nominat. Gale-
nus piceæ tātū, illosq; abuti dictione ait qui utriusq; arboris
fructū ita appellāt. Sunt aut interni nucum pinearum nuclei.

Poligonatū.] Officinæ Sigillum Mariæ, nel Salomonis di- Sigillum,
cunt, item genicularem & fraxinellam. Mariæ.

Pompholyx] Officinæ Tutiam nominant. codex Græcus Tutia.
σαρκώδες hoc est carnosus ulceribus, pro καρκινώδες habet.
Non aduerterunt Aristarchi nostri.

Propolis.] Vnguentarii Ceram uirgineam nuncupant.

Resinæ.] Dici non potest, quā interpretes Græcorū tum
antiqui, tum recentiores in arborum quæ resinas fundunt, no-
menclaturis euarient. E pinu dixi, quā Græci πεύκην uocāt,
hanc Marcellus Thedam exponit, quā ratione, ignoro Gaza;
Hermolaus pinū aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus uer-
sit. Resina è Strobilo, ut hæc etiam sit arbor. Nam Plinius de
pinu & pinastro agens, Eadem arbores alio nomine esse per
oram Italiæ, quas strobilas uocant, pleriq; arbitrantur, &c. Nota.
Eadem igitur arbor est strobilus, quæ Conos superius dicta
est, pineas nucs ferēs. Ruellius interpretatus est. Resinā Stro-
bilinam quæ ex nucibus pineis fiat, securus Pliniū, qui 16. lib.
inquit, pinus fert minimū Resinæ, interdum ex nucibus ipsis.
Itaq;

Itaq; cōfundunt hæc nomina πεύκη, κώνιν, τρόβιλον addit ē πύτιν, pro pinu, aut pinaistro, aut picea, cū inter se ēt uiribus respōdeāt, eoq; minus periculi est in expositionū diuersitate.

Rhus.] Officinæ sumach appellant.

Sagapenum.] Seplasiarij Serapinum uocant.

Sandaracha uera.

Sandaracha.] Officinæ ueram sandaracham non habent, aut saltē ignorāt, uernicē team uocantes. uera autē est, quæ in argēti fodinis cū auro & argēto inueniūt, flāmeo colore ruffescit, ita ut cinnabarim quasi referat, odore sulphuris uirus. Id qđ in auripigmēto rubrū est, uera est sandaracha, licetq; auripigmēto loco sandarachæ uti, cū idē quasi sint, simulq; alterum alteri iunctū ex fodinis colligātur. Hoc solū differunt, qđ auripigmentum nondū à natura perfectū sit: sandaracha autem per concoctionem naturæ, debitum colorem acceperit.

Seseli.] Tria sunt genera seselios, Massiliēse, Aetiopicū, & peloponnesiacū Massiliensis descriptio cōuenit cū nōstro, siliari mōtano, ut uocant uulgares, at quod officinæ ostendunt, Aethiopici semen uidetur, facillimum est, uerum comparare.

Affa odorata.
Affa foetida,

Sylphium.] Laserpitium herba est, Liquor Laser uocatur. Affertur partim ex aphrica, armenia, & india, suauissimo odore, præsertim cyrenaicū, unde etiam liquor Cyrenaicus apud autores uocatur, atq; hic officinis dicitur, affa odorata, seu belzuinū partim ex Media & Syria uiroso odore, qđ liquorū Medicū, & Syriacū nuncupant, officinæ uero, affam foetidam.

Ceterat,

Sisymbrium.] In Gallia officinæ mentam aquaticam appellant. In Italia Menta florentina uel menta gētilis aut nobilis Nā magis odoratū est. Nisi colať, in nepetā degenerat.

Scammonium.] Officinæ raro uerum habent.

Scolopendrium.] Seplasiarum Ceter ac existit.

Orosius.
Mirrha.

Scordion.] In fine sententiæ legitur in græco codice ἐπιπλαττόμενον, pro ἐπιπαττόμενον croco enim illini, sed inspergi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Orosius.

Myrrha.] Quam officinæ uendunt myrrham, est deterri-
ma species myrrhæ Optima subuirdis esse debet: cōfracta, cā dida unguiu modo. Legit in codice Græco male ἐπιπλατομένη, pro ἐπιπαττομένη. Nec hoc annotarunt censores nostri.

Aluminis species.

Solanum.] Vulgus Solatrum nominat.

Alumen.] alumen scissile officinæ uocant alumē plumę, nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, ueluti pluma esse

esse uideantur. Alumen rotundum raro in officinis inuenitur nonnunquam tamen inter singulorū lapides conspicitur, quibus uitis plumboq; mistis, uitrū paternū & laucium parant. Alumen liquidum, uocat se plaspia, rochæ alumen, cū foditur, liquidum est, postea durefcit: & si igni admoueatur rursus liquefcit. Quod placitū & latercularium à Galeno & Paulo nūcupatur, forte est officinarum alumē scziolæ, ex Gipsi fodinis, pellucens tanquā subtilissima ipsius portio. Sunt adhuc alia aluminis Genera in officinis, sed fictitia, Zuccarinum, quod ex alumine liquido aqua rosacea, & albumine oui conficitur. Mulieres hiuc fucum parant. Item alumen catinum ex herba quadam cali uulgo dicta, quæ autem sit adhuc ignoro.

Stryax.] Officinæ storax dicunt. Sed quam illæ uocant, sty racem liquidam uocant, myrrha est stacte. Calamitis autem storax, uerus styraç est de qua ueteres tractant. Stryax,
Stactæ.

Simphitum,] Variant sententiæ recentiorū in huius herbæ cognitione. Adiectum est in codice Græco γλισχρόν τι καὶ κνήσμιδες. Galenus habet γλισχρόν τι καὶ δακνῶδες, quod est uiscosum quippiam & mordax. Nota.

Scheni anthos.] Officinæ squinanthos corrupto uocabulo appellant, uerti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad differentiam quadrati seu angulosi. Sæpe autem alterum tantum adijcio, uel odorati, uel rotundi.

Calx.] Perperam in codice græco erat, συντείνει pro θερμαίνει hoc est calefacit. Oroscius nō aduertit, Gemulæus dissimulat ne id ante eum annotasse. Oroscius.

Tragus frumentaceus.] Ita dicitur, ut ab herba distingatur. Nam herba quædam etiam Tragos dicitur.

Altercū.] Deerat in codice græco τῶν ψυχόρων. Instaurauit ex Galeno. Oroscius libenter, omisit, & si necessario addatur, Gemulæus fingit se in exemplari antiquo inuenisse, sed textum tamen impressum, mutilum edidit.

Aes.] In siccioribus corporibus conuenire dicit ad cicatricem ducendam, Sin autem eluatur, in teneris ultima clausula, deerat in codice Græco, necessario addenda, pp superiore sniam, nempe in siccioribus, hoc est duris. Legendum itaq; uenit, εἰ δὲ πλυθῇ τῇ ἀπλότητι ἐπὶ τῶν ἀπαλασαρκῶν χρησιμώτερον. Ad uerbū fere ex Galeno. Nō obseruarūt cēsores nostri.

Chamædrys] Quasi dicas humilis quærcus, unde etiam uulgus,

Iua mu-
scata.

uulgi, querculam minorem appellat.

Chamæpitys.] Hoc est humilis pinus aut picea, officinæ Iuam muscatam uocant hanc antiquorum chamæpityn.

Chrysocolla.] Officinæ uocant Borax.

Ocymum.] Vulgo Basilicum dicitur.

IN IIII. CAPVT.

AD affectum induratum.] Recte dixit *μοχλεῖσθαι* quasi uerte quadam agitare. Male autem in codice græco *ἐσκηξῆσθαι* pro *ἐσκληξῆσθαι* neglexerunt castigatores.

Sed etiam à neruis & neruosis partibus.] Orosius diligens ut ipse sibi uidetur, castigator, legit in codice græco *ἀπὸ πλὴν-ξῶν*, quod est à costis aut latere ut idē uertit, pro *ἀπὸ νδρῶν*. Aetius & Oribasius nobiscum sentiunt.

Elaterium.] Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimū uidetur Dioscoridi, nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci *πρασίον* nominant.

Lathyrides.] Species Tithymali est. Capit hic Paulus Lathyrides pro ipsis granis fruticis, cum alioquin lathyris ipse frutex uocetur. Dioscorides & Aetius *σπέρματα* hoc est grana Lathyridis septem aut octo propinant.

Polypodium.] In Græco codice est *ἐπιπλοῦσα* pro *ἐπιπλοῦσα*. Nūn emendarunt Aristarchi nostri.

IN V. CAPVT.

COlocynthidis medullæ.] Hæc sunt Catapotia, quæ officinæ uocant Cochias. Deprauata autem est scriptura in codice Græco, habet enim *ἀλόης με.α.* hoc est, aloes pars una. Gale, unde Paulus transcripsit, lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos, *ἀλόης* habet *με.ω.* hoc est partes duæ. Castigatores omiserunt.

Purgatio ex malis cotoneis.] Nimis magnū uidetur pondus piperis, nempe unciæ sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes.] Habetur in compositione oliuarū colymbadum, scissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint. Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris infectas in eodem liquore aliquot diebus cōficito & utere. Catapotia ex lapide armenico.] Scammonie pondus erat nimis grande, unciæ sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur s. hoc est unciæ sex pro *το. S.* quid est semiuncia facilis

illis lapsus, cum quasi eadem literę utriusq; facies sit.

Vbi uenter inanitus.] In Gręco lege post κένωσιν, γατέ-
ρος. Nō fuit uersa in γατέρος, ὀβόλους dictio, ut putat Castiga-
tor Basiliēsis. Orosci⁹ hūc & superiorē locū prę studio omisit.

Puls.] In titulo est Gręce ὠδιδηκοῖς tu fac οἰδιδηκοῖς, quasi
œdematosis.

IN VII. CAPVT.

Frictione & medicaminum potu.] non purgantiū, sed ob-
tundentium uim medicaminis pręsumpti, intelligito.

IN VIII. CAPVT.

Mellis quod sufficit.] Post τὸ ἀρκῆν. In codice Gręco, ad-
de, ἄλλως. Hoc est aliter, omiserunt censores nostri.

Hiera Archigenis.] In Gręco cod. pro πολίε quidam φύλ-
λε legunt.

IN X. CAPVT.

Recipue induratis.] Melius in codice Gręco legitur τῶν
ἐσκληρωμένων pro τῶν ἀσκιζόμενων, quod est scyrrho ob-
ductis. Nam scyrrhus nūquam potest emolliri aut discuti, aut
medicamentis intro sumptis amoueri.

Apii radices.] Apios herba est, cuius radices alia pars sur-
sum, alia infra purgat, ne putes hic apium, quod gręci σέλινον
dicunt, intelligi.

Purgatio paulatim respondeat.] In Gręco est κατὰ λόγον,
fac tu κατ' ὀλίγον. neglexerunt castigatores.

IN XI. CAPVT.

Hedychroi.] Paulus ad uerbum quasi ex commētario Ga-
leni ad Pamphilianum transcripsit; sed exemplaria mirū
in modum uariant:

Carpobalsami.] Huc usq; conueniūt scripturę: Galenus
in citato libello Carpopalsamum non habet; uerum primo
de Antidotis, opobalsamum addit; non Carpopalsamum. Pre-
terea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis aliis simplici-
bus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita
pergit, lunci odorati floris drachmę duodecim, secūdū alios,
uigintiquatuor. Cinamomi drachmę duodecim, amomi: Ca-
sie, rhapōtici singulorū drachmę quindecim, nardi indicę, fo-
lij singul. drachmę sede cim, myrrhę, croci, singul. drachmę
duodecim, uino falerno excipito in opobalsamū manus intin-
gēs. Alia habet in cōmentario de Antidotis, sed uariat magis.

Pastilli

Pastilli scillini.] Carnis ipsius partes duæ, hoc est, ut Galenus ait drachmæ centum uiginti, erui farinæ drach. sexaginta.

Pastillorum Hedychroi.] Deest in Græco ἀγρίσκων. Antea uerteram magmatis hedychoi, secundum Galenū de Antidotis, quod Oroscius reprehendit sine causa.

Nota.

Rosarum siccarum drachmæ duodecim.] Textus Græcus habet. <.ιι. hoc est drachmæ quindecim. Oroscius castigās locum, ait legendum <.ιι. quod est drachmæ undecim. Ego <.ιβ. hoc est drachmæ duodecim, scribendum esse iudico Galeni exemplaribus tum de Antidotis, tum ad Pamphilianum, tum uersibus Andromachi consentientibus.

Napi seminit.] Galenus adiicit γογγύλιδος ἀγρίας, quod Oroscius. est Rapi syluestris, præterijt Oroscius.

Dictamni.] Post dictamni habetur in Græco ἀνθους, quod expungi debet. Oroscius ex Galeno.

Mastichæ Chiæ.] Pauli codex Chiæ non habet. Ex Galeno addendum.

Cassiæ nigrae.] Galenus Cassiæ fistulæ nigrae.

Nardi Indicæ.] Paulus ναρδοσάχους hoc est spicæ nardi, Sed Galenus ubiq; nardi indicæ habet, quanquam Aetios spicæ nardi etiam legat. Post nardi Indicæ, deest pondus in Græco <.S hoc est drachmæ sex.

Carpobalsami.] In Codice Græco tantum erat βαλσάμου. Ex Galeno inlaurandam καρποβαλσάμου.

Phu pōtici.] male legebat in Græco φε, ἀπύκ, π πς ποντικῆ.

Centaurii.] Omnes Theriacæ descriptiones apud Galenū habent κενταυρίον quod est centaurii tenuis.

Liquore hypocythidos.] Perperam in Græco ἐπυον ὑποκυθίδος pro ὀπον ὑποκυθίδος.

In nephriticis cū mulso.] Male Græcus codex habet ἐπὶ νεφρικῶν μετ' ὄξυ μέλιτος pro ἐπὶ νεφριτικῶν μετ' οἶνο μέλιτος, ex Galeno castigatum. Basiliensis castigator omisit.

Sumuntur uiperæ.] Ex libello Galeni de Theriaca ad Pamphilianū ad uerbū sunt trāscripta nisi quod deest in illo, apii.

Rutæ satiuæ seminis libra.] Paulus habet. β. hoc est sexta rii duo, male nimirū pro λιτῶν, ut habet Gale. omisit, Oroscius.

Malabathri foliorū.] Codex Pauli habet singulorū uncia. Galenus uncii quatuor. Ita ēt Aetius. Neglexit Oroscius.

Thymi summitatū.] Hic quoq; castigandus codex. Legendumq;

dumq; Γο.β. pro Γο.β. secundum Galenum & Aetium.

Piperis nigri, fœniculi singulorum libris.] Male in codice Græco Pauli λ.η. habet pro λ.β. sed facilis error erat, ponere ω. pro η primum signat β secundum, litteram ητα, quam Latini in e uertunt, ualet autem in numero, octo.

Tordyli montani.] Deest in codice Pauli, ex Galeno plane restituendum. Neglexerunt Orosius, & Gemusæus, tanquam non addenda compendio.

Philonis antidotum.] In Græco est υοσκυάμη η. ubi legendum υοσκυάμου < .η. quod præterierunt Aristarchi nostri.

Esdra.] in fine compositionis quidam legunt σερέως hoc est iutybi pro σεσέλεως.

Medicamentum Cyphoides.] Textus Græcus & mutilus, & deprauatus est. Legendum enim καλαμου < .β. S. βδελλίς < .β. S. κασσίας < .α. κινάδου τριώβολον, νάρδου στάχυος < .γ. σχοίνου άνθους < .β. S. Orosius & castigator Basiliensis reliquerunt textum deprauatum.

Compositio atactos, Piperis albi & nigri.] Deest in codice Græco πίπερεως. Orosius omisit.

IN XII. CAPVT.

Terra samia cū cremore ptisanæ.] In Græco est διαχυλῆ πτίσανης, forte μετὰ χυλῆ. Notauit etiam Orosius, Gemusæus autem omisit.

Herbæ pulicaris succo.] In fine capitis puto Græcū codicē esse deprauatū, quā proxime aut licuit, ad ueritatē cōuerti.

IN XVI. CAPVT.

Siquidem uino, aut succo.] Codex Græcus hic rursus deprauatus est. Habet enim .εἰ μὴ οἶνω ἢ χύλω τινὶ λεικῶντε καὶ τριῖβειν, &c. pro εἰ μὲν οἶνω καὶ τριῖβειν δεῖ αὐτὰ. Neglexit castigator Basiliensis.

Leſio Gre
ca deprauata.

IN XVII. CAPVT.

Oesypo.] In principio Capitis Græcus codex habet, υσώπω, pro οἶσυνω hoc est Oesypo. Aristarchi nri præterierūt.

Lixiui è ficu cui calx.] Græci hoc lixiuium uocant κοῖτον πρωτότακτον Orosius, aliq, multi uertunt, lixiuium quod primum distillauerit, Paulus autem lib. 7. ipse interpretatur, lixiuium cui calx sit admista.

Orosius,

Emplastrum ex dictamno.] Textus Græcus deprauatus corrigi debet ex Galeno de compoſi. medicamentorū secundum

dum genera in hunc modū λεπίδος < S. χαλκῷ κεκαίμενου
 < .η. ἁλοῦς. < .η. χαλβάνης. < .β. ut nos uertimus.

Aristolochiæ rotundæ & longæ drachmæ quatuor.] In em
plastro dia cinnabareos codex Græcus habet post pōdus præ
scriptum Ro.S. quod est semuncia. Sed quatuor drachmæ ua
lent semuncia, puto superfluum Neglexerunt Castigatores.

Olei ueteris.] In fine Emplastri ex lapidis asij flore. Græcus codex superflue habet ὀξὺς δρυμῖτάτου. Nam superius in mentionē aceti fecerat Paulus. Oroscius & Gemus. omiserunt:

IN XVIII. CAPVT.


Sertulæ cāpanæ.] In malagmate polyarchio, Deest μελιλί-
τῆ. Instauratum ex Galeno. Neglexerūt hoc correctores.

Pentamyron. In medicamento quædam sunt superflua, & nomen ipsum Græcum indicat, quinque tantum significans, & Oribasius consentit. Ita autem sonant ea quæ adijciuntur, folia tum, phylli uncia tres, aminoniaci uncia: Cassiæ uncia sex, Ladani, &c. aut in fine addendum, ladant uncia sex.

Seui Taurini] In medicamento diaspermaton deest co-
dici græco λ.γ. Vt sit seui Taurini libra. Sic etiam habet Ale-
xander medicus, omisit Oroscius & castigat Basiliensis.

Copton.] Sic dicitur medicamentum, quod nō coquitur, uerum tunditur, & succis aut liquidus affusis, ad figuram maelagmatis redigitur.


FINIS LIBRI VLTIMI
COMMENTARIORVM.



REGISTRVM.

* * * * * a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z,
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z,
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh.

Omnes sunt quaterniones,



REGISTRVM.
* * * * * abcdefghiklmno
ABCDEFGHIJKLMN O P Q R
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg
Библиотека Императорской Академии наук
Древн. кн. Е. В. Р.
Олденбургская
Omnes sunt quaterniones,


VS

1. *quodammodo*
 2. *quodammodo*
 3. *quodammodo*
 4. *quodammodo*
 5. *quodammodo*
 6. *quodammodo*
 7. *quodammodo*
 8. *quodammodo*
 9. *quodammodo*
 10. *quodammodo*
 11. *quodammodo*
 12. *quodammodo*
 13. *quodammodo*
 14. *quodammodo*
 15. *quodammodo*
 16. *quodammodo*
 17. *quodammodo*
 18. *quodammodo*
 19. *quodammodo*
 20. *quodammodo*
 21. *quodammodo*
 22. *quodammodo*
 23. *quodammodo*
 24. *quodammodo*
 25. *quodammodo*
 26. *quodammodo*
 27. *quodammodo*
 28. *quodammodo*
 29. *quodammodo*
 30. *quodammodo*
 31. *quodammodo*
 32. *quodammodo*
 33. *quodammodo*
 34. *quodammodo*
 35. *quodammodo*
 36. *quodammodo*
 37. *quodammodo*
 38. *quodammodo*
 39. *quodammodo*
 40. *quodammodo*
 41. *quodammodo*
 42. *quodammodo*
 43. *quodammodo*
 44. *quodammodo*
 45. *quodammodo*
 46. *quodammodo*
 47. *quodammodo*
 48. *quodammodo*
 49. *quodammodo*
 50. *quodammodo*
 51. *quodammodo*
 52. *quodammodo*
 53. *quodammodo*
 54. *quodammodo*
 55. *quodammodo*
 56. *quodammodo*
 57. *quodammodo*
 58. *quodammodo*
 59. *quodammodo*
 60. *quodammodo*
 61. *quodammodo*
 62. *quodammodo*
 63. *quodammodo*
 64. *quodammodo*
 65. *quodammodo*
 66. *quodammodo*
 67. *quodammodo*
 68. *quodammodo*
 69. *quodammodo*
 70. *quodammodo*
 71. *quodammodo*
 72. *quodammodo*
 73. *quodammodo*
 74. *quodammodo*
 75. *quodammodo*
 76. *quodammodo*
 77. *quodammodo*
 78. *quodammodo*
 79. *quodammodo*
 80. *quodammodo*
 81. *quodammodo*
 82. *quodammodo*
 83. *quodammodo*
 84. *quodammodo*
 85. *quodammodo*
 86. *quodammodo*
 87. *quodammodo*
 88. *quodammodo*
 89. *quodammodo*
 90. *quodammodo*
 91. *quodammodo*
 92. *quodammodo*
 93. *quodammodo*
 94. *quodammodo*
 95. *quodammodo*
 96. *quodammodo*
 97. *quodammodo*
 98. *quodammodo*
 99. *quodammodo*
 100. *quodammodo*

no. Deest ad
hoc correctores.
line superius, &
in significas, &
ad adiungunt so
liliz uoce sex,
& sex.
non deest co
m habet Ale
Bathensis.
no coquitur,
figuram ma

11

1234

10592

